

334  
N. M.

JAHRBÜCHER

DES

NASSAUISCHEN VEREINS

FÜR

NATURKUNDE.

---





N 266

# JAHRBÜCHER

DES

# NASSAUISCHEN VEREINS

FÜR

# NATURKUNDE.

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. ARNOLD PAGENSTECHER,

KÖNIGL. GEH. SANITÄTSRATH, INSPECTOR DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS UND  
SECRETÄR DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE.

---

JAHRGANG 49.

MIT 4 LITHOGRAPHIRTEN TAFELN.

---

WIESBADEN.

VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1896.

JAHRBÜCHER

DES

NASSAUISCHEN VEREINS

FÜR

NATURKUNDE

HERAUSGEGEBEN

Die Herren Verfasser übernehmen die Verantwortung  
für ihre Arbeiten.

DR. ARNOLD FACHENSTADT

VERLAG VON CARL RITTER IN WIESBADEN

JAHRGANG 1891

MIT 4 LITHOGRAPHIRTEN TAFELN

WIESBADEN

Druck von Carl Ritter in Wiesbaden.


1891



# Inhalt.

	Seite.
<b>I. Vereins-Nachrichten.</b>	
Protokoll der Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde vom 15. December 1895 . .	IX
Jahresbericht, erstattet in der Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde am 15. December 1895, von <b>Dr. Arnold Pagenstecher</b> , Kgl. Sanitätsrath, Museumsinspector und Secretär des Nass. Vereins für Naturkunde .	X
Bericht über die am 3. Mai 1896 in Geisenheim abgehaltene Sectionsversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde . . . . .	XVII
Nekrolog . . . . .	XXII
Verzeichniss der Mitglieder des Nassauischen Vereins für Naturkunde im September 1896 . . . . .	XXIII
<b>II. Abhandlungen.</b>	
Chemische Untersuchung der Thermalquelle des Augusta-Victoria-Bades zu Wiesbaden. Von Geh. Hofrath Prof. <b>Dr. R. Fresenius</b> und <b>Dr. Ernst Hintz</b> zu Wiesbaden . . . .	3
Das Leben einer Welt. Vortrag, gehalten in der Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde am 15. December 1895 von Oberlehrer <b>J. Klau</b> (Wiesbaden) . . . . .	25
Zur Geologie der Loreleigegend. Von stud. geol. <b>Alexander Fuchs</b> , z. Z. in Marburg. (Vorläufige Mittheilung.) . . . . .	43
Die Mollusken-Fauna der makaronesischen Inseln. Von <b>Dr. W. Kobelt</b> (Schwanheim) . . . . .	53
Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Von <b>Dr. L. von Heyden</b> , Königl. preuss. Major a. D. (Siebenter Nachtrag.) . . . .	71

	Seite.
Beiträge zur Lepidopteren-Fauna des Malayischen Archipels. (XI.) Ueber die Lepidopteren von Sumba und Sambawa. Von <b>Dr. Arnold Pagenstecher</b> (Wiesbaden.) (Hierzu Tafel I, II u. III.) . . . . .	93
Beitrag zur Kenntniss der Rhopalocerenfauna der Insel Bawean. Von Hofrath <b>Dr. B. Hagen</b> (Homburg, Pfalz). Mit Tafel IV . . . . .	171
Im erwachenden Lenze. Von <b>W. Caspary II.</b> , Lehrer in Wiesbaden	189
Nachtrag zu dem im vorigen Bande der Jahrbücher erschienenen Verzeichnisse fossiler Wirbelthiere von Mosbach von <b>Aug. Römer</b> . . . . .	232
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Station zu Wiesbaden im Jahre 1895. Von <b>Aug. Römer</b> , Conservator . . . . .	233



I.

# Vereins-Nachrichten.

---





# Protokoll

der

Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde  
vom 15. December 1895.

---

In Vertretung des durch Unwohlsein an der Theilnahme an der Versammlung verhinderten Herrn Vereins-Directors, Regierungs-Präsident von Tepper-Laski, eröffnete der Vereinssecretär Sanitätsrath Dr. Arnold Pagenstecher die zahlreich, insbesondere auch von Gästen und Vertretern benachbarter Vereine, besuchte Versammlung mit einer herzlichen Begrüssung. Herr Geh. Hofrath Dr. R. Fresenius übernahm als langjähriges Ehrenmitglied und früherer Director den Vorsitz und gab zunächst dem Vereinssecretär das Wort zur Erstattung des Jahresberichts über das verflossene 66. Vereinsjahr. (S. Anhang.)

Es folgte darauf die Neuwahl des Vorstandes durch Acclamation des bisherigen, welcher hiermit das Amt auf weitere zwei Jahre übernimmt.

Zum Schlusse hielt Herr Gymnasialoberlehrer Klau einen hochinteressanten Vortrag über »Das Leben einer Welt.«

Ein zahlreich besuchtes Festessen vereinigte Mitglieder und Freunde des Vereins in den Räumen des Casino's.

Der Vereinssecretär:

Dr. A. Pagenstecher.

---

# Jahresbericht

erstattet in der

Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde  
am 15. December 1895,

von

**Dr. A. Pagenstecher**, Königl. Sanitätsrath,  
Museumsinspector und Secretär des Nassauischen Vereins für Naturkunde.

---

Meine Herren! Der Bericht über das 66ste Vereinsjahr wird Ihre gütige Aufmerksamkeit nicht allzulange in Anspruch zu nehmen haben.

Die zwischen unserer letzten gemeinsamen Zusammenkunft an diesem Orte und heute liegende Zeit hat in unsern gewohnten Verhältnissen keine wesentlichen Aenderungen hervorgerufen.

Wenn ich mir einen Vergleich erlauben darf, so vermag ich auch heute den Vorhang vor einer blühenden, von lebendigem Strome durchflossenen Landschaft aufzuziehen, in welcher eifrige und fleissige Bewohner die lohnenden Früchte des Feldes zu säen und zu ernten bestrebt gewesen sind. Unser Verein sucht ja seine Thätigkeit nicht im politischen Gebiete, sondern in dem Frieden der Natur, unter den lebenden, wie verstummtten Zeugen derselben und in der stillen Studirstube durch jenen geistigen Verbindungsstrom, der die Centrale des menschlichen Empfindens mit der uns umgebenden Natur verbindet.

Es ist natürlich, dass innerhalb unsers Vereins, welcher über eine stattliche Zahl von Mitgliedern gebietet und ein hervorragendes naturhistorisches Museum unter seiner Verwaltung hat, sich Mancherlei vollzieht, was der Erwähnung am heutigen Tage nicht unwerth erscheinen mag.

Erlauben Sie mir daher zunächst einige Worte über unsere Mitgliederbewegung. Sie folgt naturgemäss den allgemeinen Gesetzen



der menschlichen Gesellschaft und jener, welche für einen Verein massgebend sind, welcher seine Hauptverbindungen unter der wissenschaftlichen Welt zu suchen hat. Leider ist es nicht zu erkennen, dass die dermalen herrschenden allgemeinen Lebensbedingungen, dass die gesteigerten Anforderungen auf allen Gebieten des öffentlichen Seins die Opferwilligkeit für wissenschaftliche Zwecke zu lähmen geeignet sind. Ebenso, wie andere Vereine gleichen Charakters, müssen auch wir froh sein, wenn es uns gelingt, unsern Besitzstand zu behaupten, Wir richten daher an alle unsere Mitglieder die dringende Bitte, dahin thätig sein zu wollen, dass die unvermeidlichen Lücken durch den Beitritt neuer und namentlich junger wissenschaftlich thätiger Männer ersetzt werden.

Auch in diesem Jahre haben freiwilliger Austritt, zumeist wegen Wegzugs von hier, sowie der unerbittliche Vernichter alles menschlichen Daseins die Zahl unserer Mitglieder herabgemindert.

Ihren Austritt erklärten die Herren; Dr. med. Brauns, Geh. Rath Flach, Professor Hesse, Hauptagent Marcus, Apotheker Neuss, Rentner van Sasse, Bibliotheker Dr. Schalk, Director Dr. Schmitt, Rentner Tölke, Dr. med. Wiegand und Maler Wichgraf zu Wiesbaden.

Es traten demgegenüber ein: die Herren: Dr. med. Bastelberger (Eichberg) Dr. med. Coester, Dr. phil. Grünhut, Dr. med. Landow, Baurath Licht, Dr. med. Lossen, Apotheker von Meyerling, Apotheker Nagel, Dr. med. Witkowski dahier, sowie Landrath Steinmeister zu Höchst, Rentner Suffert zu Berlin und Eisenbahnbeamter Preiss in Ludwigshafen a/Rhein.

Durch den Tod verlor der Verein mehrere hervorragende Mitglieder, zunächst das an Jahren älteste, den früheren nassauischen Reg.-Präsidenten Winter zu Elmshausen bei Biedenkopf, welcher das hohe Alter von über 90 Jahren erreichte. Zu Leipzig verschied Herr Geh. Commerzienrath Dodel, welcher lange Jahre hindurch unserm Verein treue Anhänglichkeit bewahrt und dem Museum mehrfach werthvolle Zuwendungen gemacht hatte. In Wiesbaden verstarb Herr Professor Dr. Borgmann, der ebenfalls ein treues Mitglied war, so lange es ihm seine zuletzt schwankende Gesundheit gestattete.

Mit unserm Verein verlor die gesammte gebildete Welt einen ihrer besten Vertreter, Exc. Gustav Freytag, den berühmten Schriftsteller, welcher den Abend seines Lebens so gern in den gastlichen Mauern unserer Stadt zubrachte und welchem die Naturwissenschaften, insbe-

sondere die Conchyliologie, die Quelle der Erholung und des reinen Genusses waren. In Bonn entriß uns der Tod Herrn Professor Dr. Bertkau, den verdienstvollen Herausgeber naturwissenschaftlicher Schriften, insbesondere der entomologische Jahresberichte. — Endlich verstarben noch die Herren: Kreisphysikus Dr. Ebertz in Diez, Rentner Knüttel in Stuttgart, sowie der junge Zoologe Schreiber; Schreiner Hecker und Dr. med. Letzerich zu Wiesbaden. Wir widmen den aus unserm Kreise Dahingeschiedenen ein ehrendes Andenken, zu dessen Zeichen sie von Ihren Sitzen sich erheben wollen. —

Wie in früheren Jahren, so haben sich auch in dem vergangenen viele unserer Mitglieder zu verschiedenen lohnenden Ausflügen in unsere Umgebung vereinigt.

Die unter der vortrefflichen Leitung unseres Vorstandsmitgliedes, Herrn Apothekers Vigner, sowie des Herrn Lehrers Leonhardt stehenden botanischen Excursionen sind auch in diesem Jahre mehrfach ausgeführt worden und gebührt den genannten beiden Herren der lebhafteste Dank des Vereins.

Im Frühjahr unternahmen wir einen Besuch der Kalle'schen Farbfabriken in Biebrich a/Rh., wobei der Herr Besitzer, sowie seine Angestellten in der liebenswürdigsten und dankenswerthesten Weise uns die interessanten Einrichtungen der Fabrik, wie ihrer Producte vorzuführen und den zahlreichen Teilnehmern einen höchst instructiven Nachmittag zu verschaffen wussten.

Ein weiterer Ausflug galt dem berühmten Palmgarten in Frankfurt a/M., welcher sich durch die überaus bereitwillige Güte des Herrn Directors Siebert daselbst für alle Theilnehmer zu einem sehr lohnenden gestaltete.

Im Herbst wurden nach gütiger Zusage der Direction der Höchster Farbwerke die dortigen Anstalten zur Gewinnung des Diphtherie-Heiserns von einer grossen Zahl von Mitgliedern und Theilnehmern in Augenschein genommen. Herrn Sanitätsrath Dr. Liebbertz, welcher die nöthigen Erläuterungen gab, sowie den Herren des Comités zu Höchst, Herrn Landrath Steinmeister und Herrn Dr. von Brüning, sei ein besonderer Dank an dieser Stelle für die gelungene Veranstaltung gesagt.

Unsere wissenschaftlichen Abendunterhaltungen im Casino haben in gewohnter Weise begonnen und tragen wesentlich zur Erfüllung der unserem Verein gestellten Aufgabe bei, naturwissenschaft-

liche Kenntnisse zu verbreiten. Dankend muss ich hervorheben, dass die verschiedensten Mitglieder sich bereit haben finden lassen, über Gegenstände ihres Studiums und ihrer Erfahrungen zu referiren. Unser Mitglied, Herr Dr. med. W. Kobelt von Schwanheim, hatte die grosse Güte, im Museumsaale einen zahlreich besuchten und dankbarst aufgenommenen Vortrag über das Thema: »Wie alt ist unsere Erde?« zu halten, wofür wir ihm ebenfalls zu grossem Danke verpflichtet sind.

Die wissenschaftliche Durchforschung unseres Vereinsgebietes ist wie in botanischer, so besonders in entomologischer Beziehung thätig gewesen. Leider sind die übrigen Gebiete dermalen etwas seitens unserer Mitglieder vernachlässigt, obwohl auch in ihnen noch manche wichtige Beobachtungen und Erfahrungen sicherlich zu machen wären. Hoffentlich ändert sich dies in kurzer Frist.

Einen Theil der Forschungen unserer Mitglieder finden Sie in dem diesjährigen Jahrbuche niedergelegt, welches bereits in Ihren Händen ist und wohl nicht verfehlen wird, mit seinem reichen Inhalt und den künstlerisch ausgestatteten Tafeln sich Freunde zu erwerben und auch in auswärtigen Kreisen zu bekunden, dass innerhalb unseres Vereins eine rege naturwissenschaftliche Thätigkeit sich geltend macht. Wie Ihnen bekannt ist, stellen die Jahrbücher einen wichtigen Factor für unsere Verbindung mit den übrigen naturwissenschaftlichen Vereinen dar und unsere Bibliothek erhält durch den dadurch ermöglichten Tauschverkehr alljährlich grossen und wichtigen Zuwachs. Sie finden denselben, soweit er bis Juli d. J. erfolgt war, im Jahrbuch in einem Nachtrag zum Cataloge verzeichnet, welchen Herr Conservator Römer mit gewohntem Eifer und Fleiss zusammengestellt hat. Mit Juli sind wieder eine grosse Zahl neuer Eingänge zu jenen bereits catalogisirten und in die Bibliothek eingereihten Schriften hinzugekommen und wir stehen abermals vor der schon oft ventilirten Frage der Schwierigkeit der Unterbringung unserer Schätze. Die ständige Klage von der Unzulänglichkeit der uns zugewiesenen Räume will ich nicht wieder ausführlich wiederholen und begründen, um Sie nicht durch Ihnen zu häufig genug vorgebrachte Dinge zu ermüden. Ich muss Ihnen nur mittheilen, dass unsere Hoffnung auf Besserung der Verhältnisse, die durch eine bereits im Januar hier stattgehabte Conferenz eines aus Berlin gekommenen hohen Ministerialbeamten mit der hiesigen Behörde wieder angefacht worden war, bis jetzt nicht erfüllt worden ist. Möge die Frage, die ja neuerdings von anderer, ebenfalls im Museum vertretener

Seite, wieder angeregt worden ist, im Schoosse der betheiligten Behörde eine erneute Förderung finden!

Was unsere naturhistorische Sammlung anbelangt, so hat sich Herr Conservator Römer neben der alljährlich sich wiederholenden Conservationsarbeiten mit der Aufstellung und Einordnung der im vergangenen Jahre angekauften Sandberger'schen Conochylii und Petrefakten-Sammlung beschäftigt. Bis jetzt sind die Land- und Süßwasser- wie die meerischen Conochylii geordnet aufgestellt. Eine Abtheilung enthält hauptsächlich die Originale und Varietäten, welche in dem Sandberger'schen Werke über die Land- und Süßwasserconchylien der Vorwelt aufgeführt sind. Eine zweite enthält alle Arten, welche in die Museumssammlungen einzureihen sein werden. Leider ist Herr Conservator Römer durch Krankheit in der Vollendung der Arbeiten gehindert worden.

Von neuen Erwerbungen durch Ankauf habe ich Ihnen den prächtigen Schädel eines Wallrosses, *Trichechus rosmarus* Linné, Grönland zu erwähnen. Die gleichzeitig von Hamburg uns angebotene Erwerbung von ganzen Häuten und Skeletten mussten wir aus bekannten Gründen ablehnen. Des Weiteren erwarben wir eine interessante geologische Reliefkarte der Umgegend von Wiesbaden.

An Geschenken erhielten wir:

1. Missgeburt eines Hasen (*Lepus timidus* L.) von Herrn Rentner Ostermann.

2. *Ardea cinerea*, grauer Reiher ♂ von Herrn Landwirthschafts-inspector Schulze-Rössler in Westerburg. Geschossen am Secker Weiher.

3. Von der Curhausdirection:

a) *Buteo vulgaris* L. Mäusebussard aus den Anlagen dahier.

b) *Cygnus nigricollis* L. Schwarzhalsigen Schwan. Jugendzustand.

c) *Cygnus atratus* Schwarzer Schwan.

Von Herrn Professor Dr. H. Fresenius erhielten wir Kalksteine von Niederbrechen als Belegstücke vorgenommener Analysen.

Von Herrn Alexander Meyer dahier erhielten wir ein in einem Hühnerei vorgefundenes kleines Ei.

Von Herrn Apotheker Nagel mehrere Arten von Versteinerungen von Bielefeld.



Ganz besonders werthvoll ist die reiche Schenkung von ethnographische Gegenständen bes. von Sumatra, welche Herr Rittmeister Boeck dahier die Güte hatte, unserem Museum zu überreichen. Wir sind dem Herrn Rittmeister zu ganz besonderem Danke verpflichtet für diese Zuwendung, welche unser bisher sehr kleine ethnographische Sammlung so ansehnlich vermehrt mit einer stattlichen Suite interessanter und werthvoller Gegenstände.

Auch für die Bibliothek haben wir werthvolle Geschenke zu verzeichnen. Ich nenne die uns in jüngster Zeit von den Herren Verfassern, unseren Mitgliedern, uns überreichte Schriften des Herrn Oberforstmeister Borggreve und Dr. med. van Nissen.

Unsere Jahresrechnung für 1893/94 hat der Prüfung der kgl. Regierung, sowie der Oberrechnungskammer zu Potsdam unterstanden. Sie ist uns ohne Notate zurückgesandt und dem Rechner Decharge ertheilt worden.

Der Vorstand legt heute nach zweijähriger Amtsführung sein Mandat in Ihre Hände zurück. Es ist die Aufgabe der heutigen Generalversammlung, denselben aufs Neue zu constituiren und haben Sie zu dem Ende den Herrn Vereinsdirector, die Sectionsvorsteher und Beiräthe zu wählen. Bisher haben diese Aemter verwaltet Herr Reg.-Präsident von Tepper-Laski als Director, Herr Duderstadt als Vorsteher der mineralogischen Section und Vereincassirer, Dr. Dreyer als Vorsteher der zoologischen Section, Apotheker Vigner als Vorsteher der botanischen Section, und als Beiräthe haben fungirt die Herren Professor Dr. H. Fresenius, Dr. L. Cavet und Dr. L. Kaiser.

M. H. Ich komme zum Schlusse.

Gestatten Sie mir, Ihnen nochmals die Sorge für unsere Vereinsbestrebungen recht warm ans Herz zu legen.

Die Erforschung der Natur, dieses grossen Gedankens des Schöpfers, wie der Dichter sagt, ist ja eine Aufgabe, bei der sich trotz aller Fortschritte, wie bei jeder wissenschaftlichen Forschung, stets neue Fragen ergeben. Wir stehen vor einem gewaltigen Bau, in welchem sich alle Theile nach bestimmten Gesetzen aneinander reihen, seien es die grossen Himmelskörper, die sich im Aether des Weltraumes bewegen oder seien es die uns näher stehenden Bewohner unseres Planeten. An der tausendjährigen Eiche, die mit ihrem stolzen hochragenden Wipfel dem Wüthen des Sturmes widersteht, wie an dem winzigen Insecte, das an ihrem

Füsse im schwellenden Moose sein eintägiges Dasein verträumt, sind dieselben ewigen Gesetze des Werdens und Geschehens thätig, wie in dem Blut, das die Adern unseres angestaunten und doch so leicht in Staub und Asche zerfallenden Ichs durchströmt und den Nervenzellen unseres Gehirns neue Nahrung zuführt. Wohl hebt sich das denkende Auge des Menschen hinauf zu den strahlenden Sternen, wohl durchforschen unsere Gedanken in ungehemmtem Fluge Raum und Zeit: die Lösung der letzten Fragen in der unendlichen Natur ist, wie diese selbst — unendlich.

Für die Natur gilt das oft citirte Wort unsers Altmeisters Göthe:

»Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit,  
Und jeder Schritt ist Unermesslichkeit.«

---

# Bericht

über die

am 3. Mai 1896 in Geisenheim abgehaltene Sectionsversammlung des  
Nassauischen Vereins für Naturkunde.

---

Geisenheim, den 3. Mai 1896. Die diesjährige Sectionsversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde fand in der Königlichen Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau statt. Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher eröffnete die Sitzung und begrüßte die zahlreich erschienenen Damen und Herren, worauf, nachdem auch Herr Oeconomierath Director Goethe die anwesenden Vereinsmitglieder begrüßt hatte, zunächst Herr Weinbaulehrer Zweifler seinen Vortrag hielt:

»Mittheilungen über den gegenwärtigen Stand der Beerenweinbereitung.« Redner betonte zunächst die hohe Bedeutung des Beerenweins als Frühstückweins gegenüber den Südweinen und erläuterte als ersten Punkt alsdann die Zusammensetzung der Beerensäfte im Vergleich zu derjenigen des Weines. Bei den Beerenweinen sei der Zuckergehalt bedeutend geringer als im Traubenmost, ja zuweilen sogar geringer als im Apfel- und Birnmoste. Noch grösser sei aber der Säuregehalt der Beerenmoste. Zucker und Säuren seien also in demselben in einem ungünstigen Verhältnisse vorhanden und es könnten nur durch Zusatz diese Nachtheile aufgehoben werden, um dadurch ein geniessbares Product zu gewinnen. Der Zusatz von entsprechenden Mengen Zucker und Wasser sei daher immer nothwendig; müsste sich aber natürlich nach dem Zucker- und Säuregehalt der betreffenden Säfte richten. Nach sehr zahlreichen Versuchen hätte sich in der Anstalt eine schon in den sechsziger Jahren bekannte Vorschrift zur Bereitung der verschiedenen Beerensäfte als die beste erwiesen. Nach dieser »Geisenheimer Vorschrift« würden auf 1 Ltr. Saft, 2 Ltr. Wasser

mit 1 Klgr. Zucker verdünnt. Scheinbar sei ja dabei der Wassergehalt ein grosser, aber bei jeder Abänderung des angegebenen Wasserquantums würde der Säuregehalt zu hoch und der Geschmack sowie die Vergärung litten dabei ganz wesentlich. Alle Weine, welche aber nach diesem Recepte hergestellt wurden, zeichneten sich durch hohen Alkoholgehalt, grosse Süsse und ausgezeichnete Haltbarkeit aus. — Redner ging nunmehr zum 2. Punkte seines Vortrags über: Die Behandlung des gegorenen Weines. Die Anwendung guter Reinhefe vorausgesetzt, sei die Behandlung zur Herstellung eines guten Beerenweines auch in diesem Punkte sehr einfach und leicht, da der hohe Alkoholgehalt vor Verderben desselben schütze, und schnelle Reife herbeiführe, wodurch dann andernteils wieder der Process der Gärung bis zum »Klarwerden« in viel kürzerer Zeit erfolge als beim Rheinweine. Am raschesten sei in dieser Beziehung der Stachel-, Johannis-, Erdbeer- und Heidelbeerwein vergoren. Kleinere Quantitäten Beerenweine lasse man am besten in Glaskolben oder Korbflaschen vergären. Fässer mit weniger als 300 Ltr. Inhalt könnten nicht empfohlen werden, weil sie den Luftzutritt und das Verdunsten des Alkohols begünstigen, wodurch wieder neue Gärung angeregt wird und dadurch der Zucker verschwindet, ohne dass der Alkohol sich vermehrt hat. Beim Abfüllen in die Flaschen müssen recht gute Korkstopfen Verwendung finden und es sind dieselben mit flüssigem Parffin zu überziehen, damit keine Pilze einzudringen vermögen. Ausserdem ist der Stopfen noch mit geglühtem Draht oder starken Bindfäden zuzubinden, um eine etwaige Selbstentkorkung zu verhindern. Die Flaschen sind dann liegend aufzubewahren, um die Stopfen feucht und luftdicht zu erhalten.

Redner schloss mit dem Hinweis: Würden auf diese angegebene Weise die Beerenweine bereitet und behandelt, so könnten sie die teuren Südweine, die noch oft mit Rosinen versetzt sind, als vorzügliche Frühstückswine vollständig ersetzen. Die nach diesem sehr interessanten und mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag verabreichten, zahlreichen Proben wurden von allen Mitgliedern hoch geschätzt und dem Redner herzlicher Dank ausgesprochen. —

Herr Obstbaulehrer Mertens sprach hierauf über »das Einmachen von Obst und das Einlegen desselben in Gefässe.« Redner betonte zunächst, welch ein hoher Gewinn für die gesammte Obstverwerthung erzielt würde, wenn wir die Früchte so erhalten könnten, wie sie die Natur darbiete, wenn auch nach der Conservirung die



Gestalt und das Aroma so bliebe, dass sich solche Früchte ganz wesentlich von Gelée unterschieden. Es sei ein Vorurtheil, wenn man annehme, dass nur die Fabriken die Kunst verstünden, die Früchte nach erwähnten Gesichtspunkten zu conserviren. Das Einmachen derselben sei nicht allzuschwer und gelänge, wenn nachfolgende 2 Bedingungen erfüllt würden: Man Sorge zunächst für luftdicht schliessende Gefässe. Als solche könnten die Einmachgläser von Regierungsbaumeister Schiller in Godesberg empfohlen werden, die Redner vorzeigte und eingehend erklärte. Der Ankaufspreis stelle sich bei einem Halbliterglas auf 0,40 Mk. und bei einem Literglas auf 0,56 Mk. Allerdings seien solche Gläser leicht zerbrechlich und deshalb habe man schon in früheren Jahren Blechdosen verwendet. Bei Anwendung solcher Dosen sei es aber umständlich und schwierig gewesen, vom Spengler abhängig zu sein, der die Dosen zulötete und womöglich auch wieder zu öffnen hatte. Um auch diesem Uebelstande abzuhelpen, habe neuerdings E. Böse & Comp. in Berlin (Landsbergerstr. 67) eine Blechdose construirt, welche durch umgeberkelten Rand und einen Gummiring ohne Hilfe des Spenglers leicht und luftdicht geschlossen und wieder geöffnet werden könnte. Das Dutzend von diesen Blechdosen stellte sich auf 6 Mk. — Man Sorge dann 2., für angemessenen Zuckerzusatz. den Redner für die einzelnen einznmachenden Früchte angab und der durchschnittlich so hergestellt würde, dass man auf 1 Klgr. Zucker, 1 Liter Wasser nehme. — Man wende dann 3. beim Kochen den hinreichenden Hitzgrad an, um alle Pilze zu töten und die Früchte geniessbarer zu machen. Dazu seien etwa 105 Grad Cels. nöthig. Zunächst müssten die Gefässe gründlich ausgekocht und dann geschwefelt werden. Die Früchte würden nicht ganz reif eingelegt. Empfehlenswerth sei es, die Früchte nicht am Morgen früh abzupflücken, weil sie alsdann durch den Tau zu nass geworden sind. Dabei dürfen sie nicht abgewaschen, sondern sie müssen trocken abgewischt werden. Nachdem dann die Früchte von den Stielen befreit sind, wird Frucht an Frucht in das Gefäss eingelegt und angedrückt. Erst wenn so das Gefäss mit Früchten gefüllt ist, wird die Zuckerlösung sehr vorsichtig aufgegossen. Unter dem Deckel muss etwas Luft bleiben. Nunmehr werden an einem Kordel die betreffenden Dosen in lauwarmes Wasser eingesenkt und zum Kochen gebracht. Die Kochzeit beträgt je nach der Grösse der Gefässe 7—20 Minuten. So brauchten z. B. Himbeeren im Halblitergefäss 7 Minuten, im Litergefäss 10—15 Minuten, d. h.

von dem Augenblick an gerechnet, wo das Wasser zu kochen beginnt. Die Abkühlung müsse dann langsam erfolgen. Redner erwähnte dann noch kurz wie man Dunstobst rasch conserviren könne durch Anwendung von Krügen wie sie K. J. W. Ströder in Mogendorf herstellt zum Preise von

$\frac{1}{2}$	Ltr. zu	0,14 Mk.
$\frac{3}{4}$	» zu	0,16 Mk.
1	« zu	0,20 Mk. das Stück.

Bei diesem Verfahren würden die verschlossenen Krüge gleich in kochendes Wasser versenkt und die  $\frac{1}{4}$  Ltr. Krüge 12, die  $\frac{1}{2}$  Ltr. Krüge 15 und die Ltr. Krüge 18 Minuten lang gekocht.

Hierauf hatte auch Herr Mertens die Liebenswürdigkeit, zahlreiche Proben von nach obigen Grundsätzen eingemachtem Obst den Mitgliedern zum Versuche zu überreichen; dasselbe wurde allgemein, namentlich von den Damen wegen seines vorzüglichen Geschmacks und dem frischen natürlichen Aussehen gelobt. Herrn Mertens wurde reiche Anerkennung und Dank zu Theil.

Herr Dr. Christ demonstirte hierauf sehr anschaulich alle vorhandenen Apparate der meteorologischen Station im Garten der Anstalt, und die Anwesenden waren überrascht von den ausserordentlich gewissenhaften und sorgfältigen Arbeiten, denen sich schon seit langen Jahren genannter Herr im Interesse der Wissenschaft unterzieht. Redner besprach folgende Apparate:\*)

1. Die Wild'sche Hütte.
2. Das Gefässbarometer nach Friess mit reducirter Scala.
3. Das August'sche Psychrometer mit Ventilator.
4. Das Haarhygrometer nach Koppe.
5. Das Schöpftthermometer.
6. Das Thermometer zur Messung der Bodentemperatur.
7. Das Maximum-Thermometer nach Negretti und Zambra.
8. Das Minimum-Thermometer nach Rutherford.
9. Den Thermograph nach Richard Frères, Paris.
10. Die Windfahne mit Wild'schem Anemometer.
11. Den Regenmesser nach Hellmann mit und ohne Bajonet-Verschluss.
12. Den Wolkenpiegel.
13. Den Sonnenschein-Autograph nach Campbel und Stokes.

---

\*) Herr Dr. Christ hat nachfolgenden Bericht selbst aufgestellt.

Redner betonte noch, dass die meteorologische Station eine solche II. Ordnung sei und im Jahre 1884 durch das Kgl. Preuss. Meteorol. Institut zu Berlin gegründet und eingerichtet wurde. Dem Redner wurde für seine sehr interessanten Mittheilungen reicher Beifall gezollt.

Herr Director Goethe übernahm hierauf die Führung durch die herrlichen, in fast vollem Blüthenschmucke stehenden Obstanlagen und erläuterte in der liebenswürdigsten Weise alle Einrichtungen dieser Musteranstalt. Ebenso wurden auch die Gewächshäuser unter Leitung des Herrn Garteninspectors Seeligmüller besichtigt, die äusserst zahlreiche tropische und seltene einheimische Gewächse in üppiger Pracht und reicher Auswahl zeigten. Alle Mitglieder gewannen die Ueberzeugung, dass das pomologische Institut unter der bewährten Leitung des Herrn Directors Goethe und den vortrefflichen Herren Anstaltslehrern von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt und nicht nur für die Provinz, sondern für den ganzen Staat als eine der ersten Muster-Anstalten dieser Art betrachtet werden muss. — Ein gemeinschaftliches Mittagessen im »Frankfurter Hof«, dessen Besitzer durch seine ausgezeichnete Küche und vorzüglichen Weine auch diesmal wieder allgemeines Lob erntete, vereinigte die Anwesenden bis zur späteren Nachmittagsstunde. Der vollen Befriedigung über alles Gesehene und Gehörte wurde denn auch unter allseitiger begeisterter Zustimmung in den Toasten der Herren Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher und Dr. Dreyer Ausdruck verliehen und von Herrn Director Goethe in der herzlichsten Weise erwidert.

Güll.

---

## Nekrolog.

---

Am 17. Januar 1896 starb nach längerem Leiden das Vorstandsmitglied des Nass. Vereins für Naturkunde, Herr Carl Duderstadt zu Wiesbaden. Der Verstorbene bekleidete lange Jahre das Amt eines Vereinskassirers, wie des Vorstandes der Section für Mineralogie und Geologie und zeigte jederzeit dem Verein das nachhaltigste und wärmste Interesse. Er war geboren am 5. August 1826 in Magdeburg, zog dann nach Berlin, wo er Besitzer zweier grosser Hôtels war. Als grosser Freund der Natur beschäftigte er sich schon in Berlin mit der Mineralogie, was er nach seinem Ueberzuge nach Wiesbaden im April 1873 mit grossem Eifer fortsetzte. Er brachte eine umfangreiche Mineraliensammlung zusammen, die er mit grossem Verständniss in den Räumen seines Landhauses zur Aufstellung brachte. Im November 1891 nach angestrengter Thätigkeit in seinem Arbeitscabinet von einem Schlaganfall betroffen, erholte er sich zwar wieder allmählich etwas, doch erlangte er die frühere Frische nicht wieder und musste sich mehr und mehr von der ihm lieb gewordenen Thätigkeit zurückziehen, bis ihn der Tod von längerem Siechthum erlöste.

Der Verstorbene hatte sich durch sein mildes, leutseliges Wesen und sein reges Interesse für alle Bestrebungen des Vereins in demselben viele Freunde erworben, die sein Hinscheiden mit lebhaftester Trauer erfüllte und welche ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren werden.

Der Vereinssecretär:

Dr. Arnold Pagenstecher.

---

# Verzeichniss der Mitglieder

des

Nassauischen Vereins für Naturkunde im September 1896. \*)

---

## I. Vorstand.

- Herr Regierungspräsident von Tepper-Laski, Director.
- « Geh. Sanitätsrath Dr. Arnold Pagenstecher, Museums-Inspector und Vereinssecretär.
  - « Apotheker A. Vigener, Vorsteher der botanischen Section.
  - « Rentner Dr. L. Dreyer, Vorsteher der zoologischen Section.
  - « Garteninspector Dr. L. Cavet,
  - « Professor Dr. Heinrich Fresenius, } Beiräthe.
  - « Realschuldirektor Dr. Kaiser, }
  - « Reg.-Hauptcassebuchhalter Hehner, Cassenführer.

## II. Ehrenmitglieder.

- Herr v. Baumbach, Landforstmeister a. D., in Freiburg i. B.
- « Dr. Bunsen, Geheimerath, in Heidelberg.
  - « Dr. Erlenmeyer, Professor, in Frankfurt a. M.
  - « Dr. v. Ettinghausen, Professor, in Wien.
  - « Graf zu Eulenburg, Ministerpräsident a. D., in Berlin.
  - « Dr. Fresenius, R., Geh. Hofrath und Professor, Wiesbaden.
  - « Dr. Geinitz, Geh. Hofrath, in Dresden.
  - « Dr. Ritter v. Hauer, K. K. Hofrath und Director des Hofmuseums, in Wien.
  - « Dr. Haeckel, Professor, in Jena.
  - « Alexander v. Homeyer, Major z. D., in Greifswald.
  - « Dr. v. Kölliker, Professor, in Würzburg.
  - « Dr. R. Leuckart, Geh. Rath, in Leipzig.
  - « Dr. F. v. Sandberger, Professor, Geh. Rath in München.

---

\*) Um Mittheilung vorgekommener Aenderungen im Personenstand wird freundlichst gebeten.



### III. Correspondirende Mitglieder.

- Herr Dr. O. Böttger, Professor, in Frankfurt a. M.
- « Dr. Buchner, Professor, in Giessen.
  - « Dr. Buddeberg, Rector, in Nassau a. Lahn.
  - « Dr. v. Canstein, Königl. Oeconomierath und General-Secretär, in Berlin.
  - « Freudenberg, General-Consul, in Colombó.
  - « Dr. B. Hagen, Hofrath, in Homburg (Pfalz).
  - « Ernst Herborn, Bergdirector, in Sidney.
  - « Dr. L. v. Heyden, Königl. Major z. D., in Bockenheim.
  - « Dr. Hueppe, Professor der Hygiene, in Prag.
  - « Dr. Kayser, Professor der Geologie, in Marburg.
  - « Dr. F. Kinkel, in Frankfurt a. M.
  - « Dr. C. List, in Oldenburg.
  - « Dr. Ludwig, Professor, in Bonn.
  - « Dr. Reichenbach, Professor, in Frankfurt a. M.
  - « v. Schönfeldt, Oberst z. D., in Eisenach (Villa Wartburg).
  - « P. T. C. Snellen, in Rotterdam.
  - « Dr. Thomae, Gymnasiallehrer in Elberfeld.

### IV. Ordentliche Mitglieder.

#### *A. Wohnhaft in Wiesbaden und nächster Umgebung.*

- Herr Abegg, Rentner.
- « Ahrens, Dr. med., prakt. Arzt.
  - « Albrecht, Dr. med., prakt. Arzt.
  - « Aufermann, Rentner.
  - « v. Aweyden, Ober-Reg.-Rath.
  - « Berlé, Ferd., Dr., Banquier.
  - « Becker, Dr. med., prakt. Arzt.
  - « Bergmann, J. F., Verlagsbuchhändler.
  - « Bertram, Dr., Appellationsgerichts-Vicepräsident a. D.
  - « Bischof, Dr., Chemiker.
  - « v. Bistram, Baron.
  - « Borggreve, Professor Dr., Oberforstmeister.
  - « v. Born, W., Rentner.
  - « Brauneck, Geh. Sanitätsrath.
  - « Brömme, Ad., Tonkünstler.
  - « Buntebarth, Rentner.
  - « Caesar, Reg.-Rath.
  - « Caspari II., W., Lehrer.

Herr Cavet, Dr., Königl. Garteninspector.

« Chelius, Georg, Rentner.

« Clouth, Dr. med., Sanitätsrath.

« Coester, Dr. med., prakt. Arzt.

« Conrady, Dr., Geh. Sanitätsrath.

« Cramer, Dr. med., prakt. Arzt.

« Cropp, W., Rentner.

« Cuntz, Wilhelm, Dr. med., prakt. Arzt.

« Cuntz, Friedrich, Dr. med., prakt. Arzt.

« Cuntz, Adolf, Rentner.

« Dahlen, Generalsecretär.

« v. Dewitz, Oberstlieutenant z. D.

« Dihm, Hugo, Baumeister.

« Döhring, Rechnungsrath a. D.

« Doms, Leo, Rentner.

« Dresel, Rentner.

« Dreyer, L., Dr. phil., Rentner.

« Elgershausen, Luitpold, Rentner.

« Eiffert, Oberlandesgerichtsrath a. D.

« Fiebig, Georg, Lehrer.

« Fischbach, Director a. D.

« Florschütz, Dr., Sanitätsrath.

« Frank, Dr., Dozent und Abth.-Vorst. am chem. Laboratorium  
von Fresenius.

« Freinsheim, F., Rentner.

« Fresenius, H., Dr., Professor.

« Fresenius, W., Dr., Dozent.

« Frey, Hermann, Dr.

« Freytag, Otto, Rentner.

« Freytag, O., Rentner, Premierlieut. a. D.

« Fuchs, Dr. med., Frauenarzt.

« Fuchs, Landgerichtsrath a. D.

« Funke, Dr., Zahnarzt.

« Füssmann, E., Rentner.

« Gecks, Buchhändler.

« Gessert, Th., Rentner.

« Gleitsmann, Dr. med., Kreisphysikus.

« Gräber, Commerzienrath.

« Groschwitz, C., Buchbinder.

« Groschwitz, G., Lithograph.

« Grünhut, Dr., Dozent am chem. Laboratorium von Prof. Fresenius.

Herr Güll, Lehrer.

« Güntz, Dr. med.

« Gygas, Dr. med., Oberstabsarzt a. D.

« Hackenbruch, Dr. med., prakt. Arzt.

« Hagemann, Dr. phil., Archivar.

« Hammacher G., Rentner.

« Hecker, Ewald, Dr. med., prakt. Arzt.

« Hehner, Reg.-Hauptcassebuchhalter.

« Heimerdinger, M., Juwelier.

« Heintzmann, Dr. jur., Rentner.

« Hensel, C., Buchhändler.

« Herrfahrdt, Oberstlieutenant z. D.

« Hertz, H., Kaufmann.

« Hess, Bürgermeister.

« Hessenberg, G., Rentner.

« v. Heyden, Dr., Rentner.

« Hintz, Dr. phil., Dozent.

« Hiort, Buchbinder.

« Hirsch, Franz, Schlosser.

« Hirsch, Heinrich, Schreiner.

« Hoefer, Lehrer, Gymnasialhülfslehrer.

« Honigmann, Dr. med., prakt. Arzt.

« v. Ibell, Dr., Ober-Bürgermeister.

« Jessnitzer, Rentner.

« Jung, Dr. med., prakt. Arzt.

« Kadesch, Dr., Oberlehrer.

« Kaiser, Dr., Realschuldirector.

« Kalle, F., Rentner.

« Kessler, Landesbank-Directionsrath.

« Kessler, Dr., Director a. D.

« Kind, Dr., Gewerberath.

« Kirchmair, Rentner.

« Kiesel, Dr. phil.

« Klau, J., Gymnasiallehrer.

« Klärner, Carl, Lehrer.

« Knauer, F., Rentner.

« Kobbe, F., Kaufmann.

« Koch, G., Dr. med., Hofrath.

« Kögel, Rentner.

« König, Dr. med., prakt. Arzt.

« Köpp, Rudolf, Fabrikbesitzer.

Herr Körner, Beigeordneter.

« Koettschau, Oberstlieutenant z. D.

« Kraus, Wilhelm, Buchhalter.

« Ladsch, Grubendirector a. D.

« Landow, Dr. med., prakt. Arzt.

« Laquer, Dr. med., prakt. Arzt.

« Lauer, Rentner.

« Lautz, Reallehrer an der höheren Töchterschule.

« Lenz, Dr., Oberstabs-Apotheker im Kriegsministerium a. D.

« Leisler, Rechtsanwalt.

« Leo, Rentner.

« Leonhard, Lehrer a. D.

« Leonhardt, Rentner.

« Levi, Carl, Buchhändler.

« Lex, Rechnungsrath.

« Licht, Baurath a. D.

« Löbnitz, Rentner.

« Lossen, Dr. phil., Rentner.

« Lossen, Dr. med., prakt. Arzt.

« Magdeburg, Rentmeister a. D.

« Mahlinger, Dr. phil., Hilfslehrer an der Oberrealschule.

« Marburg, F., Rentner.

« Maus, W., Postsecretär.

« Meineke, Dr., Director, Professor.

« v. Meyerling, Apotheker.

« Michaelis, Fr., Schlachthausdirector.

« Mouchall, Director des Gas- und Wasserwerks.

« Moxter, Dr. med., prakt. Arzt.

« v. Müttschefahl, A., Generallieutenant z. D., Excellenz.

« Nagel, Apotheker.

« Neuendorff, W., Badewirth.

« van Niessen, Dr. med., prakt. Arzt.

« Obertüschen, Dr. med., prakt. Arzt.

« Pagenstecher, Arnold, Dr. med., Geh. Sanitätsrath.

« Pagenstecher, Dr. H., Augenarzt, Professor.

« Peipers, Hugo, Rentner.

« Pfeiffer, Emil, Dr. med., Sanitätsrath.

« Plessner, Dr. med., prakt. Arzt.

« Preyer, Prof. Dr., Hofrath.

« Pröbsting, A., Dr. med., prakt. Arzt.

Herr **Ramdohr**, Dr. med., prakt. Arzt.

« v. Reichenau, Geh. Regierungsrath, Verwaltungsgerichtsdirector.

« Ricker, Dr. med., Sanitätsrath.

« Rinkel, Schulinspector.

« Ritter, C., sen., Buchdruckereibesitzer.

« Ritter, C., jun., Buchdrucker.

« Röder, Ad., Rentner.

« Römer, August, Conservator am Museum.

« Romeiss, Otto, Dr., Rechtsanwalt.

« Roser, K., Dr. med., prakt. Arzt.

« Rospatt, Geh. Regierungsrath.

« Rudloff, Dr. med., prakt. Arzt.

« Rühl, Georg, Kaufmann.

« **Sartorius**, Landes-Director.

« v. Scheliha, Oberst a. D.

« Schellenberg, Apotheker.

« Schellenberg, Hof-Buchdruckereibesitzer.

« Schellenberg, Dr. med., prakt. Arzt.

« Schierenberg, E., Rentner.

« Schlichter, Ad., Rentner.

« Schnabel, Rentner.

« Schreiber, Geh. Regierungsrath.

« Schulte, Rentner.

« v. Seckendorff, Telegraphendirector.

« Seip, Gymnasiallehrer.

« Seyberth, Dr., Sanitätsrath.

« Siebert, Professor an der Oberrealschule.

« Sjöström, M., Rentner.

« Sommer, Major a. D.

« Spamer, Gymnasiallehrer.

« Spieseke, Dr., Oberstabsarzt a. D.

« Staffel, Dr. med., prakt. Arzt.

« Stoss, Apotheker.

« Stempel, Apotheker.

« von **Tepper-Laski**, Regierungspräsident.

« Thanisch, A., Apotheker.

« Thönges, H., Dr., Justizrath.

« Touton, Dr. med., prakt. Arzt.

« **Vigener**, Apotheker.

« Vogelsberger, Obergeringenieur.

« Voigt, Dr. med., prakt. Arzt.

« Vollmar, Rentner.



Herr **Wachter**, Rentner.

- « **Wagemann**, H., Weinhändler.
- « **Wagemann**, Carl, Weinhändler.
- « **Wehmer**, Dr., prakt. Arzt und Frauenarzt.
- « **Weiler**, Rentner.
- « **Weinberger**, Maler.
- « **Werz**, Carl, Glaser.
- « **Westberg**, Coll.-Rath.
- « **Westphalen**, Regierungsrath.
- « **Wibel**, Dr. med., prakt. Arzt.
- « **Winter**, Kgl. niederl. Oberstlieutenant a. D.
- « **Winter**, Ernst, Baurath, Stadtbaudirector.
- « **v. Winterfeld**, Oberst z. D.
- « **Witkowski**, Dr. med., prakt. Arzt.
- « **Worst**, Seminardirector a. D.

- « **Zais**, W., Hôtelbesitzer.
- « **Ziegler**, Ludwig, Rentner.
- « **Zinsser**, Dr. med.

*B. Ausserhalb Wiesbaden (im Regierungsbezirk).*

Herr **Albert**, Fabrikbesitzer, in Biebrich.

- « **Baltzer**, Dr., Reallehrer, in Diez.
- « **Bastelberger**, Dr. med., Eichberg i. Rheingau.
- « **Beck**, Dr., Rheinhütte in Biebrich.
- « **Beyer**, Gräfl. Kielmannsegge'scher Rentmeister, in Nassau.
- « **Biegen**, Carl, in Oestrich.
- « **Blum**, J., Oberlehrer, in Frankfurt a. M.
- « **Dyckerhoff**, R., Fabrikant, in Biebrich.
- « **Esau**, Realschuldirektor, in Biedenkopf.
- « **Frank**, Hüttenbesitzer, zur Nieverner Hütte bei Ems.
- « **Frickhöffer**, Dr. med., Hofrath, in Langenschwalbach.
- « **Frohwein**, Grubendirector, in Diez.
- « **Fuchs**, Pfarrer, in Bornich.
- « **Gärtner**, Martin, Hüfislehrer, in St. Goarshausen.
- « **Geis**, Bürgermeister, in Diez.
- « **Genth**, Dr. C., in Langenschwalbach, prakt. Arzt.
- « **Gehrenbeck**, Dr. phil., Herborn.

Herr Giebeler, W., Hauptmann a. D., Montabaur.

« Goethe, Director des Königl. Instituts für Obst- und Weinbau in Geisenheim, Oeconomierath.

« Haas, Rudolph, Hüttenbesitzer, zu Neuhoﬀnungshütte bei Herborn.

« Heberle, Bergdirector, Oberlahnstein.

« Hilf, Geh. Justizrath, in Limburg.

« v. Ibell, Dr. med., prakt. Arzt, in Ems.

« Keller, Ad., in Bockenheim.

« Kobelt, W., Dr. med., in Schwanheim.

« Kreckel, Dr. med., prakt. Arzt, in Eppstein.

« Kuhn, A., Kaufmann, in Nassau.

« Kunz, Chr., Reallehrer a. D., in Ems.

« Künzler, L., in Freindiez.

« v. Lade, Eduard, in Geisenheim.

« Lewalter, Dr. med., Hofmedicus, in Biebrich.

« Leyendecker, Professor, in Weilburg.

« Linkenbach, Generaldirector, in Ems.

« Lotichius, Eduard, Dr., in St. Goarshausen.

« v. Matuschka-Greiffenclau, Hugo, Graf, auf Schloss Vollraths.

« Müller, Oberlehrer und Institutsvorsteher, in St. Goarshausen.

« Oppermann, Dr., Reallehrer, in Frankfurt a. M.

« Peters, Dr., Fabrikbesitzer, Schierstein.

« Quehl, Director, in Ems.

Realprogymnasium, in Biebrich.

Herr v. Reinach, A., Baron, Frankfurt a. M.

« v. Rössler, Rechtsanwalt, Justizrath, in Limburg.

« Schröter, Dr., Director der Irrenheil- und Pﬂeganstalt Eichberg.

« Schüssler, Seminar-Oberlehrer, in Dillenburg.

« Seitz, Dr., Adalbert, Director des zoologischen Gartens in Frankfurt a. M.

« Siebert, Garten-Director, in Frankfurt a. M.

« Siegfried, Dr., Fabrikant, in Herborn.

« Speck, Dr. med., Sanitätsrath, in Dillenburg.

« Steeg, W., Dr., Optiker, in Homburg v. d. H.

« Steinmeister, Landrath, in Höchst a. M.

« Sturm, Ed., Weinhändler, in Rüdesheim.

Herr **Thilenius**, Otto, Dr. med., Sanitätsrath, in Soden.

« **Vogelsberger**, Weinhändler, in Ems.

« **Winter**, W., Lithograph, in Frankfurt a. M.

*C. Ausserhalb des Regierungsbezirks Wiesbaden.*

Herr **Alefeld**, Dr. phil., in Darmstadt.

**Bibliothek**, Königl., in Berlin.

Herr **Dünkelberg**, Dr., Geh. Rath, in Poppelsdorf.

« **Frank**, G. A., Naturalist, in London.

« **Geisenheyner**, Gymnasiallehrer, in Kreuznach.

« **Löbbeke**, Hauptmann a. D., in Hamm (Westfalen).

« **Lugenbühl**, Dr., Assistenzarzt, in Strassburg i. E.

« **Maurer**, Fr., Rentner, in Darmstadt.

« **Meyer**, H., Dr., Professor, in Marburg.

**Königliches Oberbergamt**, in Bonn.

Herr **Preiss**, Paul, Eisenbahnbeamter, in Ludwigshafen a. Rh.

« **Salter**, Sigmund, in Wien.

« **Schenk**, Professor a. D., in Marburg a. d. Lahn.

« **Schmidt**, Dr., in Strassburg, zoologisches Institut.

« **Schneider**, Professor an der Bergacademie in Berlin.

« **Steffen**, Apotheker, in Friedrichsthal bei Saarbrücken.

« **Suffert**, L., Rentner in Berlin (Friedenau).





II.

# A b h a n d l u n g e n.

---





CHEMISCHE UNTERSUCHUNG  
DER  
THERMALQUELLE  
DES  
AUGUSTA VICTORIA BADES  
ZU  
WIESBADEN

UND  
VERGLEICHUNG DER RESULTATE MIT DEN ANALYSEN DER ÜBRIGEN  
WIESBADENER THERMALQUELLEN  
VON

**DR. C. REMIGIUS FRESENIUS,**  
GEH. HOFRATHE UND PROFESSOR, DIRECTOR DES CHEMISCHEN LABORATORIUMS ZU  
WIESBADEN

UNTER MITWIRKUNG VON

**DR. ERNST HINTZ,**  
DOCENT UND ABTHEILUNGS-VORSTEHER AM CHEMISCHEN LABORATORIUM ZU WIESBADEN.

---



Das allen Ansprüchen der Neuzeit in jeder Beziehung entsprechende Augusta Victoria Bad hat von den Wiesbadener Thermalquellen die Quelle des „Sonnenbergs“ als ausschliessliches Eigenthum erworben und nach seiner Anstalt geleitet.

Die Quelle des „Sonnenbergs“ entspringt unter dem Speisesaale im nördlichen Theil des Badehauses zum Pariser Hof in der Spiegelgasse in einem aus Bruchsteinen auf Schwellrost hergestellten Brunnen von unregelmässiger Gestalt <sup>1)</sup>).

Das Wasser quillt nicht nur in diesem Brunnen selbst, sondern auch in dessen Umgebung und strömt von da durch mehrere Seitenanälchen dem Brunnen zu.

Die Leitung der Quelle ist durch die Spiegelgasse geführt, wo vor dem Hause „zum Sonnenberg“, Spiegelgasse 1, an den gemauerten Backsteincanal sich anschliessend, zunächst ein Revisionsschacht und dann ein Ueberlaufschacht vorhanden ist. In den Ueberlaufschacht tritt aus dem Revisionsschacht das Thermalwasser ein, und wird das sich ansammelnde Thermalwasser durch eine Rohrleitung nach dem Augusta Victoria Bad weiter geführt. In dem Ueberlaufschacht befinden sich, höher gelegen wie das Abflussrohr nach dem Badehaus und daher für gewöhnlich ausser Function, zwei Rohrleitungen, von denen die eine eine Verbindung mit dem Hause „zum Sonnenberg“, die andere mit dem städtischen Canal ermöglicht.

---

<sup>1)</sup> Diese und die folgenden Angaben sind theilweise der Brochüre von Stadtbaudirektor, Baurath Ernst Winter, Wiesbaden, entnommen: „Die Thermalquellen Wiesbadens in technischer Beziehung, München, Theodor Ackermann, 1880.

In diesem Ueberlaufschacht fand Dr. E. Hintz am 6. März 1896 die Temperatur des Thermalwassers zu 50° C. oder 40° R. Die Wassermenge konnte nicht bestimmt werden, da die örtlichen Verhältnisse es nicht gestatteten, Messungen so auszuführen, dass der Quelle ein freier Abfluss gewahrt blieb.

E. Winter<sup>1)</sup> gibt die Wassermenge der Quelle des „Sonnenbergs“ zu 57 Liter in der Minute an.

Ueber die von dem Ueberlaufschachte nach dem Augusta Victoria Bade geführte directe Leitung macht der dirigirende Arzt des Augusta Victoria Bades, Dr. R. Friedländer, in seinem Werke<sup>2)</sup> „Beiträge zur Anwendung der physikalischen Heilmethoden“ folgende Angaben:

„Das Thermalwasser fliesst zunächst mit natürlichem Gefälle bis „zur Rheinstrasse, woselbst unter dem Fahrdamm ein Sammelreservoir „von 12 qm Grundfläche angelegt ist. In dieses Reservoir sind drei „cylindrische Kessel mit je einem Rückschlagventil eingebaut und mit „dem Augusta Victoria Bad durch zwei Rohrleitungen, eine Luftleitung „und eine Wasserleitung, in Verbindung gebracht. Nachdem sich die „drei Kessel durch das Rückschlagventil selbstthätig mit Thermalwasser „gefüllt haben, öffnet man den Hahn der Luftleitung im Maschinen- „hause des Augusta Victoria Bades; die hier ständig im Vorrath be- „findliche Luft von sechs Atmosphären Spannung drückt nun auf den „Inhalt der in der Rheinstrasse befindlichen Kessel, bewirkt zunächst „das Schliessen der Rückschlagsventile und zwingt das Wasser, dem „Luftdruck ausweichend, den Weg durch die zweite Leitung zu den „Sammelreservoirren (von zusammen 40 Cubikmeter Inhalt) im Augusta „Victoria Bad zurück zu legen. Die comprimirte Luft von sechs At- „mosphären Druck wird durch einen Luftcompressor von acht Pferde- „kräften in dem Maschinenhause erzeugt und in einem Luftaccumulator „von zwölf Cubikmeter Inhalt aufgespeichert. Der Luftcompressor „entnimmt die Luft aus dem Garten des Etablissements. Das selbst- „thätige Füllen der drei Kessel in der Rheinstrasse erfordert etwa 25 „bis 30 Minuten. Die Förderung vermittelt Luftdrucks von der Rhein- „strasse bis zu den Reservoirren im Badehaus erfolgt in 2—3 Minuten.

---

1) A. a. O.

2) Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1896.



„Durch diese Geschwindigkeit des Betriebs einerseits, gute Isolirung „der Rohrleitungen andererseits wird erreicht, dass das Wasser mit „einer Temperatur von  $40^{\circ}$  C. im Augusta Victoria Bad ankommt. Da „die Wiesbadener Thermalbäder mit einer Temperatur von  $26^{\circ}$ — $30^{\circ}$  R. „verordnet zu werden pflegen, ist eine künstliche Beeinflussung „der Temperatur für die Badezwecke nicht erforderlich“.

Diese Angaben hinsichtlich der Temperatur können wir voll bestätigen, denn es ergab sich, in den Räumen des Augusta Victoria Bades gemessen, als Temperatur des Thermalwassers bei regem Betriebe

am 26. Juli 1895  $39,9^{\circ}$  C.,

am 31. Juli 1895  $40,1^{\circ}$  C.,

somit im Mittel  $40^{\circ}$  C. oder  $32^{\circ}$  R.

Das specifische Gewicht des Thermalwassers wurde bei  $14^{\circ}$  C. zu 1,006455 gefunden.

Das für die Analyse bestimmte Wasser wurde am 26. Juli 1895 in den Räumen des Augusta Victoria Bades von Dr. E. Hintz entnommen.

## Chemische Analyse der Thermalquelle des Augusta Victoria Bades.

### I. Ausführung.

Die Methode der quantitativen Analyse war im Wesentlichen die, welche in der Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse von Dr. C. R. Fresenius, 6. Auflage, § 206 bis § 213, angegeben ist. Nur bei den Bestimmungen der Arsensäure, Phosphorsäure und Borsäure mussten zur Erzielung möglichst genauer Resultate besondere Verfahrungsweisen angewandt werden. Dieselben sollen an den betreffenden Stellen genau angegeben werden.

## Originalzahlen in Grammen.

### 1. Bestimmung des Chlors.

a) 100,309 g Wasser lieferten 1,8322 g Chlor-, Brom- und Jodsilber, entsprechend . . . . .	18,265559	p. M.
b) 100,636 g Wasser lieferten 1,8396 g Chlor-, Brom- und Jodsilber, entsprechend . . . . .	18,279741	„ „
Mittel . . . . .	18,272650	p. M.

Zieht man hiervon ab das dem Brom und Jod entsprechende Brom- und Jodsilber, nämlich:  
für Brom Bromsilber, nach 2b 0,008975 p. M.  
für Jod Jodsilber, nach 2a . 0,000040 „ „

Summe . . . . .	0,009015	p. M.
so bleibt Chlorsilber . . . . .	18,263635	„ „
entsprechend Chlor . . . . .	4,516552	„ „

### 2. Bestimmung des Broms und Jods.

a) 60210 g Wasser lieferten so viel freies, in Schwefelkohlenstoff gelöstes Jod, dass zu dessen Ueberführung in Jodnatrium 3,62 cc einer Lösung von unterschwefligsaurem Natron erforderlich waren, von welcher 2,88 cc 0,00103 g Jod entsprachen. Hieraus berechnet sich ein Gehalt an Jod von 0,001295 g, entsprechend . . . . .	0,0000215	p. M.
entsprechend Jodsilber . . . . .	0,000040	„ „

b) Die vom Jod getrennte Lösung gab, mit Silberlösung gefällt, 14,4188 g Chlor-Bromsilber.

α) 6,1326 g desselben ergaben im Chlorstrom geschmolzen eine Gewichtsabnahme von 0,0541 g. Die Gesamtmenge des Chlor-Bromsilbers hätte somit abgenommen um 0,127198 g.

β) 6,1611 g Chlor-Bromsilber nahmen ab 0,0550 g, demnach die Gesamtmenge 0,128716 g.

Abnahme des Chlor-Bromsilbers im Mittel 0,127957 g.

Hieraus berechnet sich der Bromgehalt der			
60210 g Wasser zu 0,229943 g Brom oder . .	0,003819	p. M.	
entsprechend Bromsilber . .	0,008975	„ „	

### 3. Bestimmung der Schwefelsäure.

a) 997,5 g Wasser lieferten 0,1506 g schwefel- sauren Baryt, entsprechend Schwefelsäure . . .	0,051838	p. M.	
b) 503,83 g Wasser lieferten 0,0757 g schwefel- sauren Baryt, entsprechend Schwefelsäure . . .	0,051587	„ „	
Mittel . .	0,051713	p. M.	

### 4. Bestimmung der Kohlensäure.

a) 240,598 g Wasser lieferten in Natronkalk- röhren aufgefangene Kohlensäure 0,1629 g, ent- sprechend . . . . .	0,677063	p. M.	
b) 256,546 g Wasser lieferten 0,1741 g Kohlensäure, entsprechend . . . . .	0,678631	„ „	
Mittel . .	0,677847	p. M.	

### 5. Bestimmung der Kieselsäure.

a) 1901,3 g Wasser lieferten 0,1140 g Kiesel- säure, entsprechend . . . . .	0,059959	p. M.	
b) 1979,7 g Wasser lieferten 0,1180 g Kiesel- säure, entsprechend . . . . .	0,059605	„ „	
Mittel . .	0,059782	p. M.	

### 6. Bestimmung des Kalks.

a) Das in 5a erhaltene Filtrat wurde, nachdem das Eisenoxyd abgeschieden, in schwach essig- saurer Lösung mit oxalsaurem Ammon gefällt. Die oxalsauren Salze ergaben in kohlensaure Ver- bindungen übergeführt 1,6482 g kohlensauren Kalk und Strontian, entsprechend . . . . .	0,866881	p. M.	
b) Das Filtrat von 5b lieferte 1,7132 g, ent- sprechend . . . . .	0,865384	„ „	
Mittel . .	0,866133	p. M.	

Zieht man hiervon ab die nach 12c vorhandene Menge kohlensauren Strontians mit . .	0,019836	p. M.
so bleibt kohlensaurer Kalk . .	0,846297	p. M.
entsprechend Kalk . .	0,473926	„ „

#### 7. Bestimmung der Magnesia.

a) Das Filtrat von 6a lieferte 0,4108 g pyrophosphorsaure Magnesia, entsprechend Magnesia .	0,077860	p. M.
b) Das Filtrat von 6b lieferte 0,4267 g pyrophosphorsaure Magnesia, entsprechend Magnesia .	0,077671	„ „
Mittel . .	0,077766	p. M.

#### 8. Bestimmung der Chloralkalimetalle.

498,75 g Wasser lieferten 3,4105 g vollkommen reine Chloralkalimetalle, entsprechend .	6,838095	p. M.
--	----------	-------

#### 9. Bestimmung des Kalis.

Aus den in 8 erhaltenen Chloralkalimetallen wurde das Kali als Kaliumplatinchlorid abgeschieden. Es ergaben sich

a) 0,2806 g Kaliumplatinchlorid, entsprechend Kali . . . . .	0,108626	p. M.
b) 502,10 g Wasser lieferten 0,2828 g Kaliumplatinchlorid, entsprechend Kali . . . . .	0,108747	„ „
Mittel . .	0,108687	p. M.
entsprechend Chlorkalium . .	0,172013	„ „

#### 10. Bestimmung des Lithions.

14239,1 g Wasser lieferten reines basisch-phosphorsaures Lithion 0,2441 g, entsprechend Lithion . . . . .	0,006656	p. M.
oder Chlorlithium . .	0,018825	„ „

#### 11. Bestimmung des Eisenoxyduls.

6906,1 g Wasser lieferten 0,0048 g Eisenoxyd, entsprechend Eisenoxydul . . . . .	0,000626	„ „
--	----------	-----

## 12. Bestimmung des Manganoxyduls, des Baryts und Strontians.

60210 g Wasser lieferten:

a) 0,0496 g Manganoxyduloxyd, entsprechend Manganoxydul . . . . .	0,000766	p. M.
b) 0,0905 g chromsauren Baryt, entsprechend Baryt . . . . .	0,000907	„ „
c) 1,4858 g schwefelsauren Strontian, entsprechend Strontian . . . . .	0,013919	„ „

## 13. Bestimmung des Ammons.

2077,8 g Wasser wurden unter Zusatz von etwas Salzsäure in einer Retorte eingekocht, alsdann nach Zufügen von gebrannter Magnesia abdestillirt und das Destillat in einer etwas Salzsäure enthaltenden Vorlage aufgefangen. Der entstandene Salmiak, in Ammoniumplatinchlorid und dieses durch Glühen in metallisches Platin übergeführt, lieferte 0,0485 g Platin, entsprechend Ammon ( $\text{NH}_4)_2\text{O}$ ) . . . . . 0,006165 p. M.

## 14. Bestimmung der Borsäure.

14186,5 g Wasser wurden mit kohlensaurem Kali bis zur deutlich alkalischen Reaction versetzt und durch Abdampfen stark concentrirt. Der sich hierbei abscheidende Niederschlag wurde abfiltrirt, ausgewaschen und, da er sich bei vorgenommener Prüfung noch als borsäurehaltig erwies, in Salzsäure gelöst und diese Lösung nach dem Verdünnen mit Wasser nochmals in Siedehitze mit kohlensaurem Kali gefällt. Das von dem nun borsäurefreien Niederschlag getrennte Filtrat wurde mit dem ersten vereinigt und bis zur feuchten Salzmasse eingedampft, die Borsäure durch Ansäuern mit Salzsäure in Freiheit gesetzt und mit Alkohol von 96 Volumprocent extrahirt.

Auf diese Weise ergab sich eine alle Borsäure enthaltende alkoholische Lösung, die mit Kalilauge



im Ueberschusse versetzt, abdestillirt und auf einen kleinen Rest eingedampft wurde. Den Rückstand säuerte man wieder mit Salzsäure an, extrahirte mit Alkohol, behandelte die alkoholische Lösung wie zuvor und verfuhr mit dem sich hierbei ergebenden Abdampfungsrückstande noch ein drittes Mal in gleicher Weise. Die schliesslich erhaltene geringe Salzmasse wurde in einen kleinen Destillationsapparat gebracht und nach dem Ansäuern mit Salzsäure wiederholt mit Methylalkohol destillirt, bis sich der Destillationsrückstand als frei von Borsäure erwies. Das Destillat wurde in chemisch reiner Kalilauge aufgefangen, nach dem Verjagen des Methylalkohols in einer Platinschale mit Fluorwasserstoffsäure im Ueberschuss versetzt und zur Trockne verdampft, der Rückstand mit einer Auflösung von einem Theil essigsauren Kalis in vier Theilen Wasser behandelt und der zurückbleibende Niederschlag zunächst mit derselben Lösung, dann mit Weingeist von 84 Volumprocent ausgewaschen. Die Menge des erhaltenen reinen Borfluorkaliums betrug 0,0729 g, entsprechend Borsäure . . . . 0,001425 p. M.

#### 15. Bestimmung der Arsensäure und der Phosphorsäure.

a) 50200 g Wasser, der Inhalt eines grossen Ballons, wurden auf etwa 5 Liter eingedampft und mit Salzsäure bis zur deutlich sauren Reaction versetzt. Man fügte nun etwas Eisenchlorid, dann überschüssigen gefällten, reinen kohlen sauren Kalk zu, mischte wiederholt und liess schliesslich den entstandenen ockerfarbenen Niederschlag sich absetzen. Derselbe musste neben überschüssigem Eisenoxydhydrat alle Arsensäure und Phosphorsäure enthalten. Man filtrirte ihn ab, wusch aus, löste in Salzsäure und behandelte mit Schwefelwasserstoff unter Erwärmen. Nach längerem Stehen in der Kälte wurde der entstandene Niederschlag

abfiltrirt, ausgewaschen und in Bromsalzsäure gelöst. Die Lösung versetzte man mit Eisenchlorür, brachte sie in einen Destillirapparat, destillirte bis auf einen kleinen Rest ab, fügte zum Rückstand Salzsäure von 1,19 spec. Gew., destillirte neuerdings und wiederholte dies, bis das letzte Destillat durch Schwefelwasserstoff nicht mehr gefällt wurde. Die vereinigten Destillate, mit Schwefelwasserstoff gefällt, ergaben nach dem Behandeln mit Alkohol, Schwefelkohlenstoff und wiederum mit Alkohol 0,0016 g Arsensulfür, entsprechend Arsensäure .

0,000030 p. M.

b) Das in a bei der Fällung mit Schwefelwasserstoff erhaltene Filtrat lieferte, nach Abscheidung der Kieselsäure wiederholt mit Salpetersäure im Wasserbade verdampft und nach Fällung der Phosphorsäure als phosphormolybdänsaures Ammon, pyrophosphorsaure Magnesia 0,0029 g, entsprechend Phosphorsäure . . . . .

0,000037 „ „

# 16. Bestimmung des Natrons.

Chloralkalimetalle sind vorhanden (nach 8) . 6,838095 p. M.

Davon geht ab:

Chlorkalium (nach 9) . 0,172013 p. M.

Chlorlithium (nach 10) . 0,018825 „ „

---

Summe . . 0,190838 „ „

Rest: Chlornatrium . . 6,647257 „ „

entsprechend Natron . . 3,527023 „ „

17. Bestimmung der beim Abdampfen mit Schwefelsäure und Glühen des erhaltenen Rückstandes in einer Atmosphäre von kohlensaurem Ammon sich ergebenden Sulfate etc.

a) 102,32 g Wasser lieferten Sulfate etc.

1,0002 g, entsprechend . . . . . 9,775215 p. M.

b) 100,38 g Wasser lieferten 0,9814 g Sul-		
fate etc., entsprechend . . . . .	9,776848	p. M.
Mittel . . . . .	9,776032	p. M.

## II. Berechnung der Analyse.

### a) Schwefelsaurer Baryt.

Baryt ist vorhanden (nach 12b) . . . . .	0,000907	p. M.
bindend Schwefelsäure . . . . .	0,000474	„ „
zu schwefelsaurem Baryt . . . . .	0,001381	p. M.

### b) Schwefelsaurer Strontian.

Strontian ist vorhanden (nach 12c) . . . . .	0,013919	p. M.
bindend Schwefelsäure . . . . .	0,010759	„ „
zu schwefelsaurem Strontian . . . . .	0,024678	p. M.

### c) Schwefelsaurer Kalk.

Schwefelsäure ist vorhanden (nach 3) . . . . .	0,051713	p. M.
Davon ist gebunden:		
an Baryt (a) . . . . .	0,000474	p. M.
an Strontian (b) . . . . .	0,010759	„ „
Summe . . . . .	0,011233	„ „
Rest Schwefelsäure . . . . .	0,040480	„ „
bindend Kalk . . . . .	0,028336	„ „
zu schwefelsaurem Kalk . . . . .	0,068816	p. M.

### d) Phosphorsaurer Kalk.

Phosphorsäure ist vorhanden (nach 15b) . . . . .	0,000037	p. M.
bindend Kalk . . . . .	0,000044	„ „
zu dreibasisch phosphorsaurem Kalk . . . . .	0,000081	p. M.

### e) Arsensäurer Kalk.

Arsensäure ist vorhanden (nach 15a) . . . . .	0,000030	p. M.
bindend Kalk (2 Aequivalente) . . . . .	0,000015	„ „
zu arsensaurem Kalk . . . . .	0,000045	p. M.

f) Borsaurer Kalk.

Borsäure ist vorhanden (nach 14) . . . . .	0,001425	p. M.
bindend Kalk . . . . .	0,001140	„ „
zu borsaurem Kalk . . . . .	0,002565	p. M.

g) Bromnatrium.

Brom ist vorhanden (nach 2b) . . . . .	0,003819	p. M.
bindend Natrium . . . . .	0,001101	„ „
zu Bromnatrium . . . . .	0,004920	p. M.

h) Jodnatrium.

Jod ist vorhanden (nach 2a) . . . . .	0,0000215	p. M.
bindend Natrium . . . . .	0,0000039	„ „
zu Jodnatrium . . . . .	0,0000254	p. M.

i) Chlornatrium.

Natron ist vorhanden (nach 16) . . . . .	3,527023	p. M.
--	----------	-------

Davon ist gebunden:

als Natrium an Jod (h) 0,000005 p. M.

als Natrium an Brom (g) 0,001483 „ „

Summe . . . . .	0,001488	p. M.
Rest Natron . . . . .	3,525535	p. M.
entsprechend Natrium . . . . .	2,616892	„ „
bindend Chlor . . . . .	4,027560	„ „
zu Chlornatrium . . . . .	6,644452	p. M.

k) Chlorkalium.

Kali ist vorhanden (nach 9) . . . . .	0,108687	p. M.
entsprechend Kalium . . . . .	0,090238	„ „
bindend Chlor . . . . .	0,081775	„ „
zu Chlorkalium . . . . .	0,172013	p. M.

l) Chlorlithium.

Lithion ist vorhanden (nach 10) . . . . .	0,006656	p. M.
entsprechend Lithium . . . . .	0,003111	„ „
bindend Chlor . . . . .	0,015714	„ „
zu Chlorlithium . . . . .	0,018825	p. M.

m) Chlorammonium.

Ammon ist vorhanden (nach 13)	. . . . .	0,006165	p. M.
entsprechend Ammonium	. . . . .	0,004271	„ „
bindend Chlor	. . . . .	0,008395	„ „
zu Chlorammonium	. . . . .	0,012666	p. M.

n) Chlorealcium.

Chlor ist vorhanden (nach 1)	. . . . .	4,516552	p. M.
------------------------------	-----------	----------	-------

Davon ist gebunden:

an Natrium (i)	. . . . .	4,027560	p. M.
an Kalium (k)	. . . . .	0,081775	„ „
an Lithium (l)	. . . . .	0,015714	„ „
an Ammonium (m)	. . . . .	0,008395	„ „

Summe	. . . . .	4,133444	p. M.
Rest Chlor	. . . . .	0,383108	p. M.
bindend Calcium	. . . . .	0,216079	„ „
zu Chlorealcium	. . . . .	0,599187	p. M.

o) Kohlensaurer Kalk.

Kalk ist vorhanden (nach 6)	. . . . .	0,473926	p. M.
-----------------------------	-----------	----------	-------

Davon ist gebunden:

als Calcium an Chlor (n)	. . . . .	0,302511	p. M.
„ Schwefelsäure (c)	. . . . .	0,028336	„ „
„ Phosphorsäure (d)	. . . . .	0,000044	„ „
„ Arsensäure (e)	. . . . .	0,000015	„ „
„ Borsäure (f)	. . . . .	0,001140	„ „

Summe	. . . . .	0,332046	p. M.
Rest Kalk	. . . . .	0,141880	p. M.
bindend Kohlensäure	. . . . .	0,111477	p. M.
zu einfach kohlensaurem Kalk	. . . . .	0,253357	p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurem Kalk	. . . . .	0,364834	„ „

p) Kohlensaure Magnesia.

Magnesia ist vorhanden (nach 7)	. . . . .	0,077766	p. M.
---------------------------------	-----------	----------	-------



bindend Kohlensäure . . .	0,085543	p. M.
zu einfach kohlensaurer Magnesia . . .	0,163309	p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurer Magnesia . . .	0,248852	„ „

q) Kohlensaures Eisenoxydul.

Eisenoxydul ist vorhanden (nach 11) . . . .	0,000626	p. M.
bindend Kohlensäure . . .	0,000383	„ „
zu einfach kohlensaurem Eisenoxydul . . .	0,001009	p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurem Eisenoxydul . . .	0,001392	„ „

r) Kohlensaures Manganoxydul.

Manganoxydul ist vorhanden (nach 12 a) . . .	0,000766	p. M.
bindend Kohlensäure . . .	0,000475	„ „
zu einfach kohlensaurem Manganoxydul . . .	0,001241	p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurem Manganoxydul . . .	0,001716	„ „

s) Kieselsäure.

Kieselsäure ist vorhanden (nach 5) . . . . .	0,059782	p. M.
--	----------	-------

t) Freie Kohlensäure.

Kohlensäure ist vorhanden (nach 4) . . .	0,677847	p. M.
--	----------	-------

Davon ist gebunden zu neutralen Salzen:

an Kalk (o) . . . .	0,111477	p. M.
an Magnesia (p) . . .	0,085543	„ „
an Eisenoxydul (q) . . .	0,000383	„ „
an Manganoxydul (r) . . .	0,000475	„ „

---

Summe . . .	0,197878	p. M.
-------------	----------	-------

Rest Kohlensäure . . .	0,479969	p. M.
------------------------	----------	-------

Davon ist mit den einfach kohlensauren

Salzen zu Bicarbonaten verbunden . . . .	0,197878	„ „
--	----------	-----

---

Völlig freie Kohlensäure . . . . .	0,282091	p. M.
------------------------------------	----------	-------

### III. Controle der Analyse.

Berechnet man die einzelnen Bestandtheile des Wassers auf den Zustand, in welchem sie in dem Rückstande enthalten sein müssen, der in 17 durch Abdampfen mit Schwefelsäure und Glühen in einer Atmosphäre von kohlensaurem Ammon erhalten wurde, so ergeben sich folgende Zahlen:

Gefunden Natron	3,527023 p. M., berechnet	
als schwefelsaures Natron . . . . .	8,072156	p. M.
Gefunden Kali	0,108687 p. M., berechnet	
als schwefelsaures Kali . . . . .	0,200931	„ „
Gefunden Lithion	0,006656 p. M., berechnet	
als schwefelsaures Lithion . . . . .	0,024382	„ „
Gefunden Baryt	0,000907 p. M., berechnet	
als schwefelsaurer Baryt . . . . .	0,001381	„ „
Gefunden Strontian	0,013919 p. M., berechnet	
als schwefelsaurer Strontian . . . . .	0,024678	„ „
Gefunden Kalk	0,473926 p. M., berechnet	
als schwefelsaurer Kalk . . . . .	1,150963	„ „
Gefunden Magnesia	0,077766 p. M., berechnet	
als schwefelsaure Magnesia . . . . .	0,233298	„ „
Gefunden Eisenoxydul	0,000626 p. M., berechnet	
als Eisenoxyd . . . . .	0,000696	„ „
Gefunden Manganoxydul	0,000766 p. M., berechnet	
als schwefelsaures Manganoxydul . .	0,001629	„ „
Gefunden Arsensäure . . . . .	0,000030	„ „
Gefunden Phosphorsäure . . . . .	0,000037	„ „
Gefunden Borsäure . . . . .	0,001425	„ „
Gefunden Kieselsäure . . . . .	0,059782	„ „
Summe . .	9,771388	p. M.
Direct gefunden (nach 17) . . . . .	9,776032	„ „

#### IV. Zusammenstellung der Resultate.

Bestandtheile der Thermalquelle des Augusta Victoria Bades

a) Die kohlensauren Salze als einfache Carbonate berechnet.

α) In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

		In 1000 Gewichtstheilen:
Chlornatrium . . . . .		6,644452
Chlorkalium . . . . .		0,172013
Chlorlithium . . . . .		0,018825
Chlorammonium . . . . .		0,012666
Chlorcalcium . . . . .		0,599187
Bromnatrium . . . . .		0,004920
Jodnatrium . . . . .		0,000025
Schwefelsaurer Kalk . . . . .		0,068816
„ Strontian . . . . .		0,024678
„ Baryt . . . . .		0,001381
Kohlensaurer Kalk . . . . .		0,253357
Kohlensaure Magnesia . . . . .		0,163309
Kohlensaures Eisenoxydul . . . . .		0,001009
„ Manganoxydul . . . . .		0,001241
Arsensaurer Kalk . . . . .		0,000045
Phosphorsaurer Kalk . . . . .		0,000081
Borsaurer Kalk . . . . .		0,002565
Kieselsäure . . . . .		0,059782
Summe . . .		8,028352
Kohlensäure, mit den einfachen Carbo-		
naten zu Bicarbonaten verbundene . . .		0,197878
Kohlensäure, völlig freie . . . . .		0,282091
Summe aller Bestandtheile . . .		8,508321

β) In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

Rubidium, Caesium, Salpetersäure, Titansäure, Kupfer, organische Substanzen, sämmtliche in sehr geringen Spuren.

b) Die kohlensauen Salze als wasserfreie Bicarbonate berechnet.

α) In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

	In 1000 Gewichtstheilen:
Chlornatrium . . . . .	6,644452
Chlorkalium . . . . .	0,172013
Chlorlithium . . . . .	0,018825
Chlorammonium . . . . .	0,012666
Chlorcalcium . . . . .	0,599187
Bromnatrium . . . . .	0,004920
Jodnatrium . . . . .	0,000025
Schwefelsaurer Kalk . . . . .	0,068816
„ Strontian . . . . .	0,024678
„ Baryt . . . . .	0,001381
Doppelt kohlensaurer Kalk . . . . .	0,364834
„ kohlensaure Magnesia . . . . .	0,248852
„ kohlensaures Eisenoxydul . . . . .	0,001392
„ „ Manganoxydul . . . . .	0,001716
Arsensaurer Kalk . . . . .	0,000045
Phosphorsaurer Kalk . . . . .	0,000081
Borsaurer Kalk . . . . .	0,002565
Kieselsäure . . . . .	0,059782
Summe . . . . .	8,226230
Kohlensäure, völlig freie . . . . .	0,282091
Summe aller Bestandtheile . . . . .	8,508321

β) In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

Siehe a.

## Beurtheilung und Vergleichung der Resultate mit den Analysen der übrigen Wiesbadener Thermal-Quellen.

Das Thermalwasser des Augusta Victoria Bades gehört, wie die Wiesbadener Thermen überhaupt, zu der Gruppe der sogenannten einfachen Kochsalzthermen, bei denen der Kochsalzgehalt den übrigen Bestandtheilen gegenüber entschieden vorwiegt. Es hat das Thermalwasser des Augusta Victoria Bades die weitgehendste Aehnlichkeit in Bezug auf die chemische Zusammensetzung mit dem Kochbrunnen und den übrigen Wiesbadener Thermalquellen, wie dies nachstehende Zusammenstellung zeigt, zu der das erforderliche Zahlenmaterial der Abhandlung von R. Fresenius<sup>1)</sup> „Die Thermalquellen Wiesbadens in chemischer Beziehung“ entnommen ist. Im Hinblick auf die chemische Zusammensetzung des Thermalwassers des Augusta Victoria Bades kann daher nicht bezweifelt werden, dass dasselbe für Badezwecke die gleiche medicinische Wirkung haben wird, wie das Wasser des Kochbrunnens und das Wasser der übrigen Wiesbadener Quellen. Demgemäss müssen wir noch ausdrücklich betonen, dass, wie die Resultate der Analyse zeigen, die heilkräftigen Bestandtheile des Thermalwassers für Badezwecke durch die Leitung der Quelle in die Räume des Augusta Victoria Bades in keiner Weise beeinträchtigt werden.

---

<sup>1)</sup> Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrgang 43.



# Bestandtheile der Quellen in 1000 Gewichtstheilen Wasser, die

	Koch- brunnen. R. Frese- nius 1885	Mineralwasser im Badhause zu den Vier Jahres- zeiten. C. Hjelt und R. Röhr 1859	Quelle im im Badhaus Zum Spiegel. G. Kerner 1856
Temperatur der Quelle . . . . .	68,75° C.	57,5° C.	66,2° C.
Specifisches Gewicht . . . . .	1,006627 bei 15° C.	1,006265 bei 15° C.	1,00628

## a) In wägbarer Menge vorhandene Bestand-

Chlornatrium . . . . .	6,828976	6,819447	6,806703
Chlorkalium . . . . .	0,182392	0,227291	0,142098
Chlorlithium . . . . .	0,023104	nicht bestimmt	nicht bestimmt
Chlorammonium . . . . .	0,017073	0,016739	0,020589
Chlorcalcium . . . . .	0,627303	0,618707	0,638000
Bromnatrium . . . . .	0,004351	0,002109	0,003231
Jodnatrium . . . . .	0,000017	nicht bestimmt	nicht bestimmt
Schwefelsaurer Kalk . . . . .	0,072480	0,089532	0,082958
„ „ Strontian . . . . .	0,021929	Spur	Spur
„ „ Baryt . . . . .	0,001272	Spur	Spur
Doppelt kohlensaurer Kalk . . . . .	0,306979	0,389674	0,301150
„ kohlensaure Magnesia . . . . .	0,270650	0,288144	0,259504
„ kohlensaures Eisenoxydul . . . . .	0,009283	0,001946	0,010109
„ kohlensaures Manganoxydul . . . . .	0,001236	0,000989	0,000905
Arsensaurer Kalk . . . . .	0,000225	nicht bestimmt	—
Phosphorsaurer Kalk . . . . .	0,000028	„	—
Borsaurer Kalk . . . . .	0,001039	„	—
Kieselsaure Thonerde . . . . .	—	—	—
Phosphorsaure Thonerde . . . . .	—	—	—
Kieselsäure . . . . .	0,062714	0,058341	0,060965
Summe . . . . .	8,431051	8,512919	8,326212
Kohlensäure, völlig freie . . . . .	0,296600	0,206024	0,407203
Stickgas . . . . .	0,005958	—	—
Summe aller Bestandtheile . . . . .	8,733609	8,718943	8,733415

## b) In unwägbarer Menge

Rubidium, Caesium, Salpetersäure, Titansäure, Kupfer, Schwefelwasserstoff, organische des Kochbrunnens, in dem des Augusta Victoria Bades (abgesehen von Schwefelwasser-  
worden, dürften sich aber wohl auch

# kohlensauen Salze als wasserfreie Bicarbonate berechnet.

Quelle in der Wilhelms- Heil- anstalt. R. Frese- nius 1871	Quelle im Badhaus Zum goldenen Brunneu. R. Suchs- land und W. Valentin 1857	Quelle im Hause Gold- gasse No. 6. (Ehemals Kupferschmied Wörner.) R. Wilden- stein 1850	Thermalquelle im Augusta Victoria Bad. R. Fresenius und E. Hintz 1896	Schützen- hofquelle. H. Frese- nius 1879	Kleine Schützen- hofquelle. R. Frese- nius 1886
40,14° C.	64,0° C.	51 bis 52° C.	40° C.	49,2° C.	45,2° C.
1,006429 bei 16° C.	1,006451 bei 15° C.	1,0064 bei 15° C.	1,006455 bei 14° C.	1,004964 bei 14,5° C.	1,004827 bei 19° C.

theile in 1000 Gewichtstheilen Wasser.

6,730694	6,725822	6,70501	6,644452	5,154046	5,138331
0,227765	0,134832	0,07699	0,172013	0,157510	0,155925
0,009752	—	—	0,018825	0,025228	0,026319
0,015870	0,015651	0,01329	0,012666	0,012340	0,014521
0,580907	0,745341	0,56797	0,599187	0,585858	0,591311
0,001431	0,003215	—	0,004920	0,002534	0,004010
0,000024	—	—	0,000025	0,000028	0,000013
0,092769	0,095990	0,09724	0,068816	0,134366	0,137989
0,000024	Spur	—	0,024678	0,020362	0,017933
0,000213	Spur	—	0,001381	0,000010	0,000431
0,421365	0,217934	0,43637	0,364834	0,200873	0,166415
0,254922	0,301181	0,26346	0,248852	0,189695	0,142967
0,007608	0,006418	0,00847	0,001392	0,003005	0,002844
0,001325	0,001386	nicht bestimmt	0,001716	0,000928	0,001164
Spur	—	—	0,000045	0,000060	0,000184
0,000245	—	nicht bestimmt	0,000081	—	0,000035
Spur	—	—	0,002565	Spur	Spur
—	—	—	—	0,000401	—
0,000193	—	—	—	0,000334	—
0,063167	0,066571	0,04539	0,059782	0,050907	0,051467
8,408274	8,314341	8,21419	8,226230	6,538485	6,451859
0,334423	0,369115	0,25213	0,282091	0,308144	0,291557
—	—	—	—	Spur	Spur
8,742697	8,683456	8,46632	8,508321	6,846629	6,748416

vorhandene Bestandtheile.

Substanzen, sämmtliche in sehr geringen Spuren. Diese Bestandtheile sind im Wasser stoff) und in dem der Schützenhofquelle (abgesehen von Titansäure) nachgewiesen in den anderen Wiesbadener Thermen finden.



DAS

# LEBEN EINER WELT.

---

VORTRAG,

GEHALTEN IN DER

GENERALVERSAMMLUNG DES NASSAUISCHEN VEREINS  
FÜR NATURKUNDE

AM 15. DECEMBER 1895

VON

OBERLEHRER J. KLAU

(WIESBADEN.)

---



*Πάντα ῥεῖ*, Alles ist im Flusse, hat einst ein griechischer Philosoph gesagt und mit diesen Worten hat er ausgedrückt, dass er intuitiv das geschaut hat, was wir als das Hauptergebniss unserer heutigen Gesamtnaturwissenschaft zu rühmen pflegen. Die Moleküle aller Körper schwingen um ihre Gleichgewichtslage und bringen hierdurch den Zustand hervor, den wir die Temperatur der Körper nennen; selbst die Atome des Aethers, der die Räume erfüllt, die man früher als leer zu bezeichnen pflegte, werden durchfluthet von den mannigfachsten Bewegungen des Lichtes, der strahlenden Wärme und der Elektrizität; die Erde, für die Alten der Urbegriff der Ruhe, sie bewegt sich um ihre Achse und um die Sonne und auch diese, die eine Zeit lang die Rolle des ruhenden Körpers übernommen zu haben schien, sie dreht sich und bewegt sich um den Schwerpunkt der Sonnen. Also keine Ruhe im Weltraum vom kleinsten Molekül bis zum grössten Weltkörper.

Aber auch keine Unveränderlichkeit, keine Dauer. Im Anorganischen wie im Organischen sehen wir beständig und unaufhaltsam die mannigfachsten Veränderungen vor sich gehen; die verbundenen Atome trennen sich unter der Wirkung der Kräfte und vereinigen sich wieder bei Aufhebung der trennenden Hindernisse. Ist uns dieser Vorgang bei den organischen Gebilden bekannt und geläufig als der Lebensprocess, so findet er doch nicht weniger in der anorganischen, leblosen Welt statt. Verwitterung, Oxydation etc. sind die Umwandlungsprocesse, die, wenn auch in langen Zeiträumen, so doch nicht weniger sicher den Stein so umgestalten, wie das Leben den organischen Körper verändert. Sollten die Himmelskörper von dem allgemeinen Entstehungs-, Wachstums- und Vernichtungsgang eine Ausnahme machen? Nein, von dem *Πάντα ῥεῖ* gibt es keine Ausnahme, so wenig in Beziehung auf Werden und Vergehen, wie in Bezug auf die Bewegung. Aber spielen sich die Zersetzungs- und Umwandlungsvorgänge in der anorganischen Natur schon so langsam ab, dass ein Menschenleben kaum ausreicht, um die oberflächlichsten zu con-



statiren, wie viel weniger dürfen wir erwarten, Zeuge dieses Processes bei einer Welt zu sein; und wenn wir die ganze Zeit zusammenfassen würden, während welcher von einer eigentlichen Kenntniss der Himmelskörper geredet werden kann, so stellen diese wenigen Jahrhunderte nur die Dauer eines Pulsschlages im Leben einer Welt dar. — Wie soll uns nun Aufschluss werden über Das, was ich zum Gegenstand meines heutigen Vortrags gewählt habe: das Leben einer Welt? Der Schöpfer selbst hat uns das Geschichtswerk seiner Schöpfung hinterlassen und zwar in eigenhändigen Aufzeichnungen in dem Geschaffenen selbst. Seit wir im Fernrohr und Spectroskop den Schlüssel zu dieser Schrift gefunden haben, vermögen wir nun von Tag zu Tag deutlicher dieses gewaltige Werk zu entziffern. Vor unserem bewaffneten Auge ziehen sie vorüber die einzelnen Himmelskörper, jeden Alters, jeden Standes, vom jugendlichsten Urnebel bis zum altersschwachen erstarrten und unfruchtbaren Planeten. Sehen wir nun Individuen derselben Art in den verschiedensten Phasen des Entwicklungsstadiums, so lässt sich daraus wohl der Lebenslauf des einzelnen Individuums mit einiger Sicherheit ableiten. Und so will ich es denn versuchen aus dem, was die Astronomie am Himmel erschaut hat, den Lebensgang eines Himmelskörpers zu schildern.

Die Kant-Laplace'sche Theorie lehrt uns den Entstehungsprocess einer Welt kennen. Der weite Himmelsraum ist erfüllt mit einer Urmaterie in höchster Verdünnung; die Moleküle sind begabt mit abstossenden und anziehenden Kräften und von einander verschieden. Zufällige dichtere Anhäufungen wirken als Attractionscentren, sammeln immer mehr Masse an sich an und gerathen durch den Zusammenstoss mit der angezogenen Masse ins Glühen. Die nach den Centren hinstürzenden Massen üben seitliche Stösse auf einander aus und versetzen die ganze Masse allmählich in strudelförmige Bewegung, welche nach und nach in Rotation übergeht, wenn zwischen den Centrifugal- und Centripetalkräften ein Gleichgewichtszustand hergestellt ist. Je dichter die Massen, desto grösser ihre Fallkraft und um so näher gelangen sie zum Centralkörper. Dort bilden sie einen Ring, während die leichteren Theile wegen ihrer zu geringen Schwungkraft dem Centralkörper einverleibt werden und dadurch dessen Temperatur erhöhen. Auch die Ringe selbst besitzen im Allgemeinen keine Stabilität. Eine zufällig dichtere Stelle zieht die leichteren nach und nach an sich und geräth durch deren Stösse selbst in Rotation; der Planet ist geboren und

vermag nun selbst aus der nicht sofort mit ihm vereinigten Ringmaterie. Ringe um sich und Nebenplaneten zu erzeugen.

Die ganze Lehre von Kant und Laplace stellt wiederum eine Intuition zweier grossen Geister dar, die in ihrem geistigen Schauen dem Wissen ihrer Zeit vorauseilten. Sehen wir zu, wie die erweiterte Kenntniss unserer Zeit sich zu dieser Hypothese stellt.

Die erste Frage, die sich uns aufdrängt und die auch thatsächlich von den Gegnern dieser Lehre als vermeintlicher Fallstrick ihren Anhängern vorgelegt wird, lautet: Woher kommt die Bewegung? welches ist der erste Anstoss zu dem Uebergang der Moleküle aus dem Zustand der Ruhe in den der Bewegung? Das Meyer'sche Princip von der Erhaltung der Energie lässt uns durch einen exacten Rückschluss diese Frage beantworten. Energie ist bewegte Masse und diese ist im Weltall constant; somit war dieselbe Summe der Energie bereits in dem Urnebel vorhanden, die wir jetzt in unserem Weltsystem vorfinden. Die Bewegung ist demnach etwas den Molekülen als wesentliche Eigenschaft Innewohnendes, welches nicht erst durch einen äusseren Anstoss oder neuen Schöpfungsakt in dieselbe hineingetragen zu werden brauchte. Eine weitere Frage nach der Ursache der Gemeinsamkeit der Richtung in dieser Bewegung, welche sich aus der Uebereinstimmung der Rotationsebenen des Centralkörpers mit den Revolutionsebenen der Planeten und Nebenplaneten ergibt, folgt aus der Entstehungsart des Urnebels, wie wir sie bei der Betrachtung des Unterganges einer Welt, die gleichzeitig die Zeugung einer neuen Welt ist, kennen lernen werden.

Haben wir so zunächst die Bedenken gegen die Theorie beseitigt, so bleibt noch übrig, ihre directe Bestätigung aus der Beobachtung analoger Zustände im Himmelsraume zu erbringen. Fragen wir uns zunächst: Gibt es im Himmelsraum noch chaotische unverdichtete Dunstmassen? Die spectralanalytischen Untersuchungen von Miller und Huggins geben hierauf eine bejahende Antwort, indem sie zeigen, dass die Spectra gewisser Nebel nur aus einzelnen hellen Linien bestehen. Nach der Kirchhoff'schen Spectraltheorie können diese Spectra ihren Ursprung nur glühenden Gasmassen von grosser Verdünnung und hoher Temperatur verdanken.

Eine zweite Entwicklungsstufe sehen wir in den Spiralnebeln, deren typische Gestalt uns der Jagdhundnebel zeigt. Die photographischen Aufnahmen, welche in den letzten Jahren hauptsächlich die Lick-Sternwarte in Californien und der Engländer Roberts gemacht hat, beweisen.

dass die Zahl dieser Gebilde am Himmel eine ausserordentlich grosse ist. Dieselben zeigen einen Kern von grosser Helligkeit und um denselben spiralg angeordnete Dunstmassen. Es ist ein werdender Centralkörper, der sich selbst mit den ihm zugehörigen Gasmassen in Drehung befindet. Den Hang zur Ringbildung können wir bereits wahrnehmen, aber der Gleichgewichtszustand der Ringe ist noch nicht erreicht; die Ringe besitzen noch keine vollendete kreisförmige Anordnung.

Einen Schritt weiter führen uns die in Sternhaufen aufgelöste Nebel. Sie zeigen sich mit Hülfe eines starken Fernrohrs, wie Lord Rosse hauptsächlich nachgewiesen hat, als ein unendliches Heer von Sternen, das Spectrum ist continuirlich und die Photographie zeigt uns neben den Sternen noch unverdichtet helle Nebelmassen.

Auch die Nebelsterne, welche uns hauptsächlich durch die photographischen Aufnahmen von Henry bekannt geworden sind, stellen eine Entwicklungsphase dar, die dem Kant-Laplace'schen System entspricht. Es sind sternartige Gebilde, welche von einer Lichthülle umgeben sind. Der Centralkörper ist noch nicht zur vollen Verdichtung gelangt. Es können sich aber schon einige Ringe abgelöst und zu Planeten verdichtet haben, die kein oder nur schwaches Licht besitzen und darum für uns nicht sichtbar sind. Mit dem Fernrohr lassen sich diese Gebilde nicht gut beobachten, da das Licht des condensirten Kerns das schwächere Licht der Dunsthülle überstrahlt, aber die Verwendung der Photographie in der Himmelskunde hat uns gezeigt, dass auch die Zahl dieser Körper eine recht grosse ist.

Die bisherigen Ausführungen dürften zur Genüge gezeigt haben, dass die Kant-Laplace'sche Theorie alle Merkmale einer guten und brauchbaren Hypothese an sich trägt, indem sie uns den Werdeprocess einer Welt in ungezwungener Weise ohne Annahme wunderbarer und räthselhafter Kräfte erklärt und sich in voller Uebereinstimmung mit den bisher beobachteten Thatfachen befindet.

Centralkörper, Planeten, Nebenplaneten, Mutter, Töchter und Enkel haben wir entstehen sehen; verfolgen wir den Lebensgang dieser Familienglieder nun weiter auf die angegebene Weise, indem wir zunächst die weitere Entwicklung eines Planeten ins Auge fassen. Wollen wir diese kennen lernen, so können wir bis zum heutigen Zustand unserer Erde der Geologie das Wort ertheilen. Sie lehrt uns wie die Erde sich allmählich verdichtete und abkühlte, wie das Wasser sich condensirte und sammelte, wie die Oberfläche der Erde durch

Schrumpfung, Eruption, Erosion und Vergletscherung sich umgestaltete, bis der heutige Zustand mit den heutigen Lebewesen nach einer Reihe von Umwandlungsperioden in Zeiträumen sich entwickelte, die im Vergleich zu einem Menschenleben als ungeheuer lang bezeichnet werden dürfen, die aber im Weltenleben als verschwindend klein anzusehen sind. In ähnlichen Perioden, wie die von unserer Erde durchlebten, sehen wir heute noch die ferneren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die zum Theil noch in feurigem, selbstleuchtendem Zustand, theilweise aber auch schon erkaltet und mit dichten Atmosphären bedeckt sind.

Aber auch die zukünftigen Schicksale unseres Planeten sind uns nicht vollständig verschlossen. In Mars und den inneren Planeten sehen wir Himmelskörper, die mit der Erde die Gleichartigkeit der Entstehung und Aehnlichkeit der Lebensbedingungen gemein haben, die aber in einer weiter fortgeschrittenen Entwicklungsphase begriffen sind und uns damit in grossen Zügen zeigen, wie die Weitergestaltung der Erde vor sich gehen wird. Die Betrachtung der geologischen Erdperioden lehrt uns, dass die Atmosphäre der Erde an Dichtigkeit und Wassergehalt nach und nach eingebüsst hat. Dieser Process ist nun keineswegs zum Stillstand gekommen, sondern schreitet in der angegebenen Weise stetig fort. Der Wasservorrath vermindert sich durch Verbindung des Wassers mit dem Gestein etc. und die Atmosphäre nimmt ab durch Loslösung vom Erdkörper nach dem Himmelsraume.

Das nächste Bild unserer Zukunft sehen wir im Mars vor uns. Gestatten Sie, meine Herren, dass ich auf das, was wir von diesem Planeten wissen, und was uns also unser zukünftiger Zustand zeigt, etwas ausführlicher eingehe. \*)

Im Jahre 1892 erschien ein grosses Werk des französischen Astronomen Flammarion, »La Planète Mars et ses conditions d'habitabilité«, welches Alles zusammenfasst, was bis zu diesem Zeitpunkt über den Planeten bekannt geworden ist. Die Geschichte der Entdeckungen auf dem Mars wird von Flammarion in drei Perioden eingetheilt, von denen die erste von Beginn astronomischer Beobachtungen überhaupt durch Galilei 1610 bis zum Jahre 1830 reicht. Huygens sieht einen dunkeln Gürtel über den Mars verlaufen und erblickt ausserdem einige dunkle Stellen. Cassini bemerkt zuerst die Polarkappen, William Herschel und Schröter zeichnen einzelne Details von hellen und dunkleren Partien.

---

\*) Nach Himmel und Erde I.—VII. Jahrgang.



Die zweite Periode umfasst hauptsächlich Beobachtungen von Beer und Mädler, John Herschel, Galle, Secchi, Lockyer, Dawes. In dieser Periode wird constatirt, dass die dunklen und helleren Stellen im allgemeinen constant, also nicht atmosphärischer Natur sind; dagegen ist die Form und das Aussehen der Gebilde veränderlich. Die spectralanalytischen Untersuchungen dieser Periode zeigen Absorptionslinien, die auf eine unserer Atmosphäre ähnlich zusammengesetzte Marsatmosphäre schliessen lassen. Diese ist weniger bewegt, dünner und durchsichtiger als die unsrige. Es giebt weniger Wasser auf dem Mars als auf der Erde. Die Wasserbedeckung erstreckt sich nur auf  $\frac{1}{3}$ , bei der Erde auf  $\frac{3}{4}$ ; die südliche Halbkugel enthält mehr Wasser, die nördliche hauptsächlich Land.

Die dritte Periode knüpft sich hauptsächlich an den Namen Schiaparelli, der den Mars in der Zeit von 1872 bis 1892 aufs gründlichste beobachtet und die Erkenntniss seiner Oberfläche in enormer Weise erweitert hat.

Zunächst bestätigt Schiaparelli die schon erwähnte Thatsache, dass es auf dem Mars 2 Klassen von Regionen gibt, von denen die eine heller, dunkelgelb, orange oder roth gefärbt erscheint, während die andere dunkelere, eisengraue, aschgraue bis schwarze Färbung zeigt; die zu ersterer Art gehörigen Gegenden werden der Einfachheit halber zunächst als Länder, die zu letzterer gehörigen als Meer bezeichnet; manche Gegenden sind von wechselnder Natur mit unbestimmten Grenzen. Die Färbung der sogenannten Meere ist meist unbeständig; sie wechselt vom dunkelsten Schwarz bis nahe an die Farbe der Festländer heran durch alle Farbennüancen.

Als neueste und interessanteste Erkenntniss verdanken wir Schiaparelli die Beobachtung und Beschreibung von Gebilden, welche er vorläufig mit dem Namen Kanäle belegte. Diese Kanäle sind dunkle Linien auf der Marsoberfläche. Jeder derselben, mit ganz geringen Ausnahmen, stellt einen Bogen eines grössten Kreises dar, verläuft also auf der Kugel gradlinig. Jeder Kanal mündet mit beiden Enden in einem Meer, einem See oder in dem Knotenpunkt mehrerer Kanäle, niemals aber mit einem freien Ende innerhalb eines Festlandes. Die Kanäle schneiden sich unter allen möglichen Winkeln oft zu 3 und 4, ja 6 und 7 in einem Punkte, der häufig ein See von grösserer oder geringerer Ausdehnung ist. Einige haben eine Länge von 10—15°, d. h. 600—900 km, andere dagegen erstrecken sich über den vierten

Theil des Planetenumfangs z. B. Euphrates und Erebus Acheron, welcher mit seiner Fortsetzung dem Dardanus und Cerberus sogar bis über  $160^{\circ}$  einnimmt.

Ein Kanal kann längere oder kürzere Zeit vollständig bis zur Unsichtbarkeit verschwinden. Nach Schiaparelli's Vermuthung tritt diese Erscheinung bei den meisten Kanälen zur Zeit des südlichen Sonnensolstizes d. h. des nördlichen Winteranfangs ein; dann kann der Kanal unbestimmt, nur durch einen leichten Schatten angedeutet, erscheinen. Ferner kann er sich darstellen als grauer verwaschener Streifen mit dem Maximum der Dunkelheit in der Mitte und Variationen in Breite und Intensität im ganzen Verlaufe. In einem anderen Stadium sehen wir ihn als völlig schwarze scharf begrenzte Linie von  $1^{\circ}$  d. h. 60 km bis  $5^{\circ}$  d. h. 300 km Breite, dessen Breite im ganzen Verlauf oder wenigstens zwischen je 2 Knotenpunkten constant ist. Die angrenzenden Theile erfahren dann gleichzeitig eine Verdunkelung von gleichmässiger Breite. Im grössten Maassstabe tritt die letztere Erscheinung um die Nordpolarkappe auf. Hier entstehen zu gewissen Zeiten sehr breite und tiefschwarze Kanäle bei gleichzeitigem Dunklerwerden der benachbarten Gebiete. Man hat diese Stelle vielfach als Nordpolarmeer gedeutet, welches aber nach Schiaparelli nicht vorhanden ist. Innerhalb weniger Tage oder Stunden sogar erscheint oft ein Kanal doppelt, aus zwei parallelen nahe bei einander befindlichen Streifen zusammengesetzt. Manchmal behält der eine dieser Streifen die Lage des alten Kanals bei, ein anderes Mal verschwindet dieser ganz und die beiden neu entstandenen Streifen fallen nur in Bezug auf die Richtung mit ihm zusammen. Der Abstand dieser Streifen variirt von  $3^{\circ}$  und weniger bis zu 10 und  $15^{\circ}$ . Dabei ist das Verhältniss der Breite der mittleren hellen und der beiden dunklen Streifen verschieden. Die Erscheinung der Verdoppelung scheint sich nach den Jahreszeiten zu richten und innerhalb eines Marsjahres gewöhnlich zweimal einzutreten: zuerst kurz nach dem Frühlingsäquinocmium, dann verschwinden nach einer Dauer von wenig Monaten zum nördlichen Solstiz die meisten Verdoppelungen, treten dann vor dem Herbstäquinocmium grösstentheils wieder auf und verschwinden alle zum südlichen Solstiz. Die Knotenpunkte nehmen an den Variationen im Aussehen der Kanäle in der Art theil, dass sie mit diesen verschwinden und mit denselben an Deutlichkeit und Ausdehnung zunehmen, wobei auch sie zur Zeit des Maximums von halbdunkeln Gegenden umrahmt



sind. Bei der sehr günstigen Constellation im Jahre 1894 haben Lowell und Schiaparelli diesen Beobachtungen noch einige Details hinzugefügt. Nur einige dunkle Stellen sind dauernd mit Wasser gefüllt, die übrigen dagegen nur dann, wenn der Schnee der Polarkappen zu schmelzen beginnt. Bei niedrigem Wasserstand erscheinen Landbrücken, welche bei hohem Wasserstand wieder verschwinden. Die ganzen Meeresgebiete erblickt man zuweilen in einem grünen Schimmer. Aber auch zur Zeit des höchsten Wassergehalts sind die Meeresflächen noch von dunkleren Streifen durchzogen, welche sich als Fortsetzungen der Landkanäle darstellen. Es folgt dann eine Periode, in welcher das ganze Gebiet heller wird, die scharfen Begrenzungen verschwinden, das Blaugrün der dunkelen Stellen blasst allmählich ab und durchläuft die Farbennüancen bis zum orangegelb. Während in den Meeresgebieten alle diese Veränderungen vor sich gehen, verharren die Continente in unveränderlicher röthlicher Färbung.

Es ist noch zu bemerken, dass die Kenntniss des Marsspectrums in diesem letzten Jahre eine wesentliche Neuerung resp. Umgestaltung erfahren hat durch Beobachtungen von Campbell auf der Lick-Sternwarte. Durch Vergleiche des Spectrums von Mars und Mond, welche im Juli 1894 nahe bei einander standen, ergab sich in der dunstfreien Atmosphäre des Mount Hamilton keinerlei Verbreiterung der atmosphärischen Regenbanden, weder beim Mars. noch bei dem Monde. Hieraus folgt zwar nach Campbell's eigener Ansicht nicht die Abwesenheit einer Marsatmosphäre, sondern nur eine viel geringere Dichte, wie sie etwa auf unseren höchsten Bergspitzen herrscht und eine grössere Klarheit derselben. Für letzterem Umstand spricht auch die Erscheinung, dass hellere Objecte bei der Bewegung zum Rande hin keine Schwächung ihrer Helligkeit erfahren. Hiermit schwindet auch der Untergrund für den Erklärungsversuch der Marsphänomene durch atmosphärische Erscheinungen.

Fassen wir nun das vorliegende Beobachtungsmaterial zusammen, so können wir nach dem Vorgang von Meyer in Berlin und Schiaparelli in Mailand uns folgendes Bild von dem heutigen Zustand des Mars machen.

Der Mars befindet sich in einem Entwicklungsstadium zwischen dem Zustand der Erde und dem des Mondes. Die Atmosphäre und der Wasserbestand haben sich sehr verringert, so dass die grossen Continentalmassen den Charakter von unveränderlichen und unfruchtbaren Wüsten

angenommen haben. Die Meere sind bis auf geringe, dauernd mit Wasser gefüllte Becken aufgetrocknet, doch werden dieselben regelmässig zur Zeit der Schneeschmelze in den Polarkappen mit Wasser überfluthet, worauf sich dann eine Vegetation entwickelt, die in ihrem Entwicklungsprocess die Farbenabstufungen vom Grün bis zum Gelb durchläuft. Von intelligentem Wesen sind bei abnehmendem Wassergehalt Strassen angelegt worden, die ursprünglich unsere Strassen an Breite nicht viel zu übertreffen brauchten; diese verbinden gradlinig die von wechselnder Ueberfluthung betroffenen Senkungen, in denen der Vegetationsprocess noch am üppigsten florirt. Diese Strassenzüge füllen sich bei der Schneeschmelze im Frühjahr mit Wasser, welches die angrenzenden Gebiete überschwemmt und auch dort die Bedingungen des Lebens zeitigt. Im Herbst trocknen diese Wasserreservoirs und Kanäle aus und das animalische und pflanzliche Leben tritt zurück. Die zeitweilige Zweitheilung der sogenannten Kanäle, die Schiaparelli jetzt Thäler zu nennen vorschlägt, erklärt dieser Forscher dadurch, dass er annimmt, durch die Länge derselben erstrecke sich ein System von mehreren Wasserkanälen, die nach den grossen Wasserreservoirs hin durch Schleusen abgesperrt sind. Wenn dann zuerst die Schleusen für die höchstgelegenen Wasserkanäle geöffnet werden, so entstehen um diese herum, an den beiden Thalwänden, zunächst 2 Vegetationsstreifen, während in der Mitte eine wasserlose Region zurückbleibt. Bei sinkendem Wasserstand, treten dann die Kanäle, welche der Thalsohle angehören, in Thätigkeit, der doppelte Kanal wird einfach, um dann schliesslich bei weiterem Sinken des Wasserstandes ganz zu verschwinden. Wenn nun auch dieser letzte Erklärungsversuch die Grenze der Vermuthung nicht überschreitet, so enthält er doch nichts Widersinniges und schliesst sich dem Vorangehenden, welches einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit für sich hat, sehr gut an.

Dass unsere Erde ähnlichen Zuständen entgegengeht, habe ich bereits am Anfang dieser Betrachtungen ausgeführt. Schon zeigt das Innere der grossen Continente Afrika, Asien und Amerika grosse ausgedehnte wasserarme Gebiete, die Wüsten. Bei abnehmender Wassermenge werden diese an Ausdehnung zu, die Meere dagegen abnehmen. Die von letztern jetzt noch eingenommenen Niederungen werden dann den Raum für die Wohnsitze des organischen Lebens abgeben und die Continente nur da bewohnbar sein, wo natürlich oder künstlich das lebenspendende Wasser wenigstens zeitweise hingeführt werden kann.

Verlust an Eigenwärme, Verminderung der Atmosphäre und des Wasservorraths schreiten aber auch von dem Stadium des Mars aus noch weiter fort und es kommt ein weiterer Moment hinzu, welcher, wenn auch sehr langsam wirkend, doch unaufhaltsam die wesentlichsten Lebensbedingungen eines Planeten umgestaltet. Es ist die Wirkung der Fluth. Schon Darwin macht darauf aufmerksam, dass die der Rotation entgegengesetzte Fluthbewegung des Wassers eine allmähliche Verlangsamung der Erdrotation zur Folge haben muss, sodass schliesslich Rotations- und Revolutionsdauer miteinander übereinstimmen werden. Ist dieser Zustand erreicht, dann hört die Wirkung von Ebbe und Fluth gänzlich auf. In dem Mond sehen wir dieses weitere Zukunftsbild unseres Planeten vor uns. Die Eigenwärme ist verschwunden, resp. auf ein Minimum reducirt; denn abgesehen von einigen in den letzten Jahren beobachteten unbedeutenden Veränderungen an Mondkratern sehen wir nirgends mehr Spuren der Thätigkeit einer innern feuerflüssigen Masse. Atmosphäre und Wasser sind verschwunden. Dies lehren uns die schwarzen Schatten der Gebirge, optische Erscheinungen am Mondrande und spectral-analytische Beobachtungen. Ausserdem stimmen Rotations- und Revolutionsdauer miteinander überein, wie sich aus dem Umstand ergibt, dass wir stets dieselbe Mondfläche sehen bis auf einige Schwankungen, Librationen, die theils von der ungleichmässigen Geschwindigkeit des Mondes in seiner Umdrehung um die Erde herrühren, theils auch nach dem Orte der Beobachtung sich richten. Alles organische Leben ist dort verstorben und Todtenruhe herrscht auf dem verödeten Himmelskörper. Aber auch ein Hauptplanet unseres Sonnensystems zeigt uns ähnliche Zustände.

Nachdem zu Anfang dieses Jahrhunderts Schröter durch Beobachtung der Bewegung eines schon von Harding entdeckten Flecks auf der Oberfläche des Merkur die Rotationsdauer des Merkur auf  $24^d 0^m 53^s$  angegeben hatte, vernachlässigt man lange Zeit diesen Planeten. Erst Schiaparelli hat ihn wieder mehrere Jahre lang sorgfältig unter günstigen Umständen beobachtet und ist dabei zu einem von dem früheren gänzlich abweichendem Resultat gekommen. Nach seiner Angabe, die er im Jahre 1889 veröffentlichte, stimmen für Merkur Umlaufs- und Umdrehungszeit genau überein, wie bei dem Monde. Jedoch ist die Libration eine bedeutend grössere als beim Monde, indem nach Schiaparelli der Merkur dieselbe Seite nicht der Sonne zukehrt, sondern den andern Brennpunkt seiner elliptischen Bahn. Deshalb beschreibt

die Sonne für den Merkurbeobachter hin und hergehend einen Bogen von  $47^{\circ}$  am Himmel innerhalb 88 Tagen. Für die Theile der Oberfläche des Merkur, für welche der Sonnenbogen ganz über dem Horizont sich befindet, steht die Sonne stets sichtbar am Himmel, hier ist ewiger Tag; diese Region umfasst etwa  $\frac{3}{8}$  der Merkuroberfläche. Umgekehrt ist für  $\frac{3}{8}$  der Merkuroberfläche, welche der Sonne abgewandt sind, und für welche der Sonnenbogen ganz unter dem Horizont liegt, ewige Nacht und das übrig bleibende  $\frac{1}{4}$  hat abwechselnden Tag und Nacht innerhalb der Periode von 88 Tagen. Während also in dieser Beziehung der Mars grosse Aehnlichkeit mit dem Monde hat, unterscheidet er sich wesentlich von demselben durch das Vorhandensein einer Atmosphäre. Schröter hatte diese schon vermuthet und Schiaparelli schliesst ihre Existenz aus folgenden Umständen. Alle Phänomen, Flecke etc. sind am deutlichsten sichtbar auf der Mitte der Scheibe und werden undeutlicher am Rande. Die einzelnen Gebilde erscheinen bei gleicher Stellung nicht immer gleich deutlich, ja es ereignet sich, dass gewisse Erscheinungen momentan verschwinden oder wieder erscheinen, mithin, so schliesst Schiaparelli, muss nicht nur eine Atmosphäre vorhanden sein, sondern dieselbe muss auch veränderlicher und dichter sein als die Marsatmosphäre. Nach alle dem glaubt der Forscher, die Möglichkeit organischen Lebens nicht unbedingt für diesen Planeten vereinen zu müssen. Indem in der Atmosphäre durch den Contrast der Temperatur auf der stets beleuchteten und der stets dunkeln Seite eine sehr regelmässige und lebhafte Circulation hervorgebracht wird, die zum Ausgleich der Wärmeverhältnisse wesentlich beitragen kann.

Wenn wir hiernach den Gang des Entwicklungsprocesses aus Analogien schliessen wollen, so gibt sich uns folgendes Gesamtbild. Von dem gasförmigen feuerflüssigem Zustand, in dem sich noch die Sonne befindet, wanderte die Erde durch den halb erkaltet mit dichter Atmosphäre bedeckten Zustand des Jupiter und Saturn in ihre heutigen Form, dann wird sie entweder dem Merkur oder dem Mars gleichen, je nachdem die Verlangsamung der Rotation oder das Schwinden der Atmosphäre und des Wassers schnelleren Fortschritt macht und schliesslich gelangt sie in den Todesstarre, die uns der Mond zeigt.

Aber der Lebensprocess eines Planeten ist nicht allein von dem eigenen Zustand abhängig, sondern auch wesentlich bedingt von seinem Verhältniss zum Centralkörper, dem er Licht, Wärme und Bewegung verdankt.



Die anscheinend ewig gleichmässigen Bahnen, welche die Planeten um die Sonne beschreiben sind das Resultat eines Gleichgewichtszustandes zwischen der centripetalen Anziehungskraft des Centralkörpers und dem centrifugalen Beharrungsvermögen des angezogenen Körpers. Die Bahn muss sich ändern, sobald eine dieser beiden Kräfte eine Aenderung erfährt. Sind Ursachen vorhanden, welche eine Aenderung derselben bedingen? Alle auf der Erde bewegten Körper kommen durch Reibung und Luftwiderstand nach kürzerer oder längerer Zeit zur Ruhe; fehlen diese Hindernisse der irdischen *perpetuum mobile* bei den Himmelskörpern? Die neuere Theorie des Lichtes der strahlenden Wärme und Electricität verlangt die Annahme eines stofflichen Trägers dieser Kräfte, der das ganze Weltall durchdringt. Ist aber der welterfüllende Aether ein Stoff, wenn auch in der höchsten Verdünnung, so erfolgen die Bewegungen der Himmelskörper in einem widerstrebenden Medium. Deshalb muss, zwar ungeheuer langsam und unmerklich, aber doch absolut sicher und unaufhaltsam die Bewegung der Planeten verlangsamt, also die Centrifugalkraft verringert werden. Ausserdem lässt sich die Erhaltung der Sonnenwärme auf 2 Arten erklären: Helmholtz nimmt an, dass der Sonnenkörper durch Contraction die Verluste ersetzt, Mayer dagegen erklärt die Erhaltung der Sonnenwärme durch den Einsturz der Meteoriden in ungeheurer Zahl. Eine Reihe von Umständen spricht dafür, dass wahrscheinlich beide Umstände vereint wirken. Ist aber der letztere Umstand richtig, so tritt eine allmähliche Vermehrung der Sonnenmasse d. h. eine Vergrösserung der Centrifugalkraft ein. Verkleinerung der Centrifugalkraft und Vergrösserung der Centrifugalkraft müssen aber die Planetenbahn stetig umgestalten und eine allmähliche Annäherung der Planeten an die Sonne hervorbringen, die mit dem schliesslichen Einsturz der Planeten in die Sonne ihren Abschluss findet. Der endliche Zusammenstoss wird eine plötzliche Umwandlung der lebendigen Kraft in Wärme bewirken, die zur Umwandlung des kleinern und eines Theils des grössern Himmelskörpers in Dampf zur Folge hat, wodurch dann ein plötzliches Wiederaufleuchten der bis dahin vielleicht schon erkalteten Sonne entsteht.

Die Frage, ob ein derartiger Vorgang bereits am Himmel beobachtet wurde, muss bejaht werden. Teleskopische Sterne erschienen plötzlich als helle Sterne I oder zwei II. Grösse und an Orten, die früher keine sichtbaren Sterne enthielten, erblickte man plötzlich einen Stern von grosser Helligkeit. Im October 1604 wurde im Schlangentrüge ein

Stern I. Kl. entdeckt, dessen Helligkeit in einem halben Jahre auf die III. Kl. herabsank und der 1606 ganz verschwand. Im Mai 1866 wurde ein Stern V.—VI. Gr. entdeckt, der in einigen Stunden zu II Gr. anwuchs, aber in 1 Monat wieder auf die IX.—X. Kl. herabsank. 1885 im August erschien in einem Nebelfleck ein Stern VI. Gr., der im September der VIII., im October der X., im November der XI. und im December der XII. Gr. angehörte. Im April vorigen Jahres wurde in Arequipa durch photographische Untersuchungen ein Stern VIII. Gr. entdeckt, an einer Stelle, welche im März desselben Jahres sicher noch keinen Stern bis zur XIV. Kl. enthielt. Die Helligkeit dieses Sternes nahm bis 11. Juli bereits bis zur XI. Gr. ab. Nach den theoretischen Berechnungen von Prof. Seeliger in München und den spectroscopischen Untersuchungen lässt sich dies Phänomen durch den Aufsturz eines dunkeln Körpers auf den betr. Stern erklären.

Mit diesem Einsturz endigt die Existenz eines Planeten und es bleibt nun noch der weitere Entwicklungsprocess einer Sonne aus Analogieschlüssen zu construiren.

Die bekannten Fixsterne wurden nach ihrer Färbung und Helligkeit von dem Jesuitenpater Secchi in 5 Typen eingetheilt und die spectralanalytischen Untersuchungen von Miller, Huggins und Vogel zeigten, dass jeder dieser 5 Typen eine bestimmte Entwicklungsphase einer Sonne darstellt.

Dem I. Typus gehören die weissglänzenden Sterne wie Sirius, Vega an; ihr Spectrum ist ein continuirliches mit wenigen sehr feinen Linien des Na, Mg, Fe, H. Es sind die heissesten Sonnen mit einer sehr geringen absorbirenden Schicht.

Die meisten gelben Sterne gehören zum II. Typus: unsere Sonne, Capella, Pollux etc. Das Spectrum ist dem Sonnenspectrum analog, continuirlich mit vielen dunkeln Linien, es deutet auf verminderte Temperatur und stärker entwickelte absorbirende Schicht (Photosphäre) hin.

Zum III. Typus werden die orangefarben und rothen Sterne gerechnet, wie  $\alpha$  Orionis,  $\alpha$  Herculis,  $\delta$  mira ceti. Das Spectrum enthält ausser dunklen Linien noch eine Reihe von säulenartigen Bändern, welche auf eine sehr stark absorbirende Schicht deuten.

Dem IV. Typus gehören nur Sterne bis zur VI. Grössenklasse an, deren Spectrum 3 helle durch dunkle Zwischenräume getrennte Bänder enthält, welche nach dem violetten Ende an Lichtstärke zunehmen und plötzlich abbrechen, ähnlich dem Spectrum der Kohlenwasserstoff-



verbindungen. Die Abkühlung muss also hier bereits soweit vorgeschritten sein, dass die Bildung chemischer Verbindungen möglich ist.

Zum V. Typus zählte man einige wenige Sterne, die ein aus hellen Linien von H und Helium bestehendes Spectrum besitzen.

Wir sehen also in diesen 5 Typen ebensoviele Entwicklungsstufen einer Sonne vor uns, vom glühendsten Körper bis zu einem solchen von weit geringerer Temperatur und starker Atmosphäre. Unsere Sonne ist in dem II. Stadium dieses Abkühlungsprocesses angelangt. Die klare leuchtende Scheibe zeigt uns in den Flecken den schon vorgeschrittenen Abkühlungsprocess, der sie im Weiterschreiten den III., IV. und V. Sterntypus zuführt.

Den genannten 5 Typen schliessen sich dann als weitere Entwicklungsstadien die veränderlichen Sterne an. Manche derselben wie Algol verharren lange Zeit im Maximum ihrer Helligkeit, dann sinken sie rasch auf das Minimum herab, in welchem sie nur für kurze Zeit verbleiben, um dann wieder ebenso schnell das Maximum zu erreichen. Nach den neueren hauptsächlich von Pickering angestellte Untersuchungen handelt es sich bei diesen Sternen um das regelmässige Vorbeiwandern dunkler Begleiter innerhalb der Gesichtslinie vor dem Hauptkörper.

Eine andere Art dieser Sterne wie  $\beta$  Lyrae zeigt eine Wandlung in der Helligkeit in der Art, dass die Perioden des Maximums und Minimums von wenig verschiedener Dauer sind und die Umwandlung aus dem einen in den andern Zustand langsam und allmählich vor sich geht. Das Spectrum zeigt immerwährend gleiche Beschaffenheit. Hier lässt sich der Wechsel in der Helligkeit einfach erklären, wenn man annimmt, dass bereits grosse Flächenstücke der Oberfläche erkaltet und dunkel geworden sind, während sich andere noch im feurigen Zustand befinden.

Wieder andere Sterne wechseln ohne erkennbare Periode oft plötzlich ihre Helligkeit ganz bedeutend und zeigen dann zur Zeit des Maximum der Helligkeit, ausser dem continuirlichen Spectrum, einzelne helle Linien; hauptsächlich des H. Hier handelt es sich um gewaltige Gasausbrüche aus dem schon zum grössten Theil an der Oberfläche erkalteten Stern. Es ist der letzte Kampf des feurigflüssigen Innern gegen die schliesslich dauernd werdende Umschliessung mit einer dunkeln erkalteten Rinde.

So wandert langsam aber sicher jede hellstrahlende leben- und wärmespendende Sonne dem Zustand zu, den ihre Kinder, die Planeten, viel früher bereits erreicht haben.

Aber auch im Uebrigen gleicht die Entwicklung der Sonnen in ihren weiteren Phasen derjenigen der Planeten.

Auch die Sonnen führen keine Existenz, die nur von sich selbst bedingt und von den andern Himmelskörpern unabhängig wären. Den Namen Fixstern tragen sie wie längst erkannt ist, mit Unrecht, da uns die spectrokopischen Untersuchungen die Bewegung in der Gesichtslinie und die teleskopischen die hierzu senkrechte Bewegung gezeigt haben. Alle Massen des Weltraums, so lehrt uns das Newton'sche Gravitationsgesetz, ziehen sich an mit einer Kraft, die dem Producte der Massen direkt und dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional ist und deshalb sind auch den Sonnen Bahnen vorgeschrieben, die derselben Ursache entstammend wie die Planetenbahnen, mit diesen das Wesen gemein haben, dass sie eben eine Folge des Gleichgewichtszustandes zwischen Anziehungskraft und lebendiger Kraft darstellen. Wie aber bei den Planeten Kräfte angenommen werden mussten, welche diese beiden Componenten umgestalten, so müssen dieselben Annahmen auch für die Bewegungen der Fixsterne gelten. Auch sie sind nicht unveränderlich und der Abstand zwischen den einzelnen Gebilden bleibt nicht ewig gleich. Gerathen aber auf diesen variablen Wegen 2 Sonnen zufällig in grössere Nähe, so können sie für eine Zeit das Bild eines Doppelsterns hervorbringen, wie wir es nach den Beobachtungen der letzten Jahre hauptsächlich nach dem Vorgange Struve's in so grosser Zahl am Himmel sehen. Zwar können auch Doppelsternsysteme dadurch entstehen, dass bei der Bildung der betreffenden Welt aus Urmaterie zufällig 2 Attractionscentren sich bildeten, oder dass ein Ring von gewaltiger Dimension sich zu einem sehr grossen Planet verdichtet, (ein Bild das unsere Sonne mit dem noch leuchtenden Jupiter einst gegeben haben mag), aber diese Annahme schliesst die oben erwähnte nicht aus und das Schlussresultat wird so oder so das gleiche sein müssen. Drehen sich 2 Sterne um einen gemeinsamen Schwerpunkt, so kommen dieselben Hemmnisse der Bewegung wie bei den Planeten in Betracht und somit muss mit abnehmender Centrifugalkraft die Centripetalkraft der Anziehung immer mehr überwiegen, so dass die beiden Körper sich spirallisch nähern und schliesslich aufeinander stossen müssen. Bei der Umwandlung ihrer lebendigen Kraft in Wärme muss aber die Temperatur eine solche Höhe erreichen, dass beide Körper vollständig in Dampf von höchster Verdünnung verwandelt werden. Damit ist dann einerseits das Ende einer Welt eingetreten, aber wir erkennen in dem

Resultat dieses Weltuntergangs ohne Weiteres das Anfangsstadium des chaotischen Urnebels, aus dem wir die Welt entstehen sahen, wieder. Das Ende einer Welt ist der Anfang einer neuen. Und nun sind wir auch in der Lage die gemeinsame Bewegung der Unnebelmasse zu erklären: es ist die alte Richtung der rotirenden Körper, welche in den Nebel übergegangen ist.

M. H. Ich habe versucht, Ihnen an der Hand des bis heute vorliegenden Beobachtungsmaterials ein Bild von den Vorgängen bei Entstehung, Entwicklung und dem Vergehen einer Welt zu entwerfen. Ich habe mich bemüht, Alles zu vermeiden, was nicht aus analogen bereits beobachteten Himmelserscheinungen geschlossen werden kann.

Die unaufhaltsam weiter fortschreitende Wissenschaft wird durch zukünftige Resultate ihrer Forschung die Lücken in dem Bilde auszufüllen und vielleicht die ein oder andere Phase richtig zu stellen vermögen; unzweifelhaft bleibt aber die Thatsache bestehen: Das Leben einer Welt ist wie das Leben eines Individuums zeitlich begrenzt nach 2 Seiten, es hat einen Anfang und ebenso sicher ein Ende, nachdem es eine Reihe von verschiedenen Entwicklungsphasen durchlaufen hat. Aber die einzelnen Welten mögen im Laufe der Zeiten untergehen, die Welt bleibt darum doch bestehen. Sie stellt die in die Erscheinung getretenen Gedanken Gottes dar und ist so ewig und unendlich wie dieser selbst.

---

## Benutzte Litteratur.

---

1. Kant: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.
  2. Himmel und Erde. Illustrierte naturwissenschaftliche Zeitschrift.  
Herausgegeben von der Gesellschaft Urania. Band I—VIII.
  3. Klein: Jahrbuch der Astronomie und Geophysik. Jahrgang I—VI.
  4. Diesterwegs Populäre Himmelskunde. Herausgegeben von Meyer u. Schwalbe.
-

ZUR

# GEOLOGIE DER LORELEIGEGEND.

---

VON

STUD. GEOL. **ALEXANDER FUCHS,**

z. Z. in MARBURG.

---

(VORLÄUFIGE MITTHEILUNG.)

---



In der Loreleigegend sind — abgesehen von diluvialen und einigen kleinen tertiären Ablagerungen — die tieferen Stufen der devonischen Formation z. T. vertreten: die Primaevusstufe Frechs und der untere Spiriferensandstein v. Sandbergers. Von diesen beiden Schichtenreihen ist die erste hier nur theilweise und zwar als Rhipidophyllenschiefer entwickelt, welcher bei Kaub, Dörscheid, Weisel und Bornich durch Gruben- und Steinbruchbetrieb mannigfach aufgeschlossen wird und eine eigenartige, aber sehr spärliche Fauna liefert. Eine ziemlich reichhaltige Liste der in dem erwähnten Horizonte überhaupt gefundenen Versteinerungen macht F. v. Sandberger in den Nassauischen Jahrbüchern 1889 bekannt; von Kaub werden achtzehn Arten erwähnt, zu denen ein neuerdings durch O. Jäkel von dort beschriebener, prachtvoller Krinit — *Ac. rex* — zu zählen ist. Ich habe dieselbe Species auf der Grube Vogelsang am Eckert bei Weisel (Sauerthal) gefunden. Schliesslich verdient noch gesagt zu werden, dass auf der Grube Kreutzberg im Sauerthal (Gemarkung Dörscheid\*) öfters Lamellibranchier, leider sehr schlecht erhalten, vorkommen; sie gehören sämmtlich Gattungen an, welche m. W. aus dem Rhipidophyllenschiefer noch nicht bekannt sind. Näheres gedenke ich später in einer ausführlicheren Arbeit mitzutheilen, wenn, wie ich hoffe, das palaeontologische Material sich bis dahin um einige bessere Stücke vermehrt hat.

Die Grenze der Rhipidophyllenschiefer nach dem unteren Spiriferensandsteinen hin ist neuerdings von Prof. Holzapfel genauer festgestellt worden. Ich verweise an dieser Stelle auf die sehr interessante Arbeit des gen. Herrn, die in den »Abhandlungen der Kgl. Preuss. geologischen

---

\*) Prof. Holzapfel in Aachen wendet sich gegen F. von Sandberger, welcher als Fundort öfter die Grube „Kreutzberg bei Dörscheid“ angiebt. Zu den Ausführungen H.'s bemerke ich, dass allerdings nur die Grube Kreutzberg im Sauerthal gemeint sein kann; diese aber liegt noch in der Gemarkung Dörscheid (oberhalb Weisel).



Landesanstalt« 1893 niedergelegt ist: »Das Rheinthale von Bingerbrück bis Lahnstein«. Ueber das Alter der zweiten Schichtenreihe hat sich Prof. Holzapfel ebenfalls ausgesprochen und in unserer Gegend dieselbe insgesamt zum unteren Spiriferensandstein (oder wie er ihn lieber nennt »Untercoblenz«) gestellt. Die Fauna dieser Schichten weicht an manchen Punkten allerdings erheblich von derjenigen ab, welche aus dem gleichen Niveau der Coblenzer Gegend bekannt wurde. Doch gilt das Gesagte nur von den versteinerungsführenden Grauwacken der Loreleigegend. Die Quarzite, welche im Spitznack, an der Lorelei und im Forstbachthale von Saueressigs bis Chilas (Mause) Mühle verbreitet sind, weisen durchweg die typische Fauna des unteren Spiriferensandsteins auf.

Es empfiehlt sich, über die Fauna der Grauwacken und der Quarzite getrennt zu berichten. Als die besten Fundorte für die ersteren sind zu nennen: Die Schanze bei Dörscheid; das Heimbachthal bei Bornich (mittlerer Lauf, rechte Seite); Eredill bei Bornich (unterhalb der Gemeinde-Mühle); die Eeg bei Bornich sammt dem Ligrenköpfchen; ferner Balledillsköpfchen bei Bornich; der Galgenkopf unweit der Lorelei, die Weinberge in der nächsten Nähe von Patersberg und eine Stelle jenseits der Lierschieder Verwerfungsspalte im Raitzenhainer Thal. An diesen Fundorten sind mir *Strophomena laticosta*, *Reusselaeria strigiceps* ebenso wie andere bezeichnende Versteinerungen des untern Spiriferensandsteins niemals begegnet, statt dessen aber folgende Arten:

*Atrypa reticularis*. (Schanze, Heimbachthal, Eredill, Patersberg, Galgenkopf,) sehr häufig.

*Cyrtina heteroclyta*. (Schanze, Heimbachthal, Patersberg, zuweilen häufig.)

*Stroph. piligera* (Heimbachthal.)

— — *rhomboidalis* (Eeg — gemein — Heimbachthal, Raitzenhain.)

*Spirifer carinatus* (überall häufig.)

*Spirifer* cf. *curvatus* (Heimbachthal, Galgenkopf).

— — *paradoxus* (Eeg, Patersberg, Heimbachthal, oft häufig, Balledillsköpfchen.)

— — *arduerneusis* (allenthalben gemein.)

*Pterinaea costata* (Eeg, Eredill.)

— — *lamellosa* (Eeg.)

— — *fasciculata* (Eeg, Eredill.)

*Strophomena Murchisoni* (Heimbachthal, Galgenkopf.)

Dazu kommen noch eine grosse Zahl anderer organischer Reste, die aber z. T. weitere Verbreitung innerhalb des Spiriferensandsteins haben, z. T. noch genauerer Bestimmung bedürfen. Auffallend ist das vollständige Fehlen der *Strophomena laticosta* an den erwähnten Stellen. \*) An sich könnte dies freilich bei der Altersbestimmung der Schichten nicht sehr ins Gewicht fallen, auch das Auftreten von Formen wie *Atrypa reticularis* und *Strophomena rhomboidalis*, die sonst nur in jüngeren devonischen Horizonten gefunden werden, hat nichts Befremdendes, wenn man bedenkt, dass diese Thiere bereits in der Silurzeit lebten; ja der Umstand, dass *Strophomena Murchisoni* gemein im Heimbachthale, in Anzahl auf dem Galgenkopfe vorkommt, verleiht den hier entwickelten Schichten ein alterthümliches Gepräge. Demgegenüber muss das häufige Auftreten der typischen *Cyrtina heteroclyta* betont werden, um so mehr, als sie bei Patersberg zusammen mit zahlreichen Exemplaren eines sehr grossen *Spirifer paradoxus* \*\*) erscheint. Wird, was noch wahrscheinlich ist, trotz alledem die Auffassung Holzapfels, dass jene Schichten insgesamt zum untern Spiriferensandstein zu stellen sind, beibehalten werden, so wäre zum ersten Male die Thatsache constatirt, dass *Atrypa reticularis* bereits im untern Spiriferensandstein vorkommt; dass sie demnach auch nicht mehr als Leitfossil für den oberen benutzt werden könne, erscheint wahrscheinlich. Ich bemerke hier, dass Prof. Kayser bereits vor längerer Zeit die Ansicht ausgesprochen hat; *Atrypa reticularis*, welche bereits im Obersilur vorhanden sei und erst im höhern Unterdevon wiedererscheine, müsse mit der Zeit auch in tiefern devonischen Niveaus gefunden werden. Jetzt bleibt es noch abzuwarten, wie die weitere Erforschung der Primaevusstufe ausfällt, da sich dann jedenfalls interessante Vergleiche mit unserer Gegend anstellen lassen werden. Den *Spirifer primaevus* führt Holzapfel aus der Loreleigegend an, *Kochia capuliformis* aus dem Wellmicher Porphyroid.

Nun wurde mir, viel später als ich die genannten Fundorte entdeckte, eine Stelle in den Quarziten an Saueressigs Mühle im Forstbachthale durch Herrn Lehrer Priestersbach-Wald-Solingen, gezeigt, welche *Strophomena laticosta* in zahlloser Menge enthielt, daneben massenhaft *Rhynchonella livonica* var. *inaurita* Sandb. und den schon von

---

\*) Nur Holzapfel erwähnt sie als Seltenheit von der Schanze. Dort fand ich sie nicht.

\*\*) Nicht *dunensis*, Kayser.

Frech erwähnten *Spirifer aff. subcuspidato*, welcher übrigens eine blosse Varietät des typischen ist; letztere Form kommt sehr selten auf dem Galgenkopfe vor. An der Mühle finden sich ferner in grossem Formenreichthum *Lamellibranchiaten* und *Gastropoden*, seltener *Palaeaden* und *Cephalopoden* sowie schlechte *Fischreste*. Auch *Renssclaeria strigiceps* und die *Singhofener Cypricardella unioniformis* (aus dem *Limopterasschiefer*) wurden gesammelt, niemals aber *Atrypa reticularis* oder gar *Cyrtina heteroclyta*. Es ist hier also die echte Fauna des untern *Spiriferensandsteins* vorhanden. Am passendsten wird gleich hier ein Fund erwähnt, welchen ich im *Breitnack-Spitznack* oberhalb der *Lorelei* gemacht habe und der für das Verständniss der geologischen Verhältnisse in der *Loreleigegend* von grossem Werth ist. Dort sammelte ich in den harten *Quarziten* ein Handstück, auf welchen *Cyrtina heteroclyta* neben *Strophomena laticosta* lag, sodass ein Irrthum vollständig ausgeschlossen ist. Auch *Strophomena rhomboidalis* und *Atrypa reticularis* fanden sich daselbst, allerdings in einer *Grauwacke*, die losgelöst vom Anstehenden in den *Weinbergen* lag. Doch ist es höchst wahrscheinlich, dass dieselbe einer jener *Bänke* angehörte, welche mit den harten *Quarziten* auch im *Spitznack* wechsellagern. Neuerdings bemerkte ich ebendort (nördliche Felsenpartie, auch *Breitnack* genannt) nicht weit von der Stelle, wo ich die vorhin erwähnten Sachen fand, noch eine *Stroph. laticosta*- und eine *Cypricardellenbank*, welche *Cyrtina heteroclyta* enthielt (als Seltenheit). Hierdurch wurde ich auf folgende Thatsachen aufmerksam gemacht: Die *Quarzite* der *Loreleigegend* [*Lorelei*, *Spitznack-Breitnack*, *Saueressigs bis Chilas (Mause) Mühle*] enthalten sämmtlich die typische Fauna des unteren *Spiriferensandsteins*, und durch das Auftreten der *C. heteroclyta* im *Breitnack* werden die Beziehungen der *Grauwacken* zu der *Quarzitfauna* enger gestaltet. Dieselben oder doch sehr ähnliche Verhältnisse stellte ich bei den jenseits der *Lierschieder Verwerfungsspalte* liegenden *Quarziten* fest, so bei *Niederwallmenach*, *Raitzenhain*, *Reichenberg*, *Lierschied*.

An den zuerst erwähnten Fundorten (*Schanze*, *Heimbachthal* u. s. w.) sind ausschliesslich mehr oder minder transversalschiefrige, milde oder harte *Grauwacken* entwickelt; zu diesen gesellen sich in der *Eeg* noch härtere *Bänke*, ohne dass man berechtigt wäre, hier von *Quarziten* zu reden. In den petrographisch so charakterisirten Schichten findet sich überall eine gleichartige Fauna: *Chonetebänke* und solche von *Spirifer arduennensis* sind am verbreitetsten. Daneben finden sich die oben er-

wähten Brachiopoden. Lamellibranchier sind häufiger nur durch die Aviculiden vertreten, im Uebrigen ziemlich selten. Anthozoen sind nirgends selten, meist schlecht erhalten; nur die zahlreichen Formen von *Zaphrentis*, *Pach. cf. cervicornis* (Eeg) und einige andere machen zuweilen eine Ausnahme. Der Galgenkopf liefert zahlreiche, aber schlecht erhaltene, kolonienbildende Korallen. Von den Gastropoden fand sich in den Grauwacken nur eine Form allgemein verbreitet: *Capulus* sp. conf. *subquadratus*. Am gemeinsten ist sie in der Eeg, sehr selten im Heimbachthale, wo sie übrigens etwas variiert, häufiger auf dem Galgenkopfe, wo neben der typischen Form der Eeg manche Varietäten vorkommen. Auch im Breitnack fand ich diese Species wieder in den Grauwacken; in den Quarziten erscheint sie ebenfalls, z. B. an Chilas Mühle und, etwas variirend, an der Lorelei. Da nun *Capulus* nach neueren Untersuchungen in der devonischen Zeit ein in voller Entwicklung begriffenes Geschlecht war, so darf man kein besonderes Gewicht auf geringfügige Unterschiede im Schalenbau legen.

Im Gegensatze zu den transversalschiefriigen Grauwacken beherbergen die Quarzite neben der Brachiopoden- eine viel reichere Lamellibranchierfauna, sodass Beushausen in Berlin ganz recht hatte, wenn er neuerdings auch diese Klasse der Mollusken mehr berücksichtigt wissen will, als es bisher geschah. Bei aufmerksamem Suchen findet man sie überall, wenngleich in den Grauwacken seltener. Der gen. Herr hatte die Güte, mir eine Anzahl meiner Arten zu bestimmen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank sage. Indessen verzichte ich jetzt noch auf nähere Angaben, da mein Material sich neuerdings um viele Species vermehrt hat, die z. T. für diesen Horizont, z. T. überhaupt neu sind. Erst wenn das ganze Material bearbeitet ist, werde ich in der Lage sein, dieser vorläufigen Mittheilung eine ausführliche Schilderung des »Unterdevons der Loreleigegend« folgen zu lassen.

Herr Prof. Holzapfel, welchem ich in jüngster Zeit zu meinem grossen Vergnügen die Fundorte der hiesigen Gegend wenigstens z. Th. zeigen konnte und dem ich manche Aufklärungen über die geologischen Verhältnisse am Mittelrhein verdanke, erklärt die immerhin bedeutende Verschiedenheit der Grauwackenfauna von derjenigen der Quarzite durch Faziesunterschiede. Mit dieser Auffassung hatte ich mich jüngst um so mehr befreundet, als ich erst nach der Besprechung mit gen. Herrn die Cypricardellen- und die Laticostabank im Breitnack entdeckte und



somit Cyrt. heteroclyta in zweifellosem unterem Spiriferensandstein nachgewiesen hatte.

Doch eine Beobachtung, welche ich nicht unerwähnt lassen darf, widerspricht dieser Ansicht: An der Sauerëssigs Mühle bilden die Quarzite des unteren Spiriferensandsteins, zwischen denen zuweilen dünne, schiefrige Grauwackenbänkchen lagern, einen Luftsattel auf der rechten Seite des Forstbachthales. Die Schichten sind gegen die Thalsohle geneigt und werden auf der linken Thalseite deutlich von Grauwacken überlagert, welche neben der bereits selten gewordenen *Stroph. laticosta* die folgenden Formen aufweisen: *Rhynchonella pila*, *Cyrtina heteroclyta* und (?) *Atrypa reticularis*. Lammellibranchier sind hier sehr häufig, und es fällt auf, dass der Charakter derselben wesentlich anders ist als gegenüber an Saueressigs Mühle. Nun hat Prof. Holzappel ein hübsches Profil des Rheinthalles von der Schanze bis zur Burg Katz und dem Forstbachthale in seiner schon erwähnten Arbeit veröffentlicht. Wenn aber die Lagerungsverhältnisse auf so kurze Strecken (Saueressigs Mühle liegt in gerader Richtung kaum eine halbe Stunde vom Rheinthal) sich so sehr ändern, so deutet dieser Umstand auf grosse Störungen hin und erschwert dadurch die Erklärung wesentlich. Eine endgültige Antwort wage ich deshalb auf die Frage, ob in der Loreleigegend nur unterer Spiriferensandstein, oder auch oberer entwickelt sei, nicht zu geben.

Nach den Ausführungen Holzappels auf Seite 46 seiner Abhandlung liegen die Grauwacken der Eeg und des Ligrenköpfchens unter den Quarziten des Spitznacks und Ransteler Berges, ferner die Grauwacken des Hühnerbergs unter den Quarziten der Lorelei. Die Quarzite des Spitznacks entsprechen denen der Lorelei infolge der von Holzappel constatirten Ueberschiebung. So liegen die Verhältnisse in der That, aber damit ist nicht alles erschöpft. Die Dörscheider Grauwacken liegen direkt über den Rhipidophyllenschiefern in der Dörscheider Mulde. In diese wären nach der Auffassung Holzappels — dies geht aus seiner Karte hervor — auch noch die Grauwacken des Heimbachthals\*) zu verlegen. Nördlich von denselben müsste das »schmale Band reiner, fossilfreier Thonschiefer« folgen, welches sich in Mühlborn bei Bornich (Forstbachthal unweit der Gemeindemühle) mit der südlich liegenden Hauptmasse der Hunsrücksschiefer vereinigen soll. Trotz vieler Bemü-

---

\*) H. nennt es Bornicher Thal.

hungen habe ich nördlich von den Grauwacken des Heimbachthals ein derartiges Band von Rhipidophyllenschiefer nicht finden können, vielmehr scheint es, als ob die Grauwacken des Heimbachthales über den Quarziten von Ranstel (? Ranscheler Berg bei Holzappel z. T.)\*) liegen. Geht man vom Heimbachthale im Streifen nach N.-O., so gelangt man nicht an die Stelle, wohin man nach der Karte kommen müsste, nämlich in das Forstbachthal zwischen Odinsnack und Gemeindemühle, sondern nach Eredill (Forstbachthal oberhalb Saueressigs Mühle) und hier liegen Schichten mit *Atrypa reticularis* und *Pterinaea fasciculata* zweifellos über den Quarziten, welche nach Saueressigs Mühle hin das Gelände beherrschen. Nun sind allerdings die Aufschlüsse nicht so gut, dass sich mit Sicherheit behaupten liesse, die Grauwacken in Eredill seien die Fortsetzung des Zuges, welcher im Heimbachthal zu Tage tritt. Schliesslich wäre noch die Möglichkeit vorhanden, dass der von mir erwähnte Grauwackenzug im Heimbachthale auf der vorliegenden Karte etwas weiter nördlich, jenseits des »schmalen Bandes der Hunsrückschiefer« zu verlegen ist und dass die noch zur »Dörscheider Mulde« zu rechnenden Grauwacken im Heimbachthale weiter südlich zu suchen sind, dies erscheint sogar wahrscheinlich. Eine endgültige Antwort auf diese Fragen hoffe ich später zu geben, wenn eine erneute Untersuchung der Lagerungsverhältnisse stattgefunden hat.

Auf die in der Loreleigegend als Einlagerungen im untern Spiriferensandstein vorkommenden Porphyroide weise ich kurz hin. Prof. Holzappel hat sie zur Genüge besprochen; die Fauna derselben setzt sich, im Gegensatz zu derjenigen der Singhofener Limopterasschiefer, aus den Brachiopoden des untern Spiriferensandsteins zusammen. Aus einem Porphyroid von Reichenberg wurden mir *Rhynchonella livonica* var. *inaurita* Sandb. und *Athyris* sp. conf. *avirostris* sowie eine *Loxonema* von einem dort arbeitenden Maurer gegeben. Dass somit unsere Porphyroide in faunistischer Hinsicht nicht ohne weiteres mit den lamellibranchiireichen Limopterasschiefern verglichen und parallelisirt werden können, ist meine Ansicht; hierin nähere ich mich der Auffassung Beushausens, welcher neuerdings in seiner grossen, schönen Monographie: »die Lamellibranchiaten des rhein. Devon« die Frage nach der Stellung

---

\*) Den Ausdruck „Ranscheler Berg“ hörte ich hier noch nicht, doch giebt es ein sog. Ranschtel (oder Ranstel) bei Bornich, ein kleines Thälchen, in dem versteinungsreiche Quarzite liegen.



der Limopteraschiefer von Singhofen für noch nicht gelöst erklärt. Leider habe ich selbst das Porphyroid bei Reichenberg noch nicht finden können. Sollte dies geschehen, so sind ohne Zweifel interessante Resultate zu erwarten.

Schliesslich erwähne ich noch, dass unter den Quarziten der Saueressigs Mühle wiederum dieselben Grauwacken, wie in der Eeg, an Borns Mühle folgen. Somit ergiebt das Profil durch die Schichten im Forstbachthale eine Wiederkehr der Schichten des Rheinthals, allerdings, wie oben erwähnt, mit einigen Veränderungen und Störungen, so besonders an Saueressigs Mühle. Auch eine Wiederholung der gesamten Schichten infolge von Ueberschiebungen scheint hier wie dort stattzufinden; denn die Quarzite der Lorelei durchschneidet man, wenn man von Borns Mühle im Forstbachthale abwärts geht, oberhalb der »obern Zellers Mühle«. Zudem hat es den Anschein, als ob die Grauwacken bei Patersberg wenigstens theilweise unter den Quarziten liegen, welche die Fortsetzung des Zuges von der Lorelei bilden, und dass die ersteren somit als ein Aequivalent der Schichten am Hühnerberg, bezw. der Eeg zu betrachten sind.

---

DIE

MOLLUSKEN - FAUNA

DER

MAKARONESISCHEN INSELN.

VON

DR. W. KOBELT  
(SCHWANHEIM.)



Mit dem Namen makaronesische Inseln bezeichnen nach dem Vorgange der Botaniker die Zoogeographen jetzt allgemein die Inselgruppen, welche wir früher die atlantischen zu nennen gewohnt waren. Man hat auf die alte griechische Benennung der »glückseligen Inseln« zurückgegriffen, um Verwechslungen mit dem nordafrikanischen Atlasgebiete zu vermeiden. Die Inseln bestehen bekanntlich aus vier Gruppen, von denen die Azoren und Maderen rein pelagisch sind, während die Canaren und Capverden dem Festlande von Afrika näher liegen, aber doch durch so bedeutende Meerestiefen von ihm getrennt werden, dass sie als unabhängig betrachtet werden müssen. Sie haben eine besondere Wichtigkeit dadurch, dass man in ihnen die Bergspitzen eines versunkenen Landes hat sehen wollen, der Atlantis des Plato, welche den Säulen des Herkules gegenüberlag. Bei oberflächlicher Betrachtung haben sie in Flora und Fauna allerdings zahlreiche gemeinsame Züge, welche dazu verleiten können, sie als Reste einer versunkenen grösseren Landmasse zu betrachten; auch der grosse Artenreichtum in manchen Thierklassen vorab den Landmollusken könnte dadurch erklärt werden, dass beim langsamen Sinken der Gebirge die Schnecken an den Gehängen in die Höhe getrieben und schliesslich auf den Gipfeln zusammengedrängt wurden. Prüfen wir die Frage einmal an der Hand eines eingehenden Studiums der Landschneckenfauna, die glücklicherweise recht genau bekannt ist.

Beginnen wir mit der nördlichsten und abgelegensten Inselgruppe, mit den Azoren.\*) Fast in der Mitte zwischen Europa und Amerika gelegen, ringsum von sehr tiefem Wasser umgeben, aus rein vulkanischem Gestein aufgebaut, sind sie der Typus einer echt oceanischen Inselgruppe oder eigentlich dreier, denn sie zerfallen in drei durch Zwischenräume von fast 200 Kilometern geschiedene Gruppen, von denen die

---

\*) cfr. Morelet, *Histoire Naturelle des Açores* 1860. — Hartung, die Azoren 1860. — Simroth, die Nacktschnecken der portugiesisch-azorischen Fauna, in *Nova Acta Leop. Carol. Acad.* Vol. 56, 1891.

nordwestliche Flores und Corvo, der mittlere Fayal, Pico, San Torge-Graciosa und Terceira, die südöstliche San Miguel und Santa Maria umfassen. Ihre Flora und Fauna sind mit besonderer Rücksicht auf die Mollusken von den Herren Drouët und Morelet und neuerdings von Dr. Simroth und von der Yacht »Hirondelle« des Fürsten von Monaco erforscht worden, und sie können als eben so gut bekannt gelten, wie irgend ein Theil des südlichen Europa. Die Zahl der bekannt gewordenen Arten beläuft sich auf 69, eine im Verhältniss zur Ausdehnung geringe Anzahl, welche aber erklärlich wird durch die Beschaffenheit des vulcanischen Bodens, dem nicht nur der Kalk fast völlig mangelt, sondern der auch in Folge seiner langsamen Verwitterung den Schnecken nur wenig sichere Verstecke bietet. Dabei ist die untere Region der Abhänge überall sorgfältig angebaut, die Inseln sind ja der Garten Portugals; die einheimische Fauna ist mit der Flora, dem Buschwald von Erica, Juniperus, Buxus, Myrica u. dgl. in den höheren Regionen zurückgedrängt, wo sie in den üppigen, feuchten Polstern der Laub- und Lebermoose ihre Zuflucht findet. Die Umgestaltung der physikalischen Verhältnisse ist aber, dank dem feuchteren Klima, viel weniger erheblich, als auf den Canaren oder gar auf Madera und Porto Santo, und von ausgestorbenen Schneckenarten wird noch nichts berichtet. Von den aufgezählten Arten ist die Hälfte (35) den Inseln eigenthümlich; 29 sind weitverbreitete, auch an den Küsten von Portugal vorkommende Arten, und es kann von diesen\*) kaum zweifelhaft sein, dass sie in den 450 Jahren, welche seit der Besiedelung verflossen sind, von Portugal aus hinübergebracht worden sind, zufällig, oder wie *Macularia lactea* und *Pomatia aspersa* absichtlich zu Nahrungszwecken. Eine weitere Art, *Helix armillata* Lowe, ist von der weitverbreiteten *Xrophila caperata* Mtg. schwerlich specifisch verschieden. Von den sechs übrig bleibenden Arten sind vier mit Madera gemeinsam, drei davon leicht verschleppbar (*Pupa anconostoma*, *P. microspora* und *Helix paupercula*) und vielleicht ohne menschliches Zuthun schon früh herübergekommen, die vierte, *Leptaxis erubescens* Lowe, jedenfalls durch Menschenhand verschleppt, denn sie findet sich auf den Azoren nur in den Orangerien. Die beiden anderen Arten sind mit den Canaren gemeinsam,

---

\*) Eine Ausnahme könnte vielleicht *Amalia gagates* machen, die Simroth, weil er sie nur mit indigenen Arten zusammen in höheren Lagen fand, für alteinheimisch halten möchte.



*Helix servilis* Shuttl. winzig klein und leicht verschleppbar, *Buliminus variatus* auf eine einzige kleine Localität beschränkt und wahrscheinlich erst in neuerer Zeit zufällig eingeführt.

Unter den 35 einheimischen Arten fällt zunächst der Reichtum an *Vitrina* auf, ein mit den Canaren und in geringerem Grade auch mit Madera gemeinsamer Characterzug. Die Gattung *Vitrina* ist allem Anscheine nach uralt, jedenfalls bis vor die Tertiärzeit zurückreichend, und deshalb zoogeographisch wenig verwendbar; von Interesse ist, dass die sämtlichen macaronesischen Arten anatomisch zu einer und derselben Gruppe gehören, und dass diese Gruppe mit *V. elliptica* Brown und *major* Fer. sich über Westeuropa bis nach Südwestdeutschland verbreitet, während sowohl in den Alpen, als in den Circumpolargebieten andere Gruppen herrschen. Jedenfalls sind sie uralt einheimisch auf den Azoren; nach Simroth ist die Raubnacktschnecke *Rutonia* s. *Vignesnelia atlantica* Morel. aus ihnen hervorgegangen, und zwar in relativ neuerer Zeit, da sie sich nur auf einigen Inseln der Mittelgruppe findet.

Die zweite stärker vertretene Schneckengruppe sind *Buliminus* aus der Gruppe *Napaeus*. Es ist das ein Zug, der mit den Canaren gemeinsam ist; auf Madera fehlt die Gruppe ganz, in Marocco und auf der iberischen Halbinsel ist sie nicht oder schwach entwickelt, wir werden bei der Betrachtung der canarischen Fauna auf sie zurückkommen. Auf den Azoren stehen diese Arten mit ihren verhältnissmässig dicken Schalen fremdartig unter den anderen, aber sie kommen mit ihnen zusammen an den Tuffwänden der höheren Lagen vor und scheinen eben so alt zu sein. Weniger auffallend ist das Auftreten zahlreicher kleiner Pupa-Arten, da diese Gattung wohl die älteste Landschneckengattung ist und bis in die Kohlenformation zurückreicht. Dass von den 8 Arten 6 eigenthümlich sind, beweist das Alter der Abtrennung. Endlich ist noch ein sehr wichtiger Characterzug, wie wir weiter unten sehen werden, das Auftreten einer Deckelschnecke (*Craspedopoma hespericum* Morelet). Nicht minder wichtig sind einige negative Characterzüge. Die sonst überall, selbst auf dem einsamen St. Helena vorhandene Gattung *Succinea* fehlt den Azoren, die Clausiliiden sind nur durch die älteste Form *Balea perversa* (var. *nitida* Mouss.) vertreten, vorausgesetzt, dass diese weitverbreitete Art nicht zu den eingeschleppten gehört; ebenso die Cionelliden nur durch *C. lubrica*; *Ferussacia* fehlt ganz; *Helix*, die Charaktergattung

des paläarktischen Gebietes, ist zwar durch sieben eigenthümliche Arten vertreten, von denen fünf zu der macaronesischen Gruppe *Leptaxis* gehören, eine zu *Actinella*, die siebente zu der durch ganz Europa verbreiteten Untergattung *Trichia*; aber im Vergleich zu der sonstigen Entwicklung der Heliciden und besonders zu der auf den anderen macaronesischen Inselgruppen muss man diese Ziffer ganz abnorm niedrig finden. Auch die Süßwasserschnecken sind auffallend gering an Zahl; erst die neueste Zeit hat uns zwei Arten, eine eingeschleppte *Physa* und ein eigenthümliches *Pisidium* kennen gelehrt. Hier genügt allerdings zur Erklärung die weite Entfernung, die einen regelmässigen Besuch durch europäische Watvögel ausschliesst.

Von grosser Wichtigkeit ist das vollständige Fehlen aller amerikanischen Züge in der Azorenfauna, obwohl sie das am weitesten vorgeschobene Glied Europas sind und die Strömungen gar nicht selten amerikanische Sämereien — gegen 20 Arten sind im Laufe der Zeit beobachtet worden — an ihre Küste anspülen. Die angebliche Verwandtschaft von *Plutonia* und *Selenites*, auf die Fischer hindeutete, hat Simroth als nicht existirend nachgewiesen. Noch auffallender ist, dass trotz des milden Klimas und der grossen Menge tropischer und anderer fremder Gewächse, die man auf den Azoren cultivirt oder als Zierbäume anpflanzt, keine tropische Art, auch keine brasilianische, übergeschleppt worden ist.

Bourguignat hat geglaubt, in der Fauna der Azoren einen continentalen Charakter zu erkennen und sieht in ihnen darum den Rest eines grösseren festlandartigen Landcomplexes. Ich kann ihm darin nicht beistimmen und halte die Fauna im Gegentheil für eine ausgesprochen insulare. Will man in den *Buliminus* einen continentalen Charakterzug sehen, so käme er viel mehr den Canaren mit ihren 23 Arten zu.

Wenden wir uns nun zu der zweiten Inselgruppe, der von Madeira. Sie besteht bekanntlich aus der gleichnamigen Hauptinsel, dem kleineren Portosanto und den ganz kleinen, unbewohnten Desertas und Selvajes. Obwohl dem Festlande näher gelegen, als die Azoren, ist sie immerhin noch 550 Kilometer vom nächsten Lande entfernt und ringsum von sehr tiefem Meere umgeben; doch verbindet ein Plateau von weniger als 2000 Faden Tiefe die Inseln mit der portugiesischen Küste, während zwischen ihnen und den Canaren erheblich grössere Tiefen (23—2400 Faden) liegen. Zur Zeit der Entdeckung waren die

Hauptinseln mit dichtem Urwald bedeckt; heute ist Portosanto völlig baumlos, die Hauptinsel in den höheren Regionen mit ähnlichem Buschwald bedeckt wie auf den Azoren. Die Molluskenfauna ist uns dank der Untersuchungen von Wollaston, Lowe, Albers, de Paiva, Watson viel genauer bekannt, als die vieler europäischer Länder. Wir kennen 176 Arten. Scheiden wir die 9 strandbewohnenden Arten (*Truncatella*, *Assiminea* und die *Auriculaceen*) aus, so bleiben für den Flächenraum von kaum 15 Quadratmeilen 167 Arten, und von diesen sind nicht weniger als 133, also über 80<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, auf die Inselgruppe beschränkt. Es sind natürlich weitaus überwiegend Landschnecken; aus den spärlichen Wasserläufen kennen wir nur 4, sämmtlich aus Europa importirte Arten. Dieser riesige Reichthum im Vergleich zu den Azoren ist sehr auffallend und wird nur zum Theil dadurch erklärt, dass die vulkanischen Gesteine hier viel älter und stärker verwittert sind als dort. Die Mollusken finden sich hauptsächlich in der Nähe des Strandes, auf einer eigenthümlichen, auch auf den Canaren hier und da entwickelten Kalkschicht, welche, oben ganz dünn, nach unten stärker werdend und am Meeresstrande bis zu 2 m dick abbrechend, die Abhänge bekleidet. Unter ihr liegen verwitterte Basalte oder vulkanische Tuffe. Dieser Kalk, der nach Lyell durch Auslaugung der vulkanischen Gesteine entstanden, erscheint noch in der nächsten Nähe betrachtet entsetzlich dürr und unfruchtbar, und doch wimmelt er von Mollusken. Die maderensische Fauna hat übrigens in Folge der Entwaldung schwere Einbussen erlitten und 12 gerade der schönsten und grössten Arten finden sich nur noch subfossil, viele sind subfossil häufiger als lebend.

Von den 34 weiter verbreiteten Arten sind sechs mit den Canaren gemein; drei derselben gehen bis zu den Azoren. Unter den mit Europa gemeinsamen Arten sind nach Watson\*), der die Insel durch längeren Aufenthalt sehr genau kennt, vier (*Hyalina crystallina*, *Patula pygmaea*, *Helix persana* und *Helix lenticula*) so allgemein verbreitet und auch fossil gefunden, dass er sie für einheimisch hält. Eingeschleppt, aber schwerlich von Menschenhand, erscheinen *Caecilianella acicula*, *Pupa umbilicata*, *Balea perversa*,

---

\*) Journal of Conchiology VII, Nr. 1. Die Abänderungen in den Zahlen gegenüber meiner früheren Darstellung in Jahrb. d. Mal. Ges. V sind Folge der neueren Untersuchungen von Watson.

vielleicht auch *Helix armillata*, durch menschliche Beihülfe die übrigen; als die letzten Ankömmlinge erscheinen ihm *Testacella haliotoidea*, *Pomatia aspersa*, *Patula rotundata*, sowie die Wasserschnecken, besonders *Planorbis glaber*, *Physa acuta* und *Hydrobra similis*.

Von den 133 einheimischen Arten entfällt weit über die Hälfte auf die Gattung *Helix* im engeren Sinne; es sind die Untergattungen, welche für die macaronesischen Inselgruppen charakteristisch sind: *Leptaxis*, *Janulus*, *Hispidella*, *Actinella*, *Plebecula*, *Ochthephila*, *Tectula*; wir werden über ihre Abstammung und Verwandtschaft später zu reden haben. Dann zahlreiche *Pupa* (je nach der Auffassung 25—28 Arten) und als scharfer Unterschied von den Azoren 8—10 *Ferussacien*, welche sich in der Form an die nordafrikanischen anschliessen, aber doch zu selbstständigen Gruppen entwickelt haben, und mehrere Arten der schon bei den Azoren erwähnten Deckelschneckengattung *Craspedopoma*. Die Gattung *Clausilia* erscheint von allen macaronesischen Inselgruppen nur hier mit drei Arten, welche sich portugiesischen Formen nähern, aber gut verschieden sind. Dagegen fehlen als Hauptunterschied von den Azoren wie von den Canaren die *Buliminus* vollständig. *Vitrina* ist nur durch drei Arten repräsentirt; auch *Parmacella* fehlt.

Nach den Untersuchungen von Watson finden sich von den einheimischen Arten 19 nur subfossil, 64 subfossil und lebend, 57 sind bisher noch nicht subfossil oder fossil aufgefunden worden. Dieselben lassen sich nicht von den subfossilen ableiten, denn sie convergiren durchaus nicht gegen diese hin; trotzdem sind sie offenbar erst auf der Insel wenigstens in ihren heutigen Wohnsitzen erschienen, als die fossilen Schichten schon gebildet waren. An eine Einwanderung ist auch nicht zu denken, da die Arten völlig eigenthümlich sind. Da man nun eine specielle Neuschöpfung so vieler Arten für die kleine Insel kaum annehmen wollen wird, bleibt meiner Ansicht nach nur eine Erklärung der Thatsache möglich. Die Arten haben früher in einem tieferen Niveau der Insel gelebt und sind bei einer positiven Strandverschiebung nach oben gedrängt worden, während ihre früheren Wohnstätten vom Meere überdeckt und etwaige dort gebildete Schichten weggespült wurden. Der steile Abbruch der Schneckenschicht an der Küste und der Küste überhaupt, die ja nur an einer Stelle zugänglich ist, deutet offenbar auf eine katastrophenartige Veränderung hin. Es



wäre wünschenswerth, dass die Verhältnisse einmal an Ort und Stelle auf diese Ansicht hin geprüft würden.

Eine eigenthümliche Erscheinung bildet in der maderensischen Conchylienfauna *Helix subplicata* Sow., welche ganz isolirt steht und höchstens mit der mittelmceerischen *Pomatia* (*Cryptomphalus*) *aspersa* Müll. in Beziehung gebracht werden kann. Sie ist auf eine der kleinen wüsten Inseln, Baxo, in der Nähe von Portosanto beschränkt und offenbar im Aussterben begriffen; die lebenden Exemplare sind kleiner und dünnschaliger als die fossilen, und haben nie den für diese charakteristischen Wulst auf der Mündungswand. Dass sie wirklich mit *aspersa* verwandt, wäre erst anatomisch nachzuweisen; die eigenthümliche Sculptur des grossen Embryonalendes spricht dagegen.

Von den für Madeira charakteristischen Arten haben sich nur zwei, *Vitrina teneriffae* und *Helix paupercula*, weiter verbreitet, erstere nach den Canaren, letztere nach Canaren und Azoren. Watson sagt daher, dass wir in Madeira ein bedeutendes Schöpfungscentrum — richtiger Entwicklungscentrum — haben, das nur wenige Arten durch natürliche Ausbreitungsmittel erhalten und noch weniger an andere Faunengebiete abgegeben hat. Wir werden aber sehen, dass ihm die Keime der heutigen Fauna auf einem nachweisbaren Wege zugekommen sind.

Der Archipel der Canaren liegt dem Festlande unvergleichlich viel näher als die beiden anderen, so nahe, dass er anscheinend noch ganz unter seinem Einfluss steht und im Gegensatz zu den Azoren und Maderen schon in grauer Vorzeit eine menschliche Bevölkerung, wahrscheinlich berberischen Stammes, erhalten hat. Er liegt auch gewissermaassen noch auf dem Sockel des afrikanischen Festlandes, wenigstens innerhalb der 2000-Faden-Linie, während er durch viel erheblichere Tiefen von Madera getrennt ist. Er zerfällt in zwei erheblich verschiedene Gruppen, eine westliche, aus lauter bergigen Inseln bestehend (Tenerife, Palma, Gomera, Hierro, Gran Canaria), und eine östliche, die flachen Inseln Fuertaventura und Lanzarote nebst den sechs kleinen sogenannten Isletas. Die östliche Gruppe besteht nur aus niederen trockenen, völlig entwaldeten Inseln, auf denen der Einfluss der Sahara sich sehr bemerklich macht. Durch die Sammlungen von Webb und Berthelot, Blauner, Wollaston, Lowe, Fritsch kennen wir ihre Fauna, wenn auch nicht so genau, wie die der Azoren und Maderen — einige der entlegeneren Inseln sind noch kaum unter-



sucht — so doch so weit, dass wir uns ein genügendes Bild von ihr machen können. Die Zusammenstellung von Mousson, die meines Wissens keine wesentliche Bereicherung erfahren hat\*), zählt, abgesehen von 13 zweifelhaften, 183 Arten auf, von denen wir 6 Strandbewohner in Abzug zu bringen haben. Es bleiben also 177 Arten, trotz der viel grösseren Ausdehnung und gebirgigen Beschaffenheit nur wenig mehr als auf dem kleinen Madeira. Von diesen sind nach Mousson 21 — nach meiner Auffassung 33, denn ich kann die Süsswasserarten Mousson's und die Nacktschnecken nicht als gut begründet anerkennen — weiter verbreitet; *Vitrina teneriffae*, *Patula servilis*, *Hyalina circumscissa*, *Discina argonautula*, *Buliminus variatus* dürften ihre Heimath auf den Canaren haben, und von dort aus weiter gewandert sein. Jedenfalls ist die Zahl der aus dem paläarktischen Faunengebiete eingewanderten oder eingeschleppten Arten trotz der Nähe an dem afrikanischen Festlande viel geringer, als auf dem fernen Madeira. Es ist das eine sehr eigenthümliche Erscheinung, die sich nicht allein durch die unwirthliche Beschaffenheit der zunächst gegenüberliegenden Küste erklären lässt, denn der Verkehr mit der iberischen Halbinsel ist eben so lebhaft wie der mit Madeira, und seine Anfänge reichen weit in das Alterthum zurück. Uebrigens haben die Einwanderer auch hier die einheimischen Arten in der Nähe der bewohnten Orte stark zurückgedrängt; Krause klagt sehr über die Schwierigkeit, dieselben aufzufinden, und über die Seltenheit lebender Exemplare. Ein Dutzend einheimischer Arten kann als bereits völlig ausgestorben gelten.

Die Hauptmasse der einheimischen Arten entfällt auch auf den Canaren auf die Gattung *Helix* im engeren Sinne; die charakteristische Untergattung ist *Hemicycla* Swains., welche auf der Inselgruppe beschränkt erscheint; sie ähnelt in der Schale den tyrrhenischen *Iberus* so sehr, das Mousson eine ganze Reihe von Arten zu dieser Unter-

---

\*) Die Arbeit von J. Mabilie in Nouv. Archives Mus. (2) vol. VII bringt zwar eine Menge neuer und ausnahmslos eigenthümlicher Arten, doch dürften dieselben alle auf Varietäten schon bekannter Formen beruhen und können zur Vergleichung mit anderen Faunenverzeichnissen nicht benutzt werden. Er bringt die Artenzahl auf 263, von denen er 222 als eigenthümlich, 27 als eingeschleppt, 14 als mit anderen Gegenden gemeinsam, 13 als auch auf den Azoren oder in Madeira vorkommend betrachtet. Der Charakter der Fauna erleidet durch seine Novitäten keine Veränderung.

gattung stellt, aber die anatomische Untersuchung einiger Arten durch Krause ergibt eine ziemlich enge Beziehung zu unseren Tachea, ein für die Erklärung ihrer Herkunft nicht unwichtiges Factum. Die maderensischen Untergattungen *Discina*, *Hispidella*, *Ochthe-phil*a, *Leptaxis* sind verhältnissmässig schwächer vertreten, dafür finden wir in ziemlich reicher Entwicklung die westeuropäischen Gruppen *Gonostoma* und besonders *Xerophila*, letztere sogar mit einer eigenthümlichen Untergruppe, *Moniliaria*. In zweiter Linie entwickelt sind, wie auf den Azoren, die *Buliminus* der Gruppe *Napaeus*. Es ist das eine recht eigenthümliche Erscheinung, denn diese Untergattung erreicht eine stärkere Entwicklung ausser im Orient nur in der östlichen Hälfte Algeriens, östlich vom Isser oriental, und nur eine Art dringt bis nach Oran vor, während sie in Südspanien und Marocco ganz fehlt, in Nordportugal und Nordspanien nur durch eine kleine, über ganz Europa verbreitete Art vertreten ist. Ihre anatomische Zugehörigkeit hat neuerdings Krause festgestellt. Auch *Vitrina* ist durch zahlreiche grosse Arten vertreten, ebenso nimmt *Patula* eine erhebliche Entwicklung, und *Pupa* zählt 10 Arten. Dagegen müssen wir als paläarktische Züge in der canarischen Molluskenfauna betrachten die stärkere Entwicklung von *Ferussacia*, das Vorkommen mehrerer Arten von *Parmacella* und vor allen Dingen das Auftreten von *Leucochroa* mit drei Arten; ferner das Vorkommen dreier ächter einheimischer *Cyclostoma* neben einem *Craspedopoma* und einem *Pomatias*, einer sonst rein paläarktischen Gattung. Dass trotz der günstigen Verhältnisse *Clausilia* ganz fehlt, kann nicht wundern, da diese Gattung im Westen überhaupt zurücktritt und in Südspanien und Marocco auch nicht vorkommt.

Von Nacktschnecken finden sich, wie es scheint, nur europäische Formen auf den Inseln. Simroth hält sie indess für in alter Zeit eingewandert, nicht für eingeschleppt, und schliesst aus dem Umstande, dass sie bis jetzt nur Farbenvarietäten, keine anatomisch unterscheidbaren Rassen entwickelt haben, auf eine Fortdauer des Landzusammenhanges bis in eine verhältnissmässig neuere Zeit.

Höchst auffallend ist auch hier das Fehlen der cosmopolitischen Gattung *Succinea*, die doch kaum übersehen worden sein kann. Geradezu verblüffend aber ist die Thatsache, dass *Pupa dealbata* Webb et Berthelot nach den Untersuchungen von Krause nicht zu dieser Gattung gehört, sondern eine Raubschnecke mit Testacelliden-

gebiss ist, welche nur mit den Gattungen *Gibbus* und *Gonidomus* in Beziehung gebracht werden kann, Gattungen, welche für die Mascarenen charakteristisch sind und kaum nach Ostafrika hinübergreifen. Sie könnte höchstens mit *Ennea liberiana* von Liberia in Beziehung gebracht werden; die im Gebiss ähnlichen *Streptostele* von den Guineainseln sind im Gehäuse völlig verschieden. Eine Erklärung kann nur das Auffinden einer *Gibbulina* im miocänen Tuff Oberitaliens geben, welche von *dealbata* nicht allzusehr verschieden ist; wir kennen aus den Mittelmeergebieten nur ganz wenig jüngere fossile Faunen, und es ist nicht unmöglich, dass die canarische *Gibbulina* mit dieser miocänen Form zusammenhängt.

Der vierte Archipel von Macaronesien, die Capverden, liegt viel weiter südlich und trägt einen wesentlich anderen Charakter. Auch er liegt noch auf einem Vorsprung des afrikanischen Sockels innerhalb der Zweitausendfadenlinie, aber die Tiefen sind doch geringer, als an den Canaren und sinken gegen das Festland hin unter 1900 Faden herab. Die Inseln sind nicht so rein aus vulcanischem Gestein aufgebaut, wie die anderen Gruppen; es finden sich auch Schichten aus älteren Gesteinen und auch tertiäre Schichten; aus einer derselben, auf der nördlichsten Insel Pal, sind zwei fossile *Helices* (*atlantidea* Morel. und *primaeva* Morel.) beschrieben worden. Eine aus mit Basalt überdecktem Tuff bestehende gehobene Küstenzone umgibt die Inseln; sie enthält mit einer Ausnahme (*Cerithium aemulum*) nur Conchylien, die heute noch in der Umgebung leben, die Hebung ist also in der Diluvialzeit erfolgt. Die Inseln, dem Gluthauch der Sahara ausgesetzt, und 10 Breitengrade südlicher gelegen als die Sahara, sind trotz ihrer gebirgigen Beschaffenheit dürr und verbrannt und ihre Molluskenfauna kann, was Artenreichthum anbelangt, einen Vergleich mit den nördlicheren Gruppen nicht aushalten. Wir kennen durch die Sammlungen von Dohrn und von Bouvier nur 38 Arten, von denen 7—8 als aus dem paläarktischen Gebiete eingeschleppt betrachtet werden müssen. Die Süßwasserconchylien tragen einen entschieden afrikanischen Charakter. *Physa wahlbergi* Krauss und *Planorbis coretus* Adans. kommen auch auf dem Festlande vor; auch eine kleine *Stenogyra* muss, wenn sie nicht mit Pflanzen eingeschleppt worden ist, als ein afrikanischer Zug betrachtet werden, und die beiden *Buliminus* sind keine *Napaeus*, sondern gehören zu der indisch-arabischen Gruppe *Leucochiloides*. Aber von den acht afrikanischen Charakter-

schnecken finden wir keine Spur, insbesondere keine Achatinide und keine Ennea und die Helices gehören zu der Untergattung *Leptaxis*, die auf Macaronesien beschränkt und für es charakteristisch ist. Auch eine *Vitrina* und einige kleine Pupa schliessen sich der macaronesischen Fauna an, und so müssen wir die Capverden doch als einen vorgeschobenen Posten derselben ansehen, um so mehr, als die Flora der gemässigten Theile mit ihren Labiaten und Compositen in enger Beziehung zu der canarischen steht, und auch am felsigen Gestade die *Crassulacea Aichryson*, die strauchige Crucifere *Sinapidendron* und *Euphorbia tuckeyana* den Typus der canarischen Inseln tragen (Drude).

Ziehen wir aus den mitgetheilten Thatsachen das Facit, so ergibt sich zunächst, dass die Fauna sämtlicher Inselgruppen sich zwar einigermaassen an die paläarktische anschliesst und mit Ausnahme der *Plutonia* keine Schneckengattung vor dieser voraus hat, dass sie aber im Einzelnen durchaus verschieden von ihr ist und nur solche Arten mit ihr gemein hat, die auf irgend eine Weise auf die Inseln oder von ihnen verschleppt worden sind. Insbesondere gehören die eingeborenen Helices auf den Azoren und Maderen beinahe sämtlich, auf den Canaren zum weitaus grösseren Theile zu Untergattungen, die heute nur noch auf diesen Inseln leben\*) und auch die *Buliminus* bilden innerhalb der Untergattung *Napaeus* eine besondere Abtheilung, deren Arten unter einander eng verwandt sind. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass die Inseln von dem paläarktischen Festland schon seit geraumer Zeit getrennt sind. Vergleichen wir die Faunen der drei Gruppen — die Capverden können wir dabei aus dem Spiele lassen — miteinander, so finden wir zwar einige gemeinsame Züge, wie die gleichen *Helix*-Untergattungen, eng verwandte Vitri-  
nen und Pupen und die nur auf ihnen lebende Deckelschneckengattung *Craspedopoma*, aber im Speciellen sind die Verschiedenheiten kaum minder gross, wie gegenüber dem Festland. Die geographische Verbreitung der Schnecken spricht ganz bestimmt dagegen, dass die drei Inselgruppen oder auch zwei derselben für längere

---

\*) Wallace in seinem klassischen Werke findet eine Verwandtschaft der atlantischen Inseln mit den mittelmeerischen in dem Vorkommen einer *Leptaxis* auf den Baléaren; aber *Helix graellsiana*, die er dabei im Auge hat, ist anatomisch total nicht nur von *Leptaxis*, sondern von *Helix* überhaupt verschieden und bildet eine eigene, noch räthselhafte Gattung *Alloglossa*.



Zeit landfest mit einander verbunden waren, und nur für die Canaren lässt das Auftreten von *Parmacella*, *Leucochroa*, *Gonostoma*, *Xerophila* und ganz besonders *Cyclostoma* und *Pomatias* auf enge und länger dauernde Verbindung mit Westeuropa oder Nordafrika schliessen. Für die Existenz der platonischen Atlantis lassen sich diese Resultate nicht verwenden.

Das Studium anderer Thierklassen ergibt bekanntlich ungefähr dieselben Resultate. Wallace hat diese Verhältnisse so gründlich beleuchtet, dass ich hier nicht genauer darauf einzugehen brauche. Die Botanik schliesst sich dem an. Nach Drude bilden die drei Inselgruppen, drei getrennte, an endemischen Florenbestandtheilen reiche und durch eine eigenartige Anordnung der Vegetation ausgezeichnete Florenbezirke, deren westeuropäischer Charakter besonders durch ein Hervortreten von *Ericaceen* und anderen immergrünen Gesträuchen gezeigt wird, welche sich aber gleichzeitig durch ein sonst im ganzen mediterran-orientalen Florenbereich vermisstes reiches Auftreten schöner *Lauraceen* im immergrünen Wald und Buschwald auszeichnen. Die Canaren sondern gleichzeitig eine eigene untere trockene (*Succulenten*-) Region aus, über welcher erst die immergrünen Wälder beginnen, und während dieselbe durch Dattelpalme und Tamarinde ebenso mit dem Orient, wie mit dem benachbarten Continent verbunden wird, weisen fleischige *Euphorbien* auf letzteren Continent allein hin. Neun grosse *Statice*-Arten finden sich auf den Canaren, aber nicht auf den anderen Inselgruppen. Der Drachenbaum ist den Canaren und Maderen gemeinsam, geht aber nicht bis auf die Azoren; ebenso *Laurus canariensis*. Dagegen findet sich die Linde der Eingeborenen (*Oreodaphne foetens*) und *Persea indica* auch wild auf den Azoren. *Clethra arborea* und *Sideroxylon* geben Madeira einen in systematischer Hinsicht alttertiären Charakter.

Diese letztere Bemerkung findet eine sehr auffallende Bestätigung, sobald wir die heutige Molluskenfauna der macaronesischen Inseln mit der vergleichen, welche uns in den tertiären Schichten von Europa erhalten ist. Wir finden da die überraschende Thatsache, dass die heute für die atlantischen Inselgruppen charakteristischen Gattungen und Untergattungen sich ohne Ausnahme schon im europäischen Tertiär finden, und zwar bis in das Untermiocän und selbst in das Eocän zurückreichen. Sandberger hat das in seinem classischen Werke schon gebührend hervorgehoben. *Gonostoma hispidula* Lam.

findet ihre nächsten Verwandten in *Helix sublenticula* Sandberger (*lapicidella* Tho.) aus dem Hochheimer Untermiocän und *Hel. tropifera* M. Edwards aus dem Cambridgekalk der Insel Wight. *Hyalina lenis* Sh. von den Canaren findet ihre nächste Verwandte in *Hyal. impressa* Sandberger von Hochheim, ebenso *Patula putrescens* Lowe von den Canaren in *P. lunula* Tho. aus dem Wiesbadener Hydrobienkalk und *P. stenospira* Reuss aus Böhmen. Die Untergattung *Janulus* Lowe wird in den Schichten am Rand der rauhen Alp durch *Helix gyrorbis* Klein, im Untermiocän des Pariser Beckens durch *Helix disparilis* Desh. repräsentiert, *Plebecula* im Untermiocän von Dijon durch *Hel. lucanii* Tourn. und *divionensis* Mart., *Hemicycla* im Mittelmiocän Südfrankreichs durch die weitverbreitete *Helix turonensis* Desh. in Deutschland durch *densepapilleta* Sandberger und *rugulosa* Martens. Ja schon im Oberoligocän von Cieurac und Cordes in Südfrankreich gehören eine ganze Reihe von *Helix* (*Roulini* Roulet, *bulbulus* Sandberger, *corduensis* Noulet) in das Formengebiet der heutigen macaronesischen Fauna und die letztgenannte bildet geradezu ein Verbindungsglied zwischen *Plebecula* und *Leptaxis*. Die letztere Untergattung wird im süddeutschen Obermiocän durch *Helix facilis* C. Mayer vertreten; mit ihr zusammen findet sich *Hyalina orbicularis* Klein, die nur mit *miguelina* Drouét von den Azoren verglichen werden kann. Auch im Mittelplocän finden sich noch canarische Züge. Die Verwandtschaft beschränkt sich aber nicht auf *Helix* allein. Auch *Clausilia* *Lowe*i kann nur von der im Untermiocän verbreiteten Untergattung *Laminifera* abgeleitet werden, und die Puppen haben ihre nächsten Verwandten im deutschen Untermiocän: *Charadrobis millegrana* Lowe in *cylindrella* A. Braun, *gorgonica* Dohrn von den Capverden in *quadrigranata* A. Braun, *Glandicula calathiscus* Lowe in *tiarula* A. Braun. Ganz besonders aber tritt der miocäne Zug in den Deckelschnecken hervor, *Pomatias* und *Cyclostoma* s. str. sind dort weit verbreitet, *Craspedopoma* aber ist für das europäische Tertiär charakteristisch, die Gattung reicht mit *Cr. conoidum* Brocchi bis ins Untereocän von Rilly zurück und geht durch alle Etagen bis ins Mittelplocän, wo sich noch *Cr. conoidale* Mich. findet. Nur für die *Buliminus* der Gruppe *Napaeus* will sich eine Ableitung aus dem europäischen Tertiär noch nicht finden.



Höchstens für *Buliminus obesatus* Webb und Verwandte, die hauptsächlich den vorderasiatischen *Petraeus* und besonders dem *B. episomus* Bgt. sehr ähnlich sehen, liesse sich vielleicht eine Verwandtschaft mit den miocänen *Buliminus* vermitteln, doch bedürfte es dazu des Nachweises der anatomischen Zugehörigkeit zu *Petraeus*, der noch nicht erbracht ist. Die von Krause untersuchten Arten sind anatomisch von *Napaeus* nicht verschieden. Bedenken wir aber, dass wir aus den dem macaronesischen Gebiete zunächst liegenden Gebieten, aus Spanien und Marocco, wo wir naturgemäss die grösste Uebereinstimmung erwarten müssen, fossile Landschnecken überhaupt noch nicht kennen, so kann uns das nicht wundern. Die Uebereinstimmung zwischen der heutigen Molluskenfauna der macaronesischen Inseln und der mitteleuropäischen Miocänfauna ist eine so grosse, dass wir ohne alles Bedenken die erstere für einen directen Nachkömmling der letzteren erklären können. Allem Anschein nach ist die Verbindung mit dem Festlande in der Miocänzeit eine innigere gewesen als heute, aber einen directen Landzusammenhang können wir selbst für diese weit entlegene Zeit nicht als wahrscheinlich, geschweige denn als sicher annehmen. Nicht nur das Fehlen vieler miocäner Gattungen und Untergattungen, die heutige Verschiedenheit der verschiedenen Gruppenfaunen sprechen dagegen, noch viel mehr der völlige Mangel von Säugethieren und Amphibien und das Zurücktreten der Reptilien nicht nur in der lebenden Fauna, sondern auch in den fossilienführenden Schichten. Auch das Fehlen aller Alpenpflanzen auf den Hochgipfeln wird sich in derselben Weise erklären lassen.

Amerikanische Züge fehlen in der Molluskenfauna vollständig. Von den Schmetterlingen der Canaren sind nach Rebel und Rogenhof<sup>\*)</sup> zwar 20 <sup>0</sup>/<sub>10</sub> mit Amerika gemeinsam, aber davon sind vier Fünftel weit verbreitete Arten und das übrigbleibende Fünftel ist auf die westlichsten Inseln beschränkt und allem Anschein nach erst in der neuesten Zeit mit Schiffen eingeschleppt. Unter den Pflanzen aber sind die meisten von weiterher stammenden Formen nicht amerikanischer, sondern südafrikanischer Herkunft; *Pinus canariensis* hat zwar Verwandte in Mexico, aber noch näher im spanischen Tertiär, und eigentlich nur ein Farn (*Aspidium canariense*) ist mit Amerika, aber auch mit Afrika gemeinsam.

---

<sup>\*)</sup> Die Schmetterlinge der Canaren in Annal. naturh. Hofmuseum Wien, Vol. IX, Nr. 1.

Die Vogelfauna der Canaren bietet ein besonderes Interesse. Ihr Grundstock ist paläarktisch, wie nicht anders zu erwarten bei einer Inselgruppe, welche für die Vögel noch in Sicht des afrikanischen Festlandes liegt und ihnen vielfach als Station auf ihren Wanderungen dient. Aber zahlreiche Arten erscheinen hier in gutunterschiedenen Localvarietäten und diese Varietäten sind auf jeder Insel anders ausgebildet; auf den weiter abliegenden Inseln haben sie sich sogar zu Arten entwickelt, wie *Parus teneriffae*, *Phylloscopus fortunatus*, die Wildtauben und andere. Die beiden südeuropäischen Steinhühner (*Caccabis rufa* und *C. petrosa*), von denen die erstere durch die Spanier nach Gran Canaria, die letztere nach Tenerifa und Gomera eingeführt wurde, haben sich in den seitdem verflossenen vierhundert Jahren sehr erheblich verändert und den Verhältnissen angepasst. Für die Mollusken lässt sich ein solcher Nachweis nicht führen; die mit europäischen identischen Arten geben nicht den geringsten Anhalt zur Abtrennung als Localvarietäten, es sei denn, dass man *Euparypha macandrewiana* von den Selvages für eine Localform der über alle Küsten des Mittelmeeres und bis nach England hinauf verbreiteten *Helix pisana* und nicht für einen selbstständigen Trieb aus der gleichen Wurzel ansehen will.

---



# DIE KÄFER

VON

NASSAU UND FRANKFURT.

VON

DR. L. VON HEYDEN,

Königl. preuss. Major a. D.

---

SIEBENTER NACHTRAG.

---

1896.





Der sechste Nachtrag behandelt die bis April 1892 im Gebiet aufgefundenen Käfer. Nach abermals 4 Jahren ist es nöthig einen siebenten Nachtrag zu geben, der wiederum unsere Fauna um 38 seit-her nicht nachgewiesene Arten bereichert, dank dem fortwährend fleissigen Sammeln, besonders in den Gebieten von Frankfurt, Schwanheim und Höchst. Herr Forstinspector Mühl, jetzt in Frankfurt a. d. Oder, früher in Wiesbaden, stellte ein Verzeichniss der an letzterem Ort 1891 und 1892 gefundenen für das Gebiet neuen Arten, meist Staphyliniden, zur Verfügung, Herr Oberst a. D. Schultze in Detmold gab Notizen über bei Mainz gefundene neue oder wenig bekannte Curculioniden. Sehr umfangreiche Verzeichnisse für das Gebiet neuer oder interessanter Arten gaben die Herren H. Bücking in Höchst und Ingenieur W. Sattler in Frankfurt. Weitere nennenswerthe Beiträge lieferten die Herren A. Weis-Frankfurt, Lehrer Schneider-Frankfurt, Stock in Höchst und Dr. Ferdinand Fuchs in Wiesbaden. Reiche Ausbeute lieferte das Gebiet von Schwanheim mit seinen alten Eichenbeständen, das jetzt, wie die grossen zusammenhängenden Waldungen, durch Eisenbahnen viel leichter zu erreichen ist, wie vor 40 Jahren, als der Verfasser dort sammelte. Das grosse Waldgebiet der Drei-Eich, Karolingischer Bannwald, war in alter Zeit begrenzt von der Mainmündung nach Vilbel und Bergen, von da nach Aschaffenburg, über den Otzberg und südlich von Darmstadt, zur Mainspitze. Wir haben es hier mit einem uralten Waldgebiet zu thun, das auf der linken Mainseite noch in grossen zusammenhängenden Waldbeständen vorhanden ist. Hier finden sich eine ganze Anzahl Waldthiere, die sonst mehr südlicheren Gebirgsgegenden angehören, oder in den höheren Theilen des benachbarten Taunusgebirges gefunden werden. In der Ebene finden sich hier z. B. *Cicindela sylvatica* F., *Procrustes coriaceus* F., *Carabus intricatus* L., *arvensis* F., *catenulatus* F., *glabratus* Payk., *convexus* F., *Cychrus rostratus* L., alles sonst Gebirgs-thiere (Taunus). Ferner *Dromaeolus barnabita* Villa, *Dirrhagus pygmaeus* F., *pyrenaicus* Bonv., *Elater sinuatus* Germ., *Megerlei* Lac. und

ruficeps Redtb., Ischnodes sanguinicollis Panz., Megapenthes lugens F., Limonius violaceus Müll., Athous mutilatus Rosh., Aulonium trisulcatum Fourer., Colydium, Teredus, Oxylaemus, Agyrtes bicolor Casteln., Olophrum piceum Gyll., Julistus floralis Oliv. et fulvohirtus Ksw., Tillus elongatus L., Clerus mutillarius F. et rufipes Brahm, Laricobius Erichsoni Rosh., Orthopleura sanguinicollis F., Bostrychus varius Ill., Niptus hololeucus Faldm. (an alten Eichen), Uloma culinaris L., Tenebrio opacus Dft., Abdera triguttata Gyll., affinis Payk. et flexuosa Payk., Orchesia luteipalpis Muls., fasciata Payk. et undulata Krtz., Hypulus quercinus Quens., Conopalpus testaceus F., Gasterocercus depressirostris F., Timarcha metallica Laich. (Gebirgsthier), Nothorhina muricata Dalm. (!), Clytus tropicus Panz., cinereus Gory, antilope Zett., Monohammus galloprovincialis Oliv., die beiden Mesosa-Arten, Menesia bipunctata Zoubk., Leptura scutellata F. et erythroptera Hagb., revestita L.

In Nachtrag 6 waren April 1892 angegeben 3470 Arten, hiervon sind aber (worauf Herr Sattler aufmerksam machte) doppelt aufgeführt Pterostichus melas im Hauptverzeichniss und Nachtrag 5, Halyzia 15 guttata in Nachtrag 5 ist = bisseptem-guttata im Hauptverzeichniss, Sylvanus surinamensis in Nachtrag 5 und Anhang zum Hauptverzeichniss, Tomicus bidentatus in Nachtrag 3 = Pityophthorus bidens im Hauptverzeichniss, Nargus velox Spence ist nicht mitgezählt, es gehen also 4 ab und 1 geht zu, so dass es giebt . . . . 3467 Arten,

Dazu Nachtrag 7 . . . . .	38	«
	<hr/>	
	3505	Arten.

Hiervon sind zu streichen . . . . .	11	«
	<hr/>	

sodass April 1896 im Gebiet nachgewiesen sind . 3494 Arten,  
ein Zuwachs gegen das Hauptverzeichniss mit 3151 Arten von 333 Arten.

Zu streichen sind 11 Arten: Neuraphes parallelus Chaud., Helops Fabricii Gmgr., Hypophloeus fraxini Kugel., Anapsis Costae Emery et subtestacea Steph., Alophus triguttatus F., Ceuthorrhynchus molitor Gyll., Apion genistae Kirby, Longitarsus ordinatus Foudr., rufulus Foudr. et cerinus All. —

Neu hinzu treten 38 Arten: Cephalophonus cephalotes Fairm., Acilius canaliculatus Nicol., Hydrochus angustatus Germ., Cryptopleurum crenatum Panz., Rhizotrogus fuscus Oliv., Elater ruficeps Redtb., Enicmus fungicola Thoms., Cryptophagus Thomsoni Reitt., Euplectus brunneus Grimmer, Bythinus nigripennis Aub., Dinarda pygmaea Wasm., Atheta

*gracilent*a Er. *longicollis* Rey, *nitidicollis* Fairm., *basicornis* Rey, *sequanica* Rey, *inhabilis* Krtz.; *Oligota granaria* Er., *Platysthetus alutaceus* Thoms., *Bledius atricapillus* Germ., *Acrognathus mandibularis* Gyll., *Malthinus seriepunctatus* Ksw., *Hypophloeus longulus* Gyll., *Orchesia undulata* Krtz., *Mordellistena confinis* Costa, *Anaspis latipalpis* Schilsky et *brunnipes* Muls., *Alophus obsoletus* Reitt., *Coeliodes trifasciatus* Bach, *Ceuthorrhynchidius apicalis* Gyll., *Ceuthorrhynchus pectoralis* Wse., *moguntiacus* Schultze, *Limnobaris pusio* Bohem., *Apion compactum* Desbr., *Cryptocephalus elegantulus* Grav., *Galerucella pusilla* Dft., *Adimonia laticollis* Sahlb., *Longitarsus curtus* All. —

## Cicindelidae.

*Cicindela silvatica* L. Fern von Wald in Sandgruben 12. 4. 92 bei Sindlingen a. Main von Bücking gef.

## Carabidae.

*Cychrus rostratus* L. Im Schwanheimer Wald 8. 5. 92 von Bücking gef. *Demetrius* (*Aëtrophorus*) *imperialis* Germ. Von Bücking und Sattler 19. 2. 93 bei Höchst aus Nidda-Genist mehrfach gesiebt.

*Dromius fenestratus* F. Im Herrwald bei Königstein im Taunus 4. 5. 90 von Bücking gef.

*Lionychus quadrillum* Dft. et var. *bipunctatus* Heer. Je zweimal von Sattler 20. 4. 89 in der Strassenunterführung der Hafenstrasse in Frankft. gef.; bei Kostheim im Maingenist 23. 3. 90 von Bücking gefunden.

*Cymindis axillaris* F. 20. 4. 95 von Sattler mehrere Ex. auf Kalkboden bei Flörsheim gef.

*Masoreus Wetterhali* Gyll. 1886 von Sattler ein Ex. in Frankfurter Umgebung gef.

*Licinus cassideus* F. 9. 4. 93 von Sattler ♂♀ in copula bei Flörsheim auf Kalkboden gef. und 28. 4. 95 ebenso auf dem Gausalgesheimer Kopf.

*Synuchus nivalis* Panz. Im Schwanheimer Wald unter Laub 13. 7. 95 von Bücking gef.

*Platynus* (*Batenus*) *livens* Gyll. Im Schwanheimer Wald 9. 8. 91 von Bücking und 15. 5. 94 von Sattler gef.

*Pl.* (*Agonum*) *gracilipes* Dft. Im Schwanheimer Wald 3. 4. 92 von Bücking gef.

- Olisthopus rotundatus* Payk. Bei Hofheim am Taunus unter Laub 9. 11. 90 von Bücking gef.
- Pterostichus* (*Adelosia*) *macer* Marsh. (*picimanus* Dft.). Auf dem Gausalgesheimer Kopf bei Bingen ein Pärchen von Sattler gef.
- Pt. (*Pedius*) *inaequalis* Marsh. Auf dem Gausalgesheimer Kopf 15. 4. 94 von Bücking und Sattler je einmal gef.
- Pt. (*Omaseus*) *vulgaris* L. var. *pennatus* Dej., die geflügelte Form, je einmal 1886 und 10. 7. 89 von Sattler bei Frankfurt gef.
- Pt. *melas* Creutz. 31. 3. 95 bei Höchst nach dem Ab Laufe des Nidda-Hochwassers in grosser Anzahl unter Genist von Bücking, Sattler und Stock gef.
- Pt. (*Arachnoideus* Chd.) *cristatus* Dufour. Ehlhalden im Taunus 17. 9. 92 und 29. 7. 94 von Bücking gef.
- Amara* (*Cyrtonotus*) *aulica* Panz. Bei Höchst a. Main im Genist an der Nidda Ende März 95 in Anzahl, auch bei Flörsheim von Bücking gefunden.
- †*Ophonus* (***Cephalophonus*** Ggbl.) ***cephalotes* Fairm.** Von Herrn Dr. med. Ferdinand Fuchs auf dem Bierstadter Berg bei Wiesbaden 1894 mehrfach gef. In Deutschland seither nur aus Sömerda in Thüringen (*planusculus* Krtz.) bekannt. Dieses vereinzelte westliche Vorkommen ist sehr auffallend, da die Art sonst nur aus Südfrankreich und im Osten aus Ungarn und Süd-Russland bekannt ist.
- Trechus* (*Lasiotrechus* Ggbl.) *micros* Hbst. Bei Höchst im Nidda-Genist Ende März 95 von Bücking gef.

## Dytiscidae.

- †*Acilius canaliculatus* Nic. In den Enkheimer Torfstichen 6. 10. 90 von Bücking gef. 1 ♂. (v. Heyden sah das Ex.)
- Rantus exoletus* Forst. var. *latitans* Sharp. Ein ♂ 8. 8. 95 von Lehrer Schneider bei Münster am Taunus gef.
- Dytiscus* (*Macrodytes*) *circumcinctus* Ahr. Zwei Ex. in den Enkheimer Torfbrüchen 8. 4. 94 von Sattler gef.

## Hydrophilidae.

- Philydrus frontalis* Er. (Wie alle folgenden Arten von A. Weis gesammelt) Metzgerbruch bei Frkft. 29. 5. 93.
- Ph. affinis* Thbg. Ebenda 5. 9. 86.

*Anacaena ovata* Rche. Frkft., Enkheim, Riederspiess.

*Laccobius minutus* L. 25. 8. 86. Am Frkfter. Forsthaus in einem Wassergraben.

var. *maculiceps* Rottbg. Enkheim 8. 4. 87, Main-Genist.

*L. bipunctatus* F. In Main-Genist.

*Limnebius papposus* Muls. Metzgerbruch 5. 9. 86.

*Berosus signaticollis* Charp. Enkheim 4. 6. 79.

*Cercyon obsoletus* Gyll. Riederspiess 30. 4. 89.

*C. ustulatus* Preyssl. Frkft. im Genist.

†*Cryptopleurum crenatum* Panz. Von Sattler bei Frkft. 1890 einmal gef. Auch von A. Weis in Main-Genist. Neu für das Gebiet.

†*Hydrochus angustatus* Germ. Von Sattler bei Frkft. 1887 einmal gef. Neu für das Gebiet.

*Ochthebius aeneus* Steph. Metzgerbruch 5. 9. 86 von A. Weis gef.

*Helophorus aequalis* Thoms. 2 Ex. von der Platte bei Wiesbaden (A. Weis).

### Georyssidae.

*Georyssus crenulatus* Rossi. Bei Höchst von Bücking gef. 28. 2. 94 im Nidda-Genist, 29. 4. 95 an einem Tümpel.

### Platyceridae.

*Systemocerus caraboides* L. var. ♀ *rufipes* Hbst. Von A. Weis auf dem Weg von Falkenstein zum Fuchstanz 27. 5. 95 mehrfach gef.

### Scarabaeidae.

*Psammobius caesus* Panz. Mai und Juni 1895 mehrfach in der Strassenunterführung der Hafenstrasse in Frankfurt von Sattler gef.

*Anoxia villosa* F. Im Schwanheimer Sand alljährlich von Anfang bis Mitte Juli oft in grosser Anzahl nach Sonnenuntergang fliegend. (Bücking.)

†*Rhizotrogus* (*Amphimallon*) *fuscus* Oliv. (1789), ater Host (1790). Von Bücking 20. 6. 89 auf dem Gausalgesheimer Kopf gef. Neu für das Gebiet.

[Ich finde jährlich in der Rheinprovinz im Alrthal an den grasigen Abhängen der Landskron Ende Juni diese Art in der Mittagssonne schwärmend, doch nur Männchen. — v. Heyden.]

*Hoplia praticola* Dft. Von Albrecht Weis im Frankfurter Waldgebiet: Oberwald 23. 5., Schwanheim 12. 5., Mönschbruch 9. 5. 1895 gef.



## Buprestidae.

- Anthaxia candens* Panz. Von Bücking im Altenhainer Thal bei Soden 14. 6. 91, bei Kelsterbach 9. 6. 95 mehrfach gef.  
*A. sepulchralis* F. 26. 5. 92 von Sattler ein Ex. Mittags bei Mombach an gefältem Kieferholz gef.  
*Agilus cinctus* Ol. Hofheim am Taunus 15. 7. 95 von Bücking gef.

## Eucnemidae.

- Throscus carinifrons* Bonv. Von Sattler Juli 91 aus Frankfurter Holz erzogen, Dornholzhausen bei Homburg Anfang Juni 92.  
*Dromaeolus barnabita* Villa. 30. 6. 95 ein Ex. an den alten Eichen bei Schwanheim von Sattler gef.  
*Dirrhagus pygmaeus* F. Im Schwanheimer Wald von Bücking 7. 6. 94 von alten Rhamnus 7 Ex. geklopft.

## Elateridae.

- Elater pomonae* Steph. Die im Hauptverzeichniss erwähnten Stücke gehören zu **var. pomonaeformis Buys.** (Von du Buysson wie die folgenden Arten bestimmt.)  
*El. pomorum* Hbst. im Hauptverzeichniss, vom Feldberg, gehört zu **var. adumbratus Buys.**  
*El. crocatus* Geoffr. Die Stammart und **var. podolicus Reitt.** in hohlen Pappeln bei Frankfurt.  
*El. sinuatus* Germ. wurde auch in letzter Zeit wieder im Gebiet gef. und zwar von Sattler im Mai 93 im Schwanheimer Wald, von Bücking 30. 4. 93 in Walldorf (Hessisches Gebiet) und Forst-Inspector Mühl Ende Mai 92 ein Ex. von Eichengebüsch am Rande eines Kieferwaldes auf der Schiersteiner Haide oberhalb Wiesbaden.  
*El. Megerlei* Lac. 18. 6. 93 von Sattler einmal im Schwanheimer Wald gef.  
†*El. ruficeps* Redtb. Im Schwanheimer Wald ein Paar an alten Eichen von Bücking geklopft 22. 6. 94. (v. Heyden sah die Ex.; er besitzt die seltene Art nur aus Slavonien, doch fand sie schon Scriba bei Oberlais in Oberhessen.)

## Dermestidae.

- Attagenus vigintiguttatus* F. Von Sattler im Mai 93 ein Ex. aus Frankfurter Waldholz erzogen.

*Dermestes bicolor* F. Im Schwanheimer Wald am Fusse einer alten Eiche 12. 5. 95 von Bücking gef. (Wohl nisteten auf dem Baume wilde Tauben. v. Heyden.) Von Sattler in einem Taubenschlag in Frankfurt mit Larven, wo sie auf jungen Tauben leben. Schon von Noll beobachtet.

*D. tessellatus* F. Von Bücking zu verschiedenen Zeiten bei Höchst, Frankfurt und im Rieder Wald gef.

### Histeridae.

*Hister funestus* Er. Am Gausalgesheimer Kopf 15. 4. 94 von Bücking gefunden.

*Dendrophilus pygmaeus* L. Im Schwanheimer Wald bei Ameisen 3. 4. 92 von Bücking gef.

*Saprinus virescens* Payk. Je ein Ex. bei Frkft. Ende 8. 89, Mitte 9. 90 und 4. 6. 95 bei Schwanheim von Sattler gef.

*Gnathonus punctulatus* Thoms. Von Bücking im Schwanheimer Wald 7. 5. 91 mehrfach in Mist, auf dem Schwanheimer Feld im Mulm eines hohlen Apfelbaumes 20. 3. 92 gef.

*Myrmetes piceus* Payk. Im Schwanheimer Wald bei *Formica rufa* 3. 4. 92 und Ende März 96 von Bücking und Sattler in grösserer Anzahl gefunden.

*Abraeus globulus* Creutz. Von beiden Herren im Schwanheimer Feld an faulen Runkelrüben 9. 7. 95 in grösserer Anzahl gef.

*Ab. globosus* Hoffm. Schwanheimer Wald bei *Formica rufa* 3. 4. 92 von Bücking gef.

### Nitidulidae.

*Carpophilus hemipterus* L. In der Strassenunterführung an der Hafenstrasse 3. 6. 95 ein Ex. von Sattler gef.

*Soronia punctatissima* Ill. Anfang Juni 92 von Sattler mehrfach an ausfliessendem Eichensaft bei Dornholzhausen bei Homburg im Taunus und von Bücking im Schwanheimer Wald ebenso 11. 3. 94 gef.

*Micrurula melanocephala* Marsh. Höchst 30. 4. 91 von Bücking gef. (von Reitter bestimmt).

### Trogositidae.

*Thymalus limbatus* F. Im Herrwald bei Königstein im Taunus unter Rinde von Bücking gef.

## **Cucujidae.**

*Psammoecus bipunctatus* F. Von Bücking bei Höchst in Nidda-Genist  
19. 2. 93 gef.

## **Lathridiidae.**

*Dasycerus sulcatus* Brongniart. Bei Hofheim am Taunus 30. 11. 92  
von Bücking mehrfach gesiebt.

*Lathridius* (*Coninomus*) *nodifer* Westw. Von Sattler bei Frkft. 30. 3. 90  
und bei Lorsbach am Taunus 15. 5. 92 gesiebt; seither im Gebiet  
nur bei Nassau gef.

*Enicmus* (*Conithassa*) *hirtus* Gyll. Von Sattler aus Frankfurter Wald-  
holz Mitte Mai 90 erzogen.

†*E. fungicola* Thoms. Von Sattler ein Ex. bei Schwanheim 23. 4. 93  
gef. Neu für das Gebiet.

*Corticaria umbilicata* Beck. Bei Enkheim und bei Höchst von Bücking  
gesiebt. (Reitter vid.)

*C. Mannerheimi* Reitt. Bei Soden im Taunus Mitte 2. 92 von Bücking  
unter Fichtenrinde gef. (Reitter vid.)

## **Cryptophagidae.**

†*Cryptophagus Thomsoni* Reitt. Hofheim am Taunus 22. 4. 94 von  
Bücking gef. (Reitter vid.) Neu für das Gebiet.

## **Erotylidae.**

*Combocerus glaber* Schall. Von Bücking bei Höchst 21. 4. 91 unter  
einem Stein gef.

## **Scaphididae.**

*Scaphosoma assimile* Er. Ein Ex. bei Dornholzhausen bei Homburg  
Ende Juli 95 von Sattler gef.

## **Anisotomidae.**

*Agathidium badium* Er. Von Bücking im Schwanheimer Wald 11. 5. 93  
gestreift. (Reitter vid.)

## **Silphidae.**

*Choleva intermedia* Krtz. und *Ch. agilis* Ill. Von A. Weis im Fischer-  
feld bei Frkft. an einer todtten Ratte gef. (Reitter vid.)

- Catops nigricans* Spence. Von A. Weis an der Louisa 13. 3. 81 und Bieber bei Offenbach 21. 5. 82 gef.
- Nargus Wilkini* Spence. Bei Hofheim am Taunus ein Ex. von Bücking gesiebt, (Reitter vid.)
- N. anisotomoides* Spence. Ebenda 3. 11. 90 mehrfach (auch von A. Weis) und bei Soden 5. 2. 94 von Bücking aus Laub gesiebt. (Reitter vid.)
- Ptomaphagus sericatus* Chd. Im Schwanheimer Wald an Eichen mit *Lasius fuscus* 1. 10. 93 und 1. 4. 94., Gausalgesheimer Kopf 15. 4. 94 von Bücking gef. (Reitter vid.) Von Sattler 22. 3. 96 auch in ersterer Localität gef.
- Sipha tristis* Ill. Nach dem Zurücktreten des Nidda-Hochwassers bei Höchst 31. 3. 95 von Bücking, Sattler und Stock gef.
- Necrophorus investigator* Zett **var. intermedius** Reitt. Die schwarze Schultermakel greift ausnahmsweise auf die rothen Epipleuren über. In Sammlung v. Heyden Ex. aus Frkft. und Oberlais im Süd-Vogelsberg.

## Scydmaenidae.

- Euconnus claviger* Müll. (Wie alle folgenden Arten von Reitter bestimmt und von Bücking gesammelt.) Schwanheimer Wald bei Ameisen in einer alten Eiche 1. 4. 94.
- E. denticornis* Müll. Ebenda 23. 6. 94.
- E. rutilipennis* Müll. Höchst in Nidda-Genist 28. 2. 92.
- E. confusus* Bris. Enkheim 8. 4. 94 in einer Pappel mit *Lasius fuliginosus*.

## Pselaphidae.

- Alle folgenden Arten von Bücking gef. und von Reitter bestimmt.)
- †*Euplectus brunneus* Grimmer. Schwanheimer Wald in einem morschen Birkenstamm mit einer Myrmiciden-Art 6. 5. 94.
- E. sanguineus* Denny. Mit voriger Art.
- Bibloporus bicolor* Denny. Schwanheimer Wald bei *Lasius brunneus* 3. 5. 94.
- Batrissus formicarius* Aub. Schwanheimer Wald in einem morschen Birkenstamm mit *Lasius brunneus* 4 Ex. 3. 5. 94.
- B. Delaportei* Aub. Schwanheimer Wald unter Eichenrinde mit *Lasius brunneus* ein Ex. 26. 5. 95.
- B. venustus* Reichb. Ein Ex. zusammen mit *B. formicarius*.

*Bryaxis Helferi* Schmidt. Schwanheimer Wald 6. 5. 94 zusammen mit *Euplectus brunneus*.

*Bythinus puncticollis* Denny. Hofheim am Taunus 30. 11. 92 gesiebt.

*B. Curtisi* Denny. Schwanheimer Wald 1. 10. 93 bei *Lasius fuliginosus*.

†*B. nigripennis* Aub. Schwanheimer Wald 11. 3. 94 gesiebt. Neu für das Gebiet.

*B. distinctus* Chaud. Höchst in Main-Genist 8. 3. 91. Seither aus dem Gebiet nur von Nassau bekannt.

*Tychus niger* Payk. var. *dichrous* Schmidt. Höchst gesiebt 15. 3. 94.

*Tyrus mucronatus* Panz. Schwanheimer Wald unter Eichenrinde 6. 5. 94.

## Scydmaenidae.

*str. Neuraphes parallelus* Chd. in Nachtrag III ist zu streichen. Das Ex. gehört nach Fauvel zu *longicollis* Mot. (Sparshalli Schaum nec Denny) Nachtrag II.

## Staphylinidae.

*Ilyobates nigricollis* Payk. Bei Frkft. von Sattler 25. 5. 94 einmal gef. *Ocyusa maura* Er. Höchst am Niddaufer von Sattler 28. 2. 92 gesiebt. (Eplh. vid.)

*Microglossa pulla* Gyll. (Wie alle Weis'schen Arten von Scriba bestimmt.) Frkft. in Main-Genist.

*Dinarda dentata* Grav. Schwanheim, Cronberg in Nestern der *Formica sanguinea* von Weis gef.

†*D. pygmaea* Wasmann. Von Bücking 2 Ex. auf dem Gausalgesheimer Kopf 15. 4. 94 bei *Formica rufibarbis* gef. Neu für das Gebiet. Sonst nur bei Linz a. Rhein.

*Lomechusa strumosa* F. Am Feldberg in Nest der *Formica sanguinea* 9. 10. 87 von Weis gef.

*Callicerus rigidicornis* Er. Flörsheim 21. 4. 94 von Sattler einmal gef. (Eplh. vid.) Siehe Hauptverzeichniss.

*Thamiaraea cinnamomea* Grav. Anfang 6. 92 bei Dornholzhausen an ausfliessendem Eichensaft 2 ♂ 1 ♀ von Sattler gef.

†*Atheta* (*Aleuonota*) ***gracilent*** Er. (*splendens* Krtz.). Sommer 1891 von Mühl bei Wiesbaden einmal gef. (Eplh. vid.) Die im Hauptverzeichniss erwähnte *Al. pallens* Redtb. gehört zu *Atheta* Subg. *Apimela* Rey.



- †*Atheta* (*Disopora* Thoms.) **longicollis** Rey. Sommer 1891 von Mühl mehrfach bei Wiesbaden gef. (Eplh. vid.)
- †*A. nitidicollis* Fairm. Ebenso einmal.
- †*A. basicornis* Rey. Ebenso mehrfach.
- †*A.* (*Metaxya* Rey) **sequanica** Rey. Ebenso mehrfach.
- †*A.* (*Anopleta* Rey) **inhabilis** Krtz. In Ganglbauer Käfer von Mittel-Europa II, 1895, 202 wird diese Art von Wiesbaden erwähnt. Sonst Barmen.
- A.* (*Plataraea* Thoms.) *brunnea* F. Frkft. im Main-Genist von A. Weis gefunden.
- A.* (*Thectura* Thoms.) *cuspidata* Er. Hofheim 16. 3. 84 von A. Weis gef.
- A.* (*Geostiba* Thoms.) *circellaris* Grav. Ebenso.
- A.* (*Aloconota* Thoms.) *sulcifrons* Steph. Frkft. im Main-Genist von A. Weis gef.
- Silusa* (*Stenusa* Krtz.) *rubra* Er. Eppstein im Taunus 3. 9. 82 von A. Weis gef.
- †*Oligota* **granaria** Er. Im April 1892 bei Castel am Rhein einmal von Mühl gef. (Eplh. vid.)
- Dinopsis* *erosa* Steph. Von Sattler 23. 3. 90 mehrfach bei Frkft. gesiebt, bei Höchst 5. 3. 93 und 31. 3. 95.
- Tachinus* *laticollis* Grav. Von Weis bei Mombach 23. 5. 80, Frkft. in Main-Genist gef.
- T. marginellus* F. In Main-Genist von A. Weis gef.
- T.* (*Drymoporus* Thoms.) *elongatus* Gyll. v. Heyden fand 20. 4. 93 ein Ex. in Bockenheim am Fenster. Seltene Art.
- Conurus* *littoreus* L. Von A. Weis bei Schwanheim gef.
- Bolitobius* *pygmaeus* F. var. *biguttatus* Steph. (*intrusus* Hampe) 18. 10. 92 bei Frkft. von A. Weis gef.
- Bryocharis* *cingulatus* Mhm. 1 Ex. 25. 4. 92 von Sattler bei Schwanheim gef.
- Mycetoporus* *splendidus* Grav. var. *longicornis* Mäklin 21. 5. 82 von A. Weis auf der Bieberer Höhe bei Offenbach gef.
- Velleius* *dilatatus* F. Von Bücking bei Höchst 31. 8. 94 im Garten der Wirthschaft zur schönen Aussicht gef.
- Quedius* (*Microsaurus* Stph.) *brevicornis* Thoms. Frkft. im April 92 ein Ex. von Sattler gef.
- Qu.* (*Micr.*) *ochripennis* Mén. Im Riederspies 7. 6. 81 von A. Weis gef.

*Quedius* (Micr.) *cruentus* Oliv. var. *virens* Rottbg. In Main-Genist von A. Weis gef.

*Qu.* (*Raphirus* Steph.) *boops* Grav. Ebenso.

*Staphylinus* (*Platydracus* Thoms.) *chalcocephalus* F. Von A. Weis bei Schwanheim 27. 5. 90 und bei Isenburg 2. 5. 80 gef.

*Philonthus* (die folgenden Arten von A. Weis gef.) *varius* Gyll. Gausalgesheim, Falkenstein 5. 6. 87, Flörsheim 15. 4. 83.

var. *bimaculatus* Grav. (Flügeldecken ganz roth) Obermainufer 12. 5. 81.

*Ph. lepidus* Grav. Flörsheim 15. 4. 83.

*Ph. fumarius* Grav. Enkheim 30. 3. 90.

*Ph. micans* Grav. Flörsheim 15. 4. 83, Gausalgesheim 12. 4. 83.

*Ph. pullus* Nordm. Frkft. in Main-Genist.

*Othius melanocephalus* Grav. Mamolshain im Taunus 20. 9. 85.

*Xantholinus linearis* Oliv. (Flügeldecken braun) Feldberg 1884.

*Lathrobium fovulum* Steph. und

*L. brunnipes* F. In Main-Genist bei Frkft.

*Achenium depressum* Grav. und

*A. humile* Nicol. Je 2 Ex. 31. 3. 95 in Genist der Nidda bei Höchst von Sattler gef.

*Stilicus fragilis* Grav. Ebenda von Sattler 15. 3. 96 mehrfach gef.

*St. rufipes* Germ. Von A. Weis in Main-Genist gef.

*Paederus caligatus* Er. Hofheim 7. 5. 82 von A. Weis gef.

*Stenus bimaculatus* Grav. Von A. Weis bei Mombach 11. 5. 90, Bieberer Höhe 29. 4. 83 gef.

*St. latifrons* Er. Von A. Weis am Entensee 21. 5. 82 gef.

†*Platysthetus alutaceus* Thoms. Von A. Weis bei Frkft. in Main-Genist gef. Neu für das Gebiet.

†*Bledius* (*Blediolus*) *atricapillus* Germ. Von Mühl im Juni 1891 und 92 je einmal bei Mombach geköschert, 20. 4. 95 von den Herren Bücking, Sattler, Weis in Menge bei Flörsheim an Lehmwänden gefunden.

†*Acrognathus mandibularis* Gyll. 1 Ex. 1886 bei Frkft. von Sattler gef. Neu für das Gebiet.

*Deleaster dichrous* Grav. Von Sattler Anfang Juni 1892 bei Dornholzhäusen bei Homburg gef.

*Lesteva punctata* Er. Von Sattler ein Ex. am Feldberg 26. 5. 90 gef.

*Orochares angustatus* Er. Je ein Ex. 3. 11. 94 und Nov. 95 an Hauswänden in Frkft. von Sattler gef.

*Arpedium quadrum* Grav. Zwei Ex. 31. 3. 95 bei Höchst von Sattler gef.  
*Olophrum piceum* Gyll. Von A. Weis bei Schwanheim 14. 4. 95 und  
im Frankfurter Wald an einem Baumstrunk bei *Lasius niger* gef.

### **Dascillidae.**

*Prionocyphon serricornis* Müll. Von Bücking im Schwanheimer Wald  
28. 6. 91 gef.

*Eubria palustris* Germ. Von Bücking bei Mombach 13. 5. 93 gef.

### **Cantharidae.**

*Lampyris noctiluca* L. Höchst a. Main 31. 7. 85 1 ♂ in das Zimmer  
geflogen. (Bücking.)

*Malthinus seriepunctatus* Ksw. Von Mühl im Juni 1891 bei Wiesbaden  
mehrfach gef. Neu für das Gebiet.

*Troglops albicans* L. Von Sattler bei Mombach 14. 5. 93 und bei  
Schwanheim mehrfach von alten Eichen geklopft.

*Julistus fulvohirtus* Bris. Von Sattler 3. 6. 94 bei Schwanheim gef.

*Haploenemus virens* Suffr. (ahenus Ksw.). Von Schilsky in Fortsetzung  
von Küster's Käfer Europa's Heft XXXI, 17 von Mainz erwähnt.  
Siehe Hauptverzeichniss.

### **Lymexylidae.**

*Elateroides dermestoides* L. Im Schwanheimer Wald von Bücking 8. 5. 92  
an einem Holzstoss fliegend gefangen.

*Lymexylon navale* L. Im Goldstein - Forst (Frankfurter Wald) von  
A. Weis gef.

### **Cleridae.**

*Tillus unifasciatus* F. Von Bücking bei Kelsterbach 9. 5. 95 an ge-  
schlagenem Holz gef.

*Laricobius Erichsoni* Rosh. Bei Mörfelden (im hessischen Theil des  
grossen Frankfurter Waldgebietes) im April 1894 von A. Weis  
einmal unter Kiefernrinde gef. Im Gebiet seither nur in der  
Lahngegend beobachtet.

*Necrobia ruficollis* F. Von Herrn v. Reichenau in Mainz in Menge mit  
Larven, aus Catalonien importirte Korkstopfen zerstörend, be-  
obachtet. Der Larvengang ist von aussen mit einer wachsartigen

weissen Masse geschlossen, wodurch die angegriffenen Korken sofort kenntlich sind. Die Larve übereinstimmend mit der Beschreibung und Abbildung bei Heeger. Mit rufic. kommt vor rufipes Deg. Herr v. Reichenau regte zuerst die Frage an, ob ruficollis das Weib von rufipes sein könne. Geschlechtsunterschiede finde ich nirgends in der Literatur angegeben. Die angegebenen Artunterschiede können ebenso gut geschlechtliche sein.

*Orthopleura sanguinicollis* F. Von Sattler 26. 5. 89 an den alten Eichen bei Schwanheim 1 Ex. gef.

## Bruchidae.

*Bruchus* (*Ptinus* olim.) *brunneus* Dft. Von Sattler 31. 3. 89 1 ♂ bei Frkft. gef.

*B. subpilosus* Sturm. Von Bücking bei Hofheim am Taunus 22. 4. 95 bei *Lasius fuliginosus* gef.

## Byrrhidae.

(*Anobiidae* auct. olim.)

*Dorcatoma setosella* Muls. Von Bücking im Schwanheimer Wald gef. 17. 6. 95. (Reitter vid.)

## Bostrychidae.

*Xylopertha retusa* Ol. Von Bücking 22. 6. 94 im Schwanheimer Wald an einem Holzstoss fliegend gef.

## Tenebrionidae.

Bei uns kommen nur 2 *Helops* vor.

1. *Helops* (*Stenomax*) *aeneus* Scop. (*incurvus* Küst.). Siehe Hauptverzeichniss. Der dort erwähnte *lanipes* aus dem Schwarzwald ist das einzige deutsche Ex., das Seidlitz bei der Revision der Gattung in Fortsetzung von Erichson Insekten Deutschlands kannte.
2. *H. (Nalassus) laevioctostriatus* Goeze (*striatus* Fourcr.). Ebenfalls die einzige *Nalassus*-Art, die bei uns vorkommt; hierher auch die im Hauptcatalog als *Fabricii* Gemminger (*quisquilius* F.) bezeichneten Exemplare. Die sogenannte Art ist = *dermestoides* Ill. (*quisquilius* Sturm), welche bei uns nicht, aber im Osten Deutschlands, vorkommt.

*Tenebrio opacus* Dft. Von Bücking im Schwanheimer Wald an einer alten Eiche nach Sonnenuntergang 1. 6. 86 fünf Ex. gef.

*Hypophloeus fraxini* im Hauptverzeichniss ist zu streichen. Die 2 Ex. gehören zu †*longulus* Gyll.

## Melandryidae.

†*Orchesia undulata* Krtz. Von Sattler im Schwanheimer Wald 22. 3. 96 ein Ex. gef.

*Anisoxya fuscula* Ill. Ein Ex. von Sattler aus Frankfurter Waldholz erzogen Juni 1892 und an den alten Eichen bei Schwanheim 1 Ex. 7. 7. 95.

## Mordellidae.

†*Mordellistena confinis* Costa. Einmal bei Frankfurt Anfang August (v. Heyden). Von Schilsky bestimmt.

*Cyrtanaspis phalerata* Germ. In grosser Anzahl Mitte Juni 1891 oberhalb Ernsthausen (in Nassau) auf Fichten und Eichen von Mühl gesammelt.

Anaspini des Gebietes. (Nach der neuesten Bearbeitung von Schilsky. Von unseren 14 Arten ist eine zu streichen, sodass 13 bleiben.)

1. *Anaspis frontalis* L. Wiesenbüsch Falkenstein, Nauheim, Frkft. altes Waldholz, Ems.
2. *A. pulicaria* Costa. Frkft. 1 Stück des Hauptverz. richtig.
3. *A. thoracica* L. (confusa Emery). Frkft. dürre Waldholz, Soden.
4. *A. ruficollis* F. Hierher die 2 Ex. *A. Costae* Emery aus Frkft. Nachtrag I. *Costae* besitzt v. Heyden nicht aus dem Gebiet.
5. [*A. subtestacea* Steph. besitzt v. Heyden nicht aus dem Gebiet. Die dafür gehaltenen 2 Ex. aus Soden und Frkft. gehören zu einer neuen westdeutschen Art †*latipalpis* Schilsky (beschrieben in Forts. von Küster, Heft XXXI, 73.)]
6. *A. Geoffroyi* Müll. Stammart Frkft. 3 Ex.  
var. *cruciata* Costa (= var. *c.* Emery Hauptverzeichniss) Frkft. 1 Ex.
7. *A. maculata* F. einmal Frkft.  
var. *pallida* Mrsh. einmal in Echzell (Wetterau).
8. *A. (Nassipa) flava* L. richtig.
9. *A. (N.) rufilabris* F. Frkft. richtig.



10. A. (N.) *melanostoma* Costa. Frkft. Waldholz richtig.
- †11. A. (Silaria) **brunnipes** Muls. Ende Juni bei Soden an Dornzäunen.  
(= *varians* Muls.) Stammart in Hauptverzeichniss.
12. A. (S.) *varians* Muls. Frkft. einmal.  
var. *collaris* Muls. Königstein, Ems.
13. A. (S.) *quadrinaculata* Gyll. Stammart von Frkft. öfter.  
var. *quadripustulata* Müll. (rothe Halsschild). Frkft., Rüdesheim, Ems.

## Anthicidae.

*Anthicus antherinus* L. var. **semitestaceus** Pic. (Echange 1892, 43.)  
Soden Ende August im Flug. Sonst Lyon. Die schwarze Deckenzeichnung ist reducirt.

## Oedemeridae.

*Nacerdes ustulata* F. Von Bücking auf dem St. Jacobsberg bei Bingen  
18. 6. 89 ein ♂ gef.

## Pythidae.

*Mycterus curculionoides* F. Von Bücking im Hengster bei Offenbach  
24. 6. 94 gef.

## Curculionidae.

Alle *Alophus triguttatus* der Sammlungen v. Heyden und Weis aus dem Gebiet sind **obsoletus** Reitter (Wiener Ent. Zeit. 1894, 303) mit haarförmigen Schuppen auf der Halsschildmitte. *A. triguttatus* F. aus dem Osten (Fabricius beschrieb ihn aus England) besitzt v. Heyden nur aus Oesterreich und Ungarn. Er hat runde Schuppen.

Zu † **Coeliodes trifasciatus** Bach bemerkt brieflich Oberst a. D. Schultze, jetzt in Detmold: »Er ist im Hauptverzeichniss als Synonym des *C. rubrufus* Hbst. angeführt. *Trifasciatus* ist jedoch eine ausgezeichnete selbstständige Art, die sich durch ihre weisse Subscutellarmakel, den rothen an der Spitze geschwärzten Rüssel, ganz besonders aber durch das nackte wulstig eingefasste Grübchen des 2 männlichen Abdominalsegmentes ausgezeichnet. Bei *erythroleucus* Gmelin (*subrufus* Hbst.) ist dieses Grübchen mit Schuppen bekleidet und ohne wulstigen Rand. Ausserdem hat letztere Art einen ganz rothen Rüssel, stumpfe Hals-

schildhöcker und keine weisse Makel hinter dem Skutellum. Wenn ich *Coeliodes trifasciatus* bei Mainz selbst auch nicht gefunden habe, so ist sein Vorkommen im Gebiet da, wo viel Eichengestrüpp, besonders Schälwald ist, unzweifelhaft.« — In Sammlung v. Heyden 2 Ex. von Frkft., eins von Prof. Dr. Moritz Schmidt vor langen Jahren gef. und eins von Senator v. H. gef.

†*Ceuthorrhynchidius apicalis* Gyll. Von Oberst Schultze 1 ♀ bei Mainz gef. Im Hauptverzeichniss mit *terminatus* vermengt, von dem er sich nach Schultze unterscheidet durch seine graue Beschuppung der Oberseite und die dünne unbestimmte rein weisse Scutellarmakel; die Fühlergeissel ist sechsgliedrig.

*Ceuthorrhynchus molitor* Gyll. des Hauptverz. ist zu streichen. Die Stücke gehören nach Schulze zu *triangulum* Bohem. Siehe Nachtrag 6. *Molitor* ist eine südeuropäische und algerische Art.

Die blauen *Ceuthorrhynchus*-Arten hat Oberst Schultze genauer untersucht. Im Gebiet kommen sicher vor 1. *sulcicollis* Payk., 2. *hirtulus* Germ. (Nachtrag 6) Wiesbaden, Frkft. vier Ex.

†3. *C. pectoralis* Wse. Frkft. ein Ex. im Juli von Senator v. Heyden gef. Mainz (Schultze).

†4. *C. moguntiacus* Schultze (Deutsch. Ent. Zeit. 1895, 278.) Oberst Schultze theilt brieflich über diese Art mit: »Bei Mainz auf Cruciferen, besonders auf *Diplotaxis tenuifolia* nicht selten und wohl oft mit den nahe verwandten *chalybaeus* Germ. Weise und *pectoralis* Weise verwechselt. Die neue Art unterscheidet sich von beiden durch geringere Grösse, ovalere Form, matte, mehr grünlichblaue Flügeldecken, ferner durch das sehr dicht punktirte Halsschild ohne vertiefte und beschuppte Mittelrinne, sowie durch die gleichmässig und dünne weisslich-grau beschuppte Unterseite.

5. *C. chalybaeus* in Sammlung v. Heyden nur aus Spanien und vom Caspi-See: Derbent. kommt aber im Gebiet vor: Mainz, Nassau.

6. *C. erysimi* F.

7. *C. contractus* Marsh. — 8. *C. aenicollis* Germ. richtig.

*Baris cupirostris* F. Von Bücking bei Flörsheim in den Kalkbrüchen 7. 6. 92 geköschert.

†*Limnobaris pusio* Bohem. Unter *T. album* bei Enkheim einmal gef. var. *martulus* Sahlb. Frkft. ein Stück. Siehe Reitter: Bestimmungstabelle XXXIII.

Mecinus Heydeni Wencker. Von Mühl mehrfach Ende Mai 1892 bei Schwanheim gef.

Alle Apion genistae aus dem Gebiet sind **compactum Desbr.** A. genistae ist ein westliches Thier: Küste von Frankreich und England. Bei compactum ist der Schaft der Fühler kaum so lang als Glied 1 der Geißel, bei genistae viel länger.

## Chrysomelidae.

Lema Erichsoni Suffr. Von Sattler 1886 einmal bei Frkft. gef.

†Cryptocephalus **elegantulus Grav.** Von Bücking an den Kalkbrüchen bei Flörsheim 7. 6. 92 mehrfach geköschert. Neu für das Gebiet.

Chrysomela marginata F. Von Sattler 1 Ex. am Rande der Enkheimer Torfbrüche 10. 6. 94 gef.

†Galerucella **pusilla Dft.** Von Sattler bei Frkft. 6. 10. 89 und Enkheim 30. 3. 90 gef. Neu für das Gebiet. Bestimmung ist richtig.

†Galeruca (Adimonia olim) **laticollis Sahlb.** Im Sommer 1891 bei Wiesbaden einmal gef. Neu für das Gebiet.

Longitarsus ordinatus Foudr. des Hauptverz. ist lurides Scop.

**var. cognatus Wse.** Am Schilf bei Offenbach Ende August.

L. rufulus Foudr. des Hauptverz. ist tabidus F. Beide Foudras'sche Arten hatte Allard seiner Zeit unrichtig gedeutet. rufulus gehört als var. zu exoletus, ordinatus ist nicht zu deuten.

L. cerinus All. ist Mischart. Das Stück aus Soden ist **curtus All.** Das Stück aus Rüdesheim ist ballotae Marsh. Das Stück aus dem Rüdellheimer Wald ist luridus Scop.

## Cerambycidae.

Rhagium sycophanta Schrank var. latefasciatum Müll. — Zeit. Entom. Breslau 1890, 21. Seitlich auf jeder Decke hat die gelbe Farbe die schwarzen Flecken fast ganz verdrängt. Bücking fand bei Schwanheim 1 Ex. 9. 6. 95.

Leptura (Anoplodera) rufipes Schall. Von Sattler Mai 1892 aus Frkft. Waldholz erzogn, von A. Weis 23. 5. 95 in Oberwald gef.

L. (A.) sexguttata F. et var. exclamationis F. Von Sattler zusammen im Schwanheimer Wald mehrfach von blühenden Sträuchern geklopft.

Gracilia minuta F. Von L. v. Heyden in Bockenheim 4. 6. 94 und Juni 96 fliegend gef.

- Criocephalus rusticus* L. Ein kleines Ex. (14 Millim.) 1895 von Sattler im Frkft. Wald gef.
- Phymatodes lividus* Rossi (*melancholicus* F.) Von Bücking im Schwanheimer Wald 11. 5. 93 an Holz gef.
- Clytanthus pilosus* Forster. In Höchst von Assessor Runkel 24. 4. 96 lebend am Fenster gef. (Mittheilung von Bücking.) Siehe Nachtrag 5. Später fand B. ebenda ein zweites Stück.
- Acanthoderes clavipes* Schrank. Von Sattler 2 Ex. aus Frkft. Waldholz erzogen.
- Exocentrus lusitanus* L. Von Sattler ein Ex. an den alten Eichen bei Schwanheim 30. 6. 95 gef.
- Agapanthia violacea* F. Von Bücking auf einer Wiese an den Farberwerken bei Höchst und ein Paar in copula 8. 7. 94 auf *Scabiosa* bei Falkenstein im Taunus gef.
- Menesia bipunctata* Zoubk. Von Bücking in grösserer Anzahl 21. 6. 94 bei Schwanheim von *Rhamnus* geklopft, auch von Director Dr. Seitz.

---

### Zusätze.\*)

---

- Carabus monilis* F. am 1. 7. 95 im Wald (!) zwischen Holzhackerhäuschen und Fasanerie 1 Stück. Auf den Wiesen in der Nachbarschaft trotz wiederholten Suchen kein Thier. Sculptur der typischen Form, blau. var. *affinis* Panz.
- Cychrus attenuatus* F. Trauerbuche bei Wiesb. am 11. 8. 95 1 Stck.
- Oeys harpaloides* Serv. In Mehrzahl unter Rinde von Weidenklatterholz Schiersteiner Au 11. u. 12. 93 u. 94.
- Trechus discus* F. In Mehrzahl Schiersteiner Au 8. 93.
- Tr. micros* Hbst. Rheingenist 3. 96. 1 Stck.
- Licinus cassideus* F. 5. u. 8. 94 je 2 Stck. Bierstadter Berg bei Wiesb.
- Pterostichus melas* und *Adelosia picimana*. Den ganzen Sommer über auf dem Bierstadter Berg; erstere gemein, letztere nicht selten.
- Ophonus diffinis* Dej. 5. u. 6. 94. Südwesthang des Bierstadter Berges in Mehrzahl.
- Ophonus obscurus* F. Ebenda.

---

\*) Die nachfolgenden Mittheilungen wurden mir während des Druckes von Herrn Dr. Fuchs freundlichst zur Verfügung gestellt.

- Cephalophonus cephalotes* Fairm. Ebenda.
- Harpalus 4.-punctatus* Dej. In Mehrzahl hohe hohe Wurzel bei Wiesb.  
in Gesellschaft mit *Harp. rufitarsis* Duft. 7. 95. u. 96.
- Harpalus autumnalis* Dft. Rheingenist 3. 95. 1 Stck.
- Dichirotrichus placidus* Gyll. Rheingenist 3. 96. 1 Stck.
- Bradyallus collaris* Payk. > 5. Bahndamm am Taunusblick ein Paar.
- Aenpalpus dorsalis* F. Rheingenist 3. 96. 1 Stck.
- Synuctus nivalis* Panz. 9. 95 in Anzahl bei der Leichtweisshöhle bei Wiesbaden.
- Masoveus Wetterhali* Gyll. 18. 3. 94 unter Moos am Fusse einer Föhre bei Freiweinstein 2 Stck.
- Polystichus connexus* Fourc. > 6. 94 u. < 5. u. > 6. 95 je ein Stck. am Bierstadter Berg bei Wiesbaden.
- Velleius dilatatus* F. < 4. 95 ein todttes trockenes Exemplar Ameisen abgenommen, die in eine alte Eiche am Neroberg (Wiesb.) bauen; in der Eiche Hornissen-Nest.
- Quedius ventralis* Arag. < 6. 95 bei der Unter-Schweinsstiege bei Schwanheim 1 Stck.
- Parasilpha tristis* Illig. Bierstadter Berg 4. 94 und 5. 95 je zwei Expl.
- Tritoma fulvicollis* F. 3. 94 unter Buchenrinde. Eiserne Hand.
- Tritoma multipunctatus* Hellw. Unter Buchenrinde 3. 94. Leichtweisshöhle.
- Anoxia villosa* F. > 7. bei Castel. Wiederholt beobachtete ich, dass das ♀ sich an den äussersten Theil eines Baumzweiges (Obstbäume, Rüter) setzt, umschwärmt wird von den ♂♂, und direct nach der Begattung fast senkrecht herabfliegt, um sich im Sand zu verkriechen; in 4 Fällen unter diesen Verhältnissen das ♀ hierbei gefangen.
- Elater sanguinolentus* Schwank. Am 2. 12. 94 in faulender Weidenstübbe Schiersteiner Au 1 Stck.
- Elater praeustus* F. Auf blühendem Weissdorn Rabengrund bei Wiesb. 2 Stck.
- Pyrochroa pectinicornis* L. An frischen Buchenstümpfen 5. 95. Eiserne Hand in Mehrzahl.
- Leptura revestita* L. < 6. Neroberg an Eichenbüschen.  
Wiesbaden, 9. 8. 96.

Dr. med. Fuchs.



BEITRÄGE  
ZUR  
LEPIDOPTEREN - FAUNA  
DES  
MALAYISCHEN ARCHIPELS.  
(XI.)

---

ÜBER DIE LEPIDOPTEREN VON SUMBA UND SAMBAWA.

VON  
**DR. ARNOLD PAGENSTECHER**  
(WIESBADEN.)

(HIERZU TAFEL I, II u. III.)

---



Die Insel Sumba, auch Pulo Tschindana, Sandelbosch oder Sandelholzinsel genannt, gehört, wie Sumbawa, wie sie die Holländer zumeist nennen oder Sambawa, wie sie richtiger nach Doherty genannt werden muss, zu den kleinen Sundainseln. Sambawa liegt direkt innerhalb jener vulkanischen Kette, welche, an den Andamanen beginnend, über Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Wetter nach der Banda-See sich erstreckt. Sie ist westlich durch die Strasse von Allas von Lombok und östlich durch die Strasse von Sapi von den Inseln Kommodo und Flores getrennt. Sie gehört administrativ zu Celebes und ist namentlich durch den gewaltigen Ausbruch des Vulkans Tambora in der Landschaft Bima in 1835 bekannt geworden. Sumba liegt südlich von Sumbawa und Flores, mit der Mitte in dem Kreuzungspunkte des 10° südl. Breite und des 120° östlicher Länge von Greenwich. Sie gehört administrativ zu Timor und ist besonders durch die ihr eigenthümlichen Pferde (Ponies) bekannt. Eine tiefe See trennt Sumba von Flores.

Beide Inseln sind bereits zur östlichen Hälfte des malayischen Archipels zu rechnen. Sie liegen jenseits jener von Wallace zur Trennung in eine indomalayische und eine austromalayische Region für die Fauna gezogenen Demarcationslinie, welche ihren Anfang zwischen Bali und Lombok nehmen und sich zwischen Borneo und Celebes fortsetzen sollte. Das Vorhandensein einer solchen scharfen zoologischen Trennungslinie wird freilich in der Neuzeit, ebenso wie die von Wallace zur Begründung seiner Theorie herangezogene Scheidung in eine flache westliche und eine tiefere östliche See, nicht mehr angenommen. Ja der neueste Forscher im malayischen Archipel, Kückenthal, spricht sich (Malay. Archipel S. 131) gerade dahin aus, dass eine scharfe Grenze zwischen indischer und australischer Fauna nicht zu ziehen sei und dass man bis Celebes und Flores ausschliesslich eine verarmte indische Fauna habe, worauf ein Mischgebiet einträte, das, je weiter wir nach Osten kämen, um so mehr australisch werde.

Kückenthal sagt (l. c. S. 130), dass bekanntlich für die Entstehung der Fauna des malayischen Archipels angenommen wird, dass in sehr alter Zeit eine Verbindung von Australien mit dem asiatischen Continent stattgefunden habe und dass sich bis Halmahera, Batjan und Buru noch Spuren der indischen Fauna nachweisen lassen. Diese Verbindung soll zunächst durch einen zwischen Celebes und den Molukken auftretenden tiefen Meeresarm unterbrochen worden sein.

Während sich nun in der östlichen Hälfte die Molukken von dem noch länger mit Australien in Verbindung stehenden Neu-Guinea trennten, aber dennoch durch die fast ununterbrochene Inselverbindung begünstigt, mancherlei neue Einwanderungen aus jenem Gebiete erhielten, kam im Westen eine Abtrennung von Celebes zu Stande, auf welcher Insel sich in Folge der Isolirung noch einige Arten der alterthümlichen Fauna erhielten, während sie im westlichen, noch mit dem asiatischen Festlande zusammenhängenden Gebiete verschwanden.

Erst in späterer Zeit erfolgte der Zerfall dieses westlichen Gebietes in Borneo, Java, Sumatra und Malacca, deren Faunaähnlichkeit eine sehr grosse ist. Das Vorhandensein des südlichen Theiles der Wallace'schen Trennungslinie ist nach Kückenthal ein Schulblümchen, das sich immer wieder vererbe.

Die von Weber sorgfältig untersuchte Säugethierfauna von Flores zeigt keinen australischen, sondern einen indischen Charakter. Erst in Osten treten Beutelhie auf, wie sie für Australien eigenthümlich sind. Weber folgerte aus seinen Untersuchungen, dass die kleinen Sunda-inseln zoogeographisch eine Fortsetzung von Java sind und dass die tiefe Kluft zwischen Bali und Lombok nicht existire.

Doherty (Butterflies of Sumba and Sambawa in Journal Asiat. soc. Bengal Vol. LX, p. II n. 2. S. 189 (1891) sagt bereits, dass er von den Insekten der Bergregion von Bima (östliches Sambawa) den Eindruck gewonnen habe, dass sie fast rein indomalayisch wäre oder doch mehr als an der Küste, was nicht mit Wallace's Anschauung von dem jüngeren Datum der Einführung des indomalayischen Elements stimmt. Er sagt, dass (S. 144) die lange Inselkette von verschiedenen Punkten her Zuzügler erhalten habe und zwar die östlichen Timor, Timorlaut und wohl auch Wetter, hauptsächlich von den Molukken, Neu-Guinea und Australien, die westlichen hauptsächlich von Java. Die von Java kommenden Einwanderer hatten weniger Gelegenheit zur Differenzirung gewonnen, als die östlichen, wodurch die Fauna der

östlichen Inseln grösseres Interesse für die Naturforscher gewinnen, insbesondere Timorlaut, Wetter, Sumba und das Hochland von Timor.

Dieselben, für die allgemeine Fauna bemerkten Punkte ergeben sich bei genauerem Hinblick auch für die Lepidoptera. Die grossen Sundainseln Borneo, Java, Sumatra haben sowohl unter sich, als mit Malacca, eine grosse Formenähnlichkeit. Freilich zeigen sowohl die einzelnen Inseln unter sich, als auch auf einer und derselben Insel bestimmte Gebiete derselben je nach der Höhenlage und der auf ihnen herrschenden atmosphärischen und anderen Einflüsse entsprechende neue Falterformen oder wenigsten bemerkenswerthe Varietäten der einzelnen Arten. Diese Variabilität der malayischen Falterarten, welche innerhalb sehr geringer Grenzen auftreten kann, ist ja längst bekannt und besonders für viele Tagfalterarten eine oft höchst überraschende und interessante, während sie bei den Nachtfaltern nur in sehr beschränkter Weise zur Beobachtung kommt, bei welchen die wechselnde Einwirkung der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse auf die früheren Stadien der Schmetterlinge, wie auch andere Momente bei der mehr verborgenen Lebensweise weniger wirksam zu sein scheinen.

Wallace hatte in seinem bekannten Werke über die malayischen Papilioniden interessante Streiflichter auf diese Erscheinungen geworfen und Rothschild widmet denselben in seiner verdienstvollen Arbeit über die Eastern Papilios in den Novit. Zoologicae besondere Aufmerksamkeit und benutzt sie zur Aufstellung von mehr oder weniger scharf charakterisirten Lokalformen und Subspecies. —

Ueber die specielle Lepidopterenfauna von Sumba und Sambawa ist bisher noch wenig bekannt geworden und beschränkt sich dies, soweit ich die Literatur übersehe, auf das Nachfolgende.

Die bekannte, bereits citirte Arbeit von Doherty giebt nicht allein Aufschluss über die von ihm beobachteten Schmetterlinge von Sumba und Sambawa, sondern auch interessante Nachweise über die allgemeinen zoologischen, geographischen und ethnologischen Verhältnisse, insbesondere von Sumba, auf Grund längeren Aufenthalts daselbst, der sich sowohl auf Sumba, als auch auf Sumbawa oder Sambawa (s. S. 122 nota) erstreckte.

Doherty fand auf jeder Insel ungefähr 140 Species, von welchen er die von Sumba besonders aufführt und die von Sambawa nebenher erwähnt. Die auf Sumbawa gesammelten Thiere kamen in den Besitz des verstorbenen B. Neumoegen in New-York, die von Sumba sollte Herr Oberthür erhalten.



Doherty sagt über die Verbreitung, dass unter den Sumba-Tagfaltern sich ein beträchtliches austromalayisches Element fände. Einige dieser Formen erschienen auch in Sambawa, insbesondere Ornithoptera nais und Danais (Nasuma) haruhassa. Andere papuanische oder timoresische Formen, welche auf Sumba vorkommen, verbreiten sich nicht bis nach Sambawa, so Radena oberthür. In einem oder zwei Fällen hat eine Art, welche sich mit geringen Veränderungen von Java bis Timor findet, auf Sumba einen ganz verschiedenen Vertreter, so Papilio maremba.

Zehn sumbanesische Formen sind nach Doherty auf Sumbawa durch andere verwandte Arten repräsentirt, nämlich sechs Danaiden, drei Pieriden und ein Papilio.

Neun Danaidenarten kommen auf Sumba vor und neun auf Sambawa und von diesen sind sechs die gleichen und drei verschieden. Zehn Arten Euploeen wurden auf Sambawa gefangen und nur sechs auf Sumba (vielleicht in Folge des anhaltenden Regens im Innern); von diesen war nur eine grosse Salpinx gemein auf beiden Inseln. Ueberwiegend von den Euploeen war auf Sumba Euploea lewa, auf Sumbawa schien es die javanische E. cleusina zu sein. Von den Satyriden trat die nichtgeäugte Form auf, wenn die Augentragende in Indien erscheint, so dass die Jahreszeiten gerade verwechselt erscheinen.

1891 hat Dr. Staudinger in der Iris S. 71 und ebenda Iris 1893 S. 93 einige ihm von Sambawa zugegangene Schmetterlinge beschrieben. Ich selbst gab 1894 in den Jahrb. des Nass. Vereins für Naturk. Jahrg. 47, S. 52 eine kleine Zusammenstellung von einigen auf Sumba gefangenen Schmetterlingen (39 Arten). Sonst ist meines Wissens ausser den wenigen Bemerkungen, welche Rothschild in den Nov. Zool. I, S. 662 (1894) und in seinen Eastern Papilios, Nov. Zool. II (1895), sowie Grose Smith in Nov. Zool. II, S. 77 und II, S. 505, und in den Rhopaloc. Exot. von Grose Smith und Kirby veröffentlichten und Oberthür in seinen Etudes d'Entomologie, nichts über Schmetterlinge von Sumba und Sambawa in der Fachliteratur mitgetheilt worden. Indess verdienen die Arbeiten von Snellen über Schmetterlinge von Flores in Tijds. voor Entom. Bd. 34, S. 229 ff. und von Röber, Beiträge zur Kenntniss der indomalayischen Lepidopterenfauna (daselbst S. 261 ff.) Beachtung, da sie über Lepidoptera benachbarter Inseln handeln, welche in gleicher oder ähnlicher Form auf Sumba oder Sambawa vorkommen. Snellen sagt bereits daselbst,

dass die ihm von Flores zugekommenen Lepidoptera Züge von Java, aber auch von Sumatra und Neuholland trugen, weniger von Celebes und den Molukken. Ich erwähne auch hier die kleine Zusammenstellung, welche Butler, P. Z. S. 1883 über 21 Schmetterlinge von Timorlaut gegeben hat. S. Forbes, Mal. Archipel II, 87.

Aus dem bis jetzt Bekannten geht im Allgemeinen hervor, dass der Charakter der Lepidopterenfauna beider Inseln ein gemischter ist, insofern zu den der indomalayischen Fauna der grossen Sundainseln angehörigen Formen eine Anzahl solcher tritt, welche den östlichen Inseln angehören. Dazu kommen eine, wenn auch geringe Zahl spezifischer Formen und einige, welche der Fauna von Celebes, der Molukken und selbst der Philippinen entsprechen. Dasselbe geht auch hervor aus dem Material, welches ich neuerdings von Sumba und Sambawa erhalten habe, das ich im Nachfolgenden einer näheren Erörterung unterziehen will und und zwar in Zusammenhang mit dem, was bis jetzt die Literatur bekannt gemacht hat\*).

Es dürfte das für die bessere Anschauung über die geographische Verbreitung der einzelnen Lepidopterenarten sowohl, als über die besondere Form ihres Auftretens, von einigem Werth sein.

Hinsichtlich der von Sumba aufgeführten Lokalitäten bemerke ich, dass das auch von Doherty (S. 158) erwähnte Waingapu oder Wayapu an der Küste gelegen ist, während Pada Dalung (wie Doherty S. 146 schreibt) oder Patadala, wie es mir mitgetheilt wurde, in einer bis zu 2500' ansteigenden, von Kalkfelsen eingenommenen Gegend zu liegen scheint.

# I.

## RHOPALOCERA.

### Papilionidae.

Genus **Ornithoptera** Bois.

(Troides H.)

#### 1. **O. haliphron**, var. **naias** Doherty.

♂♀ **O. naias** Doherty, Journal Asiat. Soc. Bengal, p. 193 n. 116 (1891). Sumba.

---

\*) Die von anderen Autoren erwähnten, mir nicht zugekommenen Arten werden unter dem Striche erwähnt werden.

♂♀ *O. naias*, var. *sambawana* Doherty l. c., p. 194, sub. n. 116 (1891). Sambawa.

♂♀ *O. socrates* Staudinger, *Iris* IV, p. 71 (1891). Wetter, Sambawa; *Iris* VI, p. 83, T. 171 (♂) (1893). Wetter.

♂♀ *Troides haliphron naias* Doh., Rothschild *Novitates Zoologicae* II, p. 207 (1895). Sumba, Sambawa, Adonara, Alor, Wetter.

Doherty beschrieb ♂♀ von Sumba, wo die Art gemein sein soll, sowie eine angeblich grössere Varietät von Sambawa, bei welcher das ♀ einen grossen goldenen Fleck zwischen Costal- und Subcostalader der Hinterflügel haben soll, während der äussere Discalfleck stets mit der centralen gelben Area vereinigt wäre, grosse schwarze Flecke mehr oder weniger umschliessend. Beim ♂ soll ein gelber Fleck, welcher bei der Sumba-Form gewöhnlich, wenn auch gering entwickelt vorhanden ist, zwischen der obern und mittleren Medianader stets fehlen.

Dr. Staudinger beschrieb *Iris* IV, p. 171, *O. socrates* noch 2 ♂♂ 1 ♀ von Wetter und 1 ♂ von Sambawa als neue Art (welche aber auch als Lokalform von *haliphron* angesehen werden könnte) sehr ausführlich. *Iris* V, p. 83, hält er *O. socrates* für dieselbe Art, wie *O. naias* Doherty und bildet *Taf. I, Fig. I* daselbst das ♂ ab, lässt es aber unbestimmt, ob die Stücke von Wetter und von Sambawa einen Namen tragen können.

Rothschild, *Nov. Zool. II*, p. 207, welcher keine Stücke von Sumba vor sich hatte, zweifelt nach Doherty's Beschreibung nicht daran, dass alle ihm zugänglichen Exemplare von Sambawa, Alor, Adonara und Wetter zu der von ihm als *Troides haliphron naias* Doherty bezeichneten Subspecies von *Troides haliphron* Boisduval von Celebes gehören.

Nachdem ich bereits früher 1 Männchen und 2 Weibchen dieser Subspecies von Sumba erhalten hatte, deren Aufführung in meiner oben angezogenen Arbeit von 1894 leider unterblieben war, fanden sich wieder ganz gleiche Vertreter in den mir von den Inseln Sambawa und Sumba neuerdings zugekommenen Collectionen und zwar 1 ♂ und 2 ♀♀ von Sambawa und 1 ♂ von Sumba. Die beiden unter sich variirenden ♀♀ von Sambawa entsprechen völlig den beiden ebenfalls von einander abweichenden Weibchen von Sumba, indem die schwarzen Randflecke mehr oder weniger mit der innern Binde zusammenfliessen. Die ♂♂ von Sumba sind ebenfalls etwas verschieden von denen von Sambawa, aber nicht genügend, um eine Trennung der beiden Formen zuzulassen.

Es unterliegt mir keinem Zweifel, dass die auf Sumba vorkommende Varietät von *haliphron* mit der auf Sambawa auftretenden unter einem Namen zu vereinigen ist, wie dies auch bereits Rothschild gethan hat. Die von Doherty als Varietät *sambawana* angenommene Form ist einzuziehen, ebenso wie der von Staudinger angegebene Name *socrates* dem älteren zu weichen hat.

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf die angeführten ausführlichen Beschreibungen von Doherty, Staudinger und Rothschild und bemerke hier nur Folgendes: Das eine mir vorliegende Männchen von Sumba entspricht der Abbildung, welche Staudinger von seinem *socrates* ♂ giebt, insofern ausser der zur Hälfte goldgelb gefärbten Mittelzelle der Hinterflügel eine aus vier, durch die schwarzen Adern getrennten Flecken gebildete goldgelbe Binde nach aussen auftritt. Als ganz schwache Andeutung eines bei einem zweiten Männchen von Sumba, wie bei dem Männchen von Sambawa auftretenden fünften etwas schmäleren Fleckes — die Mittelzelle ist bei diesen beiden breiter goldgelb ausgefüllt — zeigt sich bei dem ersten Sumba-Männchen ein kleiner goldgelber Punkt nahe dem Endrande des vierten Fleckens, welcher auf der Unterseite stärker hervortritt. Die Adern der Vorderflügel sind bei beiden Männchen von Sumba weisslich eingerahmt, und zwar in verschiedener Stärke, besonders auf der Unterseite hervortretend. Der rothe Halskragen ist bei dem einen Sumba ♂ stärker ausgeprägt, die rothen Brustflecke bei beiden vorhanden.

Das Männchen von Sambawa zeigt die Mittelzelle in etwas grösserem Umfange goldgelb gefärbt; die goldgelbe Binde besteht aus fünf Flecken.

Die Adern der Vorderflügel sind wie bei dem ♂ von Sumba weisslich eingerahmt. Der Halskragen ist kaum roth, dagegen die Brustflecke etwas mehr roth gefärbt als bei den Sumba-Faltern. Auf der Unterseite hat das Sambawa-Männchen stärkere weisse Umrahmung der Adern der Vorderflügel und auf den Hinterflügeln nach innen vor dem fünften goldgelben Bindenfleck noch eine diffuse goldgelbe Bestäubung. Der Hinterleib ist oben durchgängig schwarz gefärbt, auf den Ringen der Unterseite dagegen goldgelb bestäubt.

Die beiden Weibchen von Sumba haben auf den Vorderflügeln eine gleich starke weissliche Bestäubung neben den Adern. Die Mittelzelle wird fast ganz weisslich ausgefüllt in ihrem obern Theile, während in der Mitte derselben sich zwei keulenförmig schwarze Streifen zeigen. Weissliche Bestäubung tritt namentlich auch zu beiden Seiten der submediana



auf, während dies bei den beiden Weibchen von Sambawa weniger der Fall ist. Bei dem einen der beiden Weibchen von Sumba sind auf den Hinterflügeln die schwarzen Keilflecke reichlicher durch die goldgelbe Mittelfärbung getrennt, als bei dem andern, bei welchem die Keilflecke ganz aneinander stossen und nur drei ganz kleine von den Aesten der Mediana durchtrennte goldgelbe Fleckchen übrig lassen. Der weissliche, von Staudinger erwähnte Fleck an der Submediana ist sehr deutlich. Die Mittelzelle ist in ihrer äussern Hälfte gelb; die dahinter liegende Binde besteht aus sechs, nicht wie bei dem Staudinger'schen Exemplar aus fünf Fleckchen bei beiden ♀♀ von Sumba.

Die beiden Weibchen von Sambawa entsprechen völlig den beiden Weibchen von Sumba, nur ist bei dem einen, bei welchem an der breiten schwarzen Aussenbinde sich nur kleine gelbe Doppelfleckchen finden, die Mittelzelle der Vorderflügel weit weniger weisslich ausgefüllt, namentlich fehlt hier der mittlere weisse Strahl. Bei beiden Weibchen ist auch die weisse Bestäubung längs der Submediana, wie bemerkt, geringer als bei den Sumba-Weibchen.

Bei den ♂♂ von Sumba ist der Hinterleib oben schwärzlich, unten gelblich und zwischen den Ringen schwärzlich behaart, bei dem ♂ von Sambawa erscheint auch die Seitenparthie vor den braunschwarzen Afterlappen gelblich wie die hinteren Ringe. Bei den Weibchen von Sumba und von Sambawa ist der Hinterleib oben heller braun und sowohl unten, als an den Seiten, wo einzelne schwarze Punkte auf den Segmenten stehen, gelblich bestäubt und zwischen den Ringen schwärzlich behaart.

Die geschilderten, bei Exemplaren von Sumba, wie von Sambawa in gleicher Weise sich wiederholenden Verschiedenheiten und Aehnlichkeiten zeigen, dass zwischen denselben keine wirkliche Artverschiedenheit besteht.

## Genus *Papilio*.

### Hector-Gruppe.

#### 2. *P. aristolochiae* Fabricius.

*P. eques trojanus aristolochiae* Fabr. Syst. Ent., p. 443, n. 3, (1775).  
Indien.

*P. eques trojanus polidorus* Cramer. P. E. II., p. 45. T. 128, F. AB.  
(1777) p. p.



*P. aristolochiae* Doherty (nec. Fabr.), Journal. As. Soc. Beng. 1891, p. 192. Sambawa.

*P. aristolochiae* Fabr. Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 245.

*P. aristolochiae austrosundanus* (subsp. nov.) Rothschild, l. c., p. 249. Sambawa.

Doherty führt *P. aristolochiae* L. (sic.) mit der kurzen Bemerkung: Sambawa normal, auf. Rothschild, l. c., p. 249, welcher über ein Material von 12 ♂♂ und 3 ♀♀ verfügte, beschreibt die von Sambawa vorliegende Form als eine besondere und giebt als Unterschied von der chinesischen *aristolochiae* Fabr., hauptsächlich die Anwesenheit von nur drei kleinen weissen Flecken der Hinterflügel an. Von dreifleckigen indischen und ceylonesischen Stücken unterscheidet sich die Sambawaform hauptsächlich durch die Stellung der drei weissen Flecke.

Mir liegt ein Pärchen von Sambawa vor. Beide Stücke zeigen auf der Oberseite der Hinterflügel deutlich drei weisse Flecke vor den rothen schwarzgekernten am Afterwinkel; auf der Unterseite schiebt sich beim ♀ zwischen die rothe Analfärbung und den letzten der drei weissen Flecke eine schwache weissliche Färbung ein.

### 3. *P. oreon* Doherty.

♂♀ *P. (Menelaides) oreon* Doherty, Journal As. Soc. Beng., p. 192 n. 109 (1891). Sumba.

♂ *P. godmanni* Roeber, Tijds. v. Entom. Bd. 34, p. 271 (1891) Alor; ib. Bd. 35, T. 3, F. 1. (1892).

♂♀ *P. oreon* Doh., Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk., p. 57 (1894). Sumba.

♂ *P. oreon* Doh., Rothschild, Nov. Zool. II, p. 235 (1895). Sumba, Alor.

Von dieser Art erhielt ich verschiedene Männchen und 1 Weibchen von Sumba. Meine Exemplare zeigen, ebenso wie die Alor-Exemplare, welche Rothschild vorlagen, den rothen Fleck auf der Unterseite

- 
1. *Troides helena propinquus* Rothschild wird aus der Staudinger'schen Sammlung von Rothschild als subspec. nov. (Novit. Zool. II, p. 218) von Sambawa erwähnt. Dieselbe ist neben *Troides helena cerberus* Felder zu setzen und in zwei Exemplaren (♂♀) in der Staudinger'schen Sammlung vorhanden. Diese Subspecies, deren Unterschiede von *cerberus* Herr Rothschild genau definirt, habe ich nicht erhalten. Vergl. auch de Nicéville und Martin, Butterfl. Sumatra, p. 507 u. 569.

des Schwanzes nicht, den Röber's Exemplar auf der Abbildung hat. Bei dem ♀ sind sowohl die rothen Flecke der Hinterflügel, als die weisslich-gelbe Discalfärbung verwaschener als beim ♂. Pap. liris unterscheidet sich sofort bei ähnlicher Färbung durch den bindenartigen scharf begrenzten Verlauf der gelblichen Mittelfärbung des Hinterflügels.

*P. oreon* kommt nach Doherty nur in den Waldbergen vor. Das eine der mir zugekommenen Männchen wurde am 9. Januar 1896 gefangen.

### Machaon-Gruppe.

#### *P. demoleus* L.

*P. eques achivus demoleus* Linné, Syst. Nat. ed. X, p. 464, n. 35 n. 35 (1758).

♂♀ *P. demoleus sthenelinus* Rothschild, Novit. Zool. II, p. 281 (1895). Alor, Larentuka, Adonara, Flores, Sambawa, Sumba, Goram(?).

*P. erithonius, localformia. (malayanus)* Wallace, Tr. Linn. Soc. London XXV, p. 59 sub. n. 81 (1865). Flores.

*P. erithonius*, Snellen, Tijds. v. Ent., Bd. 34, p. 250 n. 47 (1891). Flores; Röber, ibid., p. 278 (1891); Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat., p. 57 (1894). Sumba.

*P. (Orpheides) erichthonius*, Doherty, Journ. As. Soc. Beng., p. 191 n. 107 (1891). Sumba, Sambawa.

Rothschild, dem übrigens keine Exemplare von Sumba und Sambawa vorgelegen zu haben scheinen, führt einige kleine Unterschiede von der australischen Form *P. demoleus sthenes* Mac Leay an, während Röber, der diese Art in grosser Anzahl von Flores und Alor erhielt, sagt, dass die Var. *sthenelinus* Mac Leay nicht aufrecht zu erhalten sei, da, wie schon Semper (Beitrag zur Rhopaloceren-Fauna in Australien, p. 42) constatirt habe, die für diese Form angegebenen Unterschiede durchaus nicht constant wären.

Ueber die Gründe, warum Rothschild den Linné'schen Namen *P. demoleus* für die asiatische Form und nicht für den sonst allgemein als *demoleus* bezeichneten africanischen *P. erithonius* in Anspruch nimmt, siehe die Ausführungen dieses Autors (l. c. p. 280).

Ich erhielt diese Art in meiner ersten Sumba-Sendung sehr zahlreich, während sie in der zweiten fehlte. Besondere Unterschiede kann ich ebenfalls nicht constatiren.

## Memnon-Gruppe.

### 5. *P. memnon* L.

♀ *P. eques trojanus memnon* Linné, Syst. nat. ed. X, p. 460 n. 12 (1758).

Cramer, P. L. I, p. 42 (p. p.) T. 91 Fig. C. (1776).

♂ *P. (Iliades) merapu* Doherty, Journal As. Soc. Beng., p. 191 n. 108 (1891). Sumba.

♂♀ *P. memnon* Snellen (nec Linné 1758). Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 251, n. 50 (1891). Flores.

♂♀ *P. memnon merapu* Doh., Rothschild Nov. Zool. 1895, p. 315 (Sumba, Sambawa, Flores, Adonara).

Von dieser interessanten Lokalform des weit verbreiteten *P. memnon* L. liegen mir 4 ♂♂ und 2 ♀♀ von Sambawa und 1 ♂ von Sumba vor. Eines der Männchen von Sambawa hat die Grösse der beiden ♀♀, zwei sind etwas und das vierte bedeutend kleiner. Die beiden Weibchen haben beinahe die Grösse sonstiger *memnon* ♀♀. Das Männchen von Sumba übertrifft an Grösse sämtliche Exemplare von Sambawa, auch die ♀♀.

Doherty beschrieb das Männchen dieser Lokalform nach einem besonders grossen Exemplar von Sumba und erwähnt auch eine *memnon*-Form von Sambawa, die er aber nicht besass.

Snellen sagt von seinen vier (3 ♂♂, 1 ♀) Exemplaren von Flores, dass die Männchen von javanischen dadurch unterschieden seien, dass die leichte Bestäubung um die schwarzen Flecke der zweiten Hälfte der Unterseite der Hinterflügel nicht grau, sondern röthlich-gelb sei.

Rothschild, dem Sumba-Exemplare unbekannt waren, zählt seine

## Helenus-Gruppe.

2. *P. helenus biseriatus* Rothschild, Nov. Zool. II, p. 287 (1895). Timor, Oinainisa, Sambawa.

*P. helenus* de Haan (nec Linné 1758) Verhand. Nat. Gesch. Ned. overz. bez., p. 30 (1840) p. p. (Timor).

*P. helenus* var. *Vollenhoven*, Tijd. v. Ent., Bd. III, p. 44 sub. n. 28 (1860) Timor, Koepang.

*P. (Charus) helenus* Doherty, Journal As. Soc. Beng., p. 192, n. 110 (1891, Sumba, Sambawa mountains, scarce).

Rothschild bringt seine männlichen Exemplare von Sambawa mit Weibchen von Timor in die von ihm definirte subspecies unter. Ich erhielt keine Exemplare.

mit Doherty's Beschreibung zusammenfallende Exemplare von Sambawa und Adonara zu merapu Doh.

Die mir vorliegenden Männchen von Sambawa entsprechen den Doherty'schen und Rothschild'schen Beschreibungen nicht völlig. Sie sind oberseits javanischen Exemplaren ähnlich, in sich nicht wesentlich verschieden, aber unterseits, besonders an den Hinterflügeln, abweichend. Eines derselben ist ungleich dunkler gefärbt als die andern, so dass der blaugrün Aussenrand sich von den dunklen Flecken in demselben wenig abhebt. Es zeigt eine Spur eines gelblichen Analflecks. Das zweite (grössere) Exemplar zeigt eine ausgesprochene lichtere Färbung des Aussenrandes der Hinterflügel und eine Doppelreihe schwarzer Flecke, aber keine Spur eines gelblichen Analflecks. Das dritte (mittlere Grösse) hat ebenfalls einen lichtgrauen Aussenrand, mit deutlicher Doppelreihe schwarzer Flecke und einer Spur eines gelblichen Analflecks. Das vierte (kleinste) Exemplar hat eine sehr helle lichte Färbung des Aussenrandes der Hinterflügel mit starkem Hervortreten der schwarzen Flecke. Im obern Theil der lichten Mittelparthie sind gelbliche Atome eingesprengt, welche sich am Analende zu einem gelblichen quadratischen Flecke verdichten. Die rothen Flecke am Flügelgrunde der Unterseite sind auf Vorder- und Hinterflügeln bei allen Exemplaren gleich entwickelt, auch sonst keine Verschiedenheit nachweisbar. Die von Doherty als charakteristisch angegebene rothgelbe Färbung der Umgebung der schwarzen Flecke auf der Unterseite der Hinterflügel ist aber bei den Sambawa-Exemplaren nicht ausgesprochen.

Die beiden grösseren (ungeschwänzten) Weibchen von Sambawa sind sich recht ähnlich. Das eine zeigt auf der Oberseite einen etwas grösseren rothen Fleck am Rande der Vorderflügel als das andere, die weissliche Discalfärbung der Hinterflügel ist stärker ausgesprochen, der Analwinkel stärker gelblich gefärbt, welche Färbung auf der Unterseite besonders hervortritt. Sie entsprechen der Rothschild'schen Beschreibung (l. c. p. 316).

Das von Sumba vorliegende Männchen ist grösser als die Sambawa-Exemplare. Auf der Oberseite ist es jenen ähnlich, auf der Unterseite aber wesentlich verschieden und der Doherty'schen Beschreibung entsprechend. Die aus grössern Flecken bestehende innere Fleckenbinde fällt mit der übrigen Grundfärbung zusammen. Die äussere besteht ebenfalls aus grösseren, schwarzen Flecken (als beim typischen memnon) und wird von orangerother Färbung umgeben, wie dies Snellen von den



Flores-Exemplaren angiebt. Die röthlichen Flecke am Flügelgrund sind an den Vorderflügeln stark entwickelt.

Die Differenzirung von javanischen Exemplaren ist also bei den Sambawa-Männchen gering, bei den Stücken von Sumba (und von Flores) stärker entwickelt.

### Polytes-Gruppe.

6. **P. canopus** Westwood, Ann. Mag. N. hist IX, p. 38 (1842). North Australia.

Rothschild, Nov. Zool. I, p. 685 (1894).

P. Vollenhovii umbrosus Rothschild N. Z. I, p. 686 (1894). Sambawa.

P. canopus umbrosus Rothschild, Nov. Zool. II, p. 342 (1895). Sambawa. Taf. VIII; Fig. 3.

P. canopus sumbanus Rothschild, Nov. Zool. Vol. III, 2, p. 237 (1896).

Von Sumba liegt mir ein etwas defectes Exemplar (♀) vor. Es ähnelt dem von Rothschild als P. canopus umbrosus von Sambawa abgebildeten Exemplar, ist aber anderseits auch wieder P. palephates-Stücken von den Philippinen recht ähnlich. Die Beschreibung des P. canopus umbrosus trifft ebenfalls für das Exemplar zu, nur ist der dort angegebene kleine weissliche Apicalfleck bei meinem Exemplar durch einen mit grossen länglichen, dreigetheilten weisslichgelben Fleck ersetzt, wie bei palephates.

Die Hinterflügel zeigen wenig ausgeprägte weissliche submarginale Flecke, sowohl oben wie unten, noch schwächer als auf Rothschild's Abbildung von P. canopus umbrosus. Die Fransen sind weiss.

Die Abweichungen dieser Art auf den verschiedenen so nahe gelegenen Inseln ist bemerkenswerth. S. T. III, Fig. 1.

7. **P. polytes** Linné.

Linné, Syst. nat. ed. X, p. 40, n. 7 (1758). Asia.

Clerck, Icones I, S. 1471 (1766).

Snellen, Tijd v. Ent., Bd. 34, p. 251 (Flores).

Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 343.

P. polytes theseus Cramer II, p. 128, T. 180, Fig. B. (1779).

Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 349.

Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 272. Bonerate, Timor, Flores, Kisser, Letti

P. polytes L., de Nicéville u. Martin, Butt. Sumatra, p. 567, u. 587 (1895).



Rothschild bemerkt von den Sambawa-Exemplaren der weit verbreiteten Art, dass die weisse Fleckenbinde der Hinterflügel schmaler sei, als bei solchen aus anderen Gegenden. Bei den mir von Sambawa vorliegenden Stücken (♂♂), welche im Allgemeinen denen von Java und Borneo gleichen, ist die aus sieben weissen Flecken bestehende Binde der Hinterflügel sehr schmal und die Schwänze sind geringer entwickelt, als bei javanischen. Auf der Unterseite sind die beiden untersten Flecke nur in ganz geringer Ausdehnung von bläulichen Schüppchen auf der Aussenseite begleitet. Bei einem Exemplare zeigen sich neben kleineren submarginalen Fleckchen ein gelblicher Analfleck.

Von Sumba liegen mir 2 ♂♂ und 3 ♀♀ vor. Die ersteren gleichen den Sumbawa-Stücken, doch sind die weissen Flecke der Binde der Hinterflügel etwas grösser. Von den 3 ♀♀ sind zwei von javanischen theseus ♀♀ nicht verschieden, das dritte grössere hat die Färbung des Mannes und stumpfe Schwänze. Die untern marginalen Flecke der Vorderflügel, wie die Analflecke der breiteren Discalbinde der Hinterflügel sind gelblich gefärbt. Blaue Schüppchen auf der Unterseite fehlen bei diesem ♀, bei den Männern sind sie vorhanden.

### Peranthus - Gruppe.

#### 8. *P. peranthus* Fabr.

*P. eques trojanus peranthus* Fabricius. Mant. Ins. II, p. 4, n. 33 (1787).

*P. peranthus* Donovan, Ins. of China, T. 25 (1798),

Lucas, Lep. Exot., p. 22, T. 12, Fig. 2 (1835). Java.

*P. peranthus* Felder (nec Fabr. 1787), Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 322, n. 434 (1864) p. p. Lombok.

Wallace, Trans. Linn. Soc. London XXV, p. 65, n. 35 (1865), p. p. Lombok.

Snellen, Tijds. v. Ent., Bd. 34, p. 251, n. 49 (1891). Flores.

*P. (Harimala) peranthus* var. Doherty, Journ. Asiat. Soc. Beng., p. 193 (1891). Sambawa.

♂ *P. peranthus* var. *fulgens* Röber, Tijds. v. Ent., Bd. 34, p. 374 (1891). Bonerate.

♂♀ *P. peranthus fulgens* Röber. Rothschild, Novit. Zool. II, p. 392 (1895). Bonerate, Lombok, Sambawa, Flores, Puro, Adonara.

Die mir von Sambawa vorliegenden Stücke (6 ♂♂ und 3 ♀♀) dieser schönen Art gehören zu der von Röber als *fulgens* bezeichneten Varietät.

Doherty beschrieb die von ihm auf Sambawa gefangene *peranthus* var. als selten und in der Mitte stehend zwischen dem javanischen *peranthus* und dem timoresischen *pericles*.

Rothschild führt von den Exemplaren von Sambawa und Flores (welche Snellen als identisch mit *peranthus* von Java ansieht) an, dass die blaugrüne Area der Vorderflügel, sich wie bei dem Exemplare, welches Röber von Bonerate beschrieb, bis an den Ursprung des zweiten Medianastes erstrecke, während die Ausdehnung des subapicalen grünen Bandes sehr verschieden sei.

Bei den mir vorliegenden Männern geht die grüne innere Binde bis zum Ursprung des zweiten Medianaderastes, die schwarze Binde ist scharf abschneidend ungleich breiter, als bei javanischen Stücken. Bei den javanischen sind nur drei Filzstreifen vorhanden, bei den Sambawanern sind es deren vier, ja bei einzelnen fünf und diese sind ungleich dichter, wodurch der Flügel ein wesentlich anderes Aussehen erhält. Die subapicale grüngoldne Binde ist stärker entwickelt und die innere schimmert lebhaft metallisch grüngolden, während sie bei javanischen Exemplaren an Färbung eine mehr bläuliche ist. Nur ein Exemplar, das auch etwas kleiner ist, als die übrigen, kommt den javanischen Stücken in der etwas schmälern schwärzlichen Binde, sowie in der nicht so stark metallischgrün schimmernden inneren Binde und in nur drei Filzstreifen näher.

Bei den Weibchen verläuft die schwarze Binde mehr allmählich in den grauen Flügelgrund, sowohl auf Vorder-, als Hinterflügeln. Die Unterseite zeigt keine wesentliche Verschiedenheiten zwischen Exemplaren von Java und Sambawa. Bei letztern sind die silberblauen Einfassungen der gelblichen submaginalen Fleckenbinde, wie letztere selbst, verschieden stark entwickelt. Die Sambawa-Stücke erscheinen durch die strahlende Färbung, wie durch einen stärkeren Habitus von den javanischen ausgezeichnet.

#### 9. *P. neumoeogeni* Honrath.

♂ *P. neumoeogeni* Honrath, Ent. Nachr., p. 127 (1890), Sambawa (sic!); id. Berl. Ent. Zeitung, p. 431, T. 15, Fig. 2 (1891). Sambawa (sic.).

♂ Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 390 und 503 (Sumba).

♂♀ Pagenstecher, Ent. Nachr. 1896, p. 151, n. 10, Sumba.

♂ *P. (Harimala) maramba* Doherty, Journ. As. Soc. Beng., p. 192, n. 111 (1891). Sumba.

♂ *P. marembo* Oberthür, Et. d'Ent. XIX, p. 2, T. 3, F. 12 (1894).  
Sumba.

Honrath hatte diese interessante Art irrthümlich als von Sambawa stammend, zuerst publicirt und vortrefflich abgebildet (♂). Den Fehler des Vaterlandes hat dann Rothschild (l. c. p. 503) berichtigt. Doherty sagt bei seiner Beschreibung (l. c. p. 193) von *marembo*, dass die prächtige Art keine nähern Verwandten habe, aber, abgesehen von der sexuellen Auszeichnung, dem *Pap. brama* Guérin von Borneo am nächsten komme. Die Art wäre auf Sumba nahe der Küste selten, häufiger im entfernten Innern.

Rothschild (l. c. p. 390) beregt den Unterschied von *neumoegeni* von der *Palinurus*-Gruppe, der in dem Filzfleck der Vorderflügel des Mannes besteht, sowie in dem Vorhandensein der subdiscalen dreifarbigten Flecke wie bei den andern Arten der *Peranthus*-Gruppe. Er erwähnt, dass in Oberthür's Figur die Schwänze einige grüne Schüppchen tragen, während Doherty und Honrath sagen, dass der Schwanz nicht grün sei.

Unter der Ausbeute, welche ich neuerdings von Sumba erhielt, befand sich ein Pärchen dieser schönen Art. Dies setzt mich in den Stand, mitzutheilen, dass der Schwanz des Mannes keine grüne Schüppchen trägt, während diese bei dem etwas grössern Weibchen allerdings vorhanden sind. Ich habe das bisher unbekannte Weibchen in den Ent. Nachr., Jahrgang XXII (1896), p. 151—153, n. 10, beschrieben, doch ist in dieser Beschreibung ein Fehler hinsichtlich der Grössenangabe des Weibchens stehen geblieben. Während nämlich das Männchen circa 65 mm Aussenmaass zeigt, hat das Weibchen ein solches von circa 75 mm. Im übrigen verweise ich auf die dort gegebene Beschreibung.

Der Unterschied vom Manne besteht in der Abwesenheit der Filzflecke der Vorderflügel, in der bedeutenden Grösse und in dem Verlauf der mehr verwaschen auftretenden grüngoldnen Prachtbinde. Während diese beim Mann durch die Mittelzelle der Vorderflügel durchgeht, hier von einem schwarzen Fleck (durch Bestäubung der Adern) unterbrochen, geht sie beim Weibchen um die Mittelzelle herum. Ausserdem zeigt das Weibchen am Vorderwinkel des Hinterflügels einen gelblichen Fleck. Die Unterseite entspricht nahezu völlig der Unterseite des *Peranthus*-Weibchens. Doch geht, entsprechend dem Verlauf der grünen Binde der Oberseite, die hellgraue bindenartige Färbung nicht in die Mittelzelle hinein, wie dies bei *Peranthus*-Weibchen der Fall ist.

## Antiphates - Gruppe.

### 10. *P. antiphates* Cramer.

- P. eques achivus antiphates* Cramer. P. E. I, p. 43, T. 72, Fig. A. B. (1775).  
*P. antiphates* L., Doherty, Journal As. Soc. Bengal, p. 193. Sambawa. Rothschild, Nov. Zool. II, p. 410 (1895).  
*P. eques achivus alcibiades* Fabr. Mant. Ins. II, p. 8, n. 65 (1787).  
*P. antiphates alcibiades* Rothschild, Nov. Zool. II, p. 411 (1895). Sambawa.  
*P. antiphates* Cramer, de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 524, n. 598 (1895).

Die auf Sambawa vorkommende Lokalform dieses etwas veränderlichen Schmetterlings gehört zu der von Fabricius als *alcibiades* und von Java, Sambawa, Sumatra, Nias, Bunguran, Borneo, Ceylon, South- und Central-India, Assam, Sikkim, Burmah, Shan-States, Malacca bei Rothschild aufgeführten Localform, die von der philippinischen (*euphates* Felder) wesentlich abweicht.

Es liegen mir zwei Exemplare von Sambawa vor, die mit javanischen nahezu übereinstimmen, nur sind sie auf der Unterseite kräftiger gezeichnet, und auf der Oberseite der Vorderflügel geht die zweite schwarze Binde mit ihrem Ende in die Randbinde hinein.

## Aristeus - Gruppe.

### 11. *P. aristeus* Cramer IV, p. 60, T. 318, F. E. F. (1782) Amboina.

- P. aristeus hermocrates* Felder, Verh. zool. bot. Ges. 1854, p. 303, n. 194; Reise, Nov. Lep. I, p. 57, n. 44, T. 12, F. 2 (1865). Luzon.

Oberthür, Et. d'Ent IV, p. 63, n. 156 (1879). Mindanao, XVI, p. 4 (1893). Tonkin.

Eimer, Artbildung Schmett., p. 161, T. 3, F. 2 (1889).

*P. anticrates* Distant, Rhop. Mal., p. 470, n. 32, T. 42, F. 7 (1886). Perak.

Hagen, Iris VII, p. 27, n. 30 (1894). Sumatra.

*P. hermocrates* Elwes, Journ. As. Soc. Beng., p. 437, n. 146 (1886). Tavoy, Siam.

Semper, Phil. Tagf., p. 203, n. 413 (1892). Luzon, Cebu, Mindanao.



*P. aristeus hermocrates* Feld., Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 429 (Philippinen, Palawan, Borneo, Sumatra, Malay Peninsula, Tenasserim, Burma, Timor, Wetter).

*P. (Pathysa) hermocrates* Felder, de Nicéville und Martin. Butt. Sumatra, p. 525, n. 600 (1895).

Es liegt ein Exemplar von Sumba vor, welches der Distant-schen Abbildung entspricht. Auf der Unterseite ist er näher verwandt mit *parmatus* von Australia, als mit dem dunkleren *aristeus* der Molukken. Das Roth der Unterseite der Hinterflügel ist weniger entwickelt, als bei *aristeus*. Auch findet ein rothes Durchschimmern von der Oberseite her, wie bei *Distant*, nicht statt

### **Eurypylus - Gruppe.**

*P. eurypylus* L. Syst. Nat. X, p. 464, n. 37 (1758). Molukken. de Nicéville u. Martin, Butt. Sumatra, p. 525, n. 602 (1855).

12. ♂ *P. eurypylus* var. *sallastius*, Staudinger, Iris VII, p. 381 (1895). Wetter, Sambawa.

*P. sallastius* Staudinger. Rothschild, Nov. Zool., p. 431 (1895). Sambawa. S. Abbildung T. I. II, F. 1 (♂).

Staudinger beschrieb diese Form 1895 nach einer geringen Anzahl von Exemplaren (♂♂) von den Inseln Wetter und Sambawa, und setzte sie als neue Art neben die von ihm als *P. jason*, var. *eurypylides* aufgestellte Form und nach der Unterseite neben *evemon* oder var. *mecisteus* Dist. Da *sallastius* mit *eurypylides* auf Sambawa zur selben Zeit fliegt, so hält er beide für getrennte Arten und könnte *sallastius* nicht zu *jason* gezogen werden, wenn *eurypylides* dahin gehört.

Mir scheint, dass entwede beider Formen als Arten oder aber, wie Rothschild es thut, als subspecies von *eurypylus* bezeichnet werden müssten.

Es liegen mir von *P. sallastius* von Sambawa zwei gleiche Männer, von Sumba zwei von jenen nicht verschiedene, ebenfalls ganz gleichgefärbte und gezeichnete Männchen vor.

Die ausführliche Beschreibung Staudinger's enthebt mich, eine neue hier zu geben.

13. *P. eurypylus* var. *eurypylides* Staudinger.

*P. eurypylus* Doherty (nec. Linné) Journal As. Sos. Beng., p. 193, n. 113 (1895). Sumba, Sambawa (p. p.).



♂ *P. jason*, var. *eurypylides* Staudinger, Iris VII, p. 350 (1895).  
Sambawa.

♂ *P. eurypylus eurypilides* Staudinger, Rothschild, Nov. Zool. 1895,  
p. 432 (Sambawa), Sumba (the same?).

Siehe die Abbildung Taf. I, II, Fig. 3 (♂).

Doherty führt *eurypylus* L. als selten auf Sumba und Sambawa auf und macht auf keinen Unterschied von der Grundform aufmerksam. Staudinger beschreibt seinen *eurypylides* nach einer Anzahl von ♂♂ von Sambawa. Namentlich betont er die schmalen Randflecke, sowie die auffallend verdunkelte Unterseite, welche dem typischen *eurypylus* von den Molukken am nächsten kommt. Rothschild stellt die Form *eurypylides* der ceylonesischen (*eurypylus jason*) am nächsten.

Ich erhielt *eurypylides* bis jetzt nur von Sambawa, dagegen *sallastius*, wie oben bemerkt, in ganz gleicher Weise auch von Sumba. Die Meinung Rothschild's, dass *eurypylides* auf Sambawa beschränkt sei, wird dadurch wahrscheinlicher. Ob eine oder beide Formen noch auf einer Nachbarinsel vorkommen, muss ich vorläufig dahingestellt sein lassen.

14. *P. sarpedon* Linné, Syst. Nat. ed. X, p. 461, n. 14 (1758).

Godart, Enc. Math. IX, p. 46, n. 62 (1819).

Lucas, Lep. Exot., p. 9, T. 55, Fig. 1 (1836).

Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 440.

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 526, n. 606.

*P. parsedon* Westwood, Trans. Ent. Soc. London, p. 59, T. 5,  
Fig. 1, 2. (1872).

*P. sarpedon parsedon* Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 442: Timor,  
Wetter, Adonara.

Es liegen mir von Sambawa zwei Exemplare (♂♂) vor. Sie sind kleiner, als indische Stücke, mit ziemlich breiter grüner Binde, welche nur im obern Theile der Vorderflügel durch schwärzliche Adern getheilt wird. Sie ähneln einem mir aus dem Innern von Java vorliegenden Stücke, nur sind die bei jenem gelblichen Flecke auf der Vorderseite bei dem sambawanischen roth; die Zähne der Hinterflügel sind stärker entwickelt, als bei andern Exemplaren, und die submarginalen grünen Flecke der Hinterflügel mehr strich- und hakenförmig, als winklich.

Zwei Stücke von Sumba sind ebenfalls klein. Die grüne Binde etwas schmaler, als bei den Sambawa-Exemplaren, die Zähne der Hinterflügel geringer entwickelt, sonst gleich jenen.

### Agamemnon - Gruppe.

15. **P. agamemnon** Linné.

P. eques achivus agamemnon Linné, Syst.-Nat. ed. X, p. 462, n. 21. (1758).

Cramer, P. E. II, p. 151 (1775).

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 527, n. 609 (1895).

P. agamemnon Boisd. nec Linné, 1758. Spec. gén. Lep. I, p. 230, n. 49 (1836) p. p.

Doherty, Journal As. Soc. Beng., p. 193, n. 114 (1891). Sumba, Sambawa.

P. agamemnon, localform a. Wallace, Trans. Ent. Soc. 1865, p. 67, sub n. 118 (1865). Timor, Flores.

P. agamemnon, Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. 1894, p. 57. Sumba.

Röber, Ned. Tijd. v. Entom., Bd. 34, p. 275. Ceram, Goram, Bonerate.

P. agamemnon exilis Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 451. Tenimber Islands, Dammer, Timor, Wetter, Flores, Sumba, Sambawa.

Doherty führt P. agamemnon von Sumba und Sambawa ohne weitere Bemerkungen auf; Rothschild, welchem übrigens keine Exemplare von dort zu Gebote gestanden zu haben scheinen, bezieht die auf Sambawa vorkommende Form, wie die von Flores und Wetter auf seine Subspecies exilis, welche kleiner als andere Rassen und mit zarteren Schwänzen versehen sein soll, sowie mit schmalen Flecken. Es liegen mir sowohl von Sumba (1), als von Sambawa (3) Exemplare vor, die sich untereinander weder in der Zahl und Gestalt der grünen Flecke, noch der Schwänze unterscheiden.

Gegen Stücke von Amboina (plisthenes) sind die grünen Flecke der Hinterflügel stärker entwickelt, die Schwänze schlanker, die Unterseite der Hinterflügel in der äussern Parthie verwischer; doch sind diese Unterschiede nur gering.

Stücke von Java zeigen eine stärkere Entwicklung der Mittelreihe der grünen Flecke, insbesondere des in Zelle 2 gelegenen Fleckes, welcher bei den Sambawa-Exemplaren namentlich auf der Unterseite kleiner ist. Die Schwänze der Java-Stücke sind schwächer, als die der von Sambawa stammenden. In der von Rothschild betonten Stellung der beiden Endflecke am Hinterrande bemerke ich keine Differenzen.

Umstehend gebe ich eine Uebersicht der nach dem Vorstehenden (bis jetzt) auf Sambawa und Sumba beobachteten Papilioniden mit Rücksicht auf die im malayischen Archipel beobachteten Varietäten und Subspecies der betreffenden Arten.

Diese Uebersicht ergibt eine erleichterte Anschauung darüber, wie sich die Fauna der Papilioniden auf Sumba und Sambawa zusammensetzt. Sie ergibt als interessantes Resultat, dass sich dieselbe gebildet hat zum grössern Theile aus mehr oder weniger specialisirten Formen von Arten, welche entweder, wie *P. eurypylus* L., *P. sarpedon* L. und *agamemnon* L. über den ganzen malayischen Archipel verbreitet sind oder aber aus solchen — und das ist die Mehrzahl — welche über einen Theil desselben sich erstrecken. Solche umfassen vorzugsweise das indomalayische Gebiet, wie *Ornith. helenus* L. (*pompeus* Cr.); *P. aristolochiae* Fabr., *P. helenus* L., *P. memnon* L., *P. polytes* L., *P. antiphates* oder gehören mehr dem austromalayischen an, wie *P. demoleus*, *aristeus* und *canopus*.

Diesen schliessen sich dann noch Formen an, welche wie *O. naias* in der Stammform auf Celebes fliegt oder wie *P. peranthus fulgens* Röber, dessen Stammform auf Java angetroffen wird. Endlich treten dazu noch *P. oreon* Doh., welcher nur noch auf einer weitem kleinen Sundainsel bis jetzt beobachtet wurde und der für Sumba, wie es scheint, charakteristische *P. neumoegei* Honrath.

Wir haben es also mit einer Mischfauna zu thun, deren einzelne Verteter (mit Ausnahme von *oreon* und *neumoegei*) sich in mehr oder weniger ausgeprägter Weise differenzirt haben, ähnlich wie auf anderen Inseln (*hermocrates*, *alcibiades*, *sallastius*) oder aber in besonderer Weise, wie *eurypylides*. Von den im Ganzen beobachteten 17 Arten kommen 14 auf Sambawa, 11 auf Sumba vor; 7 Formen sind beiden Inseln gemeinsam; 12 kommen auf den benachbarten kleinen Sundainseln vor, 11 auf Indien und Ceylon, je 10 auf Borneo, Sumatra und Java, 8 auf den Philippinen, sowie in China und Japan, 7 auf Celebes, je 5 auf den Molukken, Neu-Guinea und Australien, und 3 im Bismarck-Archipel.

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich hinsichtlich der Art der Differenzirung der einzelnen Vertreter der Arten auf das von mir im vorhergehenden Texte Angegebene, sowie auf die Darstellungen, welche Rothschild in der Novit. Zool. 1895 bei der Erörterung der betreffenden Arten und ihrer subspecies gegeben hat. Eine Differen-

Uebersicht der auf Sambawa und Sumba vorkommenden

India, Ceylon	Sumatra	Borneo	Java	Sambawa	Sumba	Flores, Lombok, Timor, Wetter u. s. w.
—	—	—	—	1. Orn. naias Doh.	0. naias D.	—
O. helena L. (pompeus)	O. helena (cerberus)	O. helena (pompeus)	O. helena (pompeus)	2. O. hel. propinquus R.	—	—
P. aristolochiae F.	P. aristol. antiphus	P. aristol. acuta Dr.	P. aristolochiae	3. Pap. arist. v. austrosundan. R.	—	P. arist. v. antiphus
—	—	—	—	—	4. P. oreon D.	P. oreon Doh.
P. demoleus L. (erithon.)	—	—	—	5. P. dem. var. sthenelinus R.	P. demoleus v. sthenelinus	demoleus v. P. sthenelinus
P. helenus L.	P. helenus v.	P. helenus v.	P. helenus v.	6. P. hel. v. bisriatus	—	P. hel. bisriatus
P. memnon L. v. agenor L.	P. memnon L.	P. memnon L.	Pap. memnon L.	7. P. memnon v. merapu	P. v. merapu	P. memnon v. merapu
—	—	—	—	8. P. canopus v. umbrosus R.	P. canopus v. sumbanus R.	P. canopus v. hypsichides v. Vollenhovii
P. polytes L.	P. polytes E.	P. theseus C.	P. theseus	9. P. theseus	P. theseus	P. theseus
—	—	—	P. peranthus F.	10. P. per. v. fulgens R.	—	P. per. v. fulgens Röb.
—	—	—	—	—	11. Pap. neumoe- geni Hour.	—
P. antiphat. v. alcibiades	P. alcibiades	P. alcibiades	v. alcibiades	12. P. v. alcibiades	—	—
P. aristeus v. anticrates	P. ar. v. hermocrates	P. her- mocrates	—	—	13. P. hermocrates	P. hermo- crates
P. eurypylus jason, varion	P. eurypyl. axion	P. axion	P. axion	14. euryp. v. sallastius Sn.	P. sallastius	P. sallastius
P. eurypylus	P. eurypyl. axion	P. eurypyl. axion	P. eurypyl. axion	15. P. euryp. v. eurypylides	—	—
P. sarpedon v. teredon	P. sarpedon	P. sarpedon	P. sarpedon	16. P. sarpedon parsedon	P. parsedon W.	P. parsedon
Pap. agamemnon L.	P. agamemnon L.	P. agamemnon	P. agamemnon	17. P. agamemnon exilis R.	P. exilis R.	P. exilis



Papilioniden und ihrer Verbreitung in den Varietäten.

Celebes	Molukken	Neu-Guinea	Australia	Philippinen	China, Japan	Bismarck-Archipel, Salomons-Inseln
O. hali-phron B.	—	—	—	—	—	—
O. helena, v. hephaestus	—	—	—	—	—	—
P. aristolochiae L.	—	—	—	P. ar. v. Kotzebui v. philippus	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	P. dem. v. sthenelinus	P. sthenelus	—	P. demoleus	—
—	—	—	—	P. helenus v. hystaspes	P. helenus	—
—	—	—	—	—	P. memnon v. agenor L.	—
—	—	—	P. canopus.	—	—	—
P.v.alcindor	P.alphenor P. nicanor	—	—	P. alphenor C.	P.v.borealis	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	P. euphrates F.	P. euphrates	—
—	P.aristeus C.	P. parmatius	—	P. her-mocrates	—	—
P.eurypylus pamphylus	P.eurypylus	P.eurypylus v.lycaonides	P.eurypyl. lycaon	P.eurypylus gordius	P.eurypylus v.mikado L.	P.eurypylus extensus R.
—	—	—	—	—	—	—
P. sarpedon v. milon	P. sarpedon anthedon	P.v.choredon	P.s.choredon	P. sarpedon	P. v. semi-fasciatus	P. sarpedon impar
P.agamemn. v. celebensis	P.agamemn. plisthenes	P. agamem. ligatus R.	P. agamem. ligatus R.	P. aga-memnon L.	P. aga-memnon L.	P. ag. v. neopomme-ranus v.salomonis.



zirung nach einer bestimmten Richtung hin, wie dies Wallace für die Papilioniden von Celebes dargestellt hat, lässt sich für die Sumba und Sambawa bewohnenden Arten nicht angeben. Beide Inseln scheinen in der Fauna unter sich indess verschiedener zu sein, als von den benachbarten kleinen Sunda-Inseln.

## Pieridae.

### Genus *Pontia* Fabricius.

16. *P. xiphia* Fabr. Spec. Ins. III, p. 43, n. 160 (1781); Snellen, Midd. Sumatra Lep. p. 22.

*P. nina* Fabr. Ent. Syst. III, 1, p. 194, n. 604 (1793); Moore, Cat. Lep. E. I. C. Mus. I, p. 69.

*L. chlorographa* Hübner Zutr. Exot. Schm. pag. 47, 48 (1828).

*Nychitonia xiphia* Fabr., Doherty, Journal As. Soc. Bengal 1891, p. 186: Sumba, Sambawa.

Pagenstecher, Nass. Jahrbch. f. Naturk. 1894, p. 56: Sumba.

Snellen, T. v. E. Bd. 33, p. 278 (1890) Tanah Djampea.

— T. v. E. Bd. 34, p. 244 (Flores).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 283 (Flores, Bonerate, Wetter, Kisser, Timor, Timorlaut).

*Leptosia xiphia* Fabr.; de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 486 n. 520. Distant, Rhop. Mal. p. 288, pl. 26 Fig. 8.

Doherty führt diese Art von Sumba und Sambawa auf und sagt, dass die Exemplare in Grösse und Färbung sehr differiren.

Von Sambawa liegen mir mehrere Stücke vor, ebenso von Sumba (2. XI. 94 und 15. XII. 95 Patadala), welche wenig von einander verschieden sind, aber grösser und schärfer gezeichnet als javanische. Ein ungemein kleines Exemplar stammt von Sumba, Patadala 17. XI. 95.

### Genus *Eurema* Hübner.

(*Terias* Swainson.)

17. *Eurema hecabe* Linué, Mus. Ulr. p. 249 (1764); Cramer, P. E. T. 124 B, C. (1779).

Doherty, l. c. p. 186; Sumba, Sambawa.

Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894 p. 56, Sumba.

Snellen, T. v. E. Bd. 33, p. 303 (Biliton); T. v. E. Bd. 34, p. 250 (Flores); Notes Leyd. Mus. XVI, 122 (Natuna).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 284 (Flores, Alor, Kisser, Wetter, Bonerate, Key, Goram, Lëtti, Timorlaut, Ceram.

*Terias hecabe* L., de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 487 n. 43; Snellen, Midd. Sumatra Lep. p. 23, T. 1, Fig. 6—11; Moore Cat. I, p. 63; Distant, Rhop. Mal. p. 304, T. 26, Fig. 19.

Die überaus weit über den malayischen Archipel verbreitete und veränderliche Art liegt von beiden Inseln vor, von Sumba, Waingapu 11. XI. 95.

18. **E. harina** Horsfield, Cat. Lepid. East Ind. Comp. Mus. p. 137 (1829) Java, India.

Doherty, l. c. p. 186: Sumba, Sambawa.

*Terias harina* Horsf., de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 494 n. 537. Moore Cat. Lep. E. I. C. Mus. I, pag. 64; Distant, Rhop. Mal. p. 307, T. 25, Fig. 13.

Von Sumba erhalten (5. XI. 95, Patadala).

19. **E. blanda** Bosid. Spec. Gen. I, p. 672, n. 32 (1836) Regio Indica. Von Sambawa.

### Genus **Pieris** Schrank.

20. **P. julia** Doherty. (S. die Abbildung auf T. I, II, Fig. 2 ♂). ♂♀ *Huphina julia* Doh., l. c. p. 187 T. 2, Fig. 12 (Sumba).

Doherty beschreibt ♂ und ♀ dieser interessanten und wie er sagt, schönsten der östlichen Pieriden nach Exemplaren von Sumba, die er neben *P. laeta* von Timor stellt. Es liegen mir 2 Männchen und 1 Weibchen von Sambawa vor; das eine Männchen erreicht nur die Grösse von *laeta*, ein Pärchen ist ansehnlich grösser. Die Beschreibung Doherty's ist recht gut. *P. laeta* ist sehr ähnlich und unterscheidet sich hauptsächlich durch den dunklen schwärzlichen Grund der Unterseite der Vorderflügel und den gelblichen, nicht röthlichen Grund der Hinterflügel.

3. **E. sari** Horsf. Cat. p. 136 (1829) Java, Borneo.

Doherty l. c. p. 186: Sumba, Sambawa

Moore, Cat. I, p. 64. Distant, Rhop. Mal. p. 315, T. 23, Fig. 3.

4. **E. drona** Horsfield, Cat. p. 137, Taf. 1, Fig. 13 (1829) Java, India.

Doherty, l. c. p. 186: Sambawa.

Moore, Cat. I, p. 65.

21. **P. temena** Hewitson, Exot. Butt. II. Pier. T. 3, Fig. 19.  
Wallace, Trans. Ent. Soc. Lond. Soc 3, IV, p. 336 ♀.  
Doherty, l. c. p. 187 (Sambawa).  
Röber T. v. E. Bd. 34, p. 276. Flores.  
Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 245 (Flores) (hält *P. tamar*  
= varietas von temena).  
  
Ich erhielt 2 ♂♂ (20. XI. und 27. XI. 96 Waingapu) und 1 ♀  
von Sumba (Patadala 16. XI. 95) dieser nicht minder schönen Art.  
Die Färbung der Unterseite ist bei diesem Exemplare hellcitrongelb,  
nicht rothgelb, wie bei Hewitson's und bei Snellen's Exemplaren  
von Flores. Es ist also wohl eine Lokalvarietät vorhanden.
22. **P. java** Sparrmann, Ammoen. Acad. VII, p. 504 (1767); Linné,  
Syst. Nat. III App. p. 225 (1765).  
*P. coronea* Cramer, P. E. I, T. 68, B, C. (1779); IV, Fig. 361 G, H  
(1782).  
*Belenois j.* Sparrm. (*coronea* Cr.), Doherty, l. c. p. 189, 1891  
(Sambawa). Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894,  
p. 56 (Sumba).  
*P. java* Sp. Röber, Tijd. voor Ent. Bd. 34, p. 279 (Flores, Kisser,  
Timor).  
  
Doherty hatte diese weit verbreitete Art (nach Kirby auf Java,  
Celebes, Bali, Lombok, Flores, Solor, Timor) auf Sumba nicht gefunden,  
Ich erhielt sie von beiden Inseln in variirenden Stücken je nach der  
mehr gelben oder weissen Färbung der Randflecke auf der Unterseite  
der Hinterflügel. Auch Röber (l. c.) macht auf diese Variabilität  
aufmerksam. Die Sumba-Exemplare (12. XII. 96 Waingapu) zeigen  
durchgängig eine grössere Ausbreitung des schwarzen Aussenrandes gegen-  
über denen von Sambawa.
23. **P. pitys** Godart, Enc. méth. IX, p. 134, n. 38 (1829).  
Lucas, Lep. Exot. T. 29, Fig. 1 (1833); Kirby. Cat. p. 460  
(Timor); Snellen, Tijd. voor Ent. Bd. 34, p. 244 (Flores);  
Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 279 (Key, Wetter, Letti, Kisser).  
Zwei männliche Stücke von Sambawa sind etwas grösser und auf  
der Unterseite schwärzer, als javanische.
24. **P. amalia** Vollenhoven, Mon. Piér. p. 23, n. 25, T. 3, Fig. 1  
(1865); Appias am. Distant, Rhop. Mal. pl. 33, Fig. 1.  
*P. naomi* Wall., Doherty, l. c. p. 188 (1891) Sambawa.

*P. clemathe* Doubl. Ann. Nat. Hist XVII, p. 23 (1846).

*P. aspasia* Stoll, Röber, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 278 (Ceram).

*P. lea* Doubl. Ann. Nat. Hist. XVII, p. 23 (1846). Snellen, Not. Leyd. Mus. XVI, p. 122 (Natuna Islands). Snellen, Midd. Sumatra Lep. p. 22. Snellen, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 245 (Flores). Moore, Cat. I, p. 77 (Borneo).

*Huphina lea* Doubl., de Nicéville und Martin, Butterfl. of Sumatra (Journal As. Soc. Bengal 1895) p. 506, n. 565.

Es liegt mir ein Exemplar (♂) dieser Art von Sambawa und ein weiteres (♂) von Sumba (14. XI. 95 Patadala) vor.

Ich glaube, dass auch *Huphina eirene* Doherty, l. c. p. 188 aus dem Innern von Sumba hierher gehört, ebenso wie *P. oberthuri* Röber, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 277 von Flores nur eine Lokalvarietät von *P. aspasia* = *clemathe* Doubl. = *amalia* Voll. ist.

25. *P. nerissa* Fabr. Syst. Ent. p. 471, n. 123 (1775) var. *corva* Wallace, Tr. Ent. Soc. ser. III, vol. IV, p. 339 n. 32 (1867) Java, Bali.

*Huph. nerissa* Fabr., de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 506, n. 564 (1895).

*Huphina vaso* Doherty, l. c. p. 188 1891 (Sambawa).

Doherty erwähnt diese Art bereits als Lokalform der javanischen *corva*. Mir liegt ein Exemplar von Sambawa vor, bei welchem ich keine wesentliche Unterschiede erkennen kann.

### Genus **Tachyris** Walk.

26. *T. lyncida* Cramer, P. E. II, T. 181, Fig. B (1779) ♀ *hippo* Cramer T. 195, Fig. B, C. (1782).

Snellen, Midden Sumatra Lep. p. 22.

— T. v. E. Bd. 34, p. 247 (Flores).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 281 (Flores, Key).

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, Journal As. Soc. Bengal 1895, p. 501 n. 554.

*Piérís hippo* Cr., Moore I, p. 71.

Doherty (l. c. p. 190) erwähnt diesen weit verbreiteten Schmetterling bei *Appias paulina* Cr. als von ihm fraglich auf Sambawa gesehen, ebenso wie *A. (Saletura) nathalia* auf Sumba.

Mir liegen von Sambawa ein ♂ und 2 kleinere dunkelgefärbte Weibchen vor. Der Mann ist auf der Unterseite der Hinterflügel

weisslich, wie dies Snellen von Exemplaren von Flores anführt; die Weibchen sind bräunlich mit helleren Strahlen.

27. **P. paulina** Cramer, P. E. II, T. 110, Fig. E, F. (1778).

Wallace, Trans. Ent. Soc. Lond. Ser. 3, IV, p. 369.

Doherty, l. c. p. 190: Sumba, Sambawa.

*P. paulina*, Moore, Cat. I, p. 73.

*T. albina* Boisduval, Röber, Tijd. voor Ent. Bd. 34, p. 282: Flores, Kisser, Wetter, Letti.

*P. albina* Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 246 (Flores); Vollenhoven, Mon. Piérid, p. 44; Forbes, Mal. Arch. II, p. 88 (Timorlaut).

*C. leis* Hübner Zutr. Fig. 771, 772 (1827); Distant, Rhop. Mal. T. XXV, Fig. 6, 10. (Appias l.)

*Catophaga paulina* Cramer, de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 502, n. 556 (von *leis* getrennt aufgeführt).

Es liegen mir von Sambawa ein weisses Exemplar vor, welches der Abbildung Distant's entspricht und zwei gelbgefärbte, von denen das eine in der Zeichnung dem weissen gleicht; das andere ist ohne Apicalflecke der Vorderflügel.

Von Sumba liegen einige weisse Exemplare vor, theils mit breiterem, theils mit schmalerem schwarzen Aussenrande.

28. **T. zoë** Vollenhoven, Mon. Piér. p. 37, n. 48, T. 4, Fig. 5, (1865).

*T. agave* Felder, Wien. Ent. Mont. VI, p. 286, n. 44 (1842).

Röber, Tijd. voor Entom. Bd. 34, p. 281: Ceram.

Es ist ein Stück von Sumba (Patadala 16. XI. 95) vorhanden, das ich hierher ziehe.

### Genus **Delias** Hübner.

29. **D. periboea** Godart, Enc. Méth. IX, p. 154, n. 124 (1829),

Boisduval, Spec. Gen. I, p. 449, n. 16 (1836) Java.

v. Mitis, Iris 1893, p. 108, n. 39: Java.

Mir liegen von dieser Art 2 ♂♂ und 1 ♀ von Sambawa vor, welche von javanischen Stücken nicht wesentlich verschieden sind. Gegenüber der Abbildung, welche v. Rothschild (Iris V, p. 441,

---

5. **Delias pasithoë** L. var, Doherty, l. c. p. 189: Sambawa.

Moore, Cat. I, p. 79.



T. V, Fig. 2) von dem ♀ der var. Wallacei gibt, erscheint das Gelb der Unterseite der Hinterflügel mehr orangefarben, die mittleren röthlichen Randflecke sind verwaschener. Die Sambawa-Exemplare sind grösser als die javanischen und wie das von Rothschild abgebildete ♀ von Celebes. S. Taf. I, II, p. 4 (♀).

30. **D. descombesi** Boisd. Spec. Gen. I, p. 465, n. 38 (1836); Distant Rhop. Mal. p. 466, T. XLII, Fig. 16 (♂); Moore, Cat. Lep. E. I. C. M. I, p. 81: N.-India.

var. *oraia* Doherty, Journ. As. Soc. Beng. p. II, p. 189 (1891) (Sambawa). Grose Smith and Kirby, Rhop. Exot. Delias IV, Fig. 5, 6 ♂, Fig. 7 ♀, (1893).

Siehe die Abbildung Taf. I, II, Fig. 8 (♀).

Es liegt ein Pärchen dieser schönen Pieride von Sambawa vor.

Das Männchen ist weniger stark schwarz, mehr grau bestäubt am Apex und Aussenrande des Vorderflügels, ebenso ist der Aussenrand des Hinterflügels kaum dunkler gerandet, als bei *descombesi*. Die Unterseite der Vorderflügel ist heller, die Hinterflügel haben eine mehr orange, als gelbe Grundfärbung, mit carminrothem Längsfleck des Vorderrandes. Am Grunde findet sich bei dem Sambawa-Exemplar etwas schwarze Bestäubung, was bei Distant's Abbildung nicht ersichtlich ist.

Beim Weibchen sind die Vorderflügel schwarz mit grauweisser Bestäubung der Adern, vorzüglich der Mediana und Submediana, weisslichem, keulenförmigem, querliegendem Fleck am Zellende und sieben weissgrauen submarginalen Flecken, von denen der vor dem Hinterflügel stehende der grösste ist. Die Hinterflügel sind in der Aussenparthie schwarz, die Adern graugelblich bestäubt, mit sechs submarginalen graugelblichen Flecken. Der Hinterrand ist weisslichgrau mit gelblichem Schimmer.

Die Unterseite der Vorderflügel ist schwarz, die Adern grauweiss mit schwachem, gelblichem Schimmer; die der Hinterflügel ist ebenfalls schwarz mit theils graugelblicher, theils orangegelber Bestäubung der Adern, der Hinterränder und der submarginalen Flecken. Längs des Vorderrandes ein schmaler, intensiv carminrother Fleck. Antennen schwarz; Palpen grau; Brust schwärzlich, ebenso der Hinterleib, unten gelblich bestäubt. Beine weissgrau.

---

6. *Delias sambawana* Rothschild, Nov. Zool. I, p. 662 ♂ (1894), II, T. VIII, Fig. 5, (1895): Sambawa.

Nahe verwandt und wohl und Lokalvarietät ist *D. diaphana* Semper Philipp. Tagf. T. 34, Fig. 3—5 (1890).

31. ***Delias fasciata*** Rothschild, Nov. Zool. I, p. 662 (♀) (Sumba) 1894.

*Delias hyparete* var. *sumbana* Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturkunde 1894, p. 56 ♂.

Diese, am angegebenen Orte von mir näher beschriebene, nur in einem einzigen männlichen Exemplare von Sumba vorhandene *Delias*art glaube ich nunmehr mit der, mit *Del. sacha* (Grose Smith und Kirby, Rhop. Exot. p. 36, *Delias* Fig. 4, 6 und Grose Smith in Rothschild Nov. Zool. II, p. 75 ♂ (1895) (Obi) und *Del. poecilea* nahe verwandten *fasciata* vereinigen zu müssen. Wahrscheinlich stellt sie den ♂ zu dem bei Grose Smith und Kirby (Rhop. Exot. pars 33 *Del. IV*, Fig. 1, Sumba ♀ (1895) abgebildeten ♀ von *Del. fasciata* von Sumba dar. Siehe Taf. III, Fig. 3.

### Genus ***Eronia*** Hübner.

(*Nepheronia* Butler).

32. ***E. valeria*** Cramer, P. E. I, T. 85. Fig. A (1779). Java.

Moore, Cat. Lep. E. I. C. Mus. I, p. 61: Borno, N. India.

Doherty, l. c. p. 190: Sumba, Sambawa.

Snellen, Tijd. v. Ent. Bd. 33, p. 274 (Tanah Djampea).

— — — Bd. 34, p. 250: Flores.

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 289: Flores.

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 505, n. 62.

*Neph. lutescens* Butler, Distant, Rhop. Mal. T. 26, Fig. 14.

Von Sambawa liegen zahlreiche Männchen und einige Weibchen vor, ohne wesentliche Besonderheiten, allenfalls dass die von Röber für seine Flores-Stücke angezeigte breit schwarz gesäumte Subcostale und obere Radiale des Hinterflügels ebenfalls vorhanden sind. Die Weibchen sind weisslich gefärbt. Von Sumba liegen einige den ♂♂ von Sambawa gleiche Männchen vor.

### Genus ***Catopsilia*** Hübner.

33. ***C. chryseis*** Dury, Ill. Exot. Ent. I, T. 12, Fig. 3, 4.

Distant, Rhop. Mal. p. 300, pl. 35, Fig. 1, 2.

*C. pyranthe* Linni (*evangelina* Butler), Doherty l. c. p. 191 (Sambawa): Snellen, T. v. E. Bd. 33, p. 304: Biliton; de Nicéville

und Martin, Butt. Sumatra p. 492, n. 534 (1895); Snellen, Midden Sumatra Lep. p. 23; Moore Cat. I, p. 56.

*C. philippina* Cr. v. *gnoma* Butler, Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 285 (Flores).

Moore, Cat. I, p. 56.

Von Sambawa liegt ein, der Distant'schen Abbildung entsprechendes Exemplare vor, indess ohne schwarzen Flügelmittelpunkt (der Vorderflügel).

34. **C. crocale** Cramer, P. E. I, T. 35, Fig. C, D. (1779); *alconeone* Cr., II, T. 148, Fig. E. (1779).

Doherty, l. c. p. 191 (Sumba, Sambawa).

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 249 (Flores) (*Callidryas pomona* Fabr.)

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 286 (Key, Luang, Wetter, Flores, Alor, Kisser).

De Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 490, n. 533.

Moore, Cat. Lep. E. I. C. M. I, p. 56.

Liegt von Sambawa und Sumba vor.

Die von Doherty, l. c. p. 191 aufgeführte *C. catilla* Cr. von Sumba und Sambawa wird von Snellen, l. c. p. 249 als identisch mit *Cat. pomona* Fabr. = *crocale* Cr. aufgeführt.

35. **C. scylla** Linné Mus. Lud. Ulr. III, p. 242, n. 61.

Cramer, P. E. I, p. 17, pl. 12, Fig. C, D.; Moore, Cat. Lep.

E. J. C. Mus. II, p. 58 (Java); Doherty, l. c. p. 191 (Sumba,

Sambawa); Röber, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 286. (Timor,

Luang, Letti); Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 249 (Flores).

Snellen, Midden Sumatra Lep. p. 23.

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 493, n. 535: Moore, Cat. I, p. 58.

Von Sumba in mehreren männlichen Exemplaren vorliegend.

### Genus **Hebomoia** Hübner.

36. **H. glaucippe** Linné, Syst. Nat. I, Ed. XII, p. 762; Cramer, P. E. II, p. 104, pl. 164 ABC.

Doherty, l. c. p. 191 (Sumba, Sambawa.)

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 248 (Timorlaut) (v. *timorensis*).

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 248 (Flores).

— Midden Sumatra Lep. p. 23.

Moore, Cat. I, p. 68 (Java, Borneo, N.-India).

Es liegen einige Männchen von Sumba vor (14. II. 95 Patadala und 15. XI. 95). Bei denselben ist in ähnlicher Weise, wie dies Snellen von Stücken von Flores beschreibt, der Innenrand des rothen, mit schwächeren schwarzen Fleckchen gezierten Apikalflecks weniger stark schwarz eingefasst und von citrongelber Randfärbung begleitet. Diese Varietät dürfte als *flavomarginata* bezeichnet werden können.

### Genus *Ixias* Hübner.

(*Thestias* Boisduval).

37. **I. reinwardti**, Vollenhoven, T. v. E. Bd. III, p. 125 (1860),  
Monogr. *Pierides* p. 50, n. 2, T. 6, Fig. 1 (1865). Wallace,  
Trans. Ent. Soc. 1867 p. 390 (Bali, Lombok, Flores).

Doherty, l. c. p. 191 (Sambawa).

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 249, T. 5, Fig. 2 (Bali, Lombok, Flores).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 286 (Flores).

Es liegen sowohl von Sumba (Waingapu 16. XII. 95) als von Sambawa Exemplare vor, welche in sich etwas verschieden sind. Namentlich ist aber die Zeichnung der ♀♀ viel schärfer ausgeprägt und nicht so verwaschen, wie in Snellen's Abbildung.

Die männlichen Sambawa-Exemplare sind grösser als die Männchen von Sumba und zeigen das Schwarz auf den Vorderflügeln, sowie auf den Hinterflügeln auf der Oberseite viel stärker entwickelt. Auch auf der Unterseite tritt dies hervor.

Die beiden mir von Sambawa vorliegenden ♀♀ sind ebenfalls von dem von Sumba vorhandenen Weibchen verschieden. Bei den Sambawa-Stücken ist das Schwarz der Vorder- und Hinterflügel auf der Oberseite gleichfalls viel stärker entwickelt, fast um das Doppelte. Ausserdem zeigt die weisse Grundfärbung bei den Sambawa-Exemplaren eine gelbliche Beimischung. Auch auf der Unterseite ist die schwärzliche Färbung der Sambawastücke ausgesprochener. Auch sind die Weibchen von Sambawa grösser.

38. **J. venilia** Godt., Enc. Math. IX, p. 121, n. 7 (1829); Lucas, Lep. Exot. T. 36, Fig. 1 (1835); Kirby, Cat. p. 457 (Java, Timor).

Moore, Cat. I, p. 67.

Von Sumba in mehreren männlichen und weiblichen Exemplaren eingeliefert.



Die nachstehende Uebersicht über die Verbreitung der auf Sumba (17) und Sambawa (22) vorkommenden Pieriden ergibt wiederum das Vorwiegen der zur indomalayischen Region gehörigen Falter. Ihre Verbreitung, die auf den übrigen Sundainseln eine ansehnliche ist, nimmt je weiter wir nach dem Osten kommen, um so mehr ab.

Während die Pieris- und Deliasarten eine beschränkere Verbreitung zeigen, sind die Eurema- und Catopsilia-Arten fast über die ganze vorliegende Region verbreitet. Beschränkte Verbreitung haben auch die zu Ixias gehörigen. Während *P. julia* auf Sumba und Sambawa und als *laete* auf Timor vorzukommen scheint, *temena* auf den beiden genannten Inseln und die benachbarten kleinen beschränkt ist, finden sich einige andere, wie *java* und *corva* auch auf Java, ebenso wie *periboea*, die auch auf Celebes vorkommt. *Delias oraia* von Sambawa erscheint als Varietät von der indischen *descombesi*. Die Molukken und Philippinen zeigen eine nähere Verwandtschaft, als Neu-Guinea und Australien.

## Danaidae.

### Genus *Danaüs* Latr.

39. *D. melissa* Cramer P. E. IV, p. 172, pl. 377 C. D.

*D.* (Tirumala) *melissa* Cramer, Doherty, l. c. p. 166: Sumba, Sambawa. Snellen, T. v. E. Bd. 33, p. 268 (Tanah Djampea). Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 233 (Flores) = *Limniace*?

*D. hamata* Mac Leay, Semper, Beitrag zur Rhopaloceren-Fauna von Australien, p. 3, T. 8, Fig. 1, 2 (1878).

Pagenstecher, Nass. Jahrb. f. Naturk. 1894, p. 12: Sumba.

*D. limniace* Cramer, Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 290 (Bonerate, Flores, Kisser, Timor).

*D. septentrionis* Butler, Distant, Rhop. Mal. p. 17, T. 1, Fig. 9. Doherty, l. c. p. 166: Sumba, Sambawa.

Semper versucht (l. c.) die verschiedenen sich so ähnlichen Danaisformen zu trennen. *Limniace*, welche er auf der indomalayischen Region beschränkt hält, glaubt er nicht als Lokalform von *hamata* ansehen zu dürfen, obgleich die Unterschiede nur sehr kleine seien.

---

7. *Ixias* near *pirene* Linn. (*pyrene*) wird von Doherty, l. c. p. 191 von Sumba als gesehen, aber nicht gefangen aufgeführt. Vielleicht handelt es sich um *I. venilia*.



## Uebersicht der auf Sambawa

India, Ceylon	Sumatra	Borneo	Java	Sambawa	Sumba	Kleine Sunda-Inseln Flores, Timor u. s. w.
P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia
E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe
—	—	—	E. blanda	E. blanda	—	—
E. harina	E. harina	E. harina	E. harina	E. harina	E. harina	—
E. sari	E. sari	E. sari	E. sari	E. sari	E. sari	E. sari
E. drona	—	—	E. drona	E. drona	—	—
—	—	—	—	P. julia	P. julia	P. laeta
—	—	—	—	P. temena	P. temena	P. temena
—	—	—	P. java	P. java	P. java	P. java
—	—	—	—	P. pitys	—	P. pitys
P. amalia	P. lea	P. lea	—	P. amalia	P. amalia (elrene)	P. lea
—	—	—	P. nerissa (P. corva)	P. corva (P. vaso)	—	P. corva
T. hippo	T. hippo	T. hippo	T. lyncida	T. lyncida	—	T. lyncida
T. paulina	T. paulina	T. paulina	—	T. paulina	T. paulina	T. albina
—	—	—	—	—	T. zoe (agave)	—
D. pasithe	—	D. pandemia	D. egalea	D. pasithe	—	—
—	—	—	D. periboea	D. periboea	—	—
D. descom- besi	—	—	—	D. oraia	—	—
—	—	—	—	D. sambawana	—	—
—	—	—	—	—	D. fasciata (sumbana)	—
E. hippia	E. valeria	E. lutescens	E. valeria	E. valeria	E. valeria	E. valeria
C. chryseis	C. chryseis	—	C. pyranthe	C. chryseis	—	C. chryseis
C. crocale	C. crocale	C. crocale	C. rocale	C. crocale (catilla)	C. crocale (catilla)	C. crocale
—	C. scylla	—	C. scylla	—	C. scylla	—
H. glaucippe	H. glaucippe	H. glaucippe	H. glaucippe	—	H. glaucippe	H. glaucippe
—	—	—	—	I. reinwardti	I. reinwardti	I. reinwardti
—	—	—	J. venilia	—	J. venilia	J. venilia
14	12	11	17	22	17	16

und Sumba vorkommenden Pieriden.

Celebes	Molukken	Neu- Guinea	Australien	Philippinen	China, Japan	Bismarck- Archipel, Salomons- inseln
—	—	—	—	P. xiphia	—	—
E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe
—	—	—	—	—	—	—
E. harina	E. harina	—	—	E. harina	—	—
E. sari	—	—	E. sari	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
P. emma	P. aspasia	P. hester	—	P. olga	—	—
—	—	—	—	—	—	—
T. lyncida	T. lyncida	—	—	T. lyncida	—	—
T. paulina	T. albina	—	—	—	—	—
—	T. agave	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
v. Wallacei	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	D. diaphana	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	E. boebera	—	—
—	—	—	C. chryseis	C. chryseis	—	—
C. crocale	C. crocale	C. crocale	C. crocale	C. crocale	C. crocale	—
C. scylla	C. scylla	—	—	C. scylla	—	—
H. glaucippe	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
9	8	3	3	8	2	—



## Uebersicht der auf Sambawa

India, Ceylon	Sumatra	Borneo	Java	Sambawa	Sumba	Kleine Sunda-Inseln Flores, Timor u. s. w.
P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia	P. xiphia
E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe
—	—	—	E. blanda	E. blanda	—	—
E. harina	E. harina	E. harina	E. harina	E. harina	E. harina	—
E. sari	E. sari	E. sari	E. sari	E. sari	E. sari	E. sari
E. drona	—	—	E. drona	E. drona	—	—
—	—	—	—	P. julia	P. julia	P. laeta
—	—	—	—	P. temena	P. temena	P. temena
—	—	—	P. java	P. java	P. java	P. java
—	—	—	—	P. pitys	—	P. pitys
P. amalia	P. lea	P. lea	—	P. amalia	P. amalia (eirene)	P. lea
—	—	—	P. nerissa (P. corva)	P. corva (P. vaso)	—	P. corva
T. hippo	T. hippo	T. hippo	T. lyncida	T. lyncida	—	T. lyncida
T. paulina	T. paulina	T. paulina	—	T. paulina	T. paulina	T. albina
—	—	—	—	—	T. zoe (agave)	—
D. pasithe	—	D. pandemia	D. egalea	D. pasithe	—	—
—	—	—	D. periboea	D. periboea	—	—
D. descom- besi	—	—	—	D. oraia	—	—
—	—	—	—	D. sambawana	—	—
—	—	—	—	—	D. fasciata (sumbana)	—
E. hippia	E. valeria	E. lutescens	E. valeria	E. valeria	E. valeria	E. valeria
C. chryseis	C. chryseis	—	C. pyranthe	C. chryseis	—	C. chryseis
C. crocale	C. crocale	C. crocale	C. rocale	C. crocale (catilla)	C. crocale (catilla)	C. crocale
—	C. scylla	—	C. scylla	—	C. scylla	—
H. glaucippe	H. glaucippe	H. glaucippe	H. glaucippe	—	H. glaucippe	H. glaucippe
—	—	—	—	I. reinwardti	I. reinwardti	I. reinwardti
—	—	—	J. venilia	—	J. venilia	J. venilia
14	12	11	17	22	17	16

## und Sumba vorkommenden Pieriden.

Celebes	Molukken	Neu- Guinea	Australien	Philippinen	China, Japan	Bismarck- Archipel, Salomons- inseln
—	—	—	—	P. xiphia	—	—
E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe	E. hecabe
—	—	—	—	—	—	—
E. harina	E. harina	—	—	E. harina	—	—
E. sari	—	—	E. sari	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
P. emma	P. aspasia	P. hester	—	P. olga	—	—
—	—	—	—	—	—	—
T. lyncida	T. lyncida	—	—	T. lyncida	—	—
T. paulina	T. albina	—	—	—	—	—
—	T. agave	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
v. Wallacei	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	D. diaphana	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
C. crocale	C. crocale	C. crocale	C. chryseis	E. boebera	—	—
C. scylla	C. scylla	—	C. crocale	C. chryseis	—	—
H. glaucippe	—	—	—	C. crocale	C. crocale	—
—	—	—	—	C. scylla	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
9	8	3	3	8	2	—

*D. melissa* von Java stünde der *D. hamata* sehr nahe; er hält sie für Lokalform derselben, ebenso wie *orientalis* Semper (l. c. T. 8, Fig. 5) von den Philippinen und *hamata* Mac Leay (Australien) Lokalformen darstellten. Doherty l. c. glaubt nach Semper die beiden Formen *limniace* und *melissa* leicht trennen zu können, welche beide auf beiden Inseln gemein seien. Snellen hält *melissa* = *limniace* und Röber betont die Nichtstichhaltigkeit der Charactere. Es liegen mir Formen von beiden Inseln (von Sumba namentlich) vor, welche *melissa* Cr. sowohl, als *orientalis* Semper und *limniace* Cr. entsprechen und ziehe ich es daher vor alle diese Formen unter *melissa* zu vereinen, der vielfachen Uebergänge wegen.

40. **D. chrysippus** Linné, Syst. Nat. X, n. 81. Cramer P. E. T. 188, B. C.; Doherty l. c. p. 163 (Sumba, Sambawa); Distant Rhop. Mal. p. 20, T. 1, Fig. 10, Snellen, Tijd. voor Ent. Bd. 34, p. 235 (Flores); Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 291 (Flores, Bonerate, Kisser, Ceram, Letti, Key); de Nicéville u. Martin, Butt. Sumatra p. 367, n. 9.

Die Stücke von Sambawa sind etwas grösser, als javanische, sonst aber gleich. Von Sumba (Waingapu 2. XI. 95 und 11. XI. 95) liegen auch Exemplare vor.

41. **D. plexippus** Linné, Mus. Ulr. p. 262.

Röber, Tijd. voor Ent. Bd. 34. p. 291. (Kisser, Wetter, Timorlaut, Flores, Letti, Key.)

*D. genutia*, Cramer III, p. 20, pl. 206 C, D.; Doherty, l. c. p. 144: Sumba, Sainbawa. Distant Rhop. Mal. p. 18, T. 2, Fig. 2, 3.

Snellen, T. v. E. Bd. 34, Fig. 234 (Flores).

Doherty sagt, dass seine Sumba-Exemplare etwas in der Mitte stünden, zwischen *D. genutia* und der javanesischen *D. intensa* (Moore, Pr. Zool. Soc. 1883 p. 260); Snellen zieht die Flores-Exemplare zu *intensa*. Ein mir von Sumba vorliegendes Exemplar (10. II. 95 Patala) entspricht bis auf den ihm fehlenden weissen Fleck der Mittelzelle der Hinterflügel der *D. conspicua* Butler (leucoglene Felder) von Celebes. Es ist nicht verschieden von zwei mir von Timorlaut vorliegenden Stücken (= *laratensis* Butler Proc. Zool. Soc. Lond. 1883, p. 367, pl. 38, Fig. 5), nur dass diese die 5 zusammenhängenden weissen Apicalflecke etwas grösser erscheinen lassen.



42. **D. litoralis** Doherty, l. c. p. 164, T. II, Fig. 6, Unterscite, (Sumba).

Doherty stellt diese von ihm als nov. spec. aufgeführte Form als nahe verwandt zu abigar Eschscholtz [in Kotzebue Reise III, p. 209 T. I, Fig. 12 (1821) (Philippinen) und Distant, Rhop. Mal. T. 42, Fig. 11, (Malay Peninsula)].

Mir liegen Exemplare sowohl von Sumba (29. XI. 95 Waingapu), als von Sambawa vor. Ich kann in denselben nur Varietäten der vorigen Art sehen.

43. **D. orientis** Doherty, l. c. p. 166, T. 2, Fig. 5.

Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894, p. 53. Sumba.

Doherty führt diese Art von Pada Dalung, Central-Sumba auf.

Ich erhielt sie gleichfalls von Sumba.

44. **D. (Radena) oberthüri** Doherty, l. c. p. 167, pl. II, Fig. 6 (Sumba); Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894, p. 53. Sumba.

Diese der purpurata Butler von Neu-Guinea nahestehende Form ist sowohl von Sumba (Patadala 10. XI. 95 und Waingapu 3. XII, 95), als von Sambawa vertreten.

### Genus **Euploea**, Fabr.

45. **E. meizon** Doherty, l. c. p. 189 (Sumba, Sambawa. (Salpinx.)

Von dieser indess wohl nur eine Lokalform von *E. leucostictos* von Java (eunice Godart) darstellenden stattlichen *Euploea* sind mehrere Exemplare von Sambawa und eins von Sumba vorhanden ohne wesentliche Verschiedenheiten.

*Eupl. leucostictos* Guérin, Martin und de Nicéville, Butt. Sumatra p. 375.

8. **D. (Nasuma) haruhassa** Doherty, l. c. p. 165 (Sambawa, 1000—2500') soll der *D. ismare* nahe stehen.

9. **D. (Nasuma) taimanu** Doherty, l. c. p. 165 ♀, Sumba. Wurde nur in einem (♀) Exemplar 1000' hoch gefunden.

10. **D. (Radena) kambara** Doherty l. c. p. 167, T. 2, Fig. 7 (Sumba). Soll der *D. juvena* von Java nahe stehen, nicht gemein. Auf Sambawa sollen zwei Formen von Radena vorkommen, eine der javanischen *D. juvena* nahe stehend, vom höher gelegenen Gebiete.

11. **E. (Ravadeba) philo** Grose Smith in Rothschild, Nov. Zool. 1895, p. 77. C. (Sambawa).

46. **E. eleusina** Cramer P. III, T. 266, f. D. (1788) Java.

Salpinx (Selinda) eleusina, Doherty, l. c. p. 159 (Sambawa); de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 375, n. 37; Moore, Pr. Zool. Soc. 1883 p. 299, Java.

Diese von Doherty als auf Sambawa gemein bezeichnete Art empfing ich von dort in zwei Exemplaren.

47. **E. eucalle** Staudinger, Iris 1895 p. 373, T. VII, Fig. II (Sambawa).

Von dieser schönen und grossen Art liegt mir nur ein sehr wohl erhaltenes Exemplar von Sambawa vor, welches der Abbildung und Beschreibung Staudinger's entspricht.

48. **E. melelo** Doherty l. c. p. 160 (Sumba).

Pagenstecher, Nass. Jahrb. 1894, p. 52 (Sumba).

Von Sumba erhalten (Patadala 15. XI. 95).

49. **P. elwesii** Doherty l. c. p. 161, T. II, Fig. 1.

Doherty fand zwei ♀♀ in Central-Sumba. Ich erhielt ein der Abbildung entsprechendes ♂ von Sumba (Patadala 13. XI. 95).

50. **E. lewa** Doherty (Rusama) l. c. p. 162, T. 2, Fig. 2 (Sumba).

Von Sumba erhalten (Patadala 13. XI. 95) in mehrfachen Exemplaren.

51. **E. palmedo** Doherty l. c. n. 162 pl. 2, Fig. 3 (Sumba).

Ein Exemplar von Sumba erhalten.

52. **E. lacordairei** Moore (Stictoploea l.) Pr. Zool. Soc. 1883 p. 321, Java.)

Doherty l. c. p. 160 (Sumba).

Ein Exemplar von Sumbawa erhalten.

53. **Euploea** (Crastia) **atossa** nov. spec.

Von Sumbawa liegt ein ♂ einer bei Crastia camorta, Moore (Proc. Zool. Soc. 1883 p. 279, T. 31, Fig. 7 ♂ Nicobas Island) stehende Euploea vor, die vermuthlich neu sein dürfte.

70 mm. Flügelform wie bei camorta. Vorderflügel einfarbig schwarzbraun mit schmalem Sammtfleck. Hinterflügel etwas heller mit weiss-

- 
12. **E. sumbana** Doherty (Salpinx [Calliploea] s.) l. c. p. 459. Von der Küste und dem Innern von Sumba.

13. **E. sambawana** Doherty (Calliploea s.) l. c. p. 160 (Sambawa).

14. **E. dongo** Doherty (Tripsichrois d.) Doherty l. c. p. 160 (Sambawa).

15. **E. deheerti** Doherty l. c. p. 163 (Sambawa).

lichgelbem Vorderrand und gelblichem Filzfleck am Vorderrande. Am Aussenrande schimmern weissliche marginale und submarginale Flecke der Unterseite durch, Brust schwarzbraun mit weisslichen Punkten auf dem Halsstrange und der Unterseite. Hinterleib bläulichschwarz, unten heller, bläulichweiss, Antennen schwärzlich.

Unterseite der Vorderflügel heller schwarzbraun mit 2 kleinen weissblauen costalen Flecken in der Mitte der Costa und 3 discalen, von denen 2 kleinere rundliche weissblau, ein viereckiger unterer mehr weisslichgelb ist. Am Hinterwinkel ein weisslicher marginaler Fleck.

Hinterflügel schwärzlichbraun mit 7 kleinen marginalen rundlichen und 7 grössern submarginalen weisslichen, länglichen Flecken, sowie 3 kleinen weisslichen discalen. Fransen weisslich. —

Eine Uebersicht der auf Sumba und Sambawa vorkommenden Danaiden zeigt im Vergleich mit den im übrigen malayischen Archipel vorkommenden nächsten Verwandten und vicariirenden Vertretern der Arten neben einigen durch das ganze Gebiet vertretenen Species eine überwiegend grosse Zahl von solchen, welche bislang nur auf einer oder beiden Inseln gefunden worden sind. Beide Inseln erhalten hierdurch einen eigenthümlichen Lokalcharacter. Ueberhaupt erscheint das Genus *Euploea* eines derjenigen Geschlechter zu sein, welches in seinen auf ein beschränktes Areal hingewiesenen Vertretern den Lokalcharacter der Lepidopterenfauna mit bestimmen hilft.

## Satyridae.

### Genus *Melanitis*, Fabr.

54. *Mel. leda* Linné. Syst. Nat. I, 2, p. 270, n. 151 (1767).

Cramer, P. E. III, T. 196 C. D. (1700).

Doherty, l. c. p. 170: Sumba, Sambawa (1891).

Pagenstecher, l. c. p. 53 (1894). Sumba.

Distant, Rhop. Mal. p. 111, T. 4, Fig. 10.

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 235 (Flores).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 310 (Ceram, Flores, Wetter, Alons.

Cyllo leda, Snellen, Midden Sumatra Lep. p. 13.

16. *Lethe europa* Fabr. Syst. Ent. p. 500, n. 247 (1775).

Doherty, l. c. p. 168, Sumba, Sambawa.

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 385.

17. *Mel. constantia* Cramer, Doherty, l. c. p. 170 (Sumba, Sambawa).

Uebersicht der Danaiden

India, Ceylon	Sumatra	Borneo	Java	Sambawa	Sumba
<i>D. septentrionis</i>	—	—	<i>melissa</i>	<i>melissa</i>	<i>melissa</i>
<i>chrysippus</i>	<i>chrysippus</i>	<i>chrysippus</i>	<i>chrysippus</i>	<i>chrysippus</i>	<i>chrysippus</i>
<i>plexippus</i>	<i>plexippus</i>	<i>plexippus</i>	<i>plexippus</i>	<i>plexippus</i>	<i>plexippus</i>
<i>abigar</i>	—	—	—	—	<i>litoralis</i>
—	—	—	—	—	<i>orientis</i>
—	—	—	—	<i>oberthüri</i>	<i>oberthüri</i>
—	—	—	—	<i>harahassa</i>	—
—	—	—	—	—	<i>taimanu</i>
<i>juventa</i>	<i>juventa</i>	—	<i>juventa</i>	—	<i>kamera</i>
—	<i>leucostictos</i>	—	<i>leucostictos</i>	<i>meizon</i>	<i>meizon</i>
—	<i>eleusina</i>	—	<i>eleusina</i>	<i>eleusina</i>	—
—	—	—	—	<i>philo</i>	—
—	—	—	—	<i>eucalle</i>	—
—	—	—	—	—	<i>melelo</i>
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	<i>sumbana</i>
—	—	—	—	<i>sambawana</i>	—
—	—	—	<i>lacordairei</i>	<i>lacordairei</i>	<i>lacordairei</i>
—	—	—	—	<i>dongo</i>	—
—	—	—	—	<i>atossa</i>	—
—	—	—	—	—	<i>elwesii</i>
—	—	—	—	—	<i>lewa</i>
—	—	—	—	—	<i>palmedo</i>
—	—	—	—	<i>deheerti</i>	—
4	5	2	7	14	15

Von Sumba (28. XI. 95 Waingapu) vorliegend. Die Unterseite zeigt nur Spuren der Augen.

Genus *Mycalesis* Fabr.

55. *M. medus* Fabr.

Doherty, l. c. p. 168 (Sumba, Sambawa).

Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894, p. 83: Sumba.

18. *Myc. (Calysisma) perseus* Fabr.

Doherty, l. c. p. 168 (Sumba, Sambawa).





Genus **Ypthima** Hübner.

57. **Y. hübnerei** Kirby (philomela Hübner Zutr. Fig. 83, 84) (Java).  
*Y. florensis* Snellen Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 225, pl. 4, Fig. 3 a (Flores).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 311 (Flores); Distant, Rhop. Mal.  
p. 57, T. 9, Fig. 5.

Snellen, Midden Sumatra Lep. p. 34.

Ein Exemplar von Sumba, welches ich hierher ziehe, entspricht der Snellen'schen Abbildung von *florensis* (der diese Art auch als wahrscheinliche Varietät zu *hübnerei* ansieht). Neben dem grösseren Analauge steht noch ein ganz kleines zweites.

58. **Y. baldus** Fabr. Syst. Ent. App. p. 809.

Fabr., Ent. Syst. III, 1, p. 223.

Snellen, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 236, pl. 15, Fig. 1 ♀ (Flores).

Ein Exemplar von Sumba (Waingapu 25. XI. 95) entspricht der Snellen'schen Abbildung.

**Elymniadae.**

Genus **Elymnias** Hübner.

59. **E. undularis** Drury, Ill. Exot. Ent. II, T. 10, Fig. 48; Cramer,  
P. E. III, pl. 256 AB.

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 238 (Flores).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 311, (Flores).

Doherty, l. c. p. 170 (Sambawa).

Die mir von Sambawa vorliegenden Stücke sind etwas grösser, als die von Sumba und Java, sonst aber gleich denselben. Von Sumba liegen 2 ♂♂ (Waingapu 25. XI. 95 und 5. XII. 95) und 1 ♀ (Waingapu 31. XII. 95) vor, was die Angabe Doherty's, dass keine *Elymnias* von Sumba bekannt sei, rectificirt.

**Acraeidae.**

Genus **Acraea** Fabr.

60. **A. andromacha** Fabr. Syst. Ent. p. 466, n. 162 (1775) Australia;  
Snellen, Tijd. voor Ent. Bd. 34, p. 233, T. 14, Fig. 2 (Flores,  
Australía).

---

20. **Y. asterope** Klug, Doherty, l. c. p. 169 (Sumba).

21. **Y. leuce** Doherty l. c. p. 169 = localform of *philomela* (Sumba, Sambawa),  
fallen wohl mit den oben genannten Arten zusammen.

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 301 (Letti).

— Iris 1885 p. 22 (Kabia).

Es liegt ein Exemplar von Sumba vor, welches im Allgemeinen der Snellen'schen Abbildung entspricht; die Hinterflügel zeigen indess keine gelbliche, sondern eine mehr weissliche Färbung.

Das Vorkommen dieser östlichen Art ist bemerkenswerth.

## Nymphalidae.

### Genus *Cethosia* Fabr.

61. **C. penthesilea** Cramer, P. E. II, pl. 145 BC.

Doherty, l. c. p. 171 (Sumba, Sambawa).

Röber, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 302. (Kisser) (= *Cethosia cyane* Dr.).

Snellen, Midden Sumatra Lep. p. 17.

— Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 240 (Flores).

Es liegen mir ein Männchen von Sambawa und ein Pärchen von Sumba vor. Sie sind von javanischen nicht verschieden, auch nicht von einem von Babber vorliegenden Exemplar.

62. **C. tambora** Doherty, l. c. p. 171 (Sambawa).

Doherty erwähnt diese Art als selten von den Bergen Sambawa's, von wo mir drei männliche Exemplare vorliegen.

In meiner Arbeit über Schmetterlinge von Sumba (Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894) erwähnte ich als *Ceth. cyane* Dr. var. *sumbana* eine sehr nahestehende *Cethosia*, welche mir jetzt, obwohl von den Sambawa-Exemplaren von *tambora* etwas verschieden, doch als eine Lokalform dieser Art von Sumba erscheint.

Hinsichtlich der genaueren Beschreibung der Sumbaform verweise ich auf die genannte Arbeit und erwähne hier nur, dass die von Sambawa vorliegenden *C. tambora* zwar auf der Oberseite ziemlich den Sumba-Männchen entsprechen, aber einen viel breitem schwarzen Aussenrand der Flügel und geringere Entwicklung des subapikalen Bandes zeigen.

Ebenso sind die Männer von Sambawa auf der Unterseite viel dunkler und es hebt sich namentlich die schwärzliche Grundfärbung, der Aussenhälfte aller Flügel viel kräftiger von der gelblichen und

röthlichen Innenhälfte ab, wodurch auch die Zeichnungen ungleich kräftiger erscheinen, als bei den Sumba-Exemplaren.

Siehe die Abbildung des ♂ (Sumbawa) auf T. I, II, Fig 7.

### Genus *Cynthia* Fabr.

63. **C. arsinoë** Cramer P, E. T. 160, Fig. BC. (779).

v. dejone Erichson, Nov. Act. Ac. Nat. Cur. XVI. Suppl. T. 50,

Fig. 2, 2a (1833); Doherty, l. c. p. 173 (Sumba, Sambawa);

Distant, Rhop. 1 al. p. 184, T. 10, Fig. 1, 2.

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 248 (Flores).

— T. v. E. Bd. 33, p. 296 (Billitong).

— Midden Sumatra Lep. p. 18.

Röber, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 302 (Ceram, Flores, Kisser, Bone-  
rate; Goram).

*Cynthia erotoides*, de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 403,  
n. 107.

Doherty gibt an, dass die Weibchen auf Sambawa bemerkenswerth variiren. Mir liegt ein Pärchen von dort vor. Der Mann unterscheidet sich nicht in besonderer Weise, das ♀ ist etwas blasser gelb, namentlich auf der Unterseite. Doherty will dunkelgraue Weibchen beobachtet haben und zwischenstehende Formen. Röber (l. c.) sagt, dass die Flores-Stücke am kleinsten seien und dass die Stücke von Kisser eine sehr rothbraune Färbung zeigen. Er hält alle bekannten Formen von *Cynthia* als einer Art gehörig, ebenso sagt Snellen (T. v. E. Bd. 33, p. 296). Ein mir von Sumba (Patadala 15. XI. 95) vorliegendes Männchen ist kleiner, als das von Sambawa, das hinter Molukken-Exemplaren weit zurückbleibt, und beiderseits, aber besonders auf der Unterseite rothbraun gefärbt.

### Genus *Messaras* Dumbleday.

64. **M. erymanthis** Drury Ill. Exot. Ent. I, pl. 5, Fig. 3, 4; Cramer pl. 238, Fig. G.

Cupha er. Doherty, l. c. p. 171: Sumba, Sambawa; Distant, Rhop.

Mal. p. 176, T. 8, Fig. 4;

Mess. er. Röber, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 303 Goram.

Snellen, T. v. E. Bd. 33, p. 295 (Biliton).

— Midden Sumatra Lep. p. 18.

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 400, n. 127.

Ein mir von Sumba (Patadala 6. XI. 95) vorliegendes Exemplar ist kleiner und etwas heller als javanische Exemplare.

Genus **Atella** Doubleday.

65. **A. phalanta** Drury, Ill. Exot. Ent. I, T. 21, Fig. 1, 2, (1773).  
 Doherty, l. c. p. 171 (Sumba, Sambawa).  
 Distant, Rhop. Mal. p. 173, T. 9, Fig. 4.  
 Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 303 (Flores, Letti, Kisser).  
 de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 400, n. 129.

Mehrere Exemplare liegen von Sumba und von Sumbawa vor, welche auf der Unterseite etwas lebhafter gefärbt sind, als indische und Ceylonstücke.

66. **A. egista** Cramer, P. E. III, T. 281, CD. (1782).  
 Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 203 (Ceram, Goram).  
 A. sinha Doherty, l. c. p. 171 (Sumba, Sambawa).

Von Sumba (Patadala 15. 21. 95) in einem auf der Unterseite lebhaft gefärbten Exemplare erhalten.

Genus **Junonia** Hübner.

67. **J. asterie** Linné Syst. Nat. ed. XII, 1, 2, p. 769.  
 Cramer I, p. 80, pl. 58 D, E.  
 Distant, Rhop. Mal. p. 94, T. 11, Fig. 1, 2.  
 Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 304 (Flores).  
 J. asteria, var. sumbae Doherty l. c. p. 172. Sumba, Sambawa.

Liegt von Sumba (Waingapu 5. I. 96) in einem kleinen javanischen Stücken entsprechenden Exemplare vor.

68. **J. atlites** Joh. Ammoen. Acad. VI, p. 407 (1764).  
 Doherty, l. c. p. 172 (Sumba, Sambawa). Distant, Rhop. Mal.  
 p. 93, T. 11, Fig. 11.  
 J. laomedia, Linné, Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk.  
 1894, p. 55: Sumba.  
 Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 197 (Biliton).  
 — Midden Sumatra Lep. p. 15.  
 de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 407, n. 180.

Mehrere Exemplare von Sumba (Waingapu 9. XI. 96) ohne Besonderheiten.

69. **J. erigone** Cramer P. E. I, p. 96, pl. 62 E, T.

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 241 (Flores).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 304 (Timorlaut, Timor, Ceram, Kay, Flores, Alor, Wetter).

Von Sumba (Waingapu 31. XI. 95 und Patadala (11. XI. 96) in veränderlichen Stücken erhalten, ebenso von Sambawa. Sie gleichen mehr, wie die Snellen'schen von Flores, östlichen Exemplaren, als javanischen.

J. aonis Linné, Doherty, l. c. p. 172 von Sumba und Sambawa ist dieselbe Art.

70. **J. timorensis** Wallace, Trans. Ent. Soc. 1869, p. 346 (Timor).

Doherty, l. c. p. 173, n. 37 (Sumba).

Orithya var, Pagenstecher, Jahrb. Nass. Var. f. Nat. 1894, p. 55. Sumba.

Precis tim. Wallace, Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 304 (Alor), T. 5, Fig. 3 (Band 35).

Von Sumba (Waingapu 9. I. 96 und 22. XI. 95) mehrfach erhalten).

71. **J. orithya** Linné, Mus. Ulr. p. 278; Cramer pl. 18 C,D. pl. 32 E. F., pl. 280 A, B.

Doherty, l. c. p. 173 (Sumba, Sambawa).

Röber, T. v. E. Bd. 34, p. 304 (Bonerate, Key, Flores).

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 241 (Flores).

J. ocyale, de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra p. 407, n. 152.

Snellen, Midd. Sumatra Lep. p. 19.

Von Sumba (Waingapu 24. XII. 95 und 25. XI. 95).

#### Genus **Precis** Hübner.

72. **P. ida** Cramer, P. E., p. 66, pl. 42 ED., IV., p. 167, pl. 374, CD.

Doherty, l. c., p. 173. Sumba, Sambawa.

Snellen, T. v. E. Bd. 34, p. 241 (Flores).

Von Sambawa vorliegend.

#### Genus **Rhinopalpa** Felder.

73. **Rh. sabina** Cramer, P. E. IV. T. 289, AD. (1782).

Yoma s. Doherty, l. c., p. 173 (Sumba, Sambawa).

Röber, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 305 (Flores).



Von Sumbawa ist ein Exemplar vorhanden, welches auf der Ober- und Unterseite etwas dunkler gefärbt ist, als Stücke von den Molukken und Philippinen.

Genus **Ergolis** Boisduval.

74. **E. ariadne** Linné, Syst. Nat. ed. X, p. 778.

Doherty, l. c., p. 170 (Sumba, Sambawa).

Pagenstecher, Nass. Jahrb. f. Nat. 1894, p. 44, Sumba.

Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 218 (Flores).

— Midd. Sumatra Lep. p. 15.

Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 305 (Flores).

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 398, n. 122.

Von Sumba (Waingapu 20. XI. 95) und Sambawa erhalten.

Genus **Cyrestis** Boisduval.

75. **C. nais** Wallace, Trans. Ent. Soc. 1869, p. 347 (Timor).

Doherty, l. c. p. 171, Sumba.

Doherty sagt von seinen Sumba-Stücken, dass sie in der Mitte ständen zwischen *C. nivea* Zink. und *thyodamus* Boisd.

Ich erhielt Exemplare von Sambawa und von Sumba (Patadala 8. XI, 10. XI, 14. XI und 17. XI 96) und von Sambawa.

Die Sambawa-Exemplare sind grösser und lebhafter, durchgängig dunkler in den streifigen Parthieen, auch mit breiterm dunklen Aussenrand. Im Apicalfeld der Vorderflügel treten zwei weissliche Flecke deutlich hervor, sowohl auf der Ober- als der Unterseite, welche bei den Sumba-Exemplaren verschwinden. Auf den Hinterflügeln zeigen die Sambawa-Stücke an der inneren submarginalen Binde lebhafteres Blau, die äussere mit ihr ein V bildende ist dunkler, ebenso wie die Marginalbinde. Alle diese Verschiedenheiten sind gering, sie entsprechen aber der Tendenz der Sambawa-Falter nach Verdunklung.

*Cyrestis nivalis* ist nahe verwandt, vergl. de Nicéville u. Martin, Butt. Sumatra, p. 429, n. 241 und, wie *nais*, nur Lokalform von *C. nivea* Zink. Auch *C. irmae* Forbes und *C. maenalis* Erichson stehen nahe.

---

Genus **Doleschallia** Felder.

22. **P. spec.** Doherty, l. c., p. 174 (Sumba). Snellen führt *D. bisaltide* Cramer von Flores auf.

Genus **Hypolimnias** Hübner.

76. **H. bolina** Linné Mus. Utr., p. 295.

Doherty, l. c. p. 174: Sumba, Sambawa.

Pagenstecher, Nass. Jahrb. f. Nat. 1894, p. 56, Sumba.

Röber, Tijd. v. Ent. Bd. 34, p. 305 (Flores, Alor, Ceram, Bonerate, Key, Letti).

Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 240 (Flores).

Von Sumba (Waingapu 17. XI. 95 und 9. I. 96) liegen bunte Weibchen, von Sambawa mehr dunklere vor. Eines entspricht der von Doherty citirten Form mit röthlichem Hof am Hinterrand der Vorderflügel und röthlichem Discus, das andere ist fast einfarbig schwarz mit blauweissen submarginalen Flecken und bläulichem Schimmer des Discus der Hinterflügel.

77. **H. misippus** Linné Mus. Utr., p. 264 (1764), v. diocippus Cramer P. E., T. 28, BC. (1775).

Pagenstecher, Nass. Jahrb. f. Nat. 1894, p. 55, Sumba.

Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 239 (Flores).

Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 306 (Letti).

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 413.

Von javanischen sind die männlichen Sumbastücke nicht verschieden; ♀♀ erhielt ich nicht.

Genus **Limenitis** Fabr.

78. **L. procris** Cramer II, T. 106 E, F.

Doherty, l. c. p. 176, Sumba, Sambawa.

Snellen, T. v. E., Bd. 33, p. 290: Biliton, Java.

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 417 (1895).

Von beiden Inseln vertreten; die Sumba-Stücke (Patadala 12. XI. 96 und Waingapu 3. IX. 92) sind kleiner.

- 
23. **Hyp. Saundersi** Wallace, Tr. Ent. Soc., p. 282, n. 7 (1869) Timor (= pandarus Linné) Doherty, l. c. p. 174, Sumba.

24. **Hyp. anomala** Wallace, l. c. p. 285, n. 15.

Doherty, l. c. p. 174 (Sambawa).

25. **Helcyra chionippe** Felder.

Doherty, l. c. p. 174 (Sumba).

26. **Phaedyra columella** Cramer,

Doherty, l. c., p. 174 (Sumba, Sambawa).

27. **Neptis hordonia** Stoll.

Doherty, l. c., p. 175 (Sumba, Sambawa).

Genus **Neptis** Fabr.

79. **N. nandina** Moore, Cat. I, p. 168, n. 347, Pl. IVa, Fig. 17, Java, India.

*N. nandina*, var. *sumba* Doherty l. c. p. 175 (Sumba).

Liegt von Sambawa in einem zu dieser oder einer nahe verwandten Art gehörigen Exemplar vor.

80. **N. aceris** Lep. Reise I, p. 203, T. 17, Fig. 5, 6.

Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 307 (Flores).

Snellen, T. v. E., Bd. 33, p. 270 (Tanah Djampea).

Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 238 (Flores).

Snellen, Midd. Sum. Lep. p. 15 (= synonym der vorigen = *celebensis* Hopffer).

Snellen stellt eine Varietät *florensis* von Flores auf, verwandt mit *adipana* Moore, Pr. Zool. Soc. 1872, p. 563, T. 33, Fig. 8) als verschieden von *aceris*, die er aber nicht aufrecht erhalten zu wollen scheint. Ich besitze mehrere Exemplare von Flores, die hierher zu ziehen sind, aber so geringe Unterschiede von *aceris* zeigen, dass es schwer wird, aus ihnen eine Lokalvarietät zu statuieren.

Ob auch die von Röber (T. v. E., Bd. 34, p. 307) von Timor, Wetter, Kisser, Letti aufgeführte *N. timorensis* Staudinger in lit. Bestand haben kann, steht dahin.

Genus **Athyma** Westwood.

81. **A. selenophora** Kollar. Hügel's Kaschmir IV, 1, p. 426, T. 7, Fig. 1, 2 (1844).

Moore, Cat. Lep. I, p. 175 (India).

Snellen, Midd. Sum. Lep., p. 15, T. 1, Fig. 4, 5 (1892).

*A. amhara* Druce de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 419 (1895).

Von Sambawa liegen einige, den javanischen gleiche Exemplare vor.

- 
28. **Athyma perius** Linné.

Doherty, l. c. p. 175 (Sumba, Sambawa).

29. **Athyma karita** Doherty.

Doherty, l. c. p. 175 (Sumba, Sambawa).

30. **Ath. nette** Cramer.

Doherty, l. c. p. 176 (Sambawa, 2000').

31. **Limnitis hollandii** Doherty.

Doherty, l. c. p. 177 (Sambawa, 2000').

Genus **Symphhaedra** Hübner.

82. **S. aegle** Doherty.

Doherty, l. c. p. 177 (Sumba, Patadälung).

Ein ♂ von Sumba (Patadala 14. XI. 95) entspricht der Beschreibung Doherty's.

Genus **Charaxes** Ochs.

83. **Ch. athamas** Drury, Ill. Ent. Exot I, T. 274; Doherty l. c. p. 174 (Sumba, Sumbawa); Pagenstecher, l. c. p. 56 (1894).

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 435, n. 256.

Snellen, Midd. Sum. Lep. p. 16

Mehrere Exemplare von Sumba, auch ein grösseres ♀, nicht wesentlich verschieden von javanischen Exemplaren, welche auch in der Färbung der Unterseite variiren.

84. **Ch. moorei** Distant, Rhop. Mal. p. 101, T. XIII, Fig. 3.

Pagenstecher, l. c. p. 56. Sumba.

de Nicéville und Martin, Butt. Sumatra, p. 435, n. 254.

Von Sumba.

85. **Ch. jovis** Staudinger, Iris 1894, p. 357 (Sambawa).

? Doherty, l. c. p. 174, n. 48 Char. spec. Sumba, Sambawa mountains. Siehe die Abbildung T. I, II, Fig. 6 (♂).

Es liegen mir von Sambawa zwei wohl erhaltene ♂♂ und von Sumba 2 ♂♂ und 1 ♀ (♂ 2. I. 96 Waingapu und 9. X. 95 Waingapu, ♀ 12. XII. 95 Waingapu, vor. Ich ziehe diese Stücke, welche nach ihrer Herkunft einige Verschiedenheiten zeigen, nach Staudinger's Beschreibung zu dessen *Ch. jovis*; ebenso gut stellen sie aber auch eine Lokalvarietät von *Ch. galaxia* Butler (Proc. Zool. Soc. Lond. 1861, p. 63, T. 37, Fig. 2; Grose Smith und Kirby, Rhop. Exot. Charaxes V, Fig. 3, 4 (Timor) vor, den Kirby, Cat. p. 273, zu *Ch. pyrrhus* L. zieht.

Staudinger vergleicht die von ihm als neue Art aufgestellte Form mit *Ch. gilolensis* Butler, Lep. Ex. T. 5, Fig. 6 (Batjan) und *Ch. jupiter* Butler, Lep. Ex. T. 5, Fig. 4, 7 (Neu-Guinea), von welchen beiden sie erheblicher abweicht. Mit *galaxia* verglichen, sind die Unterschiede gering. Da sie bei den Exemplaren von Sumba etwas anders sind, als bei denen von Sambawa, so verdienen sie hier eine gesonderte Beachtung.

Bei den Sambawa-Exemplaren ist der schwarze Aussenrand gegen den Hinterrand hin verschmälerter als bei *galaxia* und der den weisslichen Discus begrenzende blaugrüne Rand tritt in ihn hinein. Sowohl die submarginalen weissen Flecke, wie die oberhalb der Mittelzelle und im Apex sind auf den Vorderflügeln grösser als bei *galaxia*. Dasselbe ist mit den 7 submarginalen weissen Flecken der Hinterflügel der Fall.

Auf der Unterseite der Vorderflügel zieht bei *galaxia* ein weissliches breites Band von der Subcostalis zum Hinterrand, welches bei *jovis* von Sambawa durch die braungelbe Grundfärbung unterbrochen wird. Auf den Hinterflügeln ist der bei der Beschreibung von *galaxia* von Grose Smith angegebene V-förmige schwarze Flecken bei *jovis* ein fast gerader Strich. Die mittlere weisse Linie ist breiter, wie bei *galaxia*, ihre innere von einer schwarzen Binde begrenzte Umrandung ist leichter convex, als bei *galaxia* und reicht weiter herunter. Im Uebrigen ist Färbung und Zeichnung dieselbe.

Bei den ♂♂ Sumba-Exemplaren von *jovis* sind die weissen Flecke des Vorderflügels noch grösser; es tritt überhaupt das Weiss der Flügel noch stärker hervor und der schwarze Aussenrand wird, wie die bläuliche Begrenzung desselben, schmaler als bei den Sambawa-Exemplaren. Die beiden vor der Mittelzelle gelegenen weissen Flecke sind nur durch einen ganz schmalen schwarzen Rand von dem weisslichen Grunde geschieden.

Die Unterseite der beiden *jovis*-Männchen von Sumba zeigt auf den Vorderflügeln eine viel stärker Entwicklung von Weiss, sowohl auf dem Discus, als an den weissen Submarginalen, wie auch den Flecken am Apex und an der Mittelzelle. Auch hier schiebt sich, wenn auch in geringeren Maasse, als bei den Sambawa-Stücken, die braunröthliche Grundfärbung zwischen die ersten von der Costalis am Grunde ausgehenden weissen Flecke und die weisse Discalfärbung, so dass keine vollständige weisse discale Binde entsteht, wie bei *galaxia*. Auf den Hinterflügeln ist die mittlere weisse Binde ebenso wie bei den Sambawa-Exemplaren breiter und nicht so stark convex nach innen, auch weiter über die Aeste der *mediana* reichend; das Uebrige ist wie bei *galaxia*.

Das Weibchen von *jovis* von Sumba ist etwas grösser, als die ♂♂. Auf der Oberseite der Vorderflügel tritt die weisse Grundfärbung noch stärker hervor; sie nimmt die beiden Flecke vor der Mittelzelle in sich auf. Die vor dem Apex stehenden sind wie die submarginalen viel



Uebersicht der Nymphaliden

India, Cylon	Sumatra	Borneo	Java	Sambawa	Sumba
penthesilia	—	hypsea	penthesilia	C. penthesilia	penthesilia
—	—	—	—	C. tambora	tambora
arsinoe	arsinoe	arsinoe	arsinoe	C. arsinoe	arsinoe
erymanthis	erymanthis	erymanthis	erymanthis	M. erymanthis	erymanthis
phalanta	phalanta	—	phalanta	A. phalanta	phalanta
egista	sinha	—	egista	egista	egista
asterie	asterie	—	asterie	D. asterie	asterie
atlites	atlites	atlites	atlites	atlites	atlites
—	erigone	—	erigone	erigone	erigone
—	—	—	—	—	timorensis
orithya	orithya	—	orithya	orithya	orithya
ida	ida	ida	ida	ida	ida
—	—	—	—	sabina	sabina
ariadne	ariadne	ariadne	ariadne	ariadne	ariadne
—	nivalis	—	nivea	C. nais	nais
bolina	bolina	bolina	bolina	bolina	bolina
misippus	misippus	misippus	misippus	—	misippus
procris	procris	procris	procris	procris	procris
nandina	—	—	nandina	nandina	—
aceris	aceris	aceris	aceris	—	aceris
—	—	—	—	—	saundersi
—	anomala	—	—	anomala	—
—	—	—	—	—	chionippe
selenophora	—	—	selenophora	selenophora	—
columella	—	—	—	columella	columella
hordonia	hordonia	hordonia	hordonia	hordonia	hordonia
—	dirtea	—	dirtea	—	aegle
perius	perius	—	perius	perius	perius
—	—	—	—	harita	harita
nefte	—	nefte	nefte	nefte	—
—	—	—	—	hollandii	—
athamas	athamas	—	athamas	athamas	—
moorei	moorei	—	moorei	—	moorei
—	—	—	—	jovis	jovis

von Sumba und Sambawa.

Timor, Flores u. s. w.	Celebes	Molukken	Neu- Guinea	Australien	Philippi- nen	China, Japan
penthesia	—	—	—	—	mindanensis	—
—	—	—	—	—	—	—
arsinoe	dejone	arsinoe	—	—	dejone	—
erymanthis	—	erymanthis	—	—	—	erymanthis
—	phalanta	—	—	—	—	—
—	—	egista	—	—	—	—
asterie	—	—	—	—	asterie	asterie
atlites	—	atlites	—	—	—	atlites
erigone	erigone	erigone	—	—	—	—
timorensis	—	—	—	—	—	—
orithya	—	orithya	—	—	—	orithya
ida	ida	ida	—	—	—	—
sabina	—	sabina	—	—	sabina	—
ariadne	ariadne	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
bolina	bolina	bolina	bolina	bolina	bolina	—
misippus	misippus	misippus	—	—	misippus	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
florensis	celebensis	—	—	—	—	—
—	—	pandarus	—	—	—	—
antilope	—	anomala	anomala	—	anomala	—
—	—	chionippe	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	perius
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	athamas	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
galaxia	—	pyrrhus; gilolensis	jupiter	—	—	—

stärker entwickelt. Auf den Hinterflügeln zeigen sich die submarginalen Flecke ebenfalls stärker. Auf der Unterseite der Vorderflügel vereinigt sich der weisse Discalfleck mit dem innern Costalfleck, wie mit den beiden Flecken vor der Mittelzelle; die submarginalen Flecke sind grösser. Auf den Hinterflügeln ist die breitere und längere weisse Mittelbinde mehr geradlinig begrenzt.

Nach den geschilderten Verhältnissen kann also der Staudingersche *Ch. jovis* als Lokalvarietät von *Ch. galaxia* gelten, die auf Sumba etwas verschiedener auftritt wie auf Sambawa. *Ch. pyrrhus* zeichnet sich, wie *galaxia* und *gilolensis*, durch breitere schwärzere Randfärbung und durch gelbliches Weiss aus. Auf der Unterseite verläuft der schwärzliche, die weissliche Binde nach innen begrenzende Streifen gradlinig. Es dürften *Ch. pyrrhus*, *gilolensis*, *jovis* und *jupiter* als Lokalvarietäten einer einzigen Art zu betrachten sein. —

Bei den auf Sumba und Sambawa beobachteten Nymphaliden zeigt sich deutlich die grössere Verwandtschaft der auf Java, den benachbarten kleinen und grossen Sundainseln, wie in Indien vorkommenden Arten, als mit östlichen. Nur die Molukken haben eine grössere Zahl gemeinschaftlicher Arten. Spezifische Formen für die beiden Inseln wurden nicht beobachtet, sondern nur Lokalvarietäten.

## Libythaeinae.

### Genus *Libythaea* Farbr.

86. **L. myrrha** Godart Enc. Méth. IX, p. 171, n. 4 (1819).  
 Hübner, Zutr., Fig. 789, 790 (1832).  
 de Nicéville und Martin, Midd. Sumatra, Lep. p. 439, n. 268.  
 Von Sumba (Patadala 10. XI. 95) vorliegend.
87. **L. Geoffroyi** Godart, Enc. Méth. IX. Suppl., p. 813 (1823); Doherty, l. c. p. 178. Sumba.  
 Es liegen von Sumba (Patadala 5. XI. 95 und 16. XI. 95) Exemplare vor.
- L. antipoda* Boisduval (Felder Reise Nov. Lép. II, p. 313, n. 423, T. 42, Fig. 9, 10) ist nur Lokalvarietät, ebenso wie *caramensis* Wall.

- 
32. **L. narina** Godert, p. 171, n. 5 (1879).  
 Doherty, l. c. p. 178 Sambawa, Sumba.

Die mir von Geoffroyi von Sumba vorliegenden Stücke (♂♂) sind kleiner, als ein von Ceram stammendes. Die Umrandung der Flügel ist bei dem Ceramstück breiter schwarz, die subapicalen Flecke der Unterseite der Vorderflügel schimmern stärker hindurch, dagegen die Mittelbinde der Hinterflügel weniger.

Stücke von Stephansort (Neu-Guinea) haben die Grösse der Ceram-Exemplare. Bei ihnen treten die subapicalen weissen Flecke stärker hervor, bei einem Exemplar sogar fast so stark wie beim ♀. Die Hinterflügel haben eine mehr bräunliche Färbung, die der des Weibchens näher kommt. Ein Stück von Kakopo (Herbertshöhe Neupommern, Dr. Hagen) hat die Grösse der Sumba-Exemplare und den schmälern schwarzen Rand, auch ein gesättigteres Blau der Vorderflügel. Die Hinterflügel sind bräunröthlich schimmernd mit schwachem blauem Glanz im Grunde. Dies Exemplar zeigt auch auf der Unterseite stärkere Verschiedenheiten, als die Neu-Guinea- und Ceramstücke von dem Sumba-Exemplar. Die Unterseite der Vorderflügel ist nämlich bräunlichroth schimmernd, wie die Oberseite der Vorderflügel, an der Spitze etwas bläulich. Die weisslichen Flecke verschwinden fast ganz. Die Hinterflügel sind violett schimmernd mit bräunlichen Querbändern.

Diese Varietät verdient ebenso gut wie die *ceramensis* Wall. und *batchiana* Wall. einen Namen, als welchen ich *neopommerana* vorschlage.

## Nemeobinae.

### Genus *Zemeris* Boisduval.

#### 88. *Z. strigatus* nov. spec. T. 3, Fig. 5.

Von Sumba (Patadala 6. XI. 95) liegt ein Exemplar einer wohl noch nicht beschriebenen *Zemeris*-Art vor. Der niedliche Falter hat 30 mm Ausmass. Antennen schwarz und weiss geringelt mit dunkler Keule; Brust und Hinterleib oben schwärzlichbraun, unten heller röthlichbraun.

Alle Flügel auf der Oberseite gleichfarbig rothbraun mit zackigen weisslichen und in diese eingelagerten schwärzlichen strich- und punktförmigen Zeichnungen.

---

33. *Zemeris retarius* Grose Smith in Rothschild. Nov. Zool. 1895, p. 500 (Sumbawa, Adonara).

34. *Zemeris phlégyas* (sic!) Cram. Sambawa. (flegyas Cr. 280 E. F.) Doherty, l. c. p. 178.

In eine submarginale weissliche Zackenbinde der Vorderflügel sind nach dem Aussenrande hin schwärzliche Striche eingelagert, welche nach aussen von weissen Punkten begleitet werden. Nach innen von dieser Zackenbinde zeigen sich in der Flügelmitte einzelne schwärzliche, nach aussen weissliche Punkte und im innern Drittel senkrecht gestellte weisse Strichelchen, die nach innen von schwarzen Punkten begleitet sind. Auf den Hinterflügeln erscheinen submarginale schwarze Striche nach aussen und innen weisslich eingefasst, in der Flügelmitte vereinzelt schwarze weiss eingefasste Fleckchen und im innern Drittel einzelne senkrechte weisse Strichelchen und schwärzliche Punkte.

Die Unterseite ist viel heller gelblich-röthlichbraun, die hier gelblich-weisslichen Zeichnungen sind ähnlich wie auf der Oberseite, aber viel schärfer und deutlicher ausgeprägt, die schwärzlichen Strichelchen und Punkte kleiner. Die Fransen sind auf der Oberseite röthlichbraun, hier und da schwärzlich, auf der Unterseite heller rothbraun.

Mit *Z. flegyas* Cram. ist das Thierchen mehr verwandt, aber durch Grösse, Färbung und Zeichnung wesentlich verschieden, ebenso von *retarius* Grose Smith.

Die Angabe Doherty's, dass auf Sumba keine Species von *Zemeros* beobachtet wurde, ist somit hinfällig.

## Lycaenidae.

Genus *Miletus* Hübner.

(*Gerydus* Boisd.)

89. *M. teos* Doherty, l. c. p. 185 (Sumba, Sambawa).

Ein der Doherty'schen Beschreibung entsprechendes Exemplar liegt von Sumba (Waingapu 20. XI. 95) vor. Ist Lokalform von *M. symethus* Cramer.

35. *Gerydus boisduvalii* Moore, var. *acragas*.

Doherty, l. c. p. 186. Sumba, Sambawa.

36. *Cyaniris akasa* Horsf.

Doherty, l. c. p. 180 Sambawa (4—5000').

37. *Zizera pygmaea* Snellen, Doherty l. c. p. 189. Sumba, Sambawa.

38. *Zizera lysizone* Snellen, Doherty l. c. p. 188, Sumba, Sambawa.

39. *Polyommatus baeticus* Linné, Doherty l. c. p. 181, Sumba, Sambawa.

40. *Chilades trochilus* Freyer (putli), Doherty l. c. p. 181, Sumba, Sambawa.

41. *Everes parrhasius* Fabr., Doherty l. c. p. 181, Sumba, Sambawa.

42. *Everes theophrastus* Fabr., Doherty p. 181, Sumba.



Genus **Cupido** Schrank.

90. **C. macrophthalma** Felder, Verh. zool. bot. Ges. XII. p. 483, n. 115 (1862); Reise Nov. Lep. p. 275, n. 339, T. 34, Fig. 35 (1865); Distant, Rhop. Mal. p. 213, T. 20, Fig. 3.  
Doherty, l. c. p. 183 (Sumba).  
Ein Exemplar von Sambawa.
91. **C. Schatzi** Röber, Iris I, p. 53, T. 10, Fig. 1, Batjan (1884).  
Von Sumbawa erhalten; von Herrn Röber als solches bestimmt.
92. **C. roxus** Godart, Enc. Méth. IX, p. 659, n. 142 (1823).  
L. v. Horsf. Cat. p. 70, n. 5, T. 2, Fig. 4, 4a (1828).  
Doherty, l. c. p. 181. Sumba, Sambawa.  
Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 242 (Flores). Distant, Rhop. Mal. p. 276, T. 22, Fig. 24.  
Von Sumba. (Patadala 14. XI. 95.)
93. **C. rosimon** Fabr., Syst. Ent., p. 523, n. 341 (1775).  
Doherty, l. c. p. 187. Sumba, Sambawa.  
Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 243 (Flores). Distant, Rhop. Mal. p. 215, T. 22, Fig. 20.  
Von Sumba (4. XII. 95 Waingapu) erhalten.
94. **C. aratus** Cramer IV, T. 365, AB (1782).  
Von Sumba.  
L. masu Doh., p. 184, T. II, Fig. 11 ist dieselbe Art; Doherty hält sie für Lokalvarietät von aratus.
95. **C. puspa** Horsf. Cat. Lep. E. J. C. M., p. 67, n. 3 (1828).  
Doherty, l. c. p. 180 (Sumba, Sambawa).  
Mehrere Exemplare von Sumba (18. XI. 95 Patadala).
96. **C. cleodus** Felder, Reise Nov. Lep., p. 334, T. 34, Fig. 20.  
Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894, p. 56. Sumba.

- 
- 43 **Castalius ethion** Doubl, Doherty p. 181, Sumba, Sambawa
  - 44 **Cataphrysops cnejus** Fabr., Doherty p. 181, Sumba.
  - 45 **Catochrysops pandava** Fabr., Doherty l. c. p. 181, Sumba
  - 46 **C. strabo** Fabr., Doherty p. 181, Sumba, Sambawa.
  - 47 **Nacaduba laura** Doherty, p. 182, T. II, Fig. 9 ♀, Sumba.
  - 48 **N. hermus** Felder (viola Moore), Doherty, p. 183, Sumba, Sambawa.
  - 49 **N. ardates** Moore, Doherty p. 183, Sumba, Sambawa
  - 50 **N. dana** de Nicéville, Doherty p. 183, Sumba, Sambawa
  - 51 **Lampides bochus** Cramer, Doherty p. 183, Sumba, Sambawa
  - 52 **L. celeno** Cr., Doh. p. 185; Sumba, Sambawa.

97. **C. gaura** Doherty, l. c. p. 181, T. 2, Fig. 8 (Nacaduba g.)  
Von Sumba erhalten.
98. **C. anops** Doh. p. 183, T. II, Fig. 12. Sumba. Von Sumba  
(Patadala 7. XI. 95).

Genus **Hypolycaena** Felder.

99. **H. erylus** Godart. Enc. Méth. IX, p. 630, n. 10 (1893); Pagen-  
stecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1894, p. 55.  
Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 317 (Bonerate). Distant, Rhop.  
Mal. p. 255, T. 24, Fig. 5, 6.  
Von Sumba (Patadala 2. XI. 95) und Sambawa erhalten.

Genus **Myrina** Felder.

100. **M. atymnus** Cramer, P. E. IV, T. 33, D.E. (1782).  
Doherty, l. c. p. 175 (Sumba, Sambawa, Loxura a.)  
Von Sumba erhalten, gleich javanischen Exemplaren.

Genus **Curetis** Hübner.

101. **C. thetys** Drury, Ill. Exot. Ent. II, T. 9, Fig. 3, 4 (1770).  
Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 318 (Flores), (Curetis stigmata).  
**Curetis malayica** Feld., var. kéritana. Doherty, l. c. p. 179  
(Sumba, Sambawa).  
Von Sumba (Patadala) 5. XI. 95,

Genus **Amblypodia** Horsf.

102. **A. amantes** Hew., Cat. Lyc. Br. Mus., p. 41, n. 17, T. 2, Fig. 3  
(1852).  
A. araxes Felder, Reise Nov. Lep. II, p. 224, p. 246, T. 29,  
Fig. 3—5.  
Doherty, l. c. p. 179 (Sumba).  
Zahlreiche Exemplare von Sumba (unter anderem von Waingapu  
2. XI. und 29. XI. 1895).

53. **L. elpis** Godart, Doh. p. 185, Sumba, Sambawa.  
54. **Megisba malaya** Horsf., Doherty l. c. p. 185, Sumba, Sambawa.  
55. **Neopithecops palmira** Butler, Doherty p. 185, Sumba, Sambawa.  
56. **Spalgis epius** Westw., Doh. p. 185, Sumba, Sambawa.  
57. **Flos apidanus** Hew., var. Doherty l. c. p. 179, Sambawa.

103. **A. narada** Horsf., Cat. Lep. E. I. C. Mus., p. 98, T. 1, Fig. 3.  
 Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. 1894, p. 56.  
 Snellen, T. v. E., Bd. 33, p. 302, Biliton.  
 Von Sumba erhalten.

Die Lycaeniden zeigen fast nur allgemein im indomalayischen Gebiet verbreitete Arten.

## Hesperidae.

Genus **Ismene** Swainson.

104. **J. exclamationis** Fabr., Syst. Ent. p. 530, n. 373 (1770).  
 P. ladon Cramer III, T. 284, Fig. G. (1782).  
 Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 319 (Flores).  
 Doherty, l. c. p. 195, Sumba, Sambawa.  
 Von Sumba (28. XI. 95 Waingapu) und Sambawa erhalten.
105. **J. illusca** Hew., Exot. Butt. IV, Ismene (1867), Fig. 10, 11.  
 Von Sumba.

Genus **Pamphila** Fabr.

106. **P. matthias** Fabr., Ent. Syst. Suppl., p. 433 (1798); Doh. p. 196,  
 Sumba, Sambawa.  
 Von Sumba erhalten.
107. **P. marnas** Felder Sitzungsber. Ac. Wiss. Math. Nat. Cl. XL,  
 p. 462, n. 50 (1860).  
 Von Sumba.

Genus **Telicota** Moore.

108. **T. nigrolimbata** Snellen. Tijd. v. Ent. Bd. 19, p. 165, T. 7,  
 Fig. 5 (1876) Java.  
 Doherty, l. c. p. 196, Sumba, Sambawa.  
 Von Sumba (Patadala XI. 96).

- 58 **Surendra quercetorum** Moore, Doherty p. 179, Sambawa.  
 59. **Iraota timoleon** Stoll, Doh. p. 179, Sambawa  
 60 **Hypolycaena sipylus** Feld, Doh. p. 179 Sumba, Sambawa.  
 61. **Rapala jarbas** Fabr, Doh. p. 179, Sumba, Sambawa.  
 R orsis Hew, Doh. p. 179, Sambawa.  
 62 **R. varuna** Horsf, Doh. p. 180, Sumba, Sambawa  
 63. **L. subperusia** Snellen, Tijd. v. Ent. Bd. 39, p. 93 (Java, Sumbawa).  
 64. **Parata malayana** Feld., Doh. p. 194, Sumba.  
 65. **Hasora badra** Moore, Doherty p. 194, Sumba, Sambawa

109. **T.maesoides** Butler, Tr. Linn. Soc. 1877, p. 554, n. 5.  
Doherty, l. c. Fig. 196. Sumba, Sambawa.  
Distant, Rhop. Mal., p. 383, T. 34, Fig. 26 (Ceylon, Andamans,  
Perak, Malacca, Singapore, Java).  
Von Sumba.

Genus **Abaratha** Moore.

110. **A. syrichthus** Felder.  
Doherty, l. c. p. 195, Sumba.  
Von Sumba (Patadala 6. XI. 95) erhalten.

---

II.

**HETEROCERA**\*)

---

**Saturnidae.**

Genus **Antherea** Hübner.

111. **A. paphia** Linné, Syst. Nat. I, p. 809.  
Hampson, Ind. Moths I, p. 18, China, India, Oeylon.  
Von Sambawa erhalten.

**Sphingidae.**

Genus **Macroglossa** Scop.

112. **M. afflictitia** Butler, Pr. Zool. Soc. 1875, p. 240, pl. 36, Fig. 7.  
Hampson, Ind. Moths I, p. 103 (Simla, S. India, Ceylon).  
Von Sumba erhalten.

- 
66. **Tagiades brasidas** Doherty, p. 195, Sumba, Sambawa  
67. **Abaratha hypesides** Doh., p. 195, Sambawa.  
68. **Coladenia dan.** Fabr., Doh. p. 196, Sumba, Sambawa.  
69. **Telicota gola** Moore, Doh. p. 196, Sumba, Sambawa.  
70. **Ampittia maro** Fabr., Doh. p. 196, Sumba, Sambawa.  
71. **Parnara narooa** Moore, Doh. p. 197, Sumba, Sambawa  
72. **Suastus chilon** Doh., p. 197, Sumba  
73. **Plesioneura restricta** Moore, Doh. l. c. p. 197, Sumba, Sambawa.

---

\*) In der Anordnung der genera schliesse ich mich dem Werke von Hampson, Ind. Moths, im Wesentlichen an, wo man auch das Nähere über Synonymik etc. findet.

113. **M. fervens** Butler, Pr. Zool. Soc. 1875, p. 4, pl. 1, Fig. 3.

Von Sumba ein verflogenes Exemplar, dass zu dieser oder einer sehr nahestehenden Art gehört.

Genus **Cephanodes** Hübner.

114. **C. hylas** Linné, Mant. Ins., p. 539; Moore, Lep. Ceyl. II, pl. 93, Fig. 4, 6.

Sphinx picus Cramer, P. E. II, p. 83.

Ceph. h. Hampson, Ind. Moths I, p. 120 (W. u. S. Africa, Japan, India, Australia).

Ein Exemplar von Sumba.

Genus **Acosmeryx** Boisd.

115. **A. mixtura** Walker.

Zonilia m. Walker, Cat. 31, 34 (1864).

Acosm. m. Butler, Tr. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 535.

Swinhoe, Eastern Het., p. 9, n. 36, T. 1, Fig. 7 (Aru).

Von Sumba (5. XI. 95 Patadala) erhalten.

Genus **Choerocampa** Dup.

116. **Ch. celerio** Linné, Syst. Nat. I, p. 800.

Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 253 (Flores).

Hampson, Ind. Moths I, p. 87 (Europa, Africa, India, Java, Borneo, Timor, Australia, Fiji).

Von Sumba (Waingapu 11. XI. 95).

117. **Ch. oldenlandiae** Fabr. Syst. Ent., p. 542.

Hampson, Ind. Moths I, p. 87 (Egypten, Asia, Philippines, Java, Aru).

Von Sumba.

**Zygaenidae**

Genus **Euchromia** Hübner.

118. **E. horsfieldi** Moore, Pr. Zool. Soc. 1859, p. 200, T. 60, Fig. 13.

Swinhoe, East. Het., p. 54, n. 231 (Flores, Sumatra, Java).

Von Sambawa erhalten.



Genus **Syntomis** Ochs.

119. **S. hübneri** Boisduval, Mon. Zyg., p. 147, T. 8, Fig. 4; Hampson, Ind. Moths, p. 219 (Bombay, Singapore, Java, C. York).  
Röber, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 324 (Flores).  
Von Sumba.

**Agaristidae.**

Genus **Phalenoides** Linné.

120. **Ph. milete** Cramer, P. E. I, pl. 18, Fig. D (1779).  
Eusemia mil. Wallace I, p. 83 (1854).  
Butler, Ill. typ. Het., Bd. I, p. 9, pl. 5, Fig. 6 (1877).  
Swinhoe, Eastern Het., p. 158, n. 731, Java.  
Von Sumba.

**Hypsidae.**

Genus **Euplocia** Hübner.

(Rothschild, Nov. Zool. 1896, p. 189).

121. **E. membliaria** Cramer, P. E. III, p. 139, T. C. D. (1780).  
Pagenstecher, Het. Palawan, Iris III, p. 18, n. 16 (1890).  
Hampson, Ind. Moths I, p. 496 (Moulmein, Siam, Andamans, Java, Philippinen).

Hampson vereinigt bereits hiermit *Ag. renigera* Fabr., *Eupl. moderata* Butler und *Eupl. inconspicua* Butler, während Rothschild in der jüngsten Arbeit über Hypsiden diese Formen in 3 Subspecies vertheilte, nämlich *E. memblania* Cr., *E. renigera* Felder (wozu auch *moderata* Butler) und *E. membliaria inconspicua* Butler, Tr. Ent. Soc. Lond., p. 328, n. 12 (1875) Macassar.

Diese Form erhielt ich auch von Sambawa in einem blassen ♂ und einem dunklen ♀ mit Spuren des orangen Fleckens am Flügelgrunde längs der Costa.

Rothschild erwähnt dieselbe von S. Celebes, Kalao, Sambawa, Adonara, Pulu Laut.; Swinhoe, Eastern Het., p. 83, n. 374, von Flores und Celebes. Vergleiche auch Snellen in Tijd. v. Ent. XXII, p. 77, n. 34 (1879), (Celebes) und Hampson, Moths of India I, p. 496 sub. n. 1131.

Die Form *renigera* Felder kommt auf Java, die Form *membliaria* auf Borneo, Andamans, Palanan, Philippinen vor.

Genus **Peridrome** Walker.

(S. Rothschild, Nov. Zool. 1896, p. 185, 188.)

121. **P. orbicularis** Walker, Cat. II, p. 445.

Hampson, Ind. Moths I, p. 497 (Sikkim, Assam, Burma, Andamans).

Aganopsis subquadrata Herich-Schäffer, Samml. aussereurop. Schmett. I, p. 12, Fig. 501.

Swinhoe Eastern Het., p. 82 (Borneo, India, Silhet, Cambodja, Singapore).

Pagenstecher, Het. Palawan, Iris III, p. 10, n. 20.

Snellen, Tijd. v. Ent., Bd. 31, p. 123 (1888).

Rothschild (l. c. p. 188) führt diese Art als von Sikkim bis zu Sambawa und den Philippinen vorkommend, Borneo, Palawan, auch von Java auf.

Ich erhielt die Art von Sambawa. Beim ♀ ist die schwarze Randbinde des Hinterflügels breiter und gegen die gelbe Grundfärbung stärker abgesetzt, als bei einem Exemplar von Malacca.

Genus **Neochera** Hübner.

(Rothschild, Nov. Zool. 1896, p. 192, Fig. 1.)

Rothschild zieht 11 Aganaiden in drei Species von Neochera zusammen, nämlich in Inops-Type, Dominia-Type und Marmorea-Type. Die zu dominia Cramer, P. E. III, p. 103, T. 263, Fig. A B (1782) (Rothschild, p. 197, South India) gehörigen Formen von Eugenia Cramer theilt er in verschiedene Subspecies, nämlich N. eugenia butleri von India, N. eugenia javana (von Java), N. eug. herpa Sn. (von Celebes), Neochera eugenia fumosa (von Sambawa, Pulu Laut und Java), N. eug. proxima (von Timor, Australia); N. eug. basilissa Meyr. (von Australien); N. eug. stibostethia Butler (von Buru), N. eug. affinis (von Halmahera), N. eug. papuana von Neu-Guinea; N. eugenia Cr. von Amboina und Ceram, N. eug. fuscipennis von Neu-Britannia und n. h. heliconides Snellen von Palawan und Philippinen (nicht heliconoides Moore).

Vergl. auch Pagenstecher, Het. Palawan, p. 9 (Iris 1890).

Ich erhielt mehrere dunkel gefärbte Exemplare von Sumbawa, welche ähnlich sind solchen von Borneo. Eugenia-Exemplare von Borneo waren Herrn Rothschild unbekannt. Sie gehören zu der hier zu erwähnenden

122. **Neochera eugenia fumosa** Rothschild. Nov. Zool. 1896, p. 198.

Ein mir von Borneo vorliegendes Exemplar ist noch dunkler blass als das dunkelste der Sambawa-Exemplare. Insbesondere ist der ganze Unterflügel bis auf die helleren Adern dunkel beschattet. Auf der Unterseite ist der ganze Vorderflügel bläulichschwarz, die Adern sind am Grunde und an dem Aussenrande weisslich, der bei andern fumosa-Stücken sich findende weisse Fleck vor dem Apex der Vorderflügel fehlt vollkommen. Die Hinterflügel sind bläulich mit weissen Adern, die sich am Aussenrande verbreitern. Brust gelborange mit schwarzen Flecken, Hinterleib oben und unten gelb mit schwarzen Punkten, nach unten weisslich mit schwarzen Bändern, wie bei Sambawa-Exemplaren.

Bei den verschiedenen Formen von *Neochera* zeigt sich eine bemerkenswerthe Variation nach den Lokalitäten, wie sie sonst von *Heteroceren* selten zu beobachten ist.

### Genus *Asota* Hübner.

Cfr. Rothschild, Nov. Zool. 1896, p. 203 (Hypsa Hübner.)

124. *A. intacta* Walker II, 451 (1856).

Swinhoe, Eastern Het., p. 88, n. 190, Java, Timor, Flores.

Snellen, T. v. E., Bd. 31, p. 138, pl. 2, Fig. 3, 4.

Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 252, Flores.

Von Sumba (Waingape 10. I. 96) erhalten.

125. *A. egens* Walker, Cet. II, p. 453 (1854).

Hampson, Ind. Moths, p. 501, Formosa, India, Siam, Philippinen, Borneo, Java, Celebes.

Swinhoe, Eastern Het., p. 93, China, Silhet, Singapore, Celebes, Borneo, Philippinen.

Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 319, Letti.

Snellen, T. v. E., Bd. 22, p. 80, pl. 7, Fig. 4; Bd. 31, p. 132;

Bd. 34, p. 252, Flores.

Von Sumba (Waingapu 11. XI. 95).

### Genus *Aganais* Boisdu.

(Rothschild, Nov. Zool. 1896, I, p. 61.)

126. *A. ficus* Fabr., Ent. Syst. III, 2, p. 27.

Hampson, Ind. Moths, p. 504, India, Ceylon.

Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 327, Flores.

Snellen, T. v. E., Bd. 31, p. 125.

Swinhoe, East. Het., p. 95, India.

Von Sumba und Sambawa.

## Arctiidae.

Genus **Spilosoma** Steph.

(Alpenus Walker.)

127. **Sp. maculifascia** Walker, Cat. III, 676 (1855).

Alp. m. Butler, Cist. Ent. III, p. 34 (1875).

Swinhoe, East. Het., p. 180, Java.

Spil. m. Pagenstecher in Semon's Forschungsreise V, p. 212,  
T. 13, Fig. 7. Snellen, T. v. E. Bd. 22, p. 100 (Celebes).

Von Sumba (Waingapu 27. XI. 95) erhalten.

Genus **Pelochyta** Hübner.

(Amerila Walker.)

128. **P. astrea** Drury, Ill. Exot. Ent. II, pl. 28, Fig. 2.

Phal. melanthus Cramer III, pl. 286, Fig. B.

Hampson, Ind. Moths II, p. 38, Fig. 18, Formosa, India, Ceylon,  
Burmah. Snellen, T. v. E. Bd. 22, p. 102 (Celebes).

Rhodogatria astraea Swinhoe, Eastern Het., p. 169, India, Ceylon,  
Buru.

Pagenstecher, Het. Aru (Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1886, p. 28, n. 53).

Pagenstecher, Lep. Amboina, p. 34 (Jahrb. 1888).

Von Sumba (Waingapu 24. XII. 95).

Genus **Deiopeia** Steph.

(Utathesia Hübner.)

129. **D. pulchella** Linné, Syst. Nat. I, II, 884.

Phal. lotrix Cramer, P. E. II, pl. 109, Fig. 9.

Hampson, Ind. Moths II, p. 55, Europa, Afrika, India, Ceylon,  
Philippinen, Malay. Archipelag, Neu-Guinea, Australia, Pacific-  
gruppe.

Röber, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 327, Flores.

Snellen, T. v. E., Bd. 34, p. 351, Flores.

Einige kleine Exemplare, ähnlich den javanischen, von Sumba und  
von Sambawa.

## Noctuidae.

Genus **Rivula** Guenée.

130. **R. terrosa** Snellen, Tijd. v. Ent., Bd. XV, p. 66, pl. V, Fig. 10.

Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1884, p. 98, Amboina.

Mehrere Exemplare dieser über Afrika, Sumatra, Celebes, Java, Amboina verbreiteten Art von Sambawa erhalten.

Genus **Cosmophila** Boisduval.

131. **C. fulvida** Guenée, Noct. II, p. 397.

Hampson, Ind. Moths II, p. 409, Fig. 226, Japan, India, Ceylon, Burmah, China, Australia, Salomons, Fiji, Samoa.

Mehrere Exemplare von Sambawa.

Genus **Carea** Walker.

132. **C. subtilis** Walker, Cat. X, p. 479 (1856).

Hampson, Ind. Moths II, p. 422 (India, Ceylon, Andamans, Java.

Butler, Ill. typ. Het. VI, p. 27, T. 10, Fig. 7, ♀ ♂ ♀.

Ein einzelnes Exemplar von Sambawa liegt vor, der Butler'schen Abbildung des ♀ entsprechend, die Hinterflügel aber nicht blos an den Rändern, sondern durchgängig röthlich gefärbt.

Genus **Hypocala** Guenée.

133. **H. spec.**

Ein einzelnes von Sambawa vorliegendes Exemplar steht der *Hypocala subsatura* und *defforata* sehr nahe. 25 Millimeter; kleiner als *defforata*. Vorderflügel fast einfarbig braungrau mit zu schmalen verloschenen dunklen Querlinien vereinigten dunklen Punkten und dunkler Ringmakel. Hinterflügel gelb, in's orange spielend, mit schwarzem Flügelgrund und schwarzer Randbinde, die bei der Hälfte des Aussenrandes nach innen einbiegt und den Aussenrand und Hinterand gelb lässt wie bei *defforeta*, sich dann aber in den ganz schwarzen, nicht durch gelbe Zwischenfärbung, wie bei *defforata*, abgetheilten Flügelgrund verliert. Brust und vorderer Theil des Hinterleibes braungrau, der hintere aber gelb mit schwarzen Ringen und gelbem Afterbüschel, unten röthlichgelb, Unterseite der Vorderflügel röthlichgelb mit schwarzer Rand- und Querbinde, die längs des Innenrandes sich vereinigen. Hinterflügel röthlichgelb mit schwarzer Aussenrandsbinde.

Ob die Art noch unbeschrieben ist, konnte ich bisher nicht erfahren. Ich würde sie *villata* nennen.

Genus **Anisoneura** Guenée.

134. **A. obscurata**, n. spec. Taf. III, Fig. 4.

Von Sumba liegt mir ein Exemplar einer auch von Java in meiner Sammlung vertretenen Art vor, von welcher, da sie auch Herrn Snellen



unbekannt war, ich annehmen zu dürfen glaube, dass sie noch unbeschrieben ist.

♂ 60 mm Ausmaass. Palpen aufwärts gekrümmt, bräunlich, zweites Glied beschuppt, drittes Glied länger, spitz, am Ende heller braun, wie an der Basis. Antennen zu  $\frac{1}{3}$  der Vorderflügel reichend, fadenförmig, kurz bewimpert. Schulterdecken und Hinterleib bräunlich, unten wie die Brust heller, Beine hellbraun, Tarsen gefleckt.

Oberseite sämtlicher Flügel dunkelbraun, violett schimmernd, mit helleren und dunkleren Zickzacklinien und Querbändern. Auf den Vorderflügeln eine hellere gezackte Querlinie zu  $\frac{1}{3}$ , eine gleiche stärker entwickelte zu  $\frac{2}{3}$ , zwischen beiden eine helle punktförmige Makelandeutung. Nach aussen von der zweiten hellen Zickzacklinie in der Flügelmitte ein rundlicher, röthlichbrauner Fleck, der sich nach dem Vorderwinkel verbreitert. Nahe dem Aussenrande zwei schwärzliche, gezackte Querlinien, heller eingefasst. Fransen des gewellten Aussenrandes bräunlich, Hinterflügel mit mehreren helleren und dunkleren Querlinien, längs des Aussenrandes gedoppelt auftretend. Unterseite sämtlicher Flügel hellgraubraun mit dunkleren leicht gezackten Querlinien, die nach aussen hell erscheinen. Auf den Vorderflügeln markirt sich eine innere helle Querlinie, eine mittlere gezackte dunkle und eine lichte nahe dem Aussenrande. Auf den Hinterflügeln laufen zwei innere dunkle, nach aussen leicht convexe Querlinien durch die innere Hälfte, im äusseren Drittel eine helle, beiderseits dunkel beschattete. Helle Fransenlinien vor den dunklen Fransen des gewellten Aussenrandes.

### Genus *Spiredonia* Hübner.

135. **Sp. feducia** Stoll Cramer, P. E. V, pl. 36, Fig. 3.

Hampson, Ind. Moths I, p. 458 (India, Ceylon, Burmah, Andamans, Java). Snellen, T. v. E. Bd. 22, p. 92 (Celebes).

Von Sumba (Waingapu 8. I. 96) und Sambawa mehrfach erhalten.

### Genus *Nyctipao* Hübner

136. **N. macrops** Linné, Syst. Nat. ed. XII, III, p. 225; Cramer, Pap. Ex. T. 174, Fig. A, B; Snellen, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 252 (Flores).

Hampson, Ind. Moths II, p. 459 (Afrika, Madagascar, India, Ceylon, Burmah).

Röber, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 328 (Flores, Letti).

Von Sumba und Sambawa.

137. **N. hieroglyphica** Drury, Ill. Exot. Ent. II, p. 3, pl. II, Fig. 1.  
Hampson, Ind. Moths II, 459 (Madagascar, India, Ceylon, Burmah,  
Malacca, Philippinen, Java, Ternate).  
Von Sumba erhalten.
138. **N. crepuscularis** Linné, Syst. Nat. I, 2, p. 811.  
Hampson, Ind. Moths II, p. 461 (Japan, China, India, Ceylon,  
Burmah, Sumatra, Java, Borneo, Philippinen).  
Von Sumba.

Genus **Hulodes** Guenée.

139. **H. caranea** Cramer, P. E. III, pl. 269, E, F.  
Hampson, Ind. Moths II, p. 462 (Formosa, India, Ceylon, Burmah,  
Java). Snellen, T. v. E. Bd. 23, p. 98 (Celebes).  
Snellen, Tijds. v. Ent., Bd. 34, p. 255 (Flores).  
Von Sambawa.

Genus **Polydesma** Bois.

(Girpa Walker.)

140. **P. inangulata** Guenée, Nat. III, p. 210.  
Hampson, I. M. II, p. 47, Fig. 262 (Natal, China, India, Ceylon,  
Burmah, Andamans, Australia).  
Von Sumba und Sambawa.

Genus **Lacera** Guenée.

141. **L. alope** Cramer, P. E. III, pl. 286, E, F.  
Hampson, I. M. II, p. 491, Fig. 277 (S. Afrika, Madagascar,  
Japan, China, India, Ceylon, Burmah, Andamans).  
Von Sumbawa.

Genus **Ophiusa** Guenée.

142. **O. illibata**, Fabr., Syst. Ent., p. 592.  
Hemeroblemma peropaca Hübner, Zutr. III, p. 30, Fig. 541, 542.  
Hampson, I. M. II, p. 495 (China, India, Ceylon, Burmah).  
Snellen, T. v. E. Bd. 23 p. 99 (Celebes).  
Von Sambawa.
143. **O. cramerii** Moore, Lep. Ceyl. III, p. 177, pl. 171, Fig. 2.  
Hampson, Ind. Moths II, p. 502 (India, Ceylon, Burmah, Andamans).  
Von Sumba (Waingapu 4. XII. 95).

144. **O. onelia** Guenée, Noct. III, p. 256.  
*N. lageos* Guenée, l. c. p. 256.  
 Hampson, I. M. II. p. 502 (China, India, Ceylon, Burmah, Java, Penang).  
 Von Sambawa.
145. **O. coronata** Fabr., Syst. Ent., p. 596.  
*Corycia magica* Hübner, Intr. III, p. 32, Fig. 535, 536.  
 Hampson, I. M. II, p. 502 (India, Ceylon, Burmah, Andamans, Java, Australia).  
 Von Sumbawa mehrfach.
146. **O. honesta** Hübner, S. Exot. Schm., pl. 203, Fig. 1, 2.  
 Hampson, I. M. II, p. 504 (Philippinen, India, Ceylon, Burmah, Andamans).  
 Forbes, Mal. Arch. II, p. 89 (Timorlaut).  
 Von Sambawa erhalten.
147. **O. fulvotaenia** Guenée, Noct. III, p. 272.  
 Moore, Ceyl. Lep. III, pl. 171, Fig. 1. Snellen, T. v. E. Bd. 23, p. 102 (Celebes).  
 Hampson, Ind. Moths II, p. 504 (Japan, China, Formosa, India, Ceylon, Burmah, Sumatra, Java).  
 Von Sumba (Patadala 16. XI. 95 und Waingapu 25. XI. 95) erhalten.
148. **O. (?) cyanea** Snellen, Tijds. v. Ent., Bd. 24, p. 129, T. 14, Fig. 2, 2a (Luzon, 1882).  
 Von dieser schönen, auf Tafel I, II, Figur 5 abgebildeten Noctua, welche bisher nur von den Philippinen bekannt war, erhielt ich mehrere Exemplare von Sumbawa, neuerdings eines in einer Sendung aus Java. Snellen setzt sie als fraglich zu *Ophiusa*; vielleicht steht sie besser bei den *Glottuliden*. Ihr Vorkommen soweit westlich ist bemerkenswerth.

### Genus **Hypaetra** Guenée.

149. **G. bubo** Hübner, Intr. IV, p. 13, Fig. 633, 634.  
 Hampson, I. M. II, p. 508, Fig. 283 (Nilgiris, Ceylon, Andamans).  
 Von Sumba (Patadala 13. XI. 95 und 16. XI. 95) erhalten.

### Genus **Serrodes** Guenée.

150. **S. inara** Cramer, P. E. III, pl. 239 E.  
 Hampson, I. M. II, p. 510, Fig. 285 (Afrika, India, Ceylon, Burmah, Java, Borneo, Australia).  
 Von Sambawa und Sumba.

Genus **Remigia** Guenée.

151. **R. archesia** Cramer, P. E. III, pl. 273, F. G.  
Hampson, I. M. II, p. 526 (Ethiopian and oriental regions, N.-China).  
Röber, Tijds. v. Ent., Bd. 34, p. 328 (Key).  
Von Sumba.

Genus **Entomogramma** Guenée.

152. **E. spec.** Ein in der Nähe v. *E. tortum* Guenée III, p. 202, stehendes  
Männchen blieb bis jetzt unbestimmt.

Genus **Ischyja** Hübner.

153. **J. manlia** Cramer, T. E. I, pl. 92 A.  
Hampson, Ind. Moths II, p. 538 (Philippinen, India, Ceylon,  
Burmah, Andamans, Java).  
Von Sumba (Patadala 15. XI. 95 und 16. XI. 95).  
154. **J. schlegelii** Snellen, Tijds. v. Ent., Bd. 28, p. 4, pl. 1, Fig. 2.  
Hampson, Ill. Het. Br. M. XIII, p. 8, pl. 147, Fig. 19 (I. glaucoptera).  
Hampson, I. M. II, p. 538 (Nilgiris, Burmah, Java).  
Von Sumba (Patadala 12. XI. 95).

Genus **Ommatophora** Guenée.

155. **O. luminosa** Cramer, P. E. III, pl. 274 C, D.  
Hampson, Ind. Moths II, p. 582, Fig. 313 (Sikkim, Assam, Java,  
Philippinen).  
Von Sambawa.

Genus **Spirama** Guenée.

156. **Sp. retorta** Cramer II, pl. 116, Fig. T.  
Hampson, I. M. II, p. 553, Fig. 314 (Japan, China, India, Ceylon,  
Burmah, Andamans, Java).  
Var. *triloba*, Guenée III, p. 197.  
Von Sambawa als *retorta*, von Sumba als *triloba* erhalten.

Genus **Ophideres** Boisd.

157. **O. salaminia** Fabr., Ent. Syst. III, 2, p. 17.  
Hampson, I. M. II, p. 559 (Madagascar, Formosa, Oriental region  
to. Australia und Fiji); Moore, on Ophideridae, p. 71.  
Von Sumbawa.

158. **O. fullonica** Linné, Syst. Nat. I, 2, p. 812; Hampson, I. M. II, p. 560 (Afrika, Oriental region to New-Guinea and Australia); Moore, on Ophid. p. 64; Röber, T. v. E., Bd. 34, p. 327 (Key).  
Mehrfach von Sumbawa.
159. **O. materna** Linné, Syst. Nat. I, 2, p. 840.  
Hampson, Ind. Moths II, 561 (India, Ceylon, Burmah, Andamans, Java).  
Moore, on Oph., p. 74.  
Von Sumbawa und Sumba (12. XI. 95).
160. **O. crocale** Cramer II, p. 59, T. 134, Fig. B.  
Moore, on Oph., p. 73; Hampson, Ind. Moths III, 563 (Coromandel, Silhet, Java).  
Von Sumba und Sumbawa.

## Deltoidae.

### Genus **Hydrillodes** Guenée.

161. **H. lentalis** Guenée, Delt. et. Pyr., p. 66, pl. 5, Fig. 3; Hampson, I. M. II, 53 (S. Africa, Japan, India, Ceylon, Burmah, Andamans, Borneo, Celebes, Australia).  
Von Sumbawa.

### Genus **Corcobara** Moore.

162. **C. angulipennis** Moore, Lep. Atk., p. 180, pl. 6, Fig. 16; Hampson, Ind. Moths III, p. 69 (Sikkim, Ceylon, Singapore).  
Von Sumba (Patadala 15. XI. 95) in einem Exemplar erhalten, bei welchem der schwarze Fleck der Hinterflügel verloschen erscheint.

### Genus **Pinacia** Hübner.

163. **P. molybdaenalis** Hübner, Samml. 435, 436.  
Röber, Tijds. v. Ent., Bd. 34, p. 329 (Letti, Timorlaut, Flores).  
Von Sumba (Patadala 7. XI. 95) mehrfach erhalten.



## Uranidae.

### Micronidae.

Genus **Micronia** Guenée.

164. **M. sondaicata** Guenée, Phal. II, p. 26.  
M. aculeata Guenée, p. 26; Hampson, I. M. III, p. 567 (China, Formosa, India, Burmah, Andamans, Java, Borneo).  
Micr. gannata Guenée, p. 26. Snellen, T. v. E. Bd. 24, p. 84 (Celebes).  
Mehrfach von Sumba (Waingapu 17. XII. 95).

## Geometridae.

Genus **Zeheba** Moore.

165. **Z. lucidata** Walker, Cat. XXVI, p. 1651.  
Z. aureata Moore, Lep. Ath., p. 263.  
Hampson, I. M. III, p. 203 (Sikkim, Khasia, Nilgiris, Ceylon, Java, Borneo, Cap York).  
Von Sumba (Patadala 16. XI. 95).

Genus **Macaria** Curtis.

166. **M. sufflata** Guenée, Phal. II, p. 88, pl. 17, Fig. 4; Hampson, I. M. III, p. 206 (China, India, Ceylon, Burmah); Röber, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 231 (Flores).  
Ein Exemplar von Sumba.

Genus **Hyposidra** Guenée.

167. **H. vampyraria** Snellen, T. v. E. Bd. 24, p. 90, T. 9, Fig. 3, 3a (Celebes).  
Von Sambawa.  
168. **H. janiaria** Guenée. Ur. et Phal. II, p. 150.  
Snellen, T. v. E. Bd. 24, p. 88 (Celebes).  
Röber, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 332 (Flores).  
Von Sumba.

Genus **Abraxas** Leach.

169. **A. subhyalinata** Röber, Tijd. v. Ent., Bd. 34, p. 333, Bd. 35, T. 5, Fig. 3 (Flores).  
Mehrere Exemplare von Sumba (Patadala 12. XI. 95, 15. XI. 95 und 10. XI. 95) etwas variierend.

Die Anordnung der gelblichen und schwärzlichen Flecke am Aussenrande entspricht bei meinen Exemplaren nicht ganz der Abbildung, in-

dem die schwarze Verbindung des Aussenrandes mit dem Vorderande fehlt; statt dessen steht am Vorderrand ein rundlicher schwarzer Fleck, so dass der weisse Grund bis zum Apex reicht. Ebenso fehlt der schwarze Mittelpunkt des Hinterflügels. Doch ist kein Zweifel an derselben Art.

Genus **Eumelea** Duman.

170. **E. rosalia** Cramer, P. E. IV, p. 152, pl. 368 F.

Hampson, I. M. III, p. 320 (China, Formosa, India, Ceylon, Burma, Malayan- und Austro-malayan subregion).

E. aureliata Snellen, Tijds. v. Entom., Bd. 34, p. 255 (Flores).

Einige Exemplare von Sambawa und Sumba (Patadala 14. XI. 95).

Genus **Agathia** Guenée.

171. **A. lycaenaria** Kollar, Hügel's Kaschmir IV, p. 486; Hampson, Ind. Moths III, p. 885 (China, India, Ceylon, Borneo, Penang, Java). Snellen, T. v. E. Bd. 24, p. 79 (Celebes).

Ein Stück von Sambawa.

**Pyalidae.**

Genus **Botys** Treitschke.

172. **B. illialis** Walker, Cat. XVIII, p. 563.

Lederer, Pyralides in Wien. Ent. Mon. VII, p. 371, T. IX, Fig. 12 (Amboina).

Von Sambawa.

Genus **Cydalima** Lederer.

173. **C. conchylalis** Guenée, Delt. et Pyr., p. 303, pl. 8, Fig. 9; Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 1885, p. 106 (Amboina).

Snellen, Trans. Ent. Soc. 1890, p. 606 (Sikkim).

Von Sambawa.

174. **C. elwesialis** Snellen, Tr. Ent. Soc. 1890, p. 607, pl. XIX, Fig. 1, 1 a (Sikkim).

Ein Exemplar dieser schönen Pyralide von Sambawa liegt vor.

Genus **Glyphodes** Guenée.

175. **G. bivitalis** Walker, Cat. 68, p. 496.

Pagenstecher, Jahrb. etc. 1888, p. 108.

Snellen, Trans. Ent. Soc. 1890, p. 618 (Sikkim).

Von Sambawa.

Genus **Margaronia** Hübner.

176. **M. amphitritalis** Guenée, Delt. et Pyr., p. 307, n. 327 (1853).  
 Pagenstecher, in Semon Forschungsreise, p. 221, T. XIII, Fig. 9  
 (1895).  
 Snellen, Trans. Ent. Soc. 1890, p. 619 (Sikkim).  
 Snellen, Tijd. v. Ent., Bd. 38, p. 29 (Java).  
 Von Sambawa.

Genus **Oligostigma** Guenée.

177. **O. spec.** Von Sumba (Patadala 6. XI. 95) liegt ein bis jetzt  
 unbestimmtes Exemplar vor.

Bei Schluss der Correctur kommt mir die Arbeit von Meyrick „on Pyralidina from the Malay Archipelago“ in den Transactions of the Entom. Society of London 1894, p. 455 vor Augen. Diese Schrift behandelt die von Doherty auf Sambawa, Celebes, Pulo Laut (Borneo) und S. O. Borneo gesammelten, im Besitze von Elwes befindlichen Pyraliden. Meyrick bemerkt dabei, dass die Fauna von Sambawa die Folgen der Isolation zeige, insofern einige Arten deutlich von dem normalen Typus abweichen. Ich registriere die nachfolgenden auf Sambawa gefundenen Arten (mit Angabe weiterer Fundorte).

- Margaronia laticostalis* Gn. (Pulo Laut).  
*M. pomonalis* Gn.  
*M. costiflexalis* Gn.  
*M. conclusalis* Walk.  
*M. bicolor* Swains.  
*Coptobasis lunalis* Gn. (Celebes, S. O. Borneo).  
*Tylostega schematias* Meyr. (Pulo Laut, S. O. Borneo, Celebes).  
*Conogethes cliolalis* Walk.  
*Aripa maritima*, Walk.  
*A. abdicalis* Walk. (Pulo Laut, S. O. Borneo).  
*C. haemactalis* Snell. (Pulo Laut).  
*C. punctiferalis* Gn. (Pulo Laut, Celebes).  
*C. sublituralis* Walk.  
*Saroscelis nicoalis* Walk. (S. O. Borneo).  
*Dichocrocis pandamalis* Walk. (frenatalis Ld., Pulo Laut, S.O. Borneo).  
*Notarcha quaternalis* Z.  
*N. multilinealis* Gn. (Pulo Laut, Celebes).  
*Phlyctaenia itemalesalis* Walk.  
*Pyrausta incisalis* Walk.  
*P. ablactalis* Walk. (S. O. Borneo, Celebes).  
*P. damastesalis* Walk.  
*Dasycopa homogenes* Meyr.  
*Ischnoscopa chalcocoma* Meyr.  
*Metasia didasalis* Walk.

*Metasioides achromatias* Meyr.  
*M. lilliputalis* Snell. (?)  
*M. tholerapa* Meyr.  
*Ptilaeola collaris* Walk. (Pulo Laut).  
*Diathrausta profundalis* Ld.  
*Diasemia grammalis* Doubl. (S. O. Borneo).  
*Agathodes ostensalis* Hb.  
*Stegothyris diagonalis* Gn.  
*Pleonectusa macaralis* Walk. (Pulo Laut).  
*Nistra caelatalis* Walk. (S. O. Borneo, Celebes).  
*Hydriris ornatalis* Dup. (Pulo Laut, S. O. Borneo).  
*H. retractalis* Walk. (opalina Moore, Pulo Laut, S. O. Borneo).  
*Pinacia fulvidorsalis* Hb.  
*Siriocauta testulalis* Hb.  
*Nausinoe lindalis* Walk.  
*Symmoracma spodinopa* Meyr.  
*Mixophyla renatalis* Walk (— usalis) (erminea Moore).  
*Pterygisus foedalis* Gn. (Pulo Laut).  
*Hydrocampa oxygona* Meyr.  
*Oligostigma orthoteles* Meyr.  
*O. aureolalis* Snell.  
*O. gibbosalis* Gn. (plicatalis Walk.); (hamalis Sn.) (Celebes).  
*O. basilissa* Meyr.  
*Scirpophaga mnesidora* Meyr.  
*Endotricha decessalis* Walk.  
*E. orthotis* Meyr.  
*Pyrallis manihotalis* Gn.  
*Balanotis euryptera* Meyr.  
*Crasigenes microspila* Meyr.  
*Addaea trimeronalis* Walk.  
*Siculodes argentalis* Walk (Pulo Laut).  
*Myclois pulehra* Butl.  
*Ephestia desuetella* Walk.  
*Prasinoxena hemisema* Meyr.  
*Crambus malacellus* Dup.

Eine Uebersicht der erhaltenen Heteroceren von Sumba und Sambawa, deren Zahl allerdings viel zu klein ist, ergiebt fast nur Arten, welche im ganzen malayischen Archipel und selbst darüber hinaus eine weite Verbreitung haben.

Doherty führt 130 Tagfalter von Sumba auf (und 22 von Sambawa). Ich habe von beiden Inseln 110 Arten notirt, die ich erhalten habe (wozu noch 4 unbestimmte kommen). Ungefähr 30 von

diesen sind bei Doherty nicht verzeichnet. Die Zahl der von beiden Inseln bekannten Tagfaltern wird also über 180 betragen, vorwiegend indischen Characters. Elwes (Trans. Ent. Soc. 1894, LXXX) macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass die Forschungen Doherty's ein Ueberwiegen der indischen Typen gegenüber den australischen zeigen.

---

## Tafel-Erklärung.

---

### Taf. I, II

- Figur 1. *Papilio sallastius* Staudinger (♂), Sambawa.  
" 2. *Pieris julia* Doherty (♂), Sambawa.  
" 3. *Papilio eurypylides* Staudinger (♂), Sambawa.  
" 4. *Delias periboea* W. (♂), Sambawa.  
" 5. *Ophiusa* (?) *cyanea* Snellen (♂), Sambawa.  
" 6. *Charaxes jovis* Staudinger (♂), Sambawa.  
" 7. *Cethosia tambora* Doherty (♂), Sambawa.  
" 8. *Delias oreia* Doherty (♀), Sambawa.

### Taf. III.

- Figur 1. *Papilio canopus* Westw., var. *sumbanus* (Sumba).  
" 2. *Euploea atossa* Pag. ♀ (Sambawa).  
" 3. *Delias fasciata* Gr. Sm. ♂ (Sumba).  
" 4. *Anisoneura obscurata* Pag. (Sumba).  
" 5. *Zemeros strigatus* Pag. ♂ (Sumba).
-



BEITRAG

ZUR KENNTNISS DER

RHOPALOCEREN-FAUNA

DER

INSEL BAWEAN.

VON

**DR. B. HAGEN**

HOMBURG (PFALZ).

HIERZU TAFEL IV.

---



Im Jahre 1891 erbot sich ein nach seiner Heimathinsel zurückkehrender Baweanese, mir dort Schmetterlinge zu sammeln. Da ich diese Localität schon längst ihrer Lage wegen — zwischen Java und Borneo — im Auge hatte, so willigte ich gern in einen kleinen Vorschuss, obwohl der Mann vom Schmetterlingsfang so gut wie Nichts verstand, und mir auch keine Zeit blieb, ihn, wenn auch nur nothdürftig, abzurichten. Ein paar Monate später kehrte er zu mir nach Deli (auf der Ostküste Sumatra's) zurück und brachte mir seinen Fang, bestehend in 144 Stück im Allgemeinen recht gut erhaltener Tag-schmetterlinge, zu 42 Arten gehörend. Der Mann hatte seine Aufmerksamkeit offenbar nur auf die grösseren, auffallenderen Thiere gerichtet, denn von Hesperiden befand sich nur ein einziges Stück, und von Lycaeniden gar keines in der Sammlung.

Bevor ich dieselbe bespreche, seien mir einige kurze Angaben über die Insel Bawean gestattet, deren Namen nicht Jedem geläufig sein dürfte.

Bawean, auch wohl Lubak genannt, ist eine kleine runde Insel, 165 Quadratkm. gross, zwischen Borneo und Java, 20 geogr. Meilen direkt nördlich von der Westspitze der Insel Madura gelegen. Geographische Position: Zwischen  $5^{\circ} 43'$  und  $5^{\circ} 52'$  s. Br. und  $112^{\circ} 34'$  und  $112^{\circ} 44'$  ö. L. Sie ist ziemlich gebirgig, mit Spitzen bis nahe an 700 m Höhe, z. B. den drei Centralgipfeln Gunong besar (658 m), Gunong Waringin (654 m) und Gunong tinggi (635 m). Ich habe die Insel nur einmal flüchtig im Vorbeifahren gesehen; ihre mässig steilen Berghänge waren bis zum Gipfel hinauf bewaldet. Dass dieselbe vulkanischen Ursprungs ist, beweist der Kratersee Telaga Kastobo,  $\frac{1}{2}$  Std. Gehens im Umfang und ca. 139 m tief, sowie 5 über die Insel vertheilte heisse ( $40^{\circ}\text{C.}$ ), Schwefelverbindungen enthaltende Quellen. Das Gerippe der Insel besteht aus Leucitgestein, das sonst im indischen Archipel nur noch an zwei Bergen in Java (dem todten Vulkan Ringgit in Besoeeki und dem Moeria in Japara) vorkommt. Die Sedimente der

Küstenebenen bestehen aus Mergel, Kalk- und Sandstein; ein feiner, weisser Quarzsand, sehr geeignet zum Bekleiden der Schmelzöfen, wird in beträchtlicher Menge nach Soerabaja verschifft. Zwischen den Sandsteinlagen findet sich eine doppelte Lage werthloser Braunkohlen. Die Umgebung von Bawean ist sehr klippen- und korallenreich, die Schifffahrt desshalb dort nicht ungefährlich. Von den Centralbergen herab rinnen zahlreiche Bäche, die aber in der Zeit des Ost-Musson alle austrocknen bis auf den Bach bei dem Kampong Tamba. Die Thäler und Ebenen sind meist zu Sawahfeldern für den Reisbau hergerichtet.

Die Insel ist sehr bevölkert, ca. 40 000 Einwohner, mit 8 grösseren, längs des Strandes vertheilten Dörfern. Die stattlichste Ansiedelung, zugleich der Wohnsitz des höchsten holländischen Beamten, eines Assistent-Residenten, ist im Süden die Stadt Sankapura mit etwa 5000 Einwohnern, im Norden der Handelsplatz Tamba.

Der Baweanese ist eine Unter- oder Spielart der Bewohner von Madura, unter deren Fürsten die Insel früher stand, und deren Zunge er noch redet. Es ist ein unersetzter, kräftiger Menschenschlag, kühn, treu und ehrlich und für ein Tropenvolk auch recht arbeitsam. Uebervölkerung und eine gewisse Reiselust zwingen die jungen Leute, ausser Landes zu gehen und ihr Brod als tüchtige Matrosen, vortreffliche Pferdeknechte und geschickte Zimmerleute in der Fremde zu suchen. Ich habe viele hunderte von ihnen auf den Plantagen der Ostküste Sumatras kennen und schätzen gelernt und Singapore ist ihnen sozusagen ein zweites Vaterland geworden, wo sie einen eigenen grossen Kampong inne haben. Sie sind durchweg fanatische Mohamedaner und kennen kein höheres Ziel, als sich so viel wie möglich Geld zusammenzusparen, um baldigst ihre fromme Pilgerfahrt nach Mekka antreten und Hadji werden zu können.

Ueber die Vegetation der Insel ist aus Mangel an Berichten nicht viel zu sagen; sie wird, ebenso wie Java und Borneo, ihre grossen Nachbarn, der gewöhnlichen indomalaischen Flora angehören. Djati-(Eisenholz-)bäume sind häufig, ihr Holz jedoch von schlechter Beschaffenheit. Prof. Veth in seinem Buch über Java spricht von besonders schönen und werthvollen Calophyllumbäumen (*Caloph. inophyllum* L.) und reichen Cajeputbeständen auf Bawean, wobei aber nicht an *Melaleuca Cajuputi* Rxb. zu denken sei, da dieser Name auch einer Reihe anderer Bäume mit ätherischem Oelgehalt gegeben werde. Von Fruchtbäumen finden sich besonders Manggas und Kokosnüsse angebaut.

In der Fauna ist besonders merkwürdig eine eigenthümliche Hirschart mit langem, haarigem, nach oben aufgebogenem Schwanz, *Cervus Kühlii*, und eine besonders grosse Civettkatze; auch wird eine kleine, aber tüchtige Ponyrasse dort gezüchtet. Die Affen sollen auf Bawean so häufig sein, wie sonst nirgends im Archipel; ebenso soll es viele fliegende Hunde (*Kalongs*, *Pteropus*) und namentlich Wildschweine geben, die der Insel eigentlich ihren Namen verschafft haben sollen; *Pulobabian* heisst wörtlich übersetzt: Schweine-Insel.

Ueber die Vogelwelt Baweans hat Dr. Vordermann in Batavia eine Liste in der *Natuurk. tijdschr. v. Nederl. Indie* veröffentlicht, die 16 durchweg von den benachbarten Inseln bereits bekannte Arten umfasst.

Schmetterlinge sind meines Wissens bislang auf der Insel nicht gesammelt worden, wenigstens habe ich in der Literatur Nichts gefunden, und das mag für die nachfolgende unbedeutende Liste als Entschuldigung dienen. Denn die Lage Baweans zwischen zwei faunistisch ziemlich verschiedenen Inseln, wie Java und Borneo, ist, wie gesagt, zoogeographisch von Interesse. Da die Insel jedoch über doppelt so viel näher an Java-Madura als an Borneo liegt, so kann man schon von vornherein annehmen, dass der Einfluss Javas überwiegen wird. Aber es lässt sich auch erwarten, dass Borneo ebenfalls seinen kleinen Beitrag geleistet hat. Und drittens wird doch die Wasserstrasse von 20 geographischen Meilen Breite immerhin ein gewisses Hemmniss für die Einwanderung gebildet und die Entwicklung von Lokalformen durch Inzucht begünstigt haben. Zu vergessen ist auch nicht der offene Weg nach Süd-Celebes und die Nähe der kleinen Sunda-Inseln, von woher jedenfalls die in diesem Gebiet einigermassen frappirende *Danais* abigar gekommen ist.

Da die nachfolgende Liste nur lückenhaft ist und wenig charakteristische Arten enthält, so wäre dringend zu wünschen, dass sich ein tüchtiger Sammler einmal dahin begäbe und reichhaltigeres Material lieferte; noch interessanter aber dürfte sich eine Untersuchung der benachbarten, nur wenig weiter nach Osten liegenden Inselgruppen Solombo und Kangelang gestalten. Sind wir doch hier in der Nähe der berühmten Wallace'schen Grenzlinie zwischen indischer, resp. malayischer, und australischer Fauna, einer Grenzlinie, die so, wie sie Wallace gezogen, vom lepidopterologischen Standpunkte aus nicht aufrecht zu halten ist.



Schliesslich sei mir noch ein Wort der Selbstvertheidigung gestattet. Dr. Staudinger entsetzt sich über die Art und Weise meiner Benennung neuer Arten, die so unlateinisch wie möglich sei\*) und fürchtet, dass man schliesslich noch dahin kommt, einen *Papilio Müller*, *Schulze* oder *Meyer* (*Meyeri* giebt's ja schon!) zu nennen. Ihn jammert der Zeiten Verderbniß; wo bleibt unsere schöne, gute, alte, lateinische Binomenclatur? Nun muss ich offen gestehen, ich wusste gar nicht, dass wir noch eine lateinische Nomenclatur haben, wie sie Vater Linné selig eingeführt hatte; die heutige hielt ich für gräcolatinisch, ja, Vater Linné selbst gebrauchte schon eine Menge griechischer Namen. Ich habe gerade keine Lust, mich hinzusetzen und die Namen auf ihren griechischen oder lateinischen Ursprung hin abzuzählen, aber ich bin fest überzeugt, man wird ein bischen sehr viel Griechisch in dieser lateinischen Nomenclatur entdecken. Ich habe mir nun das so erklärt, dass ich annahm, die lateinische Sprache, oder meinetwegen die Kenntniss derselben, habe für den ungeheuer gesteigerten Bedarf an systematischen Namen nicht so recht ausgereicht, und man habe darum Hilfstruppen aus der griechischen Sprache herbeigeholt. Ich vermuthe auch, dass der selige Linné selbst weniger Werth auf das specifisch Lateinische seiner Namen gelegt hat, als Dr. Staudinger. In der neueren Zeit scheint nun auch das Griechische nicht mehr zu genügen, oder auch vielleicht ist das Niveau der classischen Bildung unserer Naturforscher — will sagen Entomologen — gesunken, kurz, es macht sich die betrübliche Erscheinung geltend, dass allerhand barbarische Wörter in unsere schöne, so überaus classische Nomenclatur hineingerathen. Die bösen Amerikaner treiben es hierin am ärgsten, aber auch die Engländer stehen nicht viel nach. War es nicht ein englischer Entomologe, der geradezu gesagt hat: *Nonsense names are the best?* — Die Zeiten ändern sich; wer giebt heute noch eine lateinische Diagnose? Dr. Staudinger hat seine Doctordissertation sicherlich noch lateinisch verfasst; ich junger Fant nicht mehr. Ernstlich gesprochen: Die lateinische — rectius: gräcolateinische Nomenclatur fängt an alt und eng zu werden, und sogar an der Hauptsache, an der **Binomenclatur**, wird gerüttelt. Wer's nicht glaubt, der nehme *Rothschild's Papilionidenarbeit* zu Hand, oder *A. B. Meyer's ornithologische Arbeiten*. Was hat denn die ganze Systematik für einen

---

\*) *Iris* Bd. IX H. 1, p. 184, Anmerk.

Zweck? Lateinische Stilübungen zu veranstalten, oder ein bestimmtes naturwissenschaftliches Object kurz und bündig zu präcisiren und zu fixiren? Ob ich meinen Schmetterling Peter oder Michel heisse, was schadet das? Linné hat seine alten trojanischen Helden zu diesem Zweck wieder lebendig gemacht, warum soll ich nicht dasselbe mit unsern deutschen oder andern thun dürfen? Wozu soll ich die erst lateinisiren? Die Zeit, wo die Völker sprachlich so getrennt waren, dass das Latein die Brücke bilden musste zum gegenseitigen Verständniss, ist allgemach vorbei; eine deutsche, englische oder französische Diagnose bereitet mir bedeutend weniger Schwierigkeit, als eine küchenlateinische; und ich bin doch auch durch's Gymnasium gelaufen, und war keiner der schlechtesten Lateiner!

Ich fechte übrigens gegen Windmühlen; denn ich werde jetzt beweisen, dass gerade der Name, woran Dr. Staudinger seine Ent-rüstung über das Unlateinische meiner Namengebung knüpft, beinahe vom reinsten, classischsten Latein ist. Die Sache betrifft nämlich meinen armen Charaxes Sulthan. Dass Charaxes nicht lateinisch ist, dafür kann ich nichts; die Gattung hiess nun einmal schon vor meiner Geburt so. Bleibt also Sulthan. Obwohl nun Dr. Staudinger ganz richtig auseinandersetzt, was das Wort Sultan bedeutet, nämlich keinen Eigennamen, so behandelt er es doch ganz wie einen solchen und exemplifizirt auf Orleans, Meyer und Müller, für die er überall den Genitiv postulirt, »wenn die lateinische Binomenclatur wirklich Gültigkeit behalten soll«. Er verlangt also Sultani, eventuell Kaiser (von Kaiser), Kingi (von King) etc. Der selige Linné ist nicht so streng gewesen, er hat den Papilio, als er ihn dem verstorbenen Agamemnon widmete, einfach Agamemnon ohne Genitiv genannt. Und das war ein Eigennamen. Nun ist aber Sultan gar kein Eigennamen, sondern ein Titel, die Bezeichnung einer Würde, wie imperator, rex, dux. Dux, da haben wir's! Dr. Staudinger beschreibt einen Schmetterling — zufällig auch einen Charaxes — Dux. Charaxes Dux! Warum denn nicht Ducis? Wo bleibt denn der Genitiv? Ja so, dux ist ein lateinisches Wort und Sulthan nicht! In meiner Verzweiflung bin ich zu meinem Leibphilologen gelaufen — ich rathe Jedem, der einen neuen Schmetterling beschreiben will, sich einen solchen zu halten — und habe ihm meine Noth geklagt. Und da hat mir denn derselbe die tröstliche Versicherung gegeben, dass es vollkommen zulässig sei und durch Stellen aus lateinischen Autoren bewiesen werden könne,

dass Namen von einem Kaliber wie Sultan unverändert, d. h. ohne lateinische Endung in die lateinische Sprache herübergenommen werden könnten. Damit war für mich die Sache erledigt. So lange Dr. Staudinger seinen *Charaxes dux* nicht in *ducis* umändert, so lange kann er auch nicht von mir verlangen, dass ich den hübschen, wohlklingenden Namen *Sulthan* in *Sulthani*, sondern höchstens in *Sulthanus*, umändere. Thun würde ich übrigens auch das nicht.

Uebrigens, seit wann denn diese Genitivwuth? Dr. Staudinger verleiht seinen Schmetterlingen ganz ruhig Namen, wie z. B. (ich greife nur einige heraus): *Pyrrhogyra Catharina*, *Agrias Beata*, *Agrias Paulus*, *Ithomia Laura*, *Tithorea Susanna*, *Papilio Pizarro*, *Tasso*, *Dismorphia Amalia*, *Amblypodia Anna*. Wo bleibt da das Latein? Und der Genetiv? Und die Consequenz?

## 1. Papilionidae.

### A. Papilio.

1. *aristolochiae* Fabr. 3 ♂♂, 1 ♀. Die ♂♂ unterscheiden sich in Nichts von meinen javanischen ♂♂; alle besitzen keinen weissen Fleck in dem Ende der Zelle der Hinterflügel, weder oben noch unten. Das ♀ unterscheidet sich von den ♂♂ dadurch, dass auf den Hinterflügeln der erste weisse Fleck, oberhalb des *Discoidalastes* aber nur sehr schwach, unten gar nicht sichtbar ist, also ein Uebergang zu der var. *austro-sundanus*. Ein von mir auf der Insel Elephanta bei Bombay gefangenes ♂♀ hat diesen Fleck beiderseits, aber nur rudimentär, und unten deutlicher als oben, unterscheidet sich jedoch von den andern Stücken dadurch, dass die weisse Fleckenreihe sich nicht rund und dicht um die Zellenspitze gruppirt, sondern in einer schrägen Linie über 2 mm entfernt an ihr vorbeizieht, so dass z. B. der Fleck oberhalb der *Subcostalis* 4 mm davon entfernt steht.

2. *polytes* L. 12 Stück, wovon 8 ♂♂ und 4 ♀♀, sämmtlich mit recht schmaler weisser Mittelbinde der Hinterflügel, wodurch sie sich sofort von den Exemplaren aus Java, Sumatra und Borneo unterscheiden. Bei den ♂♂ sind die Schwänze ziemlich kurz und die Unterseite der Hinterflügel ist ziemlich einfarbig, indem das Auge im Analwinkel nur durch einige blaue Stäubchen angedeutet und nur bei 2 Exemplaren mit einer Spur Roth gemischt ist. Ein einziges Stück zeigt eine submarginale bleichfleischfarbene Fleckenreihe. Die javanischen ♂♂ sind

gewöhnlich bunter gefärbt, das Analauge manchmal sogar auf der Oberseite deutlich. Die Baweanthiere kommen sonach ganz mit den Exemplaren überein, welche Rothschild und Pagenstecher von Sambawa haben (cf. p. 107 u. 108).

Bei den ♀♀ sind die Schwänze etwas länger und das Analauge sowie die submarginale Fleckenreihe auf den Hinterflügeln unten deutlicher und lebhafter. Drei von den ♀♀ tragen das gleiche Kleid wie das ♂, und nur ein einziges Exemplar zeigt die langgeschwänzte Form theseus Cr. mit grossen weissen Flecken im Diskus der Hinterflügel, welche den Pap. aristolochiae nachahmt und auf Java die gewöhnliche ist. Ist diese Häufigkeit des ♂-Kleides bei den ♀♀ hier blosser Zufall?

3. memnon, L. 8 Exemplare, wovon 2 ♂♂, 6 ♀♀. Die ♂♂ gehören zu der auf den grossen Sundainseln gewöhnlichen Form, welche nur rothe Flecke an den Flügelwurzeln der Unterseite, und kein Roth im Analwinkel der Hinterflügel besitzt. Von den 6 ♀♀ gehört eines der geschwänzten hellen Form achates Cr. mit gelben Keilflecken an der Wurzel der Vorderflügel, und die 5 andern der ungeschwänzten hellen Form agenor L. (cf. Distant, Rhop. mal. T. XXIX, Fig. 1) an, welche ich von Java und Banka sehr häufig, von Borneo und Sumatra niemals erhalten habe.

4. peranthus F. var. baweana? Zwei ♀♀, ein gutes und ein stark abgeflogenes Stück. Ob diese Varietät näher bei peranthus oder fulgens steht, kann ich nicht entscheiden, da ich keinen ♂ erhalten habe. Sie differirt etwas von beiden Arten, kommt jedoch eher mit den beiden ♀♀ von fulgens überein, welche ich in Geh. Rath Pagenstecher's Sammlung gesehen habe, als mit peranthus; dessen grösstes fulgens-♀ meist 50, mein peranthus-♀ 47 mm., während das gut erhaltene baweana-♀ 53 mm in der Flügellänge misst. Die Fransen sind heller, die Halbmonde auf den Hinterflügeln oben deutlicher und umfangreicher als bei peranthus, die 3 letzten vor dem Analauge stark und breit, der vierte nur gering grün bestäubt, während bei meinen peranthus-Exemplaren aus Java nur die beiden letzten Halbmonde zwischen Analauge und Schwanz voll, das nächstfolgende schon gar nicht mehr oder nur gering grün bestäubt ist. Von dem mir vorliegenden fulgens-♀ aus Pagenstecher's Sammlung unterscheidet sich die var. baweana durch etwas grössere Breite der grünen Wurzelhälfte der Vorderflügel, noch etwas über den Ursprung des 2. Medianastes hinaus.

Bei dem gut erhaltenen ♀ steht im Apex des Hinterflügels oben



ein heller gelblichbrauner dreieckiger Fleck, den ich sowohl bei meinem *peranthus*-♀, als bei den ♀♀ von *peranthus* und *fulgens* in *Pagenstecher's* Sammlung vermisste. Der Apicaltheil der Vorderflügel oben ist viel breiter und reichlicher grün bestäubt als bei *peranthus*, und die gelbgrüne Bestäubung der blaugrünen Wurzelhälfte der Vorderflügel, welche bei *peranthus* ♂ und ♀ nur die wurzelwärts gelegene Hälfte derselben einnimmt, reicht bei den beiden *Bawean*-♀♀ fast über das ganze Feld, so dass nur vorn ein schmales blaugrünes Stück übrig bleibt; die Mittelzelle namentlich ist ganz gelbgrün bestäubt, was weder bei meinem *fulgens*-♂ noch bei meinen 6 *peranthus*-Exemplaren der Fall ist, namentlich nicht beim ♀, bei dem das grüne Feld scharf in eine gelbgrüne Wurzel- und eine blaugrüne Discalhälfte geschieden ist.

Auf der Unterseite der Hinterflügel sind die Augenflecke nach hinten breiter gelb und nach vorn breiter blau gerandet, das Schwarz derselben ist jedoch trotz der bedeutenderen Grösse des Thieres nicht grösser als bei meinem *peranthus*-♀ und dem *fulgens*-♀; der gelbweisse Fleck im apex ist über doppelt so gross.

5. *telephus* Feld. Nur 1 Exemplar, ♂. Derselbe ist mit 42 mm Vorderflügelänge so gross wie ein Exemplar aus Barakur in British Indien ( $42\frac{1}{2}$  mm) und grösser als alle meine zahlreichen Exemplare von Sumatra und Banka (zwischen 35 und 39 mm). Die grüne Zeichnung jedoch ist kleiner und beschränkter als bei diesen, ein Beginn von Melanismus, den wir bei der nachfolgenden Art noch deutlicher wahrnehmen können.

6. *agamemnon* L. var. *baweana*. Ein Pärchen, bei dem die grünen Fleckenbinden der Oberseite, und zwar am bedeutendsten beim ♂, in ihrem Umfang, nicht in ihrer Anzahl, sehr reducirt sind, meist auf die Hälfte und darüber. Das Grün derselben ist bleicher, weniger saftig, so dass namentlich das ♂-Thier einen auffallend dunkeln Eindruck macht und sehr stark der dunkeln *Celebes*-form von *agamemnon*, aber ohne den eigenthümlichen Flügelschnitt derselben, gleicht. Die Grundfarbe des ♂ ist braunschwarz, die des ♀ hell olivenbraun, ohne eine Spur von Schwarz, so dass sich dasselbe durch diese helle Grundfarbe schon von allen meinen übrigen zahlreichen ♀♀ aus allen möglichen Fundorten abhebt. Der Schwanz des ♂ ist so kurz, wie ich Aehnliches nur noch von Java und bei einem *plithenes*-♂ von Ceram habe, der Schwanz des ♀ am kürzesten von allen ♀♀, mit Ausnahme einiger von Neu-Guinea.



Auch auf der Unterseite sind die grünen Flecke am Umfang reducirt, wiederum besonders stark beim ♂, bei dem auch die Aussenhälfte der Hinterflügel verwaschener und »fleckloser« ist als bei den andern ♂♂. Keine rothen Flecken am Analrand der Hinterflügel.

Jedenfalls steht diese Form näher den Molukkenrassen und der Form *exilis* Rothsch. als der javanischen. *Exilis* hat jedoch, nach einem mir vorliegenden ♂ von Sambawa zu schliessen, viel längere Schwänze, und die Unterseite der Hinterflügel ist nicht so verwischt und einfarbig, besitzt auch im Analwinkel einen röthlichen Fleck, der bei *baweana* fehlt.

## II. Pieridae.

### A. Terias.

7. *hecabe* L. 3 ♂♀, völlig entsprechend der Distant'schen Abbildung von *hecabe*, T. XXVI, Fig. 19 ♂, Fig. 11 ♀.

### B. Tachyris.

8. *nero* Fabr. Ein einziges ♂, etwas kleiner als die Sumatra-Borneo- und Javathiere meiner Sammlung und mit etwas spitzeren Vorderflügeln, etwa wie bei *zarinda*. Die Farben ist nicht das gewöhnliche schöne Feuerroth, sondern entspricht mehr dem Purpurroth, das ich öfters bei Exemplaren aus den Gajuländern in Sumatra beobachtet habe (cf. mein Verzeichniss der von mir auf Sumatra gefangenen Schmetterlinge Iris Bd. VII, H. I, p. 30).

9. *hippo* Cr. 1 ♂, der durch die weisse Unterseite der Hinterflügel und den weissen Fleck im Apex der Vorderflügel unten sich als die javanische Varietät *enyo* Boisd. ausweist.

### C. Catopsilia.

10. *crocale* Cr. 4 ♂♂ und 5 ♀♀, die theils der Form *crocale*, theils der Form *catilla* entsprechen, mit dem Unterschied, dass die ♂♂ das Schwefelgelb über alle Flügel gleichmässig, nach Aussen nur wenig heller, verbreitet haben und darum mehr der Form *flava* Butl. von den Molukken und Neu-Guinea entsprechen. Die ♀♀ gleichen meist der von Distant abgebildeten Form (T. XXV, Fig. 12), jedoch mit den ocellen von *Catilla*, was mir die Zusammengehörigkeit von *C. crocale* und *C. Catilla* wahrscheinlich macht. Doch ist richtig, dass bei dem einen *catilla*-♂ die Fühler einen rosenrothen Anflug haben,

der bei den crocale-♂♂, sowie bei den ♀♀ fehlt, wie Martin\*) hervorhebt.

Ein ♀ hat auf der Mitte der Unterseite aller 4 Flügel grosse unregelmässige braune Flecke, wie dies auch viele Exemplare aus andern Localitäten — Sumatra bis Neu-Guinea — zeigen.

### D. Appias.

11. leis Hübn. Ein ♀, das etwa der Distant'schen Fig. 6, T. XXV entspricht, nur ist die Unterseite der Hinterflügel mehr gelblich und von einem submarginalen, irregulären, verwaschenen braunen Band durchzogen. Auf der Oberseite sind alle Flügelwurzeln breiter dunkel bestäubt; diese dunkelgraue Bestäubung zieht sich namentlich breit längs des Analrandes der Hinterflügel herab und geht in leichtem Grade über den ganzen Flügel, so dass das Weiss desselben grau angeflogen erscheint.

### E. Delias.

12. hyparete L. 5 ♂♂ und 4 ♀♀ in dem javanischen Kleide,

13. egialea Cr. 3 ♂♀, ebenfalls ganz mit Javathieren aus der Provinz Kedoe übereinstimmend.

## III. Danaidae.

### A. Euploea.

14. climena Cr. var. sepulchralis Butl. 1 ♂. Auch von Java bekannt. S. Snellen, Notice sur les Lépidoptères des îles Natuna, par P. C. T. Snellen.

15. midamus L. 1 ♂, 2 ♀♀, den javanischen Exemplaren ähnlich, namentlich die ♀♀ mit grossen weissen Flecken und starkem blauem Schimmer.

16. eleusina Cr. 1 ♂.

17. castelnaui Feld. 1 ♀.

18. pagenstecheri, n. sp. 1 ♂. S. T. IV, F. 8. Gehört in die Moore'sche Unterabtheilung Menama und steht nahe bei lorzae Boisd. Hat auf den Vorderflügeln am Vorderrand oberhalb der obern Spitze der

---

\*) A list of the butterflies of Sumatra etc. by L. de Nicéville and Hofrath Dr. L. Martin (Journ. As. Soc. of Bengal. Vol. LXIV, Part. II, No. 3, 1895, p. 491).

Mittelzelle zwischen der 1. und 2. Subcostalis ein kleines weisses Fleckchen, ein ebensolches etwas davon entfernt am untern Ende zwischen 1. und 2. Medianast und 4 weisse Flecke vor dem Apex. Der erste, zwischen 2. und 3. Subcostalis, ist sehr klein und nur links sichtbar, der zweite zwischen 3. und 4. Subcostalast ist länglich, der dritte, zwischen 4. und 5. Subcostalis ist stecknadelkopfgross, rund, und der vierte, zwischen 5. Subcostal- und oberem Discoidalast ist der grösste von allen.

Auf der Unterseite findet sich auf den Vorderflügeln noch ein bleichvioletter Fleck zwischen 2. und 3. Medianast, und auf den Hinterflügeln ein ebensolcher am Ende der Zelle, umgeben von 5 gleichen in den Zellen zwischen 1. Subcostal- und 3. Medianast. Am Aussenrand steht eine unvollständige Reihe marginaler Punkte zwischen Discoidal- und Submedianast.

Benannt zu Ehren meines verehrten Freundes, des Herrn Geh. Sanitätsrathes Dr. A. Pagenstecher.

### B. *Danais*.

19. *chrysippus* L. 2 ♂♂, 3 ♀♀, von derselben düsterbraunen Färbung, wie javanische Exemplare.

20. *intensa* Moore. 1 ♀, kleiner als mein kleinstes Java-Exemplar. Es misst nur 31 mm Flügellänge.

21. *abigar* Eschsch. var. *fulginosa* mihi. 1 ♂♀ in einer interessanten Varietät, von der ich bereits das ♀ in meinem obenerwähnten Verzeichniss sumatranischer Schmetterlinge kurz als *fuliginosa* beschrieben habe und die nahe mit der Doherty'schen Form *litoralis* (cf. dessen Verzeichniss der Schmetterlinge von Sumba und Sambawa) verwandt ist. Von *D. litoralis* liegt mir ein ♀ aus Sumba (aus Pagenstecher's Sammlung) vor. Dasselbe hat sehr viel mehr Weiss auf den Hinterflügeln oben ohne die rothen Pfeile. Die submarginale Punktreihe der Hinterflügel oben, welche bei *fuliginosa* abliterirt ist, ist hier in ihrem ganzen Umfang vorhanden. Im Apex der Vorderflügel oben stehen mehrere weisse Fleckchen, ganz wie bei der Distant'schen Abbildung, bei *fuliginosa* nur ein einziger.

Es ist vielleicht dieselbe Varietät, welche von der Insel Tanah Djampea im SW. bei Celebes (also ganz in der Richtung nach Bawean hin!) durch P. C. T. Snellen\*) erwähnt wird. Snellen sagt da nur

---

\*) Snellen, Tijds. v. Entom. Bd. 33.

kurz, dass die (3) Exemplare zu einer kleinen Varietät gehören, weil sie kein Weiss in dem Braungelb der Vorderflügel haben, wie beim Typus abigar, sondern der Distant'schen Abbildung gleichen, von welcher sie sich jedoch durch das (in verschiedenem Grade) mehr beschränkte weisse Feld der Hinterflügel unterscheiden.

Die vorliegenden Exemplare sind ganz dunkel, mit sehr wenig Weiss; das ♀ ist bedeutend dunkler als der ♂: im Apex der Vorderflügel haben beide, entgegen dem Distant'schen Exemplar nur ein einziges weisses Fleckchen. Ich hatte in meiner früheren Publication erwähnt, dass ich das Thierchen von den Philippinen her, vielleicht über Borneo, nach Bawean eingewandert halte; nachdem aber nunmehr feststeht, dass dasselbe auf den kleinen Sundainseln wie auf den Inselgruppen nahe der Südwestküste von Celebes vorkommt, besteht kein Grund mehr, so weit in die Ferne zu schweifen.

22. juvena Cr. 2 ♀♀.

## V. Satyridae.

### A. Melanitis.

23. leda L. 2 ♂♂ von etwas dunklem, einfarbigem Habitus.

### B. Mycalesis.

24. medus Fabr. 1 ♂.

25. mineus L. 1 ♀, ziemlich klein, mit kleineren Ocellen als bei meinen Sumatra-Exemplaren.

### C. Lethe.

26. europa Fabr. 2 ♂♂, 1 ♀.

## V. Elymniidae.

### A. Elymnias.

27. lutescens Butl. 1 ♂. Die Augen auf den Hinterflügeln, sowohl oben wie unten, grösser als bei meinen sumatranischen ♂♂.

28. baweana, n. sp. S. T. IV F. 6. 3 ♂♂, 1 ♀. Nahe verwandt mit E. lais Cr., und ausgezeichnet durch starken Melanismus der Vorder-, sowie starken Albinismus der Hinterflügel. Dieser Antagonismus bezüglich der Färbungstendenz der beiden Flügelpaare ist sehr merkwürdig; ich habe ihn nun schon mehrfach beobachtet (cf. mein bereits mehrfach erwähntes Verzeichniss der sumatranischen Tagfalter).

Beide Geschlechter sind gleich gross und gleich gefärbt; das ♀

hat nur um eine Kleinigkeit gestrecktere und bleichere Vorderflügel. Oberseite: Vorderflügel braunschwarz, die gelbgrünen *lais*-Zeichnungen sind nur auf den gesprenkelten Vorderrand, eine Reihe submarginaler Flecke, den schmalen Innenrand und zwei lange Striche in den daran zunächst anstossenden beiden Zellen, sowie einen verwaschenen, undeutlichen Längsstrich in der Mittelzelle beschränkt, und fallen in den Zellen oberhalb des zweiten Medianastes weg; auch in den übrigen sind sie weniger scharf und lebhaft als bei *lais*.

Die Hinterflügel sind bleich gelbgrün mit breitem, braunem Aussenrand und breit dunkelbraun bestäubten Adern.

Die Unterseite zeigt die gewöhnliche *lais*-Zeichnung, mit nur geringen Abänderungen.

Was diese Art, abgesehen von der Färbung, noch hauptsächlich von *lais* unterscheidet, ist die geringe Grösse des ♀: 36 mm Vorderflügelänge gegen 42—44 mm meiner *lais*-♀♀ von Sumatra, Borneo und Java, sowie das Fehlen jeglichen blauen Schillers.

## VI. Nymphalidae.

### A. Cethosia.

29. *penthesilea* Cr. 4 ♂♂, die mir der genannten Art zugehörig scheinen und auch nahe verwandt sind mit *C. carolinae* Forbes. Sie unterscheiden sich in Nichts von javanischen Exemplaren.

### B. Precis.

30. *ida* Cr. 3 ♂♂, 2 ♀♀, vom gewöhnlichen Habitus.

### C. Iunonia.

31. *asterie* L. 5 ♂♂, 2 ♀♀; mehr mit dem javanischen als mit dem sumatranischen Habitus übereinstimmend.

32. *atlites* L. 3 ♂♂.

33. *orithyia* L. 1 ♂.

### D. Messaras.

35. *erymanthis* Dru. 2 ♂♂, 1 ♀.

### E. Neptis.

35. *leucothoë* Cr. 4 ♂♂, 3 ♀♀, alle von der javanischen Form *javana*, welche breitere weisse Bänder und Zeichnungen hat als Sumatra-Thiere.



36. *duryodana* Moore, var. 1 ♂, 2 ♀♀. Das ♀ weicht von der Distant'schen Abbildung nur insofern ab, als der weisse Fleck auf der Oberseite der Vorderflügel zwischen letzter Mediana und der Submediana fehlt, resp. nur bei einem Exemplar als ganz kleines weisses Pünktchen vorhanden ist. Auch sind die weissen Querbinden der Hinterflügel oben schmaler. Ausserdem stehen am Aussenrand der Hinterflügel unten, durch die breit dunkeln Adern getrennt, noch eine Reihe weisslicher Flecke, die auf der Distant'schen Abbildung nur als braune Linie erscheinen. Dagegen erreicht die weisse Binde der Hinterflügel unten bei allen 3 Exemplaren den Vorderrand nicht; sie stimmen also darin mehr mit dem Borneo-Typus überein, gerade wie die Sumatra-Exemplare, als wie mit einem mit breiteren weissen Bändern und Flecken gezierten Exemplar aus Mitteljava in Pagenstecher's Sammlung.

### F. *Hypolimnas*.

37. *bolina* L. 2 ♀♀, wovon eines sehr zerrissen und beschädigt. Beide sind auf der Oberseite der Vorderflügel mit Gelb geschmückt wie die Java Exemplare durchweg. Das noch gut erhaltene Exemplar ist ein grosses schönes Thier, dessen weisse Binden an den Rändern breit im schönsten Blau schillern, stärker selbst als bei Exemplaren aus Deutsch-Neuguinea.

38. *anomala* Wall. Ein einziges Exemplar, ein ♂, leider in einem äusserst zerfetzten und abgeflogenen Zustand.

### G. *Symphaedra*.

39. *annae* n. sp. S. T. IV, Fig. 9, ♀. 3 ♂♂ und 2 ♀♀, welche sich in beiden Geschlechtern genügend von den verwandten Arten *dirtea* und *cyanipardus* unterscheiden. *S. aegle* Doherty von Sumba, von welcher mir ein ♂ aus Pagenstecher's Sammlung vorliegt, ist allenfalls eine nahestehende Art.

Grösse wie *S. dirtea*.

Der ♂ unterscheidet sich von dieser durch folgende Merkmale:

Oberseite: Die grünblaue Randbinde ist bei *dirtea* am Innenrand viel mehr gezackt, bei *annae* verläuft sie mehr gerade.

Bei *dirtea* sind die Punkte und Fleckchen der Vorderflügel bei all meinen zahlreichen Exemplaren von Sumatra, Nias, Banka, Java und Borneo stets gelb, bei *annae* jedoch mit Ausnahme des weissen Apical-

flecks mehr blaugrün wie bei *cyanipardus*, namentlich die beiden grösseren Fleckchen vor der Zelle.

Die submarginalen schwarzen Punkte in der blauen Randbinde der Hinterflügel gleichen mehr denen von *cyanipardus* als von *dirtea*, indem sie eine mehr längliche Form haben, nach aussen abgerundet, nach innen mit vorspringender Spitze.

Unterseite: Dunkelbraungelb, viel dunkler und viel mehr schwarz berusst als die dunkelsten *dirtea*-Exemplare, welche ich aus den Bergen Sumatra's habe. Die Flecken der Hinterflügel heben sich nicht wie bei *dirtea* bleichgelb von dem braungelben Grunde ab, sondern dunkel ockergelb von dem braunschwarzgelben Grund, der gegen den Aussenrand hin in eine centimeterbreite etwas hellere Randbinde übergeht, in der eine Reihe kurzer schwarzer Pfeile steht, welche bei *dirtea* nur durch schwarze Punkte angedeutet ist.

Die submarginalen Flecke der Vorderflügel, welche bei *dirtea* nur vom zweiten Medianast an abwärts blau werden, und stets getrennt sind, hängen bei *annae* zusammen und reichen bis zum ersten Medianast hinauf. Die Fühlerkolben sind weniger lebhaft ockergelb gefärbt als bei *dirtea*.

Das ♀ hat folgende Unterscheidungsmerkmale: Die Flecken und Punkte zeigen im Allgemeinen die Anordnung wie bei *dirtea*-♀♀, fallen jedoch durch ihr paradoxes Colorit sofort auf, indem sie nämlich auf den Vorderflügeln ganz blass und weiss, auf den Hinterflügeln jedoch tiefdunkel orange werden, auch auf der Unterseite.

Ein Characteristicum auf den Vorderflügeln ist noch die starke Vergrösserung der am Ende des vordersten Drittels des Vorderrandes stehenden und schief nach dem Aussenrand hin verlaufenden Flecken, namentlich des zwischen dem unteren Discoidal- und dem 1. Medianast, sodass sie bei *annae* eine förmliche Fleckenbinde bilden, wie aus der Abbildung ersichtlich ist. Die ♀♀ bilden damit einen gewissen Uebergang zu der *S. perdix* Butl. von Nias.

Ich freue mich, dieser hübschen Art den Namen meiner hochverehrten und gelehrten Freundin, Fräulein Anna Treichel auf Hochpaleschken, beilegen zu dürfen.

### H. *Euthalia*.

40. *Kastobo*, n. sp. an var. S. T. IV Fig. 5. Da *Euth. garuda* sehr variiert und ich zur Vergleichung nur sehr dunkle, fast einfarbige suma-

tranische ♀♀ besitze, so wage ich dies — einzige — Exemplar, ein ♀, nicht als eigene Art aufzustellen, obwohl mir dasselbe in England als »probably nova sp.« diagnosticirt ward, sondern betrachte es vorläufig nur als Lokalarasse von garuda.

Das Thierchen zeichnet sich dadurch aus, dass alle die Flecken und Binden, welche sich bei garuda — ich spreche nur von den ♀♀ — oft in nur schattenhafter Anlage finden, sehr scharf, deutlich und saftig ausgebildet sind, was namentlich auf der Unterseite noch deutlicher hervortritt als auf der Oberseite.

Die weisse Fleckenbinde der Vorderflügel oben ist so scharf, wie auf der Distant'schen Abbildung T. XIV, Fig. 2, ja noch etwas breiter und die Flecken hängen mehr zusammen.

Auf den Hinterflügeln oben steht eine Reihe grosser sammt-schwarzer, submarginaler Pfeilflecke statt der Punkté wie bei garuda.

Die Unterseite ist von garuda nicht in der Zeichnung, wohl aber in der Farbe auffällig verschieden. Die garuda-♀♀ sind alle bleich ledergelb, mit ganz wenig weisslich-violett an den Rändern, namentlich der Vorderflügel. Das Baweanthier zeigt nun als Grundfarbe kein Ledergelb ausser in den Makeln der Mittelzelle der Vorderflügel, dagegen ein bleiches Grünlichgrau mit braunen Schattirungen, nach aussen in bleich weisslich-violett übergehend.

Benannt nach dem Telaga Kastobo, einem Kratersee auf Bawean.

### I. Doleschallia.

41. bisaltide Cr. Ein sehr kleines ♀.

## VII. Hesperiiidae.

### A. Tagiades.

42. ravi Moore. Eine ♀-Varietät in 1 Stück, welche noch einen Glasfleck in der Mittelzelle der Vorderflügel besitzt, wie ich es auch an Exemplaren aus der Provinz Kedoe auf Java bemerkt habe.

## Tafel-Erklärung.

### Taf. IV.

Fig. 6. Elymnias baweana ♂.

Fig. 7. Euthalia kastobo ♀.

Fig. 8. Euploea pagenstecheri.

Fig. 9. Symphaedra annae.

IM

# ERWACHENDEN LENZE.

---

VON

**W. CASPARI II.**

LEHRER IN WIESBADEN.

---





## I.

Aus seiner südlichen Heimath, wohl den glücklichen Inseln der Tropen, schreitet alljährlich ein jugendlicher Reisender nach Norden. Ohne Pass und Erlaubniss von jenen Gestaden wandernd, wird er überall mit Jubel begrüsst von den sehnsvoll auf ihn harrenden Völkern. Blumen umduften, fröhliche Vogelschaaren begleiten ihn; Freude und Wonne verbreitet er rings umher, wo er hinkommt.

Doch reist er überaus bequem und langsam, oft auch sprungweise, doch nie mit dem Schnellzuge, die alte Reichspostschnecke könnte ihn oft überholen; ein rüstiger Fussgänger vermag manche Tage mit ihm Schritt zu halten, an andern stürmt der Jüngling in Geschwindmärschen weit voraus, jenen zurücklassend. Doch siehe, der Fussgänger würde nach einiger Zeit doch den Vorseilenden auf dem Wege treffen, da letzterer sich kaum von manchem Blümchen, von manchem schönen Thale, das er traf, trennen kann.

Wenn dieser »Ewig - Junge«, der Frühling, Ende Januar von Afrika nach Italien aufbricht, so kommt wohl Ende März heran, ehe er unsere Heimath berührt; Anfangs Mai erreicht er Petersburg, im Juni rastet er endlich am Eismeer, um sich abzukühlen von dem anstrengenden Marsche.

In der Poebene, an der Riviera, verweilt er lange Zeit und sendet Grüsse dem »alten Weissbart« herüber. Dieser, wir meinen natürlich den Winter, hat sich zu sehr eingewöhnt, jener kann sich lange Zeit nicht von dem blühenden, reichgesegneten Lande, in welches er schon Rosen zaubert, während bei uns noch dichter Schnee fällt, trennen; auch will er sich stärken zum Kampfe mit dem Weissbart, dem Alten.

Bisher war der Kampf mit diesem leicht; doch nun sitzt der Alte hinter der Mauer, seiner Festung — den Alpen. Daher kommt es, dass der Frühling bei uns nicht so schnell und mit einem Male, wie

in des Dichters Herz auf die Berge steigt: es hält dem Lenze gewöhnlich schwer, den Winter zu vertreiben.

Feuchtwarme Luftströme machen sich aus Süden auf, heben die Schneedecke weg, treiben die Eisdecken der Flüsse dem Meere zu. Dem Winter wird es endlich »ungemüthlich«, und er geht ein paar Meilen nach Norden zurück. »Wirds?« fragt wohl schüchtern die Goldammer auf der Strasse, wohin sie durch die Noth getrieben wurde. »Wird Frühling, Frühling?« fragt die Haubenlerche auf dem Kehrichthügel. Und die Meise spottet gegen den Winter gewandt schon: »Ich geb', wenn Du gehst, auch Dir ein Bretzelchen«. Doch der Alte wird wüthend und ruft drohend: »Noch nicht!« Schneeschauer und Eishagel folgen — die Vögel des Nordens können noch nicht zurück in ihre Heimath, Storch und Schwälbchen müssen sich noch gedulden. Bald aber setzt der Lenz stärker ein mit frischer Kraft; die südlichen Lüfte bringen die Lerchen mit, »die sich nun nicht mehr davon abbringen lassen, den Frühling einzusingen«. Der Frühling kommt, Frühling siegt, und »der Winter räumt das Feld!«

Die Saatkrähe krächzt dem Lenze zu: »Wart, wart noch!« Sie hat sich zu sehr in das Feld gewöhnt, möchte noch all' die Schnecken, Würmer und Grasraupen verspeisen, die, durch die Wärme gelockt, ihre Winterquartiere schon verlassen haben. Doch merkt sie bald, dass es im Walde auch schon herrlicher wird; bald erhebt sie sich zum nahen Forste, um ihr Nest auszubessern, das die Winterstürme ihr arg zerzaust haben.

Die Dohlen umkreisen in stolzem Fluge die verwitterten Kirchthürme und Burgen, heben sich hoch empor, um dann aus schwindelnder Höhe pfeilgeschwind, mit angelegten Flügeln herabzustürzen. Aber plötzlich breiten sie die kräftigen Schwingen weit aus, der Fall wird gehemmt, und die kühnen Vögel steigen wieder sanft nach oben; einer sucht es dem andern in dieser Luftturnerei zuvorzuthun. So tanzt das übermüthige Völklein seinen Hochzeitsreigen, fröhlich schallt der Dohlen »kiak« und deutlich hört man, wenn man's hören will, auch ein jauchzendes »Glück, Glück!« dazwischen rufen.

Die Täubchen sonnen sich vor dem Schlage, versuchen sich im Girren und Schnäbeln, erheben sich stolzen, schillernden Fluges über die Häuser und umkreisen, sich neckend und gegenseitig überholend, ihr Stadtviertel. Vor einigen Tagen noch getrauten sie sich kaum

aus dem Schlag in den Hof, nun wissen sie vor lauter Glück sich kaum in ihrem Thun und Treiben zu zügel.

Und ihr Glück und das Glück aller Schläfer der Flur und des Waldes und aller, die den Winter träumend, schlafend und trauernd, oder im fernen Süden zubrachten, hat wirklich seinen Anfang genommen.

Auch der Sperling meint es so und schilpt unermüdlich auf dem Dache. Er hat seine »glänzend schwarze Frühlingshalsbinde angelegt«. Das bedeutet, das »Vergnügliche im Schwange ist, dass Feste vorbereitet werden: Verlobung, Hochzeit!« Sie haben sich viel zu erzählen von den Schrecken des Winters, vom Hinscheiden hungernder Genossen zu der Zeit, von kommenden Tagen. Dabei geht es oft hitzig zu, jeder will recht haben, das gehört zum Sperlingsdasein. Schon schleppen sie Strohhalme. Hühnerfedern und andere weiche Siebensachen herbei und verschwinden damit im Dachkandel. Junges Leben wird sich bald darin regen.

Vorsichtigere Hausväter unter ihnen bereiten ihr Heim in Mauerlöchern, die leichtsinnigen und unerfahrenen müssen später mitten im Maienglück sehen, wie sie mit ihrer Haushaltung bei Ueberschwemmungen im Kandel fertig werden, ähnlich wie es manchen leichtsinnigen »Menschen« ergeht, die zu schnell und unbesonnen in den Hafen der Ehe einlaufen.

## II.

Fürwahr, die Luft ist lind und lau geworden, es ist wirklich Frühling! Unsere lieben Osterferien haben begonnen, bald ertönen die Osterglocken. Zu Hause ist es etwas ungemütlich geworden: Da wird gescheuert und gefegt, auf das Schreibpult wurden schon verschiedene Attacken unternommen, alles wird drunter und drüber gestellt.

Meine grösste Plage ist es, an solchen Tagen durch Regen- und ander ungemütliches Wetter an's Zimmer gefesselt zu sein. Jüngst war es anders, ein echter Frühlingstag! »Machen wir uns lieber durch« und streifen, wie in den fröhlichen Knabenjahren, durch Flur und Wald!

Hinaus! »Nicht in den Park und über die Promenade!« Ziello! Wir streifen durch's Feld mit der sprossenden Saat, über's rieselnde Bächlein, in den noch keinen Schatten bietenden Wald, zur Waldwiese, zum Kamm des Gebirges, wenn's möglich ist; vergessen nicht, allerlei

kleine »Utensilien« mitzunehmen, die gelegentlich verwerthet werden. Wir stöbern allerlei kleinem Gethier, oft Gesindel nach, »Ungeziefer nennt's der Mensch!« Sehen wir zu, ob es »knospet und treibet auf den Hügeln,« von denen ich im Spätherbst Abschied nahm, ob auch die Thierchen des Waldes »munter geworden« sind, die im rauhen Wetter im Moos und Haidegestrüpp und unter Laub, selbst in der Erde einen Zufluchtsort fanden!

Zu Hause, im Pappkasten, hat schon manches sein »Todtenhemdchen« abgestreift. Manchem gab ich die gold'ne Freiheit, da mich seine Zucht, sein Gedeihen und Beobachtung seiner Lebensweise mehr interessirten, als seine Einreihung in die Sammlung, wo es schon längst vertreten ist.

Draussen sind sicher schon viele Schläfer wach geworden, und andere Thiere entfalten sich erst frisch, sei es aus der Nympe oder aus dem Ei.

Denn es ist wohl zu unterscheiden bei den Kleinthieren, besonders bei den höheren, was überwintert und sich um Ostern und später nochmals im abgetragenen, zerzausten, zerschlissenen Röckchen zeigt, und ferner das, was sich neu entwickelt und sich in seinem Glanze mit dem Glanze des Frühlings misst.

In den Knabenjahren liefen wir wohl mit verwehtem Schopfe — desto besser konnte uns die frische Frühlingsluft die Winterblässe von Stirn und Wange fächeln — dem Kukuksrufe nach; heute betreten wir langsameren Schrittes, aber nicht minder wohlgemuth, den Pfad in's Freie.

Damals konnte uns ein überwinterter »Fuchs«, erbeutet und wohlgeborgen in der Schachtel, in Ekstase versetzen, heute interessirt er uns in anderer Hinsicht, wie wir näher sehen werden, und wir lassen den »Rothen« ruhig fliegen und sehen zu, was er treibt und wie's ihm ergeht. —

Vor der Stadt sehen wir das dampfende, frischgepflügte Ackerfeld. Am Raine, an Böschungen, überall tritt uns Leben entgegen! Wie ist die Natur schon so reich, wenn man nachstöbert im Gras, die Luft wimmelt von unzählbaren Schaaren kleiner Insecten! Das sind keine Mücken und Fliegen, sondern fast ausnahmslos Käfer, welche die warme Sonne aus den dürrn Grashaufen hervorlockt. »Wolken von kleinem Geflügel« ziehen eben vorbei, nach dem Dünger, der, wie man leicht auch ohne Hinsehen bemerkt, dort vom Oeconom ausgebreitet wird,



fast lauter Aphodius! Dazwischen auch Erdföhe und deren Verwandte. — Glänzende Raubkäferchen erheben sich in die Lüfte, um sich zu sonnen.

Im Weitergehen weht uns köstlicher Veilchenduft entgegen — und richtig, da schauen die »blauen Frühlingsaugen« aus dem sprossenden Grase hervor. Breit legt der Löwenzahn seine Blätter über emporwollende Hungerblümchen und Hirtentäschel, dass sie im Schatten derselben ersticken und er seine Blüten entfalten kann. Auf Kosten ihrer Nachbarn, die gerade im Begriff waren, lustig zu treiben, mästet sich ebenso die Cichorie, breiten sich die Wegericharten aus. Welcher Unterschied zwischen diesen »protzigen« Gesellen und dem Blauveilchen!

Dass der Löwenzahn ein Goldprotze ist, kann Niemand bestreiten: nachdem er sich bereichert, lässt er seine Goldstücke, die Blüten glänzen. Doch über Nacht fährt alles davon in die Lüfte, und er wird arm wie ein Bettler. Zerrissen und zerlumpt zeigt er sich im Herbst, während die Cichorie als gute Haushälterin fast kärglich von ihrem Ersparten lebt und bekanntlich nur das allernöthigste für ihre Blüten ausgiebt und sich kaum ein Kleid (Blätter) im Sommer und Herbst gönnt.

Doch was zeigt sich da für ein merkwürdiges Thier? Als Grundgräber scharrt es umsigt den Sand und Lehm weg, einen kleinen Wall hat es zwischen sprossendem Hahnenfuss und Löwenzahn hinter sich geschafft und, hin und her sich wendend und drehend, ein mehr als fingerlanges Loch gebohrt, öfters benutzt es auch ein verlassenes Loch der Feldgrille, spart sich darum die »Grundarbeit«.

Seine Körperform ist nicht sonderlich zum Graben eingerichtet. Einmal hält es in der Arbeit inne und steigt gemächlich auf das frische Spitzwegerichblatt neben sich, um sich daran zu laben. Sein Käferkopf und sein Brustschild sind auffallend schmal im Verhältniss zu dem fast fingerdicken langen Hinterleibe, auf dessen Grund, nahe dem Brustschilde, sich ein Paar sehr kleine Flügeldecken spreizen. Es ist die »Oelmutter« oder der Oelwurm (*Meloë proscarabaeus*), ein bläulich schwarzer Oelkäfer, der dem gegrabenen Loche seine Eier in Gestalt eines weichen, dotterartigen Klumpens, der eine Menge davon enthält, anvertraut.

Fassen wir den Käfer an, so dringen aus allen Fugen und Gelenken, selbst an den Beinen und Fühlern kleine braune Tröpfchen



einer ölartigen, ätzenden Flüssigkeit. Wie manches Kind lässt das Thier schnell aus der Hand fallen, sobald es diese Feuchtigkeit gewahr wird! Wie manchem »Grossen« ekelt nun das Thier! Auch die Vögel hüten sich vor ihm.

Da das Thier nicht fliegen kann, sehr träg und schwerfällig in seinen Bewegungen ist, einer Gefahr also deshalb nicht, wie beispielsweise der Goldlaufkäfer, entgehen kann, auch keine andern Organe hat, womit es sich etwa wehren könnte, schützt es sich durch dieses Mittel.

Eine ähnliche Schutzvorrichtung treffen wir auch bei vielen andern wehrlosen Thieren, sofern sie nicht, wie z. B. manche Fische und Schmetterlinge, durch grosse ungeheure Eierzahl ihren Feinden einen nicht zu überwältigenden Damm entgegenzusetzen haben.

Der angegriffene Igel rollt sich zusammen und bietet den Hunden seine Stacheln zum Anbeissen, Kellerasseln und andere machen es ähnlich wie der Igel; die Schildkröte zieht ihre Beine und ihr Schwänzchen, auch den Kopf mit dem langen Halse, alles auf einen Ruck unter ihren Panzer. Die Raubkäfer drohen mit aufgehobenem Hinterleib dem Angreifer und senden ihm einen Gruss zu in Gestalt eines durchdringend riechenden, scharfen Duftes. Gewiss werden viele kleine Thiere, die diese angreifen, dadurch gleich erschreckt und machen sich eiligst aus dem Staube. Ungeniessbare, ja ekelhafte Sachen ahmen andere nach. Die Raupe von *Acronysta alni* sieht bis zur letzten Häutung einem Vogelkothe täuschend ähnlich, desgleichen die von *Gonoph. Derasa* und *Th. batis*, ja Schmetterlinge, wie der Apfelwickler, ferner *Cilix glauca* (*spinula*) sind diesem ekelhaften Dinge ähnlich. Auf Weideplätzen der Schafe und Ziegen treibt sich ein Käfer herum, der, wenn er gestört wird, sofort seine Beine in eigens dafür eingerichtete Fugen seines Körpers zurückzieht, dann gleicht er einem Schaf- oder Ziegenböhnchen zum Verwechseln.

Solche Käfer sind z. B.: *Byrrhus pilula* und *fasciatus*. Diese und andere stellen sich todt, um zu gelegener Zeit desto flinker davon zu eilen. Das thun viele Käfer, Raupen und Schmetterlinge.

So hilft sich jedes Lebewesen in seiner Weise.

Selbst die Pflanze hat ihre Schutzmittel in Gifthaaren, Drüsen, Borsten oder Stacheln, betäubendem Geruche, Dornen und Gefässen, welche mit scharfem Saft gefüllt sind, oder sie sind selbst vom »Scheitel bis zur Sohle giftig«.

Doch kehren wir zur »Oelmutter« zurück! Hat sie ihre Eier glücklich in der Erdhöhle, so scharrt sie flink Erde darüber, glättet sie alles, dass Niemand vermuthen soll, welchen kostbaren Schatz sie hier dem Boden anvertraut hat. Weiterhin kann sie nicht mehr für ihre Nachkommenschaft sorgen, denn bald stirbt sie.

Nach Monatsfrist erscheinen aus derselben Erdhöhle winzige, sechsbeinige, behaarte Engerlinge in grosser Anzahl und klettern an den »Butterblumen« (Löwenzahn, Hahnenfuss etc.) in die Höhe, in deren Blüthen sie Platz nehmen; oft sind mehrere in einer Blüthe.

Was treiben sie dort?

Sie fasten daselbst trotz der mit Honig gefüllten Näpfchen der Blüthe, warten auf das Erscheinen der Immen, besonders auf die Hummeln und die Frühlingsbienen, die in Erdlöchern des Raines hausen. Kommt eine solche Biene zur Blüthe, gleich springt so ein Racker, die Meloëlarve, auf ihren Rücken und beisst sich in den Haaren fest. Ahnungslos trägt die Biene den Engerling in ihren Bau. Dort wandert derselbe in eine Wabe, in eine Brutzelle, verzehrt das darin vorgefundene Ei oder die Bienenlarve, häutet sich dann und sieht selbst nun wie eine Bienenlarve aus, also ohne Beine, ganz weiss, ohne Spur von Haaren. Als Bienenmade benimmt sie sich, ist ganz artig und lässt sich von den Bienen mit Ambrosia füttern.

Haben wir nicht Aehnliches bei dem Kuckuck? Nach mehreren Häutungen ist der madenähnliche Engerling gross geworden; er wälzt sich aus dem Bienenneste und verwandelt sich in der Erde in eine Nymphe (Puppe). Aus letzterer kriecht im April oder Mai der besprochene Käfer. Ein ächter Schmarotzer, an denen ja die Erde so reich ist. Denken wir nur an die Tachinen (Schlupffliegen) und Ichneumoniden (Schlupfwespen), die noch schlimmer sind als die Meloëlarve und ihren Wirth (z. B. Raupen und Engerlinge) ganz ausfressen. Die Kohlweisslings- und die Kiefern-glucken-Raupe müssen oft hundert und noch mehr dieser Schlupfwespen beherbergen. Denken wir ferner an die Gallwespen, an das Geisblatt unter den Pflanzen, den Wein, die Flachsseide, den Hopfen, die Mispel und viele andere.

Indem wir solches erwägen, kriecht am Raine eine grosse Raupe daher! Ein Neuling denkt da gewiss: Ei, woher schon so gross? Es ist ja noch so früh im Jahre! Sieht er genauer hin, so wird er ein allbekanntes Thier erkennen, eine Raupe, die im Herbste öfters in grösserer Anzahl in den Wiesen, besonders nach der Grummeternte an

Wiesenkнопf, Klee, niederen Salix-Arten und dergl. gefunden wird: die Raupe des gemeinen Brombeer- oder Wiesenspinners, *Bombyx rubi*. Sie wird gemeinhin für eine Bärenraupe gehalten, was aber grundfalsch ist, denn es giebt daraus keine buntgezeichneten Bärenspinner, sondern einen grauen, unscheinbaren Schmetterling, eben die *Bombyx rubi*, während der deutsche Bär (*Aritia caja*) eine Aritide ist. Nur das haben sie gemeinschaftlich, dass sie der grossen Spinnerfamilie angehören. Die meisten Bärenraupen-Arten überwintern klein, manche Arten als Puppen, die *Bombyx rubi*-Raupe überwintert erwachsen. Im October ist sie noch thätig, Morgens ist sie oft bereift und scheint sich alsdann in dem Ertragen der Kälte zu üben. Hierauf verkriecht sie sich unter Haufen durren Grases oder unter Moos, auch wohl unter Blättern der Hecken, selbst in weiche Erde. Da liegt sie denn den ganzen Winter hindurch wie eine Schnecke zusammengeringtelt, ohne Nahrung, hungernd; sie friert mit dem Boden und thaut mit ihm auf, ihr Saft ist oft vereist.

Um Ostern feiert auch sie ihre Auferstehung. Sie trinkt sich nun so voll Wasser, dass sie mindestens um  $\frac{1}{3}$  ihrer Grösse nach Verlassen des Winterquartiers zunimmt, geniesst aber sonst nichts mehr. Es kommt jetzt darauf an, ob alle inneren Organe durch das von der Sonne erwärmte Wasser neu belebt werden oder nicht, ob sie besonders die Excremente freigeben kann. Geschieht letzteres nicht, so ist sie verloren, im andern Falle sehen wir sie bald Fäden ziehen und sich einen Cocon zwischen Grashalmen anfertigen, woraus im Mai der graue oder graubraune Schmetterling erscheint.

Das Männchen fliegt dann Nachmittags rastlos im Sonnenschein, das im Gras sitzende dicke, sehr träge Weibchen mit den gekämmten Fühlhörnern aufspürend. In der folgenden Nacht setzt letzteres seine Eier klumpenweise ab, damit es eher fertig wird und nicht zu viel zu fliegen braucht. Mit solchen Klumpen werden Brombeerblätter, Himbeeren, Sahlweiden und andere Sträucher, auch Grashalme und Klee bedacht. Das Rubi-Weibchen ist also ein nächtliches Thier, während sein Männchen ein den Sonnenschein liebendes Geschöpf ist.

Rathen möchte ich nicht, die Raupen anzugreifen! Wer sie mitnehmen und überwintern will, um einen Schmetterling zu züchten, lasse sie in eine Schachtel rollen. Die Haare brechen leicht ab und erzeugen in der Haut, besonders an den Gelenken und zwischen den Fingern eindringend, ein furchtbares Jucken und Brennen. In meiner Jugend hörte

ich einmal davon sprechen, dass in einem benachbarten Dorfe ein Knabe, der viele Raupen davon heimgetragen, welche zum Theil in seine Kleider bis auf die Haut gedrunken waren, daran gestorben sei. Die Geschichte ist glaublich; wie die Brennhare wirken, weiss ich auch zu genüge. Darum vergreift sich auch kein Vogel an dem Geschöpfe; er wäre verloren, wollte er seine Kehle und seinen Magen mit den Haaren tapeziren. Der Rabe allein scheint sie zu zerhacken und den hervorquellenden Inhalt zu verspeisen:

Es giebt noch viele andere Arten von Raupen, die gleich der Rubi-Raupe erwachsen überwintern, ja sogar merkwürdiger Weise einige, die im Herbst im Cocon sitzen und sich nicht verpuppen, sondern erst im Frühjahr dieses besorgen, z. B. die Adlerfarnleule (*Eriopus pteridis* oder *pupureofasciata*) im Gespinnst am welken Adlerfarn, ferner *Hadena adusta* und andere *Hadena*-Arten, *Agrotis cinerea*, beide im Erdcocon; von andern Insekten sind es besonders viele Blattwespen, besonders *Cimbex variabilis*, *Lophyrus pini*, *Tenthredo scalaris*, ferner die Holzwespe *Sirex gigas*, die eingesponnen als Larven zum Verpuppen fertig überwintern.

Nehmen wir diese Thiere in ihren Cocons vor Weihnachten in's warme Zimmer, so verderben sie; nach dieser in's Warme gebracht, verwandeln sie sich bald, in der Freiheit gewöhnlich erst im April und Mai.

Dass sie, vor Weihnachten in's warme Zimmer gebracht, einfach vertrocknen, oder darin nass gehalten, verschimmeln, später aber nicht (die Blattwespen machen davon eine Ausnahme, indem beides nicht geschieht), sie aber sonst auch nicht auf die Wärme im Zimmer reagiren, ist fast räthselhaft; es wird aber diese Thatsache begreiflicher, wenn man noch folgendes erwägt: Ein Zweig vom Apfelbaum oder der Schlehe und dergl. einige Zeit vor Weihnachten in's warme Zimmer (im Glase Wasser stehend) gebracht, wird sehr spärlich Blüthen und Blätter, gewöhnlich aber nichts treiben, vertrocknen; probirt man es nach Weihnachten und zwar besonders von Ende Januar ab, so erhält man in kurzer Zeit den schönsten Blüthenstrauss.

Es scheint fast so, als ob unsere Pflanzen und mit ihnen die Thiere, die davon abhängig sind, einen Winterschlaf machen **müssen**, vor allen Dingen Ruhe nöthig haben, die Ruhe geht eigentlich schon im August an, denn da arbeiten die meisten Bäume und viele andere Gewächse nicht mehr neu, sondern sammeln und bewahren das Erworbene



und denken an die Zukunft. Bald nach dem kürzesten Tage arbeitet dagegen die Natur trotz grösserer Kälte, trotz Eis und Schnee schon wieder neu, indem die Säfte wieder anfangen zu steigen.

Unter grösseren Hecken, am Waldesrande, bei Steinbrüchen, nehmen wir von dem dort angehäuften Laube und schütteln es im Regenschirm tüchtig durch. Man wird mitunter eine grössere Anzahl von Raupen im Schirme haben, die sich im Laube versteckt hielten, die meisten sind halb erwachsen, selten grösser, aber auch kleinere von anderen Arten sind darunter, z. B. *Agrotis fimbria*, *pronuba*, *janthina*, *Naenia typica*, öfters auch *Mania maura* und wie sie alle heissen mögen.

Beleuchtet man Abends den Schwarzdorn, den Weissdorn, junge Kirschbäume, Weiden, frisch sprossendes Gras, Nessel und dergl., so wird man dieselben Arten finden, die sich an den frischen Blättern oder gerade sich öffnenden Knospen und Blüthen gütlich thun.

Noch andere Arten überwintern als sehr kleine, kaum dem Ei entschlüpfte Geschöpfe, wie viele Noctuen, einige Spanner und Tagfalter und besonders die »Bären«-Arten, daher und weil ihre Raupen stark behaart sind, ihr Name. Eine wahre Bärennatur müssen solche Thiere haben, so klein dem eisigen Winter zu trotzen. Im Norden und hohen Gebirgen giebt es Arten, welche zweimal dem Winter trotzen müssen, bis sie erwachsen sind!

»Im Herbste«, so wird, ohne weiter zu überlegen, behauptet, »stirbt alles aus der Kleinwelt«. Tausende und Abertausende Thierchen werden durch die eintretende Kälte getödtet; es wird aber jedesmal dabei vergessen, sich die Frage vorzulegen: Woher so viele Kleinthiere im nächsten Jahre? Damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet und obiger Satz schon in's Gegentheil umgewandelt. Gerade das Gegentheil ist wahr. Wer danach strebt, sich Ueberzeugung davon zu verschaffen, wird bald erkennen, dass das Urtheil ein ganz oberflächliches ist.

Kein höheres Thier ist so gut ausgerüstet, den Winter zu überstehen, als gerade die Individuen der niederen Thierwelt es sind. Die Würmer und Maden gehen einfach tiefer in die Erde. Die Heuschrecken und andere Geradflügler überwintern meist als Eier, einige, z. B. der Ohrwurm, als fertige Insekten. Die Käfer, Schmetterlinge und andere überwintern in irgend einer Form: als Imagines vom Herbste her, andere als Larven, andere als Eier, noch andere als Puppen (Nymphen). Manche Arten erwarten den Winter immer in derselben Form, andere wechselnd, noch andere in allen vier Formen, immer schlafend; man kann letzteres



auch vom Ei behaupten. Während im Sommer ein Ei (derselben Art) sich in einigen Tagen entwickelt und die Larve entlässt, ruht ein Ei, im Herbst gelegt, oft 7 Monate und geht nicht eher aus, bis es gehörig warm ist.

Die fertigen Insekten, Spinnen und dergl. haben unter loser Rinde und Moos, unter Laub, in hohlen Bäumen und Baumwurzeln, in Felsritzen, in Mulm, selbst in Kellern und verlassenen Hütten etc. die feinsten Verstecke. Es giebt Laubanhäufungen, worunter viele Thierchen schlafen, wohn der Winter kaum zu dringen vermag.

Besonders sind zu erwähnen und von höchster Bedeutung für diese Thiere: dürre Grasplätze, auch Waldblössen, dichtes Haidekraut, Heidel-, Himbeer- und Brombeergestrüpp, Weissdorn- und Schlehen- und andere dichte Hecken in Feldern.

Was zum Beispiel in Haidekraut überwintert, kann man sehr gut erkennen, wenn man an Böschungen im Walde an gelinderen Wintertagen die überhängenden Gebüsche (im Januar) abklopft, indem man gleichzeitig einen Regenschirm unterhält. Tausende fallen in den Schirm: Spinnen, Käfer, Raupen in allen Grössen, einzelne Schmetterlinge, Asseln, Tausendfüsse, Schlupfwespen, Fliegen und wie sie alle heissen. Die Temperatur darf dabei 0 Grad zeigen. Die Thiere kommen aus den unteren Theilen des Gestrüppes herauf, um sich einmal zu lüften. Freilich können die beflügelten nicht davon flattern, aber längere Zeit in die warme Hand gesetzt, thun sie es; die flügellosen und alle andern wandeln wie im Traume umher, und die Schlupfwespen und andere Immen können nicht stehen.

Das Urtheil lautet doch nun anders! Oder untersuchen wir das Moos am Waldesrande, oder das, welches die Bäume unten am Stammende überzieht, indem wir die Moosdecke abheben.

Ausser Schmetterlingspuppen finden wir bald den Waldgoldschmied und andere Carabus-Arten, die erstarrt sanft zwischen Moos und Humuserde schlummern. Dazwischen entdecken wir Spinnen, Asseln, Schlupfliegen und -Wespen, Hummeln, Erdwespen, Bienen, Raupen, z. B. die Kieferngluckenraupe und Bären.

Freilich sterben viele Arten (als fertige Insekten) im Herbst ab, aber das ist auch im Frühling und Sommer so. Die Thiere haben als Imagines ein kurzes Dasein, manche sind ja geradezu sprichwörtlich geworden (Eintagsfliege).

Gerade die, welche als fertige Insekten überwintern, haben die längste Lebensdauer, z. B. sämtliche Orrhodien (bei uns), *Amph. cinnamomea*, *Calocampa exoleta* und *vetusta*; es können allein an 100 Schmetterlingsarten sein, manche davon leben von August bis zum Mai des andern Jahres, also volle 9 Monate! Wie viele Arten des Hochsommers erreichen nicht neun Tage! Manche leben nur einige Stunden! Unser Urtheil ist ein ganz anderes geworden.

Geradezu verblüffend wirkt es, wenn man um Ostern und noch später gegen Abend einen Baum mit irgend einer Süßigkeit (Honig oder Syrup, dem man einige Tropfen guten Rumes oder Aepfeläthers zugegeben hat) bestreicht, alten Bekannten vom September und October her begegnet und zwar in ungeheurer Anzahl!

### III.

Der hohlknollige Lerchensporn steht um Ostern in den Hecken in voller Blüthe (in anderen Lenzen auch oft später!), stäubende Haselkätzchen schweben über ihm und den rothen Narben, welche aus den braunen Fruchtknospen des Strauches sich heraushängen, um den gelben Staub aufzufangen und vorläufig aufzuheben für sonnigere Tage. Bei ihnen ist der Fruchtknoten wegen der Gefahr des Erfrierens nämlich noch nicht ausgebildet, jedoch verspricht er bei fortdauernd warmer Witterung zugleich mit den ersten Blättern sich zu entwickeln.

Aehnliches finden wir bei vielen Schmetterlingen und andern Insekten. Da ist gleich schon einer von ihnen. Hinter der Hecke auf dem grauen Steine sonnt sich der kleine Fuchs (*Van. urticae*). Selbstgefällig legt er seine hübschen Flügel hin auf den Stein, klappt sie zusammen wie im Uebermuth und fort gehts wie der Blitz in die Lüfte. Aha! er bemerkte einen andern Schmetterling, einen Citronenvogel, der arglos am Grenzsteine vorüber dem Walde zusteuern wollte. Bald sieht man beide wie tolle Jungen sich balgen. Doch nicht lange. Der Rothe lässt den Gelben ziehen, der dann möglichst eilig fortzukommen sucht. Langsam, stolz, siegesbewusst segelt der Fuchs dem Marksteine wieder zu. Von da aus überschaut er sein Gebiet und lässt keinen Falter ungerufen ziehen.

Betrachtet man sein und des Citronenvogels Kleid näher, so ist es nicht mehr ganz tadellos: sie sind ja auch schon über ein halbes Jahr alt. Es wird von beiden behauptet, dass nur die Weibchen überwintern

und zwar befruchtet, ich behaupte dagegen auf Grund von häufigen Beobachtungen, dass beide Geschlechter überwintern und erst im Frühjahr zur Paarung schreiten. Am besten ist dies bei dem Citronenvogel zu erkennen. Das Weibchen desselben ist weiss, das Männchen gelb, und beide fliegen im Frühjahr häufig, das Männchen sogar häufiger als das Weibchen. Es wäre geradezu unsinnig anzunehmen, dass die Männchen nur, um die Natur zu beleben, überwintern müssen.

Was der Fuchs da bei dem Grenzsteine mit dem Vorübergehenden anstellt, ist nur ein Minnespiel, er setzt es fort und rempelt sogar Hummeln an, bis er die Rechte findet.

Längere Zeit streicht er im Frühjahr umher; oft verlässt er schon im Februar den Keller oder den hohlen Baum, worin er überwinterte, um sich zu sonnen. Die Nesseln, worauf er seine Eier ablegen will, lassen lange auf sich warten: erst im April kommen sie hervor.

Anfangs Mai bringt er seine Eier in grossen Haufen auf die Herzen der Nessel unter. Aehnlich wie er machen es auch der Trauermantel, sein Vetter, der grosse Fuchs (beide auf Weiden, letzterer auch auf Birn- und Kirschbäumen), ferner der Distelfalter auf Disteln, das Tagpfau, der Admiral auch auf Nesseln, der Citronenvogel auf Faulbaum und Kreuzdorn.

Nicht zu vergessen sind, wie schon erwähnt, eine Menge von Eulen (Noctuen) und auch Spanner, die ebenso überwintern und welche fast alle Kleider, wie dürre röthliche, braune oder gelbe Blätter haben oder rindenfarbig sind.

Bei all' diesen genannten Thieren finden wir im Grunde dasselbe, was wir beim Haselstrauch finden. Sieht man näher zu, so bemerkt man schon im August, oft noch früher, die Kätzchen klein, aber schon alles vorbereitet. Sie brauchen sich nur noch zu strecken und zu dehnen. Ebenso bei seinen Verwandten der Birke und der Erle etc.

Ueber ein halbes Jahr, oft fast  $\frac{3}{4}$  Jahre, warten diese Bäume und Sträucher wie die genannten Falter, auf gelegene, günstigere, wärmere Zeit!

Und die Herbstzeitlose paart sich schon im September, um erst im Mai nächsten Jahres Ansätze zu Kapseln zwischen den grossen Blättern zu zeigen, die sich erst im Juni vollständig entwickeln!

Ich könnte hier noch mehr Beispiele von Pflanzen und Schmetterlingen und auch von andern Kerbthieren bringen, es würde mich aber

zu weit führen. Erwähnt seien nur noch *Xylina*-Arten und die befruchteten Wespen, Hummeln, bei denen letzteren aber die Männchen alle im Herbste das Zeitliche segnen müssen.

Es herrscht ein grosser, erhabener, vernünftiger Geist und mächtiger Wille in der Natur.

Besonders auffallend wie bei der Herbstzeitlose und den Kätzchenblütlern ist das Warten auf bessere Gelegenheit bei den Hummelköniginnen und bei einem von den genannten Schmetterlingen, bei dem Trauermantel (*Van. antiopa*).

Letzterer ist schon im Juli überall in Waldungen zu sehen; er hat eine überaus rasche Entwicklung: in kaum zwei Monaten ist er vom Ei bis zum Imago gelangt. Seine Verwandten, die andern Vanessen (Zackenflügler), ausgenommen der »grosse Fuchs«, der es dem Trauermantel gleichthut, schreiten alle nochmals zu neuer Fortpflanzung in demselben Sommer; oft haben sie in der Zeit 2—3 Generationen.

Der Trauermantel und der grosse Fuchs aber wollen ihren Kindern nur Weiches vorsetzen und warten darum mit dem Eierablegen vom Juli bis Mai. Beim Warten bleicht der Trauermantel, wird am Rand der Flügel, der früher gelb war, weiss; sein Mantel ist zerfetzt und nur noch graustatt schwarzbraun. Im April oder Mai setzt er seine Eier an die grünenden Weiden, Pappeln und Birken in grossen Haufen ab.

Wie anders ist es bei den Insekten und den blühenden Pflanzen des Hochsommers! Hier heisst es so oft: »Am Morgen roth, am Abend todt.« Am Morgen erblüht die Rose, der Klatschmohn, die Winde, am Abend sind sie entblättert! Am Morgen verlässt ein glänzender Bläuling seine Puppe, am Abend zieht eine Ameise ihn todt in die Vorrathskammer! Sie hatte es nicht nöthig, ihn vorher zu tödten; todt und starr fand sie ihn am Wege liegen. Für Nachkommenschaft haben die Blumen und der Falter trotz der kurzen Zeit, für sie ein langer, freudiger Sonnentag, gesorgt.

Oder nehmen wir ein Nachtstück, kehren obigen Satz um! Die scheidende Sonne begrüsst noch eine *Agrotis*, die eben ihre Puppenhülle in der feuchten, dunklen Erde zurückgelassen hat. In ihrer Nähe steht die Nachtkerze, *Oenothera biennis*, welche fast regelmässig um 6 Uhr Abends eine neue Blüthe öffnet und aus dem rothgelben Kelche berauschende Düfte in die beginnende Dämmerung sendet. In der Blüthe trifft die *Agrotis* mit einer andern ihrer Art zusammen; sie befruchten die Stempel und pflegen schliesslich auch ihre Minne: am Morgen findet



die aufgehende Sonne die Blume am Welkwerden, der männliche Falter schleicht am Boden und kann sich kaum der Wolfsspinne erwehren, bis er todesmatt ihre Beute wird. Das Weibchen setzt in der folgenden Nacht die Eier ab und stirbt.

#### IV.

Die Pappeln des Waldes, die »zitternden Espen«, hängen schon ihre schönen, seidenwolligen »Schäfchen« aus und senden aus den feuerrothen Staubfäden, die fast unter Seide versteckt sind, trotzdem bleichgelben Staub aus.

Die Kätzchen waren im Herbste noch nicht entwickelt, nur die dickeren rundlichen Knospen an den Trieben liessen Anfänge zu Kätzchen darunter vermuthen, ähnlich wie bei der Sahlweide, die im October schon dickere Blütenknospen zeigte.

Aehnlich ist es ja bekanntlich bei dem Apfelbaume und bei andern Obstbäumen, nur mit dem Unterschiede, dass die frühblühenden Kätzchen-träger aus den dickeren Knospen nur Blüten (Kätzchen) entsenden, während bei letzteren, den Obstbäumen, aus den »Fruchtaugen« Blüten und Blätter entwickeln. Aber bei all' diesen Pflanzen ist leise schon im Herbste angedeutet, was im Frühling kommen mag.

So ist es auch bei den Kleinthieren. Man denke nur an die Puppen, die geduldig auf den Lenz den ganzen traurigen Winter hindurch warten. Und wie alle die oben genannten Pflanzen nicht auf einmal blühen, sondern die Pappeln zuerst (nach der Erle und Hasel), während die Sahlweide dann erst schüchtern anfängt, später der Apfelbaum und andere sich schmücken, so verlassen die Frühlingsfalter, die wirklichen »Frühlings- und Sommerboten« nicht alle auf einmal ihre Puppen, wenn der Frühling endgültig bei uns eingekehrt ist, sondern mehrere Arten kommen zur Zeit der Pappelblüthe (z. B. *Taeniocampa populeti*, *Smerinthus populi*), dann schliessen sich solche an, welche die Sahlweide besuchen (*Taeniocampa gracilis*, *opima*, *incerta* und andere) etc.

Und merkwürdiger Weise (oder vielleicht nicht merkwürdiger Weise, sondern natürlich!) leben die späteren Raupen von diesen Arten ausschliesslich oder am liebsten, wenigstens in ihrer Jugend, an den Pflanzen, welche zu der Zeit blühten, als ihre Schmetterlinge die Puppen verliessen! Nur wenige Arten machen davon eine Ausnahme, oft sind diese Vorläufer der Blüten, sodass die auskriechenden Räumchen sich von diesen nähren. Ausnahmen bestätigen aber die Regel, und die heisst hier:



Der Schmetterling erscheint in der Regel zur Zeit der Blüthe seiner Hauptnährpflanze. (Das Gesetz lässt sich auch auf viele andere Kleinthiere anwenden.)

Und ist das Imago nicht selbst die Blüthezeit des Thieres, das so lange und so oft sich quält in seinen Erdentagen, kämpfend mit den Unbilden der Witterung und Feinden, bis es in seinem Farbenglanze erstet! Gerade wie die Pflanze längere oder kürzere Zeit oft nur für einige Stunden, ihren höchsten Schmuck, die Blüthe, zeigt, so das Leben des fertigen Insektes! Viele davon zeigen sich sehr hinfällig, bald ist der Glanz dahin, andere sind langlebig.

»Ach wie bald, wie bald, schwindet Schönheit und Gestalt!« Manche Arten machen scheinbar eine Ausnahme. Nehmen wir den ersten besten, den Kohlweissling, heraus! Er fliegt zwei- bis dreimal im Jahre, sodass man ihn fast ohne Unterbrechung von Mai bis zum Spätjahr fliegen sieht. Der Kohl blüht nur einmal im Jahre, so weiss man. Doch halt! Der Kohlweissling lebt als Raupe nicht allein am Kohl, sondern auch häufig auf der Kapuzinerkresse, der Reseda, dem Goldlack, am Rettig, Sommer- und Winterraps und andern Kreuzblüthlern. So ist es mit den meisten andern sogenannten Ausnahmen.

Um das Gesetz noch mehr zu erhärten, mache ich darauf aufmerksam, dass wohl die meisten Pflanzenarten bei uns auch als Samen überwintern. Bei den Kleinthieren ist es oft gerade so. Die meisten überwintern wohl auch als Eier. Und sind hier in dem Falle Ei und Same im Grunde nicht dieselben Erscheinungen? Selbst die Knospe der höheren Pflanze ist ein Ei! Auch als Puppe lässt sich die Knospe auffassen. Naturgemäss entfalten sich Ei und Same erst im Frühjahr, früher oder später, je nach der Art; man kann so ziemlich schon voraussagen nach diesen Voraussetzungen hin, dass die Insekten und die Pflanzen, die als Eier, beziehungsweise als Samen überwintern, auch auf einander angewiesen sind. Die betreffenden Insekten ergötzen sich an den Blüthen der Pflanzen, die sie zur Zeit ihres Ausschlüpfens vorfinden, befruchten die Pflanzen, indem sie Pollen befördern und legen schliesslich ihre Eier am liebsten an diesen Pflanzen ab.

Es herrscht eine geheime Beziehung zwischen Pflanzen und Thieren, die wir nur ahnen können!

Unbewusst leisten die Thierchen den Pflanzen die höchsten Dienste, legen aber auch zugleich den Grund zur Erhaltung ihrer Nahrung.

Gerade wie Ei und Same sich nähern, so sind, wie schon angedeutet, Puppe und Knospe fast gleiche Gebilde, »Wickelkinder« der Natur; überwinternde »Kätzchen« der Weiden und dergl. und Puppen der Schmetterlinge gleichen sich sehr in ihrem Warten auf den Frühling. Durch die eintretende Kühle des Herbstes und noch mehr durch den rauhen Winter werden beide in der Entwicklung und im Fortpflanzungsgeschäfte gehemmt.

Wie es nun auch bei den Knospen nun Ausnahmen giebt, indem sich manche in warmen Herbstes entwickeln, ein Aepfelbaum z. B. zum zweiten Male blüht, so auch Ausnahmen unter den Puppen, die oft im Herbstes vorzeitig schlüpfen, indem sie durch die Wärme getäuscht wurden.

Wenn der Aepfelbaum dann noch Früchte ansetzte und die auskriechenden Falter Eier legten, so werden beider Nachkommen unerbitterlich durch die Kälte vernichtet.

Nun könnte noch jemand die Frage aufwerfen: Wo bleiben die überwinternden Raupen und andere Larven? Giebt es Analoges im Pflanzenwuchs? Gewiss! Abgesehen von den Bäumen und Sträuchern finden wir bei den Pflanzen viele Compositen (Löwenzahn, Habichtskraut, Massliebchen, Cichorie etc.), ferner die Schlüsselblume, das Veilchen, Nesseln, Bienensaug, Ballote, Münzenarten, Farnkraut und wie sie alle heissen mögen, die alle perenniren. Im Herbstes sterben die oberirdischen Stengel und die Blätter meist ab, der niedere oder unterirdische Stengel bleibt frisch, viele davon führen selbst im Winter noch einigermaassen ein oberirdisches Leben: die Blätter sind nur nicht so lebhaft grün, sondern bräunlich (wie z. B. beim Löwenzahn, der Cichorie und dem Massliebchen); kommen gelindere Tage, so färben sich diese Blätter mit dem schönsten Grün.

Das Merkwürdigste ist nun, dass die überwinternden Raupen (abgesehen von den meisten »Glucken«- und Spinnerraupen) sich meist von diesen Pflanzen nähren. Im Grunde ist dies auch ganz natürlich! Ich brauche dies wohl nicht mehr weiter zu erörtern.

Nur dieses sei gesagt: Diese Pflanzen stehen oft in grösserer Anzahl an unbauten Orten, an Böschungen, Zäunen, Hecken etc. Da überwintern derartige Raupen auch gern.

Tritt im Winter einmal gelinderes Wetter ein, und die Raupen erwachen, so finden sie gleich an den unter Laub und Gras versteckten Blättern und »Herzen« der Pflanzen noch hinreichend Nahrung; und

im Frühling brauchen sie nicht lange danach zu suchen. Das Imago entwickelt sich dann ebenso schnell wie die Blüthe seiner Nährpflanze.

Es ist darum ein ehernes, feststehendes Gesetz:

Das Imago erscheint zur Zeit der Blüthe seiner Nährpflanze.

Viele Insekten müssen, wenn sie sich auch schon im Sommer vorher entwickelten, die Blüthen ihrer Nährpflanzen erwarten.

Wie manches dieser Thiere fällt in der langen Wartezeit der Schwalbe, der Eule, der Fledermaus und anderen Räubern zum Opfer!

Das aufgestellte Gesetz wurde schon zum Theil geahnt von W. Marshall, Professor in Leipzig, wenn er schreibt in seinem Werk »Spaziergänge eines Naturforschers«, Seite 93:

»— wir können sogar sagen, dass als Larve von niedrigen, namentlich einjährigen Pflanzen lebende Schmetterlinge fast immer in Gestalt von Raupen, Puppen oder vielleicht befruchteten Weibchen überwintern und dass überwinternde Eier fast ausschliesslich bei Formen vorkommen, die als Raupen auf höheren Gewächsen leben«.

Und unser allverehrter selige Herr Dr. Rössler schrieb in seinen »Die Schuppenflügler des Regierungsbezirks und ihre Entwicklungsgeschichte« (Jahrbuch des Nass. Vereins für Naturkunde 1880 und 81) Seite 83 bei *Agrotis Castanea* (Esp.) (*Neglecta* H.): »Der Schmetterling erscheint im August mit Beginn der Haideblüthe, auf welcher er Nachts saugend getroffen wird. Er (der Schmetterling nämlich) bestätigt damit den vielfach zutreffenden Satz, dass die Schmetterlinge meist zur Zeit der Blüthe ihrer Nährpflanzen zu erscheinen pflegen.«

Das ist der Satz, der mir viel zu denken und die Veranlassung gab, denselben nachzuforschen, ob er wahr ist. Und ich habe ihn für wahr gefunden, wie wir sahen.

## V.

Zwischen niedergebeugten, noch dünnen Grashalmen leuchten roth und blau die Blüthen des Lungenkrautes (*Pulmonaria angustifolia*), »umschwärmt von pelzigen Frühlingsbienen, deren hellblonde Köpfchen sich tief in die nektargefüllten Blumenröhren versenken.« Ein Citronenvogel sitzt mit zusammengeklappten Flügeln saugend an einer Blüthe, vermuthlich derselbe, der vorher vom »Fuchs« so siegreich aus dem Felde geschlagen wurde. Der Citronenvogel hat auch hier kein Glück. Gerade will er seinen Rüssel von der einen Röhre in die andere versenken, als

»summ« eine borstige Hummel in den Knäuel der rothen Blüthen fährt, woran der Falter sitzt. Die Hummel weiss um die Blüthen Bescheid. Die rothen, das sind die frischaufgegangenen und mit Honig gefüllten, die besucht sie zuerst, dann die blauen, welche älter sind und meist schon von andern Insekten ihres Honigs beraubt sind.

Der »Gelbe« macht sich schnell auch hier aus dem Staube und sucht die nahe Waldwiese zu erreichen, wo die ihm sympatischen Schlüsselblumen blühen. Hier vertreibt er sich eine zeitlang die Zeit mit Honiglecken — da gewahrt er seines Gleichen in weissem Gewande und nun geht eine tolle Hetzjagd los. Der weisse ist das Weibchen, es fliegt gaukelnd voraus, er blindlings hinterdrein. Man sieht es dem weissen an, dass es ihm nicht ernst ist mit der Flucht, wiederholt lässt es sich plötzlich an einer Schlüsselblume oder im Grase nieder, suchend umkreist der gelbe die betreffende Stelle, bald erheben sie sich beide wieder in die Lüfte über den Erlenbusch und entschwinden dem Blicke.

Wir wollen beide nicht in ihrem Glücke stören; drohend umkreist auch uns die Hummel beim Weiterschreiten mit ihrem »Bum, bomm, bum, bomm!« Sie rückt uns fliegend immer näher, als ob sie es wirklich ernst meinte und stechen wollte. Der Cigarrenduft vertreibt sie, und nun streicht sie hinauf in die Kätzchen der Sahlweide.

Trotz des kaum hingegangenen Winters ist die Natur doch schon reich. Bückt man sich und sieht den Boden, den Grasboden näher an, so findet man allerlei kriechende und fliegende Geschöpfchen! Wenn man dieses gewahrt, möchte man den Fuss nicht mehr niedersetzen, da er allerlei zerquetscht und tödtet. Unter flachen Steinen wimmelt es von Lauf- und Bombadirkäferchen, Aaskäfern, Asseln und Würmern, auf und unter den tothen Blättern zeigt sich irgend ein Milbchen, Mückchen und anderes!

Ueberall zeigen sich Spuren neuen Lebens. Der Vorfrühling kehrt, wie Dr. Ferdinand Cohn richtig bemerkt, die »sonstige Ordnung um, wonach die Pflanze zuerst das einfachere Laubkleid anlegt, ehe sie mit dem Schmuck des Frühlings prangt. Blumen begrüssen als die Ersten die Auferstehung der Natur, und fast alle Gewächse, welche im ersten Frühling zur Entwicklung kommen, stehen in voller Blüthe, ehe noch eine Spur von Blättern sich zeigt«. »Diese Einrichtung dient«, wie er weiter sagt, »der Insektenbefruchtung; denn in den kalten Tagen (und noch mehr kalten Nächten) des jungen Frühlings, wo nur wenig Insekten schwärmen, können die Blüthen um so mehr auf Insektenbesuch



rechnen, je weniger sie durch das Laub verdeckt werden«. Diese Blüthen sind nicht alle wirkliche Schöpfungen des Frühlings; schon im Herbste vorher waren dieselben in allen ihren Theilen vollständig angelegt, aber von der vorsorglichen Mutterpflanze in die schützenden Hüllen der Knospendecken eingeschlossen worden. Die Sonne des Frühlings hat darum leichte Arbeit: Die wartenden Knospen und Kätzchen zeigen sich sehr dankbar; kaum merken sie das bischen Wärme, so strecken und dehnen sie sich und die schönsten Blüthen sind fertig. Das angefangene »Kunstwerk des Herbstes« wird mit »frischen Farben colorirt und zur Schau und allgemeiner Bewunderung öffentlich ausgestellt«. Zu diesen Pflanzen gehören das Schneeglöckchen, das Gänseblümchen, die Niesswurz (Weihnachtsrose) *Helleborus niger*, *fötidus* und *Helleb. viridis*, Seidelbast, Haselstrauch, Pappeln, Weiden und viele andere; selbst bei späteren Maiblumen und dem Buschrandröschen, ist alles schon im Herbste vorbereitet.

Hierauf folgt der zweite Theil des Frühlings, der wirklich erwachende Lenz mit seinen Veilchen, Sternblumen, Hungerblümchen, Leberblümchen, Schlüsselblumen, brechenden Baumknospen, während man den dritten Theil des Lenzes als Hochfrühling bezeichnen muss, in dem alles sich zu neuem Leben entfaltet hat, von dem der Dichter singt:

Saatengrün, Veilchenduft,  
Lerchenwirbel, Amselschlag,  
Samenregen, linde Luft!  
Wenn ich solche Worte singe,  
Braucht es dann noch grosser Dinge,  
Dich zu preisen, Frühlingstag!

Doch gehen wir weiter und sehen, was der erwachende Lenz uns bringt.

Da raschelt es im Laube! Eilig läuft ein Goldschmied über Stock und Stein und eilt quer über den Fusspfad. Goldig und smaragdgrün zugleich glänzt sein Kleid in der Sonne. Wohin willst Du, eiliger Geselle? Das Fahrgeleise läuft er entlang, plötzlich steigt er über dessen Rand und verschwindet zwischen den Blättern des Waldveilchens (*Viola silvestris*). Bald kommt er wieder hervor, und was hat er in seiner Zange? Eine kleine Leiche und zwar diejenige einer Honigbiene. Die fleissige Imme fegte zu Haus die Zelle; frisches Mehl holte sie dann vom Pappelbaume, süssen Nektar sammelte sie bei den Weiden und den Veilchen. Am Abend liess sie sich nochmals verleiten, zu



den Waldveilchen zu fliegen, obgleich sie müde war. Der Honig derselben hatte am Mittag zu gut geschmeckt. Es hielt ihr nun schwer, eine Tracht zusammen zu bringen; die andern Insekten hatten fast alles an diesem sonnigen Tage geholt. Der Thau durchnässte sie, zum Tode ermattet liess sie sich auf dem Veilchenblatte nieder. Am Morgen liegt sie unter demselben, der Käfer hat sie gewittert und gefunden.

Mitten im Frühlingsglück werden wir dadurch an den Tod, an Zerstörung, an etwas Grässliches erinnert! Geben wir acht darauf, so finden wir noch viel mehr Beispiele. Schon oben hörten wir, dass viele Insekten überwintern und im Frühjahr die Eier absetzen. Dann müssen sie alle sterben mitten unter duftenden Blumen, dem zarten Grüne, dem überall erwachenden Leben! Es ist dies eine harte Naturnothwendigkeit. Gerade wie bei dem Menschen!

»Mitten in dem Maienglück lag ein Kirchhof drinnen«, singt der Dichter im »Postillon.« So sehen wir mitten im freudigen Schaffen der Natur, auch überall Tod und Schrecken!

Die grüne Grasdecke im ersten Frühling, die man überall nach dem Schmelzen des Schnees wahrnimmt, ist kein »Kind der Frühlingssonne«. Die Gräser verstehen es meist bei grösster Kälte ihr Leben zu erhalten und bei der geringsten Wärme sich im frischen Grün zu zeigen. Doch dieses Grüne ist nur dazu bestimmt, die Nahrung, seine Stoffe herzugeben für das andere leuchtendere Grün, das sich nun entwickelt. Bald treiben lustig üppigere Blätter aus dem Herz auf und bald auch die Halme in die Höhe, ein Vorgang, den wir besonders bei dem überwinternden Getreide in jedem Frühling beobachten können. Die alten Blätter vom Winter her werden gelb, in einiger Zeit finden wir keine Spur mehr von ihnen.

Selbst die Wurzeln müssen nach und nach abdanken und neue treten an ihre Stelle.

Wie die eine Honigbiene, welche wir vorhin kennen lernten, so müssen alle Arbeiter des Bienenvolkes nach und nach im zeitigen Frühjahr das Zeitliche segnen; sie vermögen nicht wie weiland die Götter sich durch Ambrosia der Blüthen verjüngen, neues frisches Leben regt sich in den Zellen. Und wenn der Apfelbaum und die Linde blühen, sind es meist frische Arbeiter, die dann den Honig holen.

## VI.

»Wenn von fern und nah Vogelstimmen in lauter Lebenslust durch die Luft jauchzen, wenn die Waldbiene wohlgefällig im Sonnenscheine

von Blume zu Blume schwärmt, der Käfer geschäftig über den Sand läuft«, fröhliche Menschen sich in Gottes schöner Natur ergehen, dann könnte man meinen, es sei ewiger Gottesfrieden in der Natur. Aber dem lichten Gemälde entspricht auch eine Nachtseite und wir müssen nicht vergessen, dass die Thiere nur leben, indem ein's das andere tödtet, das »Aller Gedanken auf Mord gerichtet sind«, dass der Sperling die Raupe verspeist, die Amsel den Käfer zerhackt, der Sperber im Begriff ist, auf einen von den beiden zu stossen. Und nicht allein unter den Thieren herrscht dieser ewige Kampf, auch in der Welt der Pflanzen, wie schon oben angedeutet, so unschuldig und harmlos sie erscheint.

Das wusste schon Walther von der Vogelweide, als er im »Waldstreit« sang:

„Ich hör' ein Wasser rauschen  
Und ging den Fischen lauschen;  
Ich sah die Dinge dieser Welt,  
Wald, Laub und Rohr und Gras und Feld  
Was kriechet oder flieget,  
Was Bein zu Beine bieget,  
Das sah ich, und ich sah auch das:  
Da lebt nicht eines ohne Hass . . . .  
Das Wild und das Gewürme,  
Da streiten starke Stürme,  
So auch die Vögel unter sich.“

Die Ursache des Streites ist die nämliche, welche auch in der menschlichen Gesellschaft die Triebfeder so vieler schlimmen Handlungen ist: »Der Brodneid, der Kampf um's Dasein!«

— »Die Erde ist eben nicht gross genug, um all' das Leben zu ernähren, welches auch nur einem einzigen Frühling ihrem Schoosse entsprosst, ein Theil muss nothwendig zu Grunde gehen, wenn über ihren Leichen die übrigen ihre Existenz finden sollen.« Die Pflanzen kämpfen um die Güter der Erde, um Boden und Wasser, um Wasser und Luft. Hier heisst es so oft:

»Du gehst, denn ich bin gross und Du bist klein!«

Das Recht des Stärkeren entscheidet. Der dicht geschlossene Buchenwald unterdrückt jegliches Leben unter sich, darum eilen sich die Buchwindröschen im Hag, damit sie noch schnell blühen, ehe der Schatten des Waldes sie deckt. Der Buchenwald duldet sogar noch nicht einmal seine Kleinen, seine eigne Nachkommenschaft, unter sich. Fröh-

lich keimen die Samen im Vorfrühling; im Sommer sucht man vergebens nach den kleinen Buchen, fast alle sind erstickt, nur hier und da findet man an lichterem Stellen ein kümmerliches Pflänzchen, das auch nach und nach eingeht.

»Um jeden Fussbreit Bodens, um jeden Tropfen Wassers streiten sich die niedrigen Kräuter, und die Bäume sind bestrebt, sie sammt und sonders zu verdrängen.« Auf nacktem Gesteine haben ein paar Moose und Flechten Fuss gefasst, sie suchen sich gegenseitig zu verdrängen; sind die Moose von den Flechten vertrieben, so verdrängen Walderdbeeren mit duftenden Früchten wieder letztere, bis Brombeer-ranken diese ersticken.

»Alle Waffen gelten, dem Gegner wird die Nahrung, die Luft entzogen«, jenem das Licht, dieser wird verstümmelt, erdrückt, zuletzt kommt der Mensch mit Pflug, Hacke und Schaufel, in Kurzem sind alle mit Stumpf und Stiel ausgerottet.

Am heftigsten wüthet der Kampf zwischen den beiden Hauptformen unseres Waldes, zwischen Laubholz und Nadelholz. Die Kiefer hat ein unermessliches Reich in einem fast ununterbrochenen Gürtel von den Ardennen bis über den Ural hinaus eingenommen, nur Wachholder und Birke wagen es, sich in ihr Gebiet einzuschleichen. Im Bunde mit ihr sind Haidekraut und Heidelbeere, Rennthier- und anderen Flechten. Kaum, dass hier und da gelb blühender Ginster und Besenstrauch, Sonnengold und Schimmelkraut Gnade finden.

Weit duldsamer sind die Laubbäume, am wenigsten, wie schon erwähnt, die Buche, am duldsamsten die Eiche. Daher kommt es aber auch, dass letztere überall im Rückgange ist, denn entschieden sind sie seltener geworden, seitdem der Mensch in dem grössten Theil unseres Vaterlandes der Kiefer und noch mehr der Rothtanne, da sie schneller Ertrag bringt, in ihrem Vordringen zu Hilfe kam. »An zahlreichen Gegenden Mitteleuropas hat sich in den Namen der Ortschaften oder den Traditionen alter Leute die Erinnerung an ehemaligen Laubwald erhalten, der heute verschwunden ist.« Kiefer und Fichte sind jetzt dort die Alleinherrscher des Waldes.

In andern Gegenden trifft das Nadelholz auf einen ebenbürtigen Gegner, auf die schon erwähnte Buche. Auf den dänischen Inseln gab es vordem nur Kiefer- und Birkenwald, heute finden wir dort die prächtigsten Buchenwälder. Und in unsern Wäldern (des Taunus) kann man beobachten, wie die Buche die Eiche überall verdrängt. »Zwar

sind letztere langlebiger und zäher und verachten den hartnäckigen Gegner, der sich zwischen ihnen einnistet, aber bald vermag der junge Eichennachwuchs nicht mehr unter dem finsternen Schatten der Buchenwipfel aufzukommen, die alten Stämme, denen sie wohl nichts anhaben können, sind auf den Aussterbeetat gesetzt, und schliesslich behauptet die Buche allein das Feld.« (Dr. Cohn.)

Was der Wald mit seinem Schatten begrub, das sieht man am deutlichsten, wenn die Axt oder das Feuer ihn vertilgt. Auf dem entblössten Erdboden entwickeln sich nicht wieder die nämlichen Arten, sondern ganz andere. Zum Theil sind es die ehemaligen Bürger des Bodens, die auf demselben schon angesessen waren, ehe die Waldbäume sie aus ihrem ererbten Besitze verdrängten. Jahrzehnte, oft Jahrhunderte harreten die Unterdrückten auf den Moment, wo sie wieder ihrer Usurpatoren ledig sein würden.

Zum Theil sind es auch fremde Geschlechter, die oft aus weiter Ferne vom Wind als Samen hergeführt werden und von dem herrenlos gewordenen Terrain Besitz ergreifen. Alte Eingesessene und Unterdrückte sind: Himbeere und Brombeere, Weide, Maiblume, Erdbeere, Espe, Eberesche, Heidel- und Preisselbeeren, neue Eindringlinge: Waldmiere, Habichtskraut, Weidenröschen, Waldkreuzkraut, Gras.

Allmählich erhebt sich Gesträuch, und indem die kräftigsten nach Barbarensitte die Schwächlinge in ihrer Mitte ersticken, bildet sich in Kurzem die Waldschonung aus; es entsteht ein Laubwald, wo vielleicht früher ein Nadelwald gewesen und umgekehrt.

Aber die Bäume und Sträucher kämpfen nicht allein unter sich, auch gegen Räuber und Mörder müssen sie sich wehren. Ein ganzes Heer von Insekten bedroht sie, Schmarotzerpflanzen, Schuppenwurz (Orbanchen) und Pilze umklammern und durchfressen sie. Doch es würde mich zu weit führen, näher darauf einzugehen.

Wir müssen, da nun einmal vom Kampf die Rede ist, auch der Thiere nicht vergessen. Welch' eine eigenthümliche Gesellschaft gewahren wir auf dem frischgepflügten Acker! Der Bauer zertrat eine Maus, die der wühlende Pflug aus ihrer unterirdischen Wohnung herausstörte. Nun sitzen Goldschmiede und andere Carabus-Arten rings herum und fressen an dem Aas, bis zuletzt nur noch das Gerippe übrig bleibt. Sehen wir näher zu, so merken wir, dass die Gesellschaft durchaus nicht »einmüthiglich« die Beute verzehrt. Jedenfalls betrachten sie sich gegenseitig auch mit scheelen Blicken, da beisst einer den andern, der



andere, nicht faul, thut dasselbe, bis der Schwächere davon humpelt, um auf Seitenwegen sich wieder heranzuschleichen, er gedenkt neben dem Gartenlaufkäfer eine bessere Nachbarschaft zu finden. Doch auch dieser wendet sich drohend um und siehe da, sie kneifen sich gehörig, bis der letztere mit zerbrochener Kinnlade sich davon macht, um von einem anderen *Carabus* verspeist zu werden. So auch hier überall der alte Neid und Zank!

Bekannt sind die »Thaten« des Maulwurfs, der graben muss tief in der Erde, während hoch in der Luft der Habicht und andere Raubvögel ihre Kreise ziehen, spähend, auf eine Taube oder einen Singvogel zu stossen.

Der »Todtengräber« verscharrt allerlei kleine todte Wirbelthiere, um seine Eier daran abzulegen, damit seine Engerlinge darin sich mästen können. Der Puppenräuber (*Calos. sycophanta*) klettert auf Eichen und andern Waldbäumen umher bis in's Gezweig, um Raupen und allerlei Kleinthiere zu verspeisen.

Die Larven der Marienkäferchen leben von Blattläusen; Ameisen als der letzteren Freunde wehren jenen und suchen sie mit Stumpf und Stiel auszurotten.

Wie wüthen die Raubthiere unter den Nagern und Huftthieren! Doch weiter die bekannte Materie zu erörtern, ist nicht nöthig.

Aber der Schmarotzer und ähnlicher Geschöpfe müssen wir hier noch mit einigen Worten gedenken. Der Schmetterlingssammler wird oft enttäuscht, wenn aus seinen glücklich überwinterten Puppen statt der erhofften Falter der Kasten von wespen-, schnaken- und mückenähnlichen Thierchen wimmelt. Es sind dieses die Tachinen und Schlupfwespen. Diese legen ihre Eier auf die Raupe, oder stechen die Raupen vermittle des Legestachels an und schieben je ein Ei oder mehrere in deren Körper. Die daraus sich entwickelnden Maden leben auf Kosten ihrer Wirthe, diesen selbst mangelt es nicht an Fresslust, werden gross und dick, als ob ihnen nichts fehle. Manche Schlupfwespenmaden kriechen, wenn die Raupen erwachsen, aus denselben, indem sie ebenso viele Löcher machen, als sie vorhanden waren. Das ist etwas Furchtbares, Schreckliches! Die Raupe gleicht dann einem Siebe und muss elendiglich umkommen. Andere Tachinen und Schlupfwespen bleiben in der Raupe, welche sich ruhig verpuppt, aber keinen Schmetterling liefert, sondern eben die Nachkommen der Parasiten. Selbst Puppen und Eier der Schmetterlinge werden von anderem Gesindel heimgesucht!



Wie bei den Raupen der Schmetterlinge, so geht es auch bei den Käferlarven, die auch »angestochen« werden und Tachinen und Schlupfwespen liefern. Fast jede Raupen- und Käferlarven-Art haben ihre besonderen Parasiten, oft mehrere Arten, die sie heimsuchen.

Welche Bedeutung dieses Gesindel aber für den Haushalt der Natur hat, ist leicht einzusehen, wenn man bedenkt, welche Mengen von Eier ein Schmetterlingsweibchen abzulegen vermag. Wären diese den Raupen und Engerlingen nachstellenden Geschöpfe nicht, so würden die Insekten überhand nehmen, der Mensch hätte bald nichts mehr zu reissen und zu beissen. Ohne Raupen und andern Larven können die Tachinen (Schlupffliegen) und Ichneumoniden (Schlupfwespen) nicht existiren. Verschwänden erstere, so wären letztere auch zugleich mit von der Erde vertilgt.

Die kleinen Geschöpfchen halten unter den Kleinthieren ähnlich Polizei und das Gleichgewicht in der Natur, wie etwa die Raubthiere unter den Huf- und Nagethieren, oder die Raubvögel unter den übrigen Vögeln, wie diese auch unter den Kleinthieren. Doch genug hiervon.

## VII.

Verlassen wir dieses traurige Bild und wenden uns einem lieblicheren zu. Es herrscht nicht bloss Hass und Zwietracht in der Natur, sondern, wie wir im Frühling besonders sehen, in noch höherem Grade die Liebe, deren schönste Seite, die Fürsorge der Eltern für ihre Kleinen, wir näher beleuchten wollen.

Freilich begegnen wir in vielen Ordnungen der Thiere keiner Elternliebe, weil sehr viele nur ein kurzes Dasein haben.

Ein stumpfsinniges Aufgussthierchen wächst heran. Wenn es gross genug ist, theilt sich sein Körper in gleich grosse Theile. Hier müssen wir mit Professor Marshall fragen: »Wo ist nun die Mutter, wo das Kind? Also hier kann von Mutterliebe und -Sorge keine Rede sein, viel weniger von Kindesliebe.

Aber rührend ist die Sorgfalt und der Eifer, mit welchen so zahlreiche Thiere bestrebt sind, einen möglichst günstigen Ort für ihre Eier zu erlangen. Viele von diesen Geschöpfen, welche ich hier meine, lernen ihre Nachkommenschaft nie kennen, da sie selbst ein nur kurzes Dasein haben, bald nach dem Eierabsetzen sterben müssen. Aber ihre Eier bringen sie da unter, wo die Jungen bald ihre Nahrung finden können,

oder die Eier werden (wohl in den meisten Fällen) an die Nahrungsquelle selbst gelegt.

Eine Schmeissfliege, so theilt Marshall mit, die er mit einem rothen Klexchen versehen, fing er 32mal und setzte sie jedesmal wieder an die Luft. Ebenso regelmässig kehrte sie wieder zurück, um absolut ihre Eier an einem Fleischstück absetzen zu wollen, bis er die Sache satt bekam und das Fenster schloss.

Die Ausdauer einer solchen Mutter ist fabelhaft; dabei spielt der Geruch eine Hauptrolle, denn eine Schmeissfliege setzt ihre Eier auch an Aasblumen ab. Schmetterlingsweibchen finden mit ausgezeichnete Sicherheit die oft seltenen Pflanzen, von denen ihre Raupe sich nährt.

Manche Schmetterlingsweibchen, und zwar besonders die, deren Raupen an verschiedenen und häufig vorkommenden Pflanzen sich nähren können, sind allerdings, so scheint es, oft leichtsinnig beim Ablegen der Eier. So finden wir eben eine vertrocknete Dolde der Schafgarbe vom Vorjahre, welche ganz besetzt ist mit Eiern von *Taeniocampa gracilis*. Wenn wir die eben noch frischen, weissen Eier, die sich wegen ihrer Farbe leicht von dieser grauen Unterlage abheben, zwei Tage in der Pappschachtel aufbewahren, so werden sie grau, sind kaum mehr von den Früchtchen der Schafgarbe zu unterscheiden. Beachten wir dieses und bedenken weiter, dass die Aprilzeit noch keine warme ist (höchstens brennt die Sonne am Mittag öfters schon heiss, die Nächte aber sind kühl, die Morgen neblig und unfreundlich), so erkennen wir: Das Schmetterlingsweibchen hat so viel für seine Nachkommenschaft gethan, als es nur thun konnte: Die Eier sind auf der grauen Unterlage bald geschützt vor Vögeln und andern Feinden, die Sonne brennt gehörig auf die dunkle Unterlage und bringt die Eier bald zum Schlüpfen, die trockenen Pflanzentheile schützen sie gegen Kälte und Nässe, die auskriechenden Räupchen finden gleich Nahrung, sie brauchen sich bloss fallen zu lassen und sitzen im Klee, Löwenzahn oder Schlehenbusch etc., die als Nahrung dienen, denn diese Thierchen sind keine Kostverächter. So machen es viele Schmetterlinge, besonders Eulen des Frühlings! Leichtsinn hiess sie nicht hier Eier absetzen, sondern geradezu Ueberlegung! Aehnliche Stellen wie die Dolden der Schafgarbe sind dürre Zäune und Latten, trockene Rinde und a. m.

Der Oleanderschwärmer, der in heissen Sommern aus den Tropenländern nordwärts bis zu uns fliegt, entdeckt hier in Gärten und an

Veranden den schönen Futterstrauch seiner Raupen, der doch nur ein Fremdling bei uns ist.

Mit »tödtlicher Sicherheit« wissen die Schlupfwespen und Schlupffliegen die unglücklichen Larven anderer Insekten, welche sie anbohren, um ihre Brut in ihnen unterzubringen, aufzufinden. Raupen, welche in Stengeln oder Halmen leben, werden sogar von solchen trächtigen Weibchen heimgesucht.

Viele Schmetterlingsweibchen, z. B. besonders die der Ordensbänder (Catocalen), der Stachelbeerspanner und andere legen ihre Eier, welche zu überwintern haben, nicht an die Blätter ihrer Nährpflanzen, sondern, als ob sie wüssten, dass diese im Herbste abfallen, an die Rinde oder noch besser, um sie den Augen lüsterner Vögel zu verbergen, unter die Rinde, in Flechten und Spalten der Stämme, andere, z. B. die Frostspanner an die Winterknospen oder an Zweigen. Dabei gleichen auch hier die Eier in der Farbe der Unterlage.

Der Kohlweissling und seine Verwandten bringen ihre zarten, gelben Eier im Sommer an die Unterseite der Blätter an, damit sie nicht so leicht bemerkt werden können und ihnen die Sonnenhitze nicht schaden kann.

Sollten die Schmetterlinge eine Ahnung davon haben, was ihren Kleinen Verderben bringen kann? Ich will die Frage nicht beantworten.

Manche Spinnerweibchen bedecken ihre Eier mit ihrer Afterwolle, um diese warm zu betten, damit sie den Winter überstehen können (z. B. *Ocneria dispar*, *Bombyx catax* [Everia] und andere). Andere überziehen sie mit einer Art Firniss zum Schutze gegen Kälte und Nässe. Die Schildläuse decken in ihrem Tode ihre Eier mit ihrem Panzer.

Die Spinnen im Gegensatz zu den vorigen sind die Thiere, welche noch längere Zeit leben und sehen, was aus ihren Eiern wird. Die Weibchen sind zwar ungemüthliche Ehegattinnen, denn wenn sie ihre Ehemänner erwischen können, fressen sie die Väter ihrer Kinder auf, wie schon der alte Degeer vor mehr als 120 Jahren beobachtete und mit Entrüstung und mit Grauen darüber berichtete; aber gute liebevolle Mütter sind sie durchweg.

Viele bauen künstliche Nester, oft in Gestalt einer Kugel, die sie mit Gefahr ihres Lebens vertheidigen. Sie verlieren es nicht aus dem Auge und springen gleich herbei, um nachzusehen, was es giebt, wenn ein Störenfried es betastet. Sie füttern die Spinnchen im Neste, vergrössern es, sobald das Wachsthum der Kleinen es verlangt.

Andere, die Wolfsspinnen und Tigerspinnen, tragen ein Säckchen mit Eiern und später mit ihren Jungen gefüllt, vorsorglich unter dem Leibe mit sich herum. Nimmt man dasselbe hinweg, so rennen sie suchend umher. Legt man es in ihre Nähe, so springen sie, wenn sie es glücklich entdeckt, auf ihr »Ein und Alles«, und frohlockend rennen sie damit davon über Stock und Stein.

In meiner Jugend machte ich mir öfters den Spass, sie anzuführen. Ich ballte ein wenig Baumwolle zur Grösse und Kugelgestalt ihres Eiersäckchens. Ihr eignes nahm ich ihnen weg. Das Kunstsäckchen warf ich ihnen dann vor. Schleunigst nahmen sie es und rannten damit davon. Plötzlich hielten sie mitten im Laufe und liessen dasselbe enttäuscht fallen, rannten suchend umher, und ich erbarmte mich ihrer und gab ihnen ihr eignes. »So spottet«, wie Marshall sagt, »der Mensch frivol mit den heiligsten Gefühlen seiner Mitgeschöpfe!«

Auch unter den Käfern finden wir zärtliche Mütter. Vor allen Dingen ist hier der Rosskäfer, im gewöhnlichen Leben Dungkäfer genannt, zu erwähnen und seine ganze Verwandtschaft. Da das Weibchen jedoch seine Eier an gerade nicht nach Rosen duftenden Orten unterbringt, so wollen wir uns nicht weiter dabei aufhalten, auch wurde ihrer schon oben gedacht.

Die Blattroller sind wahre Künstler unter den Rüsselkäfern. Mit grosser Mühe und auf umständlichste Weise drehen diese ein Blatt oder mehrere zu einer Rolle zusammen, dass sie Cigarren nicht unähnlich sehen und legen bei'm Rollen ein oder mehrere Eier in das Blatt. Dass dieses sich besser rollen lässt, schneiden manche dasselbe am Stiel etwas an, dass es welk wird. Andere Arten stechen gleich einen ganzen Trieb an und rollen mehrere junge Blätter auf. Wenn die Rollen fertig und die Eier hinein gelegt sind, werden von manchen Arten die Blätterstiele ganz durchbissen, dass sie zur Erde fallen, andere Arten lassen dieselben hängen.

Die Larven leben dann von den faulenden Blättern und verwandeln sich in denselben oder in der Erde zu Puppen, die im andern Jahre schlüpfen. Dahin gehören der Birkenblattroller (*Rhynchites betuleti*), *Rhynchites betulae*, *Rh. alliariae* und der gemeine Rebenstecher, der oft grossen Schaden am Weinstock verursacht.

Wie die Ameisen liebevoll für ihre Brut sorgen, ist allgemein bekannt. Rührend ist es, mit anzusehen, wie dieselben, wenn sie im Neste gestört werden, zuerst ihre Nymphen (die weiss eingewickelten



Puppen), welche sie fein säuberlich in die Sonne getragen hatten, in die Kiefern nehmen und damit eiligst in den Gängen verschwinden, damit ja den Kindern kein Leid geschieht.

Die Raubwespen, obgleich sie schreckliche Thaten vollbringen, sind nicht minder für ihre Jungen besorgt. Die Weibchen rauben für ihre Larven Insekten (Raupe, Blattläuse, Blattwespenlarven, Käfer, selbst Honigbienen, Mücken etc.), welche sie erst durch einen Stich lähmen und dann in ihre Nester schleppen, ähnlich verfahren die echten Wespen, nur mit dem Unterschiede, dass diese mehr auf süsse Frucht und Honig ihr Augenmerk richten, deshalb oft grossen Schaden in Gärten anrichten können.

Wie alle Immen für ihre Nachkommenschaft sorgen, ist bekannt genug und hier nicht weiter zu erörtern.

Bekannt sind die Stichlinge, die als Baumeister aus einfachen Pflanzenfasern, die sie mit dem Maule zusammenschleppen und verfilzen, runde Nestchen an allerlei Wassergewächsen anbringen. In jedem Neste liegen etwa 100—150 Eier. Nach dem Eierlegen wird das Weibchen vom Männchen verjagt. Letzteres übernimmt allein die Wache und Sorge für die wasserhellen Eier und für die nachfolgende, sehr unruhige Brut. Es bewacht die beiden Eingänge des Nestes, jedes sich nähernde Thier wird attackirt, selbst der Hecht, so gross er auch ist. Sofort fährt es dann wieder in's Nest, um zu sehen, ob noch alles in Ordnung ist. Dann postirt es sich wieder vor dasselbe, umkreist es, schlägt mit den Flossen frisches Wasser durch das Nest, damit der nöthige Sauerstoff hineingelange.

Wenn die Brut geschlüpft ist, dann beginnt erst recht die Arbeit für den geplagten Papa. Die Eier lagen wenigstens still, aber jetzt ist die Sache viel heikler geworden! Neugierig und vorwitzig, wie einmal die liebe Jugend ist, wird es den winzig kleinen Weltbürgern zu langweilig im engen Neste und hin und wieder schlüpft eins heraus, um sich in der grossen Welt umzuschauen. Doch der Papa nimmt es zornig in's Maul und trägt es zurück in die Wiege. Im Umdrehen sind aber 3—4 andere heraus geschwommen, die werden wieder hineingeschafft. Kaum sind diese d'rin, so sieht der gestrenge Zuchtmeister, dass auf der andern Seite sich wieder andere seiner hoffnungsvollen Zöglinge vor dem andern Eingange herumtreiben, flugs geht es im Blitze dorthin und -- marsch in's Nest! heisst's hier wieder. Nun geht's wieder zum ersten Loche — und so den ganzen Tag und wohl auch die Nacht fort. Dazu



kommt noch die Plage, für all' die lieben Kinder und für sich die Nahrung herbeizuschaffen. Es ist gut, dass in dem Flechtwerk des Nestes sich allerlei kleine Geschöpfchen, besonders Infusorien, ansiedeln, welche zum grössten Theil den Kleinen zur Nahrung dienen.

Ganz ähnlich bauen andere Fische Nester, wie die chinesischen Grossflosser oder Macropoden, die männlichen Welse und andere.

Es soll sogar Fischmännchen geben, welche die Eier nach dem Ablegen in die Mundhöhle nehmen, worin sie sich entwickeln und die Jungen eine Zeitlang hausen.

Die reinsten »Pantoffelhelden« aber sind die Seepferdchen, welche am Hinterleib eine Tasche besitzen, worin sie die vom Weibchen abgelegten Eier verbergen; andere Männchen heften sie reihenweise am Bauche an. Die Art mit der Tasche ist aber wohl die interessanteste, denn hier sind die Rollen scheinbar vertauscht. Bei den Säugethieren nehmen die weiblichen Beuteltiere ihre sehr unentwickelt geborenen Jungen noch eine Zeit lang in einen Beutel oder eine Tasche des Hinterleibes. Hier ist es der Mann. Die Tasche bei dem männlichen Seepferdchen wird bald umfangreicher, er geräth demnach in »interessante Umstände«, bis eines Tages die kleinen Seepferdchen eins nach dem andern hervorkommen, »der Seehengst hat geboren, geföhlt!«

Wie unter den Fischen, so giebt es auch unter den Kröten und Fröschen der heissen Zone Beispiele echter Elternliebe und zwar sind es vorzugsweise die Männchen, die die Sorgen und Lasten für die Nachkommenschaft tragen.

Die Geburtshelferkröte, Höhlenkröte, *Alytes Obstetricans*, ist leider die einzige (im Südwesten) unseres Vaterlandes. Das Männchen wickelt das frisch gelegte schleimige Band mit den dunklen Eiern um die Hinterbeine und kriecht mit der »theuren Last« in eine feuchte Höhle einer Mauer oder gräbt eine solche vorher in die Erde. Darin bleibt es einige Wochen, hierauf kommt es mit dem »Kinderpacket« wieder hervor, sucht einen Tümpel, um dort die Eier ausgehen zu lassen, worauf dann die Kaulquappen munter davon eilen. Dann ist es seiner Sorgen ledig.

Wie nun die Vögel liebevoll für ihre Nachkommenschaft sorgen, ist allgemein bekannt, wir brauchen dies auch nicht näher an Beispielen zu erörtern. Manche Eltern könnten sich daran ein Beispiel nehmen.

Werden wir nicht unwillkürlich an treuer Eltern Sorgen und Leid erinnert, wenn man das Gebahren des Vogels beobachtet, wenn er Eier oder Kleine im Neste hat!

Es ist nur ein Kinderlied, das folgende, aber ich kann es mir nicht versagen, es zu bringen:

„In der Wiegen sah' ich liegen  
Dort ein kleines Vögelein,  
Und es streckt sich, und es reckt sich  
In dem Nestchen, warm und klein.

Leise gehet, leise wehet  
Durch die Zweige hin der Wind.  
Auf und nieder, hin und wieder  
Schaukelt er das Vogelkind.

Und zur Seiten singt voll Freuden  
Mütterlein ein Wiegenlied;  
Und ihr Singen und ihr Klingen  
Durch den stillen Abend zieht.

Vögelein reget und bewegt  
Leis' im Schlaf die Flügelein,  
Träumt von Fliegen in der Wiegen  
Und von Duft und Sonnenschein.“

Die Schilderung dieses Familienidylls stammt von einem wahren Naturfreund, und wir brauchen kein Wort mehr hinzuzufügen, wir erkennen, dass in der Vogelwelt wohl ähnliche Elternfreuden und Elternsorgen existiren als in der Menschenwelt, aber dass auch keine Thierklasse ähnliches aufzuweisen hat.

»Die Liebe der Vögel zu ihrer Nachkommenschaft ist eine an Aufopferung reiche, eine rührend grosse. Der Vogel erduldet körperliches Missbehagen, Schmerzen Tage und Wochen lang seinen Kindern zu Liebe! Welche Geduld und Liebe beweist der Vogel bei'm Brüten und Aufziehen der Kleinen!« Ja die Liebe und Geduld und Gutmüthigkeit zeigen sie sogar den Nachkommen einer fremden Art.

Weit einförmiger gestaltet sich die Pflege der Nachkommenschaft bei den Säugethieren, obgleich sie auch ihre Jungen aufopferungsvoll lieben. Viele, besonders die Fleisch- und Insektenfresser, sowie die Nager, legen auch Nester, oft in Höhlen, an, andere, wie die Hufthiere und Wale, bringen Junge zur Welt, welche bald den Alten folgen können, während erstere weniger entwickelte Nachkommen haben, die längere Zeit in der Höhle oder in hohlen Bäumen und dergl. zubringen müssen.

Wir haben bei den Säugethieren demnach etwas Analoges mit den Vögeln: Nesthocker und Nestflüchter, wenn man diese Eintheilung auch hier gelten lassen will; wir können nicht gut andere Ausdrücke dafür finden.

Bei manchen Ordnungen der Säugethiere, besonders bei solchen, welche gewöhnlich nur 1 Junges bekommen, tritt die Gewohnheit, die Kleinen längere Zeit mit sich herumzutragen, immer wieder auf, so bei den Fledermäusen, Affen, Lemuriden, Faultieren. Alle diese tragen sogar ihre Kinder auf dem Rücken oder an der Brust, genau so, wie der Mensch im urwüchsigen Zustande auch thut, »bald an der Brust, bald wie die Hottentottinnen huckpack auf dem Rücken.«

So erkennen wir in der wenn auch oft unbewussten Sorgfalt, der Opferwilligkeit und -freudigkeit, der Geduld, welche auch selbst kleine Thiere zeigen, in der sorgsamen Ausübung der Mutter- und oft auch Vaterpflichten, die Liebe, die sich durch die Thierreihe aufwärts steigert bis sie bei den warmblütigen Thieren, beim Vogel, Säugethier und bei den Menschen ihren höchsten Ausdruck findet. — —

### VIII.

Doch müssen wir weiter schreiten, die Sonne sinkt. In dem Fahrgeleise der Strasse rennen einige rothbeinige Laufkäfer auf und ab. Sie vermögen nicht den Wall derselben zu übersteigen, die Wände sind vom Rade geglättet, da rutschen sie immer wieder herunter, bis es endlich nach und nach hier und da einem gelingt, aus dem für sie tiefen Thal zu entkommen, ehe ein neuer Wagen erscheint.

Da steht eine grosse Gruppe Erlenbäumchen. Die meisten sind verblüht, einige haben noch ihre Kätzchen heraushängen, während schon der Boden ganz davon übersät ist. Die zapfenähnlichen Früchtchen brauchen fast ein Jahr, bis sie die geflügelten Samen losgeben können, was gewöhnlich im Winter bis Februar geschieht. So lange bleiben auch, ähnlich wie bei den Kiefern, die kleinen Zapfen auf dem Baume, bis aller Samen fortgeflogen ist. Dann fallen die zu drei und vier an einem im Winter vertrocknenden Aestchen sitzenden Zäpfchen selbst und auch bald die Aestchen zur Erde, den Boden mit einem schwarzen Geniste deckend.

Schon oft besuchten wir diese Büsche und die weiter oben stehenden Haselsträucher und Birken, um die scheckige *Endromis versicolora* (Buntflügel oder Scheckflügel), den bei uns seltenen, prächtigen Spinner,

zu erbeuten. Wir sahen uns fast die Augen aus, um das Weibchen endlich einmal »in den Zweigspitzen der Birken und Erlen« zu erbeuten. Es ist nach der gewonnenen Regel Zeit, dass der Falter da sein muss.

Wir erinnern uns, dass wir im Vorjahre im Hochsommer einen Strauch von diesem Erlendickicht ganz zernagt fanden und die umstehenden Bäumchen auch viele Frassspuren der *Versicolora*-Raupen zeigten, die gesellig leben.

Leider waren wir zu spät, die Thiere schon in Moos und dergl. verpuppt. Selbst die ausgeschlüpften Eier sassen noch in verschiedenen Häufchen an den Zweigen, und diese Zweige waren, ach ja, diese waren gerade nicht oben an der Spitze der Bäumchen, sondern ziemlich tief, beinahe das Gras und die Böschung berührend. Vielleicht finden wir einen von den ausgegangenen Schmetterlingen! Und richtig, was sitzt hier? Es ist doch gut, dass man die genannten, oft kleinlich scheinenden Umstände festnagelt im Gedächtnisse!

Da sitzt ein Pärchen dieses edlen Wildes! Das Männchen sucht im Sonnenschein, trotzdem es ein Nachtfalter ist, schnell das Weite zu erreichen, nur zu! Das trägere Weibchen wandert in eine Schachtel und wird im Weiterschreiten von Zeit zu Zeit in der Schachtel betrachtet, wie eine Dohle den goldnen Reif in ihrem Neste öfters beäugeln soll. Ist es vielleicht nur der Sammeleifer, der uns die Beute besehen lässt oder was sonst? Wir wollen endlich einmal das Geschöpf in allen Stadien der Entwicklung kennen lernen; hoffentlich legt es wie alle Saturniden uns willig Eier! Dies sagend, öffnen wir wieder vorsichtig die Schachtel — und fort ist das geträumte Glück in die Luft! Wer hätte das gedacht! So träg und doch auch wieder so flink! Wie sich der Falter eilt, in den Buchenwald zu kommen! Doch da ist ein ganzes Häufchen Eier in der Schachtel abgelegt. Es ist gut, dass der Schmetterling fortflug, sonst hätten wir zuviel bekommen, denken wir, ähnlich wie der Fuchs in der Fabel.

Zu Hause im Gärtchen warten schon 3 Bäumchen (Erlen- und Birkenbüsche), worauf sie gezogen werden sollen.

Andere Saturniden benutzen wie *Endromis versicolora* die Tageswärme, fliegen also im hellen Sonnenschein, obgleich sie Nachtfalter sind. Jedoch fliegen nur die Männchen am Tage, während die Weibchen sehr träge sind und nur bei der Eierablage lebhafter werden. Woher kommt es nun, dass die Männchen derselben Tagthiere geworden



sind? Um Ostern und noch später (im Mai) sind gewöhnlich die Nächte noch recht kühl, oft bringen sie noch Reif und Eis. Die Sonnenwärme des Tages lockt aber trotzdem diese Spinner aus ihrem Gespinnste, z. B. *Aglia tan* (Leyendecker), *Saturnia pavonia*, die schon genannte *Endr. versicolora*, *Drepana falcataria*, *cultraria*, *binaria*, *lacertinaria*, *curvatula*, *harpagula*, *Cilix glaucata* (spinula), *Bombyx rubi* und Andere.

Die Weibchen sitzen an Stämmen der Bäume, im Laube und an den noch dürrn Blättern der niederen Büsche und gleichen den welken Blättern, indem sie braun, gelblich oder grau aussehen, *Spinula* (*Glaucata*) allein sieht in beiden Geschlechtern einem Vogelexcremente nicht unähnlich. So sind diese Thierchen sehr geschützt vor nachstellenden Feinden. Die Männchen fliegen nun beim ersten besten Sonnenschein wie rasend umher und suchen die Genossinnen auf, um der Minne zu fröhnen, sie sind alle lebhafter gefärbt, manche gleichen in der Farbe den Tagfaltern, auch ist ihr Flug diesen fast gleich. Wenn man ein *Pavonia*-Männchen sich umhertummeln sieht, so glaubt man Anfangs einen »Fuchs« vor sich zu haben.

Ich sagte, dass die Männchen den ersten besten Sonnenschein benutzten, um aufzufliegen. Viele entomologische Werke nämlich behaupten, dass diese und jene der genannten Arten von 8—10 Uhr Morgens, andere von 10—12 u. s. w. nur flögen. Doch dem ist nicht ganz so. Ist der Morgen neblig und kühl und bricht die Sonne erst am Nachmittag durch, so sieht man solche Männchen auch dann auf-fliegen, wenn auch im Buche steht, nur von 10 bis 12 Uhr Vormittags.

So fliegen *Pavonia*, die sonst am Tage umherflattern, gewöhnlich von 4 bis 6 Uhr Nachmittags, selbst noch an warmen Abenden in der Dämmerung umher, nach Weibchen spähend. Und die vorhin erwähnte *Endr. versicolora* traf ich, wie mitgetheilt, am späten Nachmittag in Paarung. Die Regeln, welche die Bücher angeben in Hinsicht des Fluges, ist nur an solchen Tagen zutreffend, wenn die Nacht vorher kühl und dann am Morgen die Sonne in allem Glanze sich erhebt. Das ist aber leider recht selten im April der Fall.

Die nächsten Verwandten der genannten Saturniden und *Drepana*-Arten sind in südlichen Ländern in beiden Geschlechtern nur nächtliche Thiere. Die Männchen haben da nicht nöthig, den Sonnenschein abzu-



warten, sie erstarren nicht in der Nacht, darum sind auch beide Geschlechter gleich gefärbt und haben meist düstere Farben.

## IX.

Betrachten wir nun noch den blühenden Sahlweidenbaum (*Salix caprea*)

Vorzugsweise an feuchten, humusreichen Waldstellen, an Waldbächen, gewöhnlich in grosser Gesellschaft stehend, ist *Salix caprea* ein echter Frühlingsbote, der um Ostern die dicken braunen Blütenknospen sprengt und die weisseidenen »flockigen wolligen« Blütenkätzchen hervortreibt, während die Blattknospen vorläufig noch warten, bis wärmere Tage eintreten und alles sich allgemein schmückt.

Sie ist ein Sinnbild der Auferstehung und vertritt die Palme heisser Zonen bei uns sowohl, wie hoch droben an den Gestaden in der Nähe des Polarkreises. Sie ist ein Bild unvergänglicher Lebenskraft; sie spottet den Bemühungen des Forstmanns, das Weichholz und damit auch sie auszurotten, um nur Nutz- und Brennholz im Walde zu pflegen.

Sobald wärmere Tage eintreten nach den rauen Wintertagen, besonders nach einem durchdringenden warmen Regen, entwickeln sich aus den seidenen »Lämmchen«, wie die Kätzchen von den Kindern wohl in den meisten Gegenden Deutschlands genannt werden, auf verschiedenen Bäumen getrennt auch zweierlei verschiedene Blüten. Die Lämmchen des einen Baumes wurden gelb, ihre fleischigen Spindeln sind mit bräunlichen, wolligen Schuppen lose besetzt, dazwischen hängen unzählige Staubgefässe heraus: an langen dünnen Fädchen baumeln kleine Beuteln mit feurig goldenem Staube. Das sind die männlichen Blüten, die Brüderchen. Ein Strauss davon duftet stark nach purem Honig.

Die Lämmchen des andern Baumes dagegen werden silbergrau mit grünlichem Schimmer und bestehen ebenfalls aus Schüppchen, welche nur etwas kleiner und weniger wollig sind als die der Brüderchen, und lauter Fruchtgefässen, welche wie Säckchen geformt, zwei gelbliche Knöpfchen tragen. Das sind die weiblichen Blüten, die Schwesterchen. Diese duften weniger nach Honig, trotzdem die Köpfchen oder Narben und die Schüppchen vollständig mit solchen überdeckt sind.

Die kleineren, spitzeren Knospen entwickeln sich schnell, aber erst nach dem Abfallen der »Brüderchen« zu länglich runden, vorne ziemlich lang, zugespitzten wolligen zarten Blättern (daher auch der Name »Woll-

weide«), welche oben ein dunkleres gesättigteres Grün, unten ein silbernes Weiss zeigen.

Welches Leben und welche Wonne auf dem alten, oft mit Moos und Flechten überzogenen, oft vom Stnrm zerzausten, von Knaben zerrissenen, zerborstenen Weidenbaume besonders im ersten Frühling sich abspielt, ist kaum mit Worten zu schildern.

Seufzend in der lauen Frühlingsluft harren die Schwesterchen des Grusses der Brüderchen. Begierig behalten die süssen, klebrigen Narben den Staub, den zufällig der Wind ihnen von drüben vom Goldbruder zuträgt; doch wie manches Stäubchen verweht spurlos und hat also den Zweck seines Daseins nicht erfüllt!

Siehe, da kommt zu Mittag ein braunes Kerlchen, ein geflügeltes Amorchen, summend herbei, direct zum Baume, der stärker duftet. Die zarten Staubbeutelchen werden von ihm zertreten. Der goldige Staub färbt es gelb, dass es wie gepudert aussieht; seine Höschen, welche gleich beim Beginne der Arbeit, beim Eintreten in die Schuppen mit süssem Nektar benetzt wurden, sind bald mit Goldklümpchen bedeckt.

Seine Gesellen, die andern Bienen, seine plumpen Verwandten, die Hummeln, die Schwebfliegen und Blumenfliegen, Wespen, ein ganzes Heer zuletzt, erobern die zahllosen Honigschlösschen; prächtige Sommervöglein: Fuchs, Tagpfau, Citronenvögel, Trauermantel, die den langen kalten Winter über in Baumritzen erstarrt sassen, alle hungrig und durstend nach dem süssen »Stoffe«, Fliegen, Schlupfwespen, Käferchen, alles zerwühlend und zerstrampelnd, thun sich hier götlich.

Allein der Hunger ist gross, die goldigen Dinger versprechen mit ihrem Duft mehr, als sie wirklich geben, auch sind der Näscher zu viel. Hinüber geht's daher allmählig zum Baume, der die Schwesterchen trägt. Weniger duftend, haben diese dafür mehr mit Nektar aufzuwarten. Lange verweilen die goldgepuderten Geschöpfchen daselbst, ein Schwesterchen nach dem andern kommt an die Reihe, allen wird der Dienst der Liebe erzeigt. Manches goldne Staubkügelchen wird von den süssen, klebrigen Närbchen als Gruss und Geschenk vom Brüderchen d'rüben festgehalten und nie mehr losgelassen. Als Botenlohn bekommen die Liebesboten Honig in Hülle und Fülle. Manch' brummende Hummel lässt sich noch spät am Abend am Weidenbaum vernehmen, sie kann sich gar nicht von ihm trennen.

Die Stempelblüthen pflegen sorgsam die erhaltenen Körnchen und wecken mit ihrer Hilfe im Fruchtknoten den Samen, der schon Ende

Mai und in der ersten Woche des Juni als kleine Körnchen im weissem Federkleide reif ist und mit dem Winde oft weithin reist. Regen und Thau schlagen den Wanderer nieder, feuchte Stellen im Walde, Bachufer, Sümpfe halten ihn fest und im nächsten Jahre spriessen die Weidenbäumchen auf. So stillen die Liebesboten des Tages das heimliche Sehnen und Verlangen der getrennt lebenden Blüthentheile.

Sie thun, unbewusst dessen, was sie eigentlich bewerkstelligen, welches eigentlich der Zweck ihres eiligen Thuns und Treibens ist. Die fleissigen Immen stillen am Baume nicht bloss ihren Hunger und Durst, sondern füttern auch zu Hause ihre Königin mit dem heimgebrachten Nektar und ziehen damit deren Nachkommenschaft gross. Die andern, die Käfer, Ichneumoniden und Schmetterlinge machen sich dort ein süsses Zeitvertreib, während die Blumenfliege, die Hummelschwebe und die andern Fliegen nicht bloss naschen wollen, sondern auch zum Aerger der andern allerlei Schabernack verüben. Die Hummelschwebe (*Bombylius medius* z. B.) spielt mehr mit den Blüthen, stört die Hummeln, verjagt die Falter, zornig stösst sie auf die Honigbiene, als ob ihr Fleiss sie ärgere. Sieht man näher zu, so wird man auch erkennen, dass sie dann und wann, gleich einem Schwärmer, ihren langen, aber immer gestreckten Rüssel in die Röhren taucht, um den Honig im Grunde zu schlürfen.

Das ist ein Gestrampel auf den Blüthen, ein Zappeln und rastloses Hin- und Herfliegen! Dazu ertönt ein allerliebstes Frühlingsliedchen vom Weidenbaume her. Die Blumenschwebe spielt erste Geige, die Schmarotzerfliege die näselnde Klarinette, die Hummeln und Bienen die Bässe und Posaunen. Es stimmen ein die Holz- und Goldwespen, die Schlupfwespen und Schlupffliegen und wie sie alle heissen mögen. Die Tänzer sind die Mücken, Fliegen und Schmetterlinge.

Und der alte Weidenbaum mag sich wohl darüber freuen, dass ihm wieder seine List gelungen ist!

Liebesboten, die den Staub hinüber tragen zu den, welcher ihn sehnüchtig erwartet, muss er haben, sonst ist, wenn er alles dem Zufall des neckischen Spieles, dem Winde überlassen will, das meiste verloren.

Es genügt ihm nicht, einige Gäste zufällig zu bekommen. Wenn einer einen Weinschank einrichtet, will er ein volles Haus, so steckt er in irgend einer Gestalt »Gottes Arm« aus, dass sind die langen Aeste mit den Kätzchen. Damit ist es aber nicht allein gethan, dass

die Blüthen Honig haben und weit hinaus ragen, es muss auch Reklame gemacht werden, womöglich in den schreiendsten Farben, hier starkes Gold, durch starken Duft, der die Insekten, in weiter Ferne wirkend, herbeilockt wie die Bratwurst den Bauersmann. Auch an Gelegenheit zum Tanzen fehlt es nicht, und Prügel kann es wie auf jeder Kirmes auch absetzen.

Der Weidenbaum bewirthe seine zahlreichen Gäste mit feiner Speise und süßem Tranke, sodass manche Zecher, wie wir noch sehen werden, sein Haus taumelnd verlassen, giebt den vielen Geschöpfen einen Ort zur gegenseitigen Annäherung, Gelegenheit, neue Bekanntschaften anzuknüpfen, zu freien und zu lieben. »Nektar oder Blüthenhonig ist der Kuppelpelz, den sich die Thierchen bei den entomophilen Blüthen verdienen!« Sie wissen nicht, warum sie dies alles thun müssen, über Blumenduft, Honigseim und Minne würden sie es auch bald vergessen, wenn es ihnen Jemand zuraunte oder ein böser Feind sie stören wollte.

Was die Sonnenkinder und der Wind dem Weidenbaume nicht alle besorgen können, das thun die geflügelten, geschäftigen, meist bräunlichen, gelblichen oder wie Gespenster gefärbten kleinen Boten der Nacht, eine Menge Noctuen und einige Spanner. Zum grossen Theil haben viele von den Noctuen den Winter über, wie wir schon hörten, geschlafen, manche Arten sind erst kürzlich der Erde entschlüpft, manche machen den ersten Flugversuch.

Schon zu Beginn der Dämmerung erheben sich diese Thierchen »zu baden im Aether die irdische Brust«. Wie Pünktchen jagen sie, hoch oben im Gewirr der Zweige umherirrend und lange Zeit gar nicht zur Ruhe kommend. Manchmal schwirrt eins mit deutlich wahrnehmbarem Gsumme, vom Grase neben uns herkommend, an unserem Ohre vorbei. Die Genossen jagen sich, spielend verfolgen sich die Geschlechter, aber alles hoch über uns, geräuschlos. Und der alte Baum freut sich dessen, er hat auch wieder Gäste herbei gezaubert, aber bessere als die des Tages. Kein Gebrumme und Gsumme wie in der Sonne; aber wir möchten behaupten, dieses Getreibe sei trotzdem poesievoller! Es ist ein Liebesgetändel zwischen den duftenden Kätzchen, die diese Wesen gelockt und gerufen, ihm Honig spendend und Gelegenheit gebend, den Bund für ihr kurzes Eheleben zu knüpfen.

Die Dämmerung erlaubt uns noch zu beobachten, wie einzelne dieser Kleinen hier und da von dem Honig nippend wie rasend zu Nachbar-



weiden eilen, wie Pärchen sich auf Kätzchen niederlassen, um im weichen Nestchen zu ruhen. Berausgender Duft steigt zu uns hernieder, noch immer kommen tanzende Elfchen geflogen.

Nur die Sahlweide hat die Ehre, im ersten Frühjahrsregen, mit ihrem Duft und Honig diese Thiere zu berauschen. Nicht einmal ihre Verwandten, Korb- und Silberweide, viel weniger die Buche und andere Kätzchenträger zeigen dies geheimnissvolle Treiben. Dass die Thiere wirklich berauscht sind, dass förmlich ein Ball mit Zechgelage stattfindet in dem luftigen süssen Kätzchensaal des alten knorrigen Weidenbaumes, erkennen wir, von der Trunkenheit der Geschöpfe werden wir uns später überzeugen.

Welcher Unhold fährt da zwischen die harmlosen Vögelchen? Eine hässliche Fledermaus ist es, sie strebt knirschend den kleinen Gestalten nach und erwischt manche. Deutlich sieht man mehrere dieser unheimlichen Räuber nun die Reihen der Weiden abstreifen. Der »Schatten der Nacht«, der Ziegenmelker gesellt sich dazu und jagt heiser meckernd den Waldsaum auf und ab! Eulen, wie der Waldkauz, suchen auch ihren Hunger zu stillen. Wie manches zum Nektar eilendes Thierchen erreicht nicht die Weide.

Ein Glück ist es, dass die kleinen Gesellen meist düstere Farben haben und dass die gelben Vöglein sich bald auf gelben Grunde, die Kätzchen, niederliessen! Um die Thierchen näher zu sehen, haben wir ein grosses, weisses Tuch mitgebracht, eine Blendlaterne giebt das nöthige Licht. Das Tuch wird unter dem Weidenbaume so ausgebreitet, dass der grössere Theil der blühenden Aeste sich senkrecht darüber befindet.

Noch warten wir ein wenig, etwa bis 9 Uhr, zünden die Lampe an und geben dem Baum 2 bis 3 kräftige Stösse. Da liegt die ganze Schaar der Zecher auf dem weissen Grunde! An günstig gelegenen Stellen fallen hunderte auf das Tuch. Sowohl die Staubgefässblüthen als die Fruchtgefässblüthen, letztere im höheren Grade, liefern das Ergebniss.

Die Zecher lassen sich in die Hand nehmen, betrachten, einsperren, machen keine Anstalten zum Fortfliegen! Woher kommt dieses? Vorher waren sie doch so flink! Warum schwirren sie nicht davon?

Der süsse Nektar hat sie berauscht und der Meth die Sinne umnebelt. Die Kühle der Nacht mag auch etwas dazu beitragen. Wahrscheinlich ist der Rausch der einzige Grund.



Sind die Kätzchen nämlich am Abblühen, dann kommt dieselbe Zechgesellschaft auch beim Abschütteln zum Vorschein, fliegt aber trotz der Kühle bald auf, ja, oft stiebt alles beim Anstossen davon. Sehr wenig oder nichts fällt auf das Tuch als abgeblühte Kätzchen. Die Thiere sind angelockt (die abgeblühten Kätzchen duften noch fast wie frische) allein der Meth fehlte oder wurde nur noch in geringem Maasse gespendet.

Sprachen wir bisher von den Freunden der Kätzchen, müssen wir auch Feinde derselben erwähnen. Unter dem Gold und Silber der Kätzchen wüthet die Bosheit. Die fleischigen Spindeln der Kätzchen und die zarten Staubfäden dienen neben dem Honig einer grossen Menge von Gesindel zur Nahrung. Sehen wir uns mehrere Zweige mit Blüthen an! Einzelne Theile davon sind verkümmert, hier eine Stelle von Staubgefässen oder Fruchtgefässen entblösst, dort das ganze Kätzchen, offenbar noch frisch, inwendig ganz morsch.

Man sieht keinen der Verderber offen und frei. Sie scheuen wie alle Diebe das Licht. Wir klopfen einige Zweige auf ein grosses weisses Papier aus. Siehe, da liegen grössere und kleinere Thierchen, es sind kaum dem Ei entschlüpfte Räupchen und Larven von Käferchen. Und wie gemästet! Kaum können sie den Körper vorwärts bringen. Wollten wir sie mit etwas anderem füttern, sie würden lieber verhungern; besonders ist dieses bei den Engerlingen der Fall, welche absolut keine andere Nahrung als die Spindeln der Lämmchen, welche sie aushöhlen, zu sich nehmen und schon erwachsen sind, während die Räupchen die abfallenden Kätzchen oder die Schwesterchen weiter benagen und erst später mit niederen Pflanzen, Löwenzahn, Wegerich, Gras, Winden, Weidenlaub und dergl. sich gross mästen.

Die Eier dieser Larven wurden meist schon im Spätherbst an den dicken Knospen der Weiden von Schmetterlingen und Käfern abgesetzt. Wir urtheilen nun doch schon milder über diese Thierchen! Die Kätzchen bieten ihnen ja die erste und oft einzige Nahrung, welche der Lenz um diese Zeit aufbringen kann.

Doch, mein Lieber, sieh', plaudernd sind wir im Dunkel an unserm Ziele angelangt! Gott grüsse dich,

Meine liebe Heimath im Thale,  
Von Bergen, Wiesen und Reben umkränzt!

---

## Nachtrag

zu dem

im vorigen Bande der Jahrbücher erschienenen Verzeichnisse  
fossiler Wirbelthiere von Mosbach,

von

Aug. Römer.

---

**Megaceros giganteus Owen.** Riesenhirsch.\*) (*Cervus euryceros* Hibb.)

Ein fast vollständiger Schädel (Oberkiefer) wurde in der Lössgrube auf dem Besitzthum des Herrn Dr. Peters zu Schierstein am Rheine, in 16 Meter Tiefe aufgefunden. Die Geweihschaufeln fanden sich nicht, da, wie aus den Erhöhungen auf den Rosenstöcken sich schliessen lässt, der Hirsch dieselben abgeworfen hatte.

Wir geben die Maasse dieses seltenen Prachtstückes wie folgt an: Die Länge des Schädels vom Hinterhaupte bis zum Vorderande beträgt 55 cm. Die Breite der Augenränder des Zwischenkiefers voneinander 25 cm. Dieselbe über der Mitte der Zahnreihe 15 cm. Die Breite der Nasenhöhle 10 cm und die Länge dieser selbst 13 cm. Die Breite der Rosenstöcke voneinander 26 cm.

**Rhinoceros tichorhinus Cuv.** Wollhaariges Nashorn.

Ein Backenzahn des Oberkiefers wurde in derselben Lokalität aufgefunden.

---

\*) Der Riesenhirsch findet sich häufig in den Torfmooren Irlands und wird als identisch mit dem im Nibelungen-Liede erwähnten grimmen Schelch, welcher im 12. Jahrhundert noch gelebt haben soll, bezeichnet.

---

# Ergebnisse

der

## meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden

### im Jahre 1895.

Von

**Aug. Römer,**

Conservator.

---

Die beigelegte Tabelle ergibt folgende

#### Jahres-Uebersicht.\*)

Mittlerer Luftdruck . . . . .	750,8 mm
Höchster beobachteter Luftdruck am 28. December . . .	765,9 «
Niedrigster « « « 13. « . . .	729,3 «
Mittlere Lufttemperatur . . . . .	9,1° C.
Höchste beobachtete Lufttemperatur am 28. Juli . . .	32,5 «
Niedrigste « « « 8. Februar . . —	18,4 «
Höchstes Tagesmittel der « « 24. Juli . . .	24,6 «
Niedrigstes « « « 24. Januar . . . —	12,8 «
Mittlere absolute Feuchtigkeit . . . . .	7,4 mm
« relative « . . . . .	78 %
Höhensumme der atmosphärischen Niederschläge . . .	545,2 mm
Grösste Regenhöhe innerhalb 24 Stunden am 24. October .	24,5 «

---

\*) Die Beobachtungsstunden sind: 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. (Ortszeit.)

# Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden

im Jahre 1895.

Oestliche Länge von Greenwich = 8° 13'. Nördliche Breite = 50° 5'. Höhe des Barometers über dem Meere = 113,5 Meter.


Monate.	Lu f t d r u c k reduc. auf 00C.				L u f t t e m p e r a t u r.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Mittel.	Maxi- mum.	Datum.	Mini- mum.	Datum.	7 h a.	2 h p.	9 h p.	Mittel.		Mittel.		Differenz.	Absolutes Max.		Absolutes Min.		Datum.		7 h a.	2 h p.	9 h p.	Mittel.		7 h a.	2 h p.	9 h p.	Mittel.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									C.°	C.°	C.°	C.°		C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°				C.°	C.°					C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C.°	C

Monate.	Bewölkung wolkenlos = 0. bedeckt = 10.			Niederschlag.		Zahl der Tage mit								Zahl der						Zahl der Beobachtungen.										
	7 <sup>h</sup> a.	2 <sup>h</sup> p.	9 <sup>h</sup> p.	Mittel.	Sum- ma.	Maxi- mum in 24 Stun- den.	Datum.	mehr als 0,2 mm Regen, Schnee, Grau- peln.	Regen.	Schnee.	Graupeln und Hagel.	Nebel.	Gewitter.	Wetterleuchten.	heiteren Lage (wolkenlos).	trübten Lage (bedeckt).	Sturmtage.	Eistage.	Frosttage.	Sonnertage.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Windstillen.	
Januar . .	8,6	8,4	8,8	8,5	41,6	5,4	16.	20	8 19	—	—	—	—	—	2	21	—	14	23	—	23	8	3	3	—	18	6	21	11	
Februar .	7,3	5,3	6,3	6,3	14,6	4,0	13.	9	— 10	—	—	—	—	—	6	11	—	16	26	—	18	26	10	1	—	2	10	8	9	
März . . .	6,6	6,1	6,3	6,3	48,3	13,8	28.	12	13 3 2	—	—	—	1	—	5	15	1	—	11	—	5	6	16	3	5	29	7	11	11	
April . . .	5,0	6,0	4,2	5,1	29,5	5,7	19.	11	11 1	—	—	—	3	—	5	6	—	—	1	—	13	10	7	6	9	18	8	10	9	
Mai . . .	3,9	6,2	6,0	5,4	65,3	21,0	19.	16	17	—	—	—	4	—	6	8	1	—	—	1	14	17	9	7	4	8	3	18	13	
Juni . . .	4,3	5,2	5,9	5,1	58,2	21,0	20.	11	13	—	1	—	4	3	5	3	—	—	—	9	27	7	1	3	3	14	4	23	8	
Juli . . .	6,1	6,7	5,2	6,0	33,4	7,0	22.	10	12	—	1	—	4	3	—	8	—	—	11	—	9	2	3	1	10	26	14	8	20	
August. .	5,2	4,7	3,7	4,5	44,9	14,2	14.	13	15	—	1	—	4	—	8	3	—	—	10	—	6	4	1	5	5	25	14	13	20	
September	2,8	2,4	1,4	2,2	3,1	1,6	14.	3	4	—	—	—	2	—	18	2	—	—	12	—	7	3	8	5	4	4	7	8	44	
October .	7,6	6,4	6,3	6,8	68,2	24,5	24.	15	16	—	—	—	2	—	2	10	1	—	3	—	7	5	5	5	4	24	11	8	24	
November	7,9	7,0	7,5	7,5	44,5	15,0	13.	14	14	1	—	—	2	—	2	16	—	1	8	—	3	21	19	7	7	14	4	—	15	
December	8,9	8,4	8,8	8,7	93,6	21,6	7.	18	16	7	1	—	1	—	—	22	—	3	12	—	3	22	12	3	—	17	15	9	12	
Jahr . . .	6,2	6,1	5,9	6,0	545,2	24,5	24. X.	152	139 41	6	5 22	6	5 22	6	59	125	3 34	84 43	135	131	94	49	51	199	103	137	196			



Zahl der Tage mit Niederschlag (mehr als 0,2 mm)	152
« « « « Regen	139
« « « « Schnee	41
« « « « Hagel	1
« « « « Graupeln	5
« « « « Thau	19
« « « « Reif	32
« « « « Nebel	5
« « « « Gewitter	22
« « « « Wetterleuchten	6
Zahl der heiteren (wolkenlosen) Tage	59
« « trüben (bedeckten) Tage	125
« « Sturmtage	3
« « Eistage	34
« « Frosttage	84
« « Sommertage	43
Zahl der beobachteten N.-Winde	135
« « « NE.-	131
« « « E.-	94
« « « SE.-	49
« « « S.-	51
« « « SW.-	199
« « « W.-	103
« « « NW.-	137
« « « Windstillen	196





























JAHRBÜCHER

DES

NASSAUISCHEN VEREINS

FÜR

NATURKUNDE.

---









JAHRBÜCHER  
DES  
NASSAUISCHEN VEREINS  
FÜR  
NATURKUNDE.

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. ARNOLD PAGENSTECHER,

KÖNIGL. GEH. SANITÄTSRATH, INSPECTOR DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS UND  
SECRETÄR DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE.

---

JAHRGANG 50.

MIT EINEM PORTRÄT VON C. R. FRESENIUS  
UND EINER KARTEN-SKIZZE.

---

WIESBADEN.  
VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1897.

---


*Die Herren Verfasser übernehmen die Verantwortung  
für ihre Arbeiten.*

---

# I n h a l t.

	Seite
 <b>I. Vereins-Nachrichten.</b>	
Protokoll der Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde vom 13. December 1896 . . .	IX
Jahresbericht, erstattet in der Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde am 13. December 1896, von <b>Dr. Arnold Pagenstecher</b> , Kgl. Geh. Sanitätsrath, Museumsinspector und Secretär des Nassauischen Vereins für Naturkunde . . . . .	X
Bericht über die wissenschaftlichen Abendunterhaltungen des Vereins, von Lehrer <b>Güll</b> (Wiesbaden). . . . .	XVII
Nekrolog. C. Remigius Fresenius . . . . .	XXIX
Verzeichniss der Mitglieder des Nassauischen Vereins für Naturkunde im Juni 1897 . . . . .	XXXIV
Siebenter Nachtrag zum Cataloge der Bibliothek des Nassauischen Vereins für Naturkunde, von <b>Aug. Römer</b> , Conservator, Wiesbaden . . . . .	XXXIII
Verzeichniss der Akademien, Staatsstellen, Gesellschaften, Instituten etc., mit welchen der Nassauische Verein für Naturkunde gegen seine Jahrbücher im Tauschverkehr steht . . . . .	LXXXI
 <b>II. Abhandlungen.</b>	
Chemische Untersuchung der Adler-Quelle zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit der Analyse des Wiesbadener Kochbrunnens. Von Prof. <b>Dr. C. Remigius Fresenius</b> und Prof. <b>Dr. Heinrich Fresenius</b> zu Wiesbaden . . .	3
Verzeichniss der in den Jahren 1893—95 von mir in Kaiser-Wilhelmsland und Neupommern gesammelten Tag-schmetterlinge (mit Ausschluss der Familien der Lycaeniden und Hesperiid. Von Hofrath <b>Dr. B. Hagen</b> , Frankfurt a. M. (Mit einer Kartenskizze) . . . . .	23

	Seite
Catalog der Coleopteren von Japan. Von <b>H. von Schoenfeldt</b> , Oberst a. D. (Dritter Nachtrag) . . . . .	97
Die Wirbelthiere des Regierungsbezirks Wiesbaden. Von Prof. <b>Dr. B. Borggreve</b> (Wiesbaden) . . . . .	145
Die Lepidopteren des Nordpolargebietes. Von <b>Dr. Arnold</b> <b>Pagenstecher</b> (Wiesbaden) . . . . .	179
Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse der meteo- rologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden von den Jahren 1870—1895 incl. nebst den Angaben der 26jährigen Mittelwerthe, der höchsten und tief- sten Barometer- und Thermometerstände und der Summen der weiteren Beobachtungen dieses Zeit- raumes. Von <b>Aug. Römer</b> (Wiesbaden) . . . . .	241
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden im Jahre 1896. Von <b>Aug. Römer</b> (Wiesbaden) . . . . .	246



I.

## Vereins-Nachrichten.

---





# Protokoll

der

Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde  
vom 13. December 1896.

---

Der Vereinssecretär Geh. Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher eröffnete, da der Herr Vereinsdirector Regierungs-Präsident von Tepper-Laski durch Unwohlsein verhindert war, die zahlreich besuchte Versammlung. Herr Geh. Hofrath Dr. R. Fresenius hatte die Güte, den Vorsitz zu übernehmen. Er begrüßte die Vereinsmitglieder und Gäste und ertheilte, in die Tagesordnung eintretend, zunächst dem Vereinssecretär das Wort zur Erstattung des Jahresberichts. (S. Anhang.) Als zweiter Gegenstand der Tagesordnung wird die Wahl eines Kassirers an Stelle des verstorbenen Herrn Rentners C. Duderstadt vorgenommen. Dieselbe fiel auf den provisorischen Rechner, Herrn Reg.-Hauptkassebuchhalter Hehner.

Da sich zu 3. der Tagesordnung, Anträge und Wünsche, Niemand zum Wort meldete, hielt darauf 4. Herr Hofrath Dr. B. Hagen (Frankfurt a. M.) seinen angemeldeten Vortrag: „Land und Leute in Neu-Guinea“. Der durch zahlreiche Photographien, ethnographische und zoologische Präparate äusserst instruktiv gehaltene Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Darauf Schluss.

An die Versammlung schloss sich ein zahlreich besuchtes gemeinschaftliches Festmahl in den Räumen des Casinos an.

Der Vereinssecretär:

Dr. A. Pagenstecher.

---

# Jahresbericht

erstattet in der

Generalversammlung des Nassauischen Vereins für Naturkunde  
am 13. December 1896,

von

**Dr. A. Pagenstecher**, Königl. Geh. Sanitätsrath,  
Museumsinspector und Secretär des Nassauischen Vereins für Naturkunde.

---

Meine Herren! Das 67ste Vereinsjahr, über welches ich Ihnen heute statutengemäss zu berichten habe, schliesst sich in ruhiger und gleichmässiger Entwicklung seinen Vorgängern an.

Gestatten Sie mir, dass ich Sie zunächst mit den Veränderungen bekannt mache, welche sich im Personalbestande unserer Mitglieder vollzogen haben. In die Zahl unserer correspondirenden Mitglieder wurde aufgenommen: Herr Hofrath Dr. B. Hagen aus Homburg (Pfalz), jetzt in Frankfurt a. M., welcher die Güte haben wird, in der heutigen Generalversammlung uns Einiges aus seinen reichen Erlebnissen im fernen Osten und speciell in Deutsch-Neu-Guinea vorzutragen.

Als ordentliche Mitglieder traten unserem Verein bei die Herren:

Regierungshauptkassenbuchhalter Hehner, Dr. phil. Ebel, Dr. med. Ernst Pagenstecher, Dr. med. Ricker junior, Dr. med. Scheinmann dahier und Herr Sigmund Salter in Wien.

Ausgetreten sind die Herren:

Geh. Reg.-Rath Fonk zu Rüdesheim, Realgymnasiallehrer Caspari zu Oberlahnstein, Professor Dr. Schneider zu Berlin, Rentner W. Vogel und Oberstlieutenant von Dewitz zu Wiesbaden.

Durch Wegzug verlor der Verein die Herren:

Gymnasiallehrer Höfer, Exzellenz General der Infanterie von Kraatz-Koschlau, Exz. Generalleutnant von Müttschefahl, Rentner Nötzel und Fabrikant C. Scholz dahier.

Ueberaus schmerzlich sind die zahlreichen Verluste, die wir im vergangenen Jahre durch den Tod von Mitgliedern erlitten haben.

Unser Vorstandsmitglied Herr Carl Duderstadt, der lange Jahre als Cassirer des Vereins, wie als Vorstand der Section für Mineralogie und Patäontologie in dem Verein gewirkt hatte, starb am 17. Januar 1896 nach längerem Leiden. Sie finden einen kurzen Lebensgang des liebenswürdigen, von uns Allen verehrten Mannes im diesjährigen Jahrbuch.

Am 4. Juli 1896 verstarb ein nicht minder treues Mitglied, Herr Bergdirector Emil Herget, welchen der Vorstand als Ersatz für Herrn Duderstadt in seine Mitte cooptirt hatte.

Emil Herget war geboren am 8. April 1833 zu Hadamar, besuchte das Gymnasium zu Wiesbaden und bezog 1852 die Bergacademie zu Freiburg in Sachsen. Nach Beendigung der Studien fand er Anfangs Anstellung im nassauischen Staatsdienst. 1858 übernahm er die Stelle eines Directors der Emser Blei- und Hüttenwerke und trat 1864 zur Rheinischen Bergbau- und Hüttenwesen-Actien-Gesellschaft als Bergwerksdirector über. Bis 1867 wohnte er in Katzenelnbogen und von da bis zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst im Jahre 1893 zu Diez. Im letzteren Jahre siedelte er nach Wiesbaden über. Leider konnte er sich nicht lange der wohlverdienten Ruhe erfreuen: ein Herzleiden, an welchem er im Frühjahr 1878 erkrankte, raffte ihn am 4. Juli 1895 dahin.

Der Verstorbene verband mit einem reichen Wissen eine treue Hingabe an seinen Beruf und ein offenes, warmes Herz für alles Gute und Edle. Unvergessen wird, wie es in dem ihm im hiesigen »Rheinischen Kurier« gewidmeten Nachruf lautet, das Wirken dieses wackeren Mannes bleiben an den Orten, wo er thätig war, und in den Vereinen, denen er als Mitglied angehörte. Leider sollte es ihm nicht vergönnt sein, innerhalb unseres Vorstandes länger thätig zu sein; mit seiner freundlichen Zusage verband er bereits ahnungsvoll die Bemerkung, er werde wohl nicht lange wirken können.

Fast zu gleicher Zeit, am 6. Juli 1896, verstarb zu Wiesbaden im 68. Lebensjahre ein ebenfalls hochgeschätztes, treues Mitglied unseres

Vereins, Herr Major a. D. Schlieben. Geboren am 21. Februar 1828 in Landsberg an der Wertha, machte er als Offizier den Krieg von 1870/71 mit, nahm 1875 seinen Abschied und siedelte nach Wiesbaden über. Mit einer umfassenden Kenntniss der Klassiker von Schulpforta her ausgerüstet, widmete er sich nicht nur dem Studium der Alterthumswissenschaften und war ein eifriges Mitglied des hiesigen Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, sondern er fehlte auch bei fast keiner wissenschaftlichen und geselligen Vereinigung unseres naturhistorischen Vereins, wo er, wie dort, mit seinem gesunden Humor ein stets gern gesehenes Mitglied wurde. Auch den schönen Künsten und der Musik war der Verstorbene ein eifriger Jünger, und so ist mit ihm, wie in einem Nachrufe im hiesigen »Tagblatt« bemerkt wurde, ein von idealem Streben beseelter, schaffensfreudiger Mann dahingeschieden.

Ausser den genannten Herren verloren wir noch eine Anzahl von werthen Mitgliedern, als welche ich Ihnen zu nennen habe:

Consistorialpräsident de la Croix, Rentner Dresel, Rentner Dr. Ferdinand Haas, Hüttendirector Ladsch, Rechnungsrath Lex, Augenarzt Dr. Meurer senior, Rector a. D. Polak, Rentner Adam Schmitt, Stadtrath Steinkauler zu Wiesbaden, pract. Arzt Dr. von Ibell zu Bad Ems.

Wir bewahren allen diesen früheren Mitgliedern, deren Heimgang eine so grosse Lücke in unseren Verein gerissen hat, ein bleibendes, warmes Angedenken.

Ich bitte Sie, sich zum Zeichen dessen von Ihren Sitzen erheben zu wollen. —

Meine Herren! Das innere Leben unseres Vereins ist in ähnlicher Weise verlaufen, wie in früheren Jahren. Unsere wissenschaftlichen Abendunterhaltungen, welche so sehr unserer Aufgabe der Förderung und Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse dienen und das Band unserer Mitglieder stets fester zu schlingen geeignet sind, sind in gewohnter Weise fortgesetzt worden. Wir sind Allen, welche sich an denselben betheiligten, zu lebhaftem Dank verpflichtet, insbesondere aber Denen, welche sich zur Mittheilung ihrer Studien und Erfahrungen in so bereitwilliger Weise vereinigten.

Die von den Herren Vigener und Leonhardt in dankenswerther Weise schon seit vielen Jahren geleiteten botanischen Excursionen wurden, trotzdem die Witterung in diesem Jahre ihnen vielfache Hin-



dernisse entgegensetzte, doch in gewohnter Weise ausgeführt und haben ihre Anziehungskraft und belehrende Eigenschaft bewährt.

Ein gemeinsamer Vereinsausflug führte uns im Frühjahr in die Räume des königl. Instituts für Obst- und Weinbau nach Geisenheim. Sie finden das von unserem bewährten Schriftführer, Herrn Güll, verfasste Protokoll über diese, in jeder Weise wohl gelungene Sectionsversammlung bereits im diesjährigen Jahrbuch. Einen zweiten geplanten Ausflug vereitelte die, wie bereits bemerkt, in diesem Jahre so überaus ungünstige Witterung seit Mitte Juli.

Von unseren wissenschaftlichen Bestrebungen gibt Ihnen weiter das bereits in Ihren Händen befindliche diesjährige Jahrbuch Kunde, das Sie also aus eigener Anschauung kennen gelernt haben mögen. Wir unterhalten, wie Ihnen bekannt ist, durch das Jahrbuch einen lebhaften Tauschverkehr mit den literarischen Erzeugnissen vieler wissenschaftlichen Kreise, Akademien und Staatsstellen des In- und Auslandes, deren Zahl sich nunmehr auf 297 stellt. Als neue Tauschverbindungen haben wir zu erwähnen:

1. Porto in Portugal: *Annals des Sciencias naturas*;
2. Crefeld: naturwissenschaftliches Sammelwesen;
3. Stockholm: *Entomologisk Tidskrift*.

Die Vereinsbibliothek hat sich namentlich durch diese erwähnte Tauschverbindungen erheblich vermehrt. Im 6ten Nachtrage zu dem Cataloge der Bibliothek betrug der am 12. Juli 1895 abgeschlossene Bestand 15 900 Nummern. Hierzu kamen vom 12. Juli 1895 bis 26. October 1896 weitere 456 Nummern, so dass der catalogische Bestand sich auf 16 356 Bücher und Schriften erhöht; die weiter eingegangenen Tauschschriften werden demnächst zur Catalogisirung und Einordnung in die Bibliothek gelangen und in einem in Aussicht genommenen siebenten Nachtrage zum Catalog der Vereinsbibliothek veröffentlicht werden. Allerdings erwächst uns, wie ich dies Ihnen schon des Oefteren berichten musste, eine steigende Schwierigkeit in Unterbringung und zweckmässige Aufstellung dieser Schätze, die ja mit dem wachsenden Raummangel, den unser naturwissenschaftliches Institut, wie die anderen im Museum untergebrachten Sammlungen schon seit Jahren empfinden, zusammenfällt. Es ist Ihnen bekannt, dass die so lange ventilirte Frage des Uebergangs dieser Sammlungen an den communalständischen Verband in eine neue Phase eingetreten ist. Durch das bereitwillige Entgegenkommen der städtischen Behörden, eventuell bei Benutzung des Platzes

der Justizgebäude in der Friedrichstrasse für die genannten Zwecke das sogen. Dern'sche Terrain zur Verfügung stellen zu wollen, haben die unbestimmten Aussichten eine neue greifbarere Gestalt gewonnen.

Zur Förderung der Angelegenheit haben die beteiligten Vereine nicht allein ein Immediatgesuch an Seine Majestät unseren allergnädigsten Kaiser abgehen lassen, sondern es war auch eine Abordnung derselben, wobei unser Verein durch Herrn Professor Dr. Heinrich Fresenius vertreten war, persönlich in Berlin vorstellig und zwar nicht allein bei Sr. Durchlaucht dem Herrn Reichskanzler, sondern auch bei den Herren Ministern der geistlichen Unterrichten und Medicinalangelegenheiten, wie der Finanzen.

Wir wollen hoffen, dass diese für uns, wie die Stadt und den Bezirksverband so wichtige Frage endlich ihre Lösung findet, und dass der Gedanke, welchen ich Ihnen bereits in der Generalversammlung im Jahre 1894 zuerst vorlegen durfte und welcher dann von anderer Seite aufgenommen wurde, in dem bereitwilligen Entgegenkommen aller beteiligten Faktoren eine endliche Verwirklichung finde.

Dann würde auch für uns die Möglichkeit gegeben sein, von den uns in der Aufstellung und Nutzbarmachung unserer Sammlungen, namentlich auch der speciell nassauischen Collection beengenden Verhältnissen befreit zu werden und den uns gebotenen Stillstand in einen erfreulichen Fortschritt verwandeln zu können.

Was die Thätigkeit im naturhistorischen Museum betrifft, das auch in diesem Jahre wieder von dem Publikum, wie von Gelehrten aufs Eifrigste besucht und benutzt wurde, so wurde die alljährlich übliche Durchsicht der Bestände vorgenommen. Die wie Ihnen bekannt, vor einigen Jahren angekaufte Professor Sandberger'sche Sammlung von Land-, Süsswasser- und Meeres-Conchylien ist nunmehr durch Herrn Conservator Römer mit Aufwendung des grössten Fleisses aufgestellt und vorerst in 4 grossen Glaspulten als Sammlung für sich gesondert gehalten worden. Unsere Museumssammlung erhält durch dieselbe einen sehr bedeutenden Zuwachs, wie dies bereits im Jahresbericht vom 13. Dezember 1897 angegeben worden ist. Dies wird durch einen in Aussicht genommenen Nachtrag zum Cataloge der Conchyliensammlung im Einzelnen ersichtlich werden. Diese Sandberger'sche Conchyliensammlung wird einen dauernden Werth behalten, indem sie als Vergleichsmaterial für Sandberger's berühmtes Werk: »Die Land- und Süsswasser-Conchylien der Vorwelt« gedient

hat. Namentlich sind es die Familien der Helicaceen, Bulimidaeen, Achatoidaeeen, Cyllindrellidaeeen, Limnadaeeen, Uninidaeeen, Buliminidaeeen, Achatinelladaeeen und Phipidaeeen, wobei viele Arten vorhanden sind, die überhaupt nicht für Geld zu beschaffen gewesen waren. Gerade diese kleinen und kleinsten Arten sind nun in unserer Museumssammlung in besonderer Vollständigkeit vertreten. Auch bei den meerischen Conchylien wurden viele für das Museum neue Familien und Arten eingereiht.

Von den Versteinerungen als eigentliches Material für das erwähnte grosse Werk ist ebenfalls ein grosser Theil fertig aufgestellt und in Glaspulten verwahrt. Bis jetzt sind dies die Arten aus dem Untereocän, Oligacän, Untermiocän, Mittelmiocän, Unter-, Mittel- und Obergleistocän. Die in den einzelnen Schichtengruppen gleichzeitig, aber an verschiedenen Localitäten vorkommenden Arten sind nach diesen geordnet, wodurch sofort die Eigenthümlichkeiten der betreffenden Localität eigenthümlichen Arten, sowie derjenigen Arten, welche ein gemeinschaftliches Vorkommen haben, veranschaulicht werden.

Die Sammlung enthält auch viele Original Exemplare, welche für die Abbildungen benutzt worden sind und als Typen natürlich von bleibendem wissenschaftlichen Werthe sind. Auch hier sind viele Arten vorhanden, welche von dem früheren Besitzer nicht käuflich erworben worden, sondern nur durch Freundeshand verschafft werden konnten.

Gleich den Uebergangsversteinerungen Nassaus und denen des Mainz-Wiesbadener Beckens wird die ganze Sammlung nach ihrer fertigen Aufstellung eine wesentliche Zierde unseres Museums darstellen.

Als Geschenke erhielt das Museum:

Eine kleine Collection von Versteinerungen aus dem Litorinellen-Kalke des Mühlthals und dem Diluvialsande des Hesslers von unserem Mitgliede Herrn Fabrikbesitzer Dyckerhoff in Biebrich.

2. Pferde Zähne aus einer Thongrube zu Siesshahn durch gütige Vermittelung des Herrn Lehrers Görg zu Rambach.

3. Ein Hornissennest (*Vespa crabo* L.) mit Larven, Puppen und ausgebildeten Hornissen von Herrn Dr. med. Friedrich Cuntz dahier.

Herr Rentner Schröder aus Norwegen sandte dem Museum zum Kauf ein: einen Bastard von Auerhahn mit Birkhahn, und einen Bastard von Birkhahn mit Schneehahn aus Norwegen. Beide Seltenheiten sind zur

Ansicht ausgestellt, wie auch die sämmtlichen vorher beregten Gegenstände.

Unsere Rechnung für 1895/96 ist, nachdem sie Königl. Regierung vorgelegen, in diesen Tagen auch von Königl. Oberrechnungskammer geprüft zurückgekommen und zwar ohne wesentliche Notata.

Hinsichtlich der Verwaltung unseres Vereins hat der Vorstand Herrn Regierungshauptkassabuchhalter Hehner, welcher schon seit längerer Zeit für den erkrankten Herrn Duderstadt die Dienstgeschäfte des Cassirers besorgt hatte, als Mitglied des Vorstandes behufs Wahrnehmung der Cassengeschäfte cooptirt und empfiehlt Ihnen die Genehmigung dieser Vorwahl.

Meine Herren! Ich habe Ihnen hiermit das Wesentliche aus dem Vereinsleben für das verflossene Jahr, sowie über den Fortgang der uns anvertrauten Institute mitgetheilt. Es erübrigt mir noch, neben meinem Danke für Ihre gütige Aufmerksamkeit Ihnen eine Bitte ans Herz zu legen. Unsere jetzige Zeit mit dem Hervortreten specifischer Partei-Interessen ist im Allgemeinen der Förderung wissenschaftlicher Vereine nicht als günstig zu bezeichnen. Um so mehr tritt für uns Alle die Verpflichtung heran, fest zu stehen in der Vertretung unserer Aufgaben, die ja nicht nur idealer, wissenschaftlicher, sondern auch eminent praktischer Anwendung fähig sind. Vereinigen Sie sich mit dem Vorstande, dem so kräftig herangewachsenen Baume, von dem leider alljährlich manch welches Blatt niederweht, neue jugendliche Kräfte zuzuführen. Der Jugend gehört die Zukunft und auf ihr beruht die Zukunft der Naturwissenschaft!

---



# Bericht

über die

wissenschaftlichen Abendunterhaltungen des Vereins.

---

Der Nassauische Verein für Naturkunde hielt im Winterhalbjahre 1896/97 14 wissenschaftliche Abendunterhaltungen ab. Die höchste Mitgliederzahl in den einzelnen Sitzungen betrug 55, die geringste 9 Mitglieder. Im Ganzen wurden 37 grössere und kleinere Vorträge gehalten.

## I.

1896 am 29. October.

Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher eröffnet die erste Sitzung und begrüsst die anwesenden Mitglieder.

Herr Apotheker Vigener sprach über »Farne« und legte aus seinem Herbarium sehr viele seltene, einheimische und ausländische Farne der Versammlung vor.

Herr Oberlehrer Dr. Kadesch sprach über Tesla's Versuche und erklärte dessen Wechselstrommaschine und den Transformator.

Herr Dr. Staffel sprach über neuere Versuche mit Röntgenstrahlen.

## II.

1896 am 5. November.

Herr Oberlehrer Dr. Kadesch führte in dem Physikzimmer der Oberrealschule die Tesla'schen Versuche vor und demonstrierte die in Anwendung kommenden Apparate.



III.

1896 am 12. November.

Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher liess einen Aufruf über die Südpolar-Expedition cirkuliren und forderte zur Unterstützung der wissenschaftlichen Erforschung des Südpoles auf.

Herr Dr. Grünhut sprach über die Hefenpilze. Um den Gährungsprocess einzuleiten, sei

1. die Zuführung von Nährstoffen, von welchen die Hefe lebt nöthig.
2. Es müssen alle Stoffe ferngehalten werden, die schädigend auf die Hefe einwirken.
3. Es sind gewisse Temperaturen nöthig, um die Gährung einzuleiten.

Sodann wurden die Versuche von Hansen in Kopenhagen vorgeführt und die Ergebnisse dieser Versuche für die Praxis erläutert.

IV.

1896 am 19. November.

Herr Dr. Mahlinger sprach über Selbstverstümmelungen in der Thierwelt und schilderte die wissenschaftlichen Untersuchungen von Prof. Frederik in Lüttich. Auch der Mechanismus des Abwerfens der verschiedenen Glieder der Thiere wurde demonstrirt.

Herr Hofrath Hagen zeigte photographische Aufnahmen der Einwohner von Neu-Guinea, die er selbst hergestellt und gab die nöthigen Erläuterungen dazu.

Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher zeigte eine Sammlung von Alpenpflanzen und besprach die Aehnlichkeit der Flora der Alpenwelt mit derjenigen im hohen Norden. Auch die Verbreitung der Fauna in den einzelnen Welttheilen wurde, in 6 Gruppen vertheilt, eingehend erläutert.

Herr Oberlehrer Dr. Kadesch hatte im Laufe des letzten Winters Versuche angestellt über das Betreiben Geissler'scher und Hittorf-Crookes'scher Röhren mit nur einem Inductorpol und berichtete über die erlangten Ergebnisse der Hauptsache nach Folgendes: Geissler'sche und Hittorf-Crookes'sche Röhren kann man vermittelst eines einzigen Inductorpoles betreiben, indem man eine Elektrode mit ihm verbindet. Welchen Pol man benutzt, ist für die Wirkung gleichgültig. Bei Hittorf-Crookes'schen Röhren fand Kadesch, abgesehen von

der geringeren Intensität, dieselben Erscheinungen wie bei Verwendung beider Pole. Dagegen verschwanden bei Geissler'schen Röhren die Unterschiede an den Elektroden vollständig, vielmehr trat an beiden Elektroden das blaue Kathodenglimmlicht auf, während zwischen ihnen eine Säule pulsirenden Anodenlichtes zu sehen war. Die Verbindung des anderen Induktorpols mit der Erde (Gas- oder Wasserleitung) war ohne wesentlichen Einfluss, dagegen hatte die Verbindung der anderen Elektrode der Röhre mit der Erde eine bedeutende Erhöhung der Helligkeit zur Folge. Auch bei Berührung der Wand einer Geissler'schen Röhre mit dem Finger trat bis zur Berührungsstelle eine Steigerung der Helligkeit ein, während bei ableitender Berührung der Wand einer Hittorf-Crookes'schen Röhre oder einer Vacuumlampe an der gegenüberliegenden Wandstelle sich Fluorescenz zeigte und das Kathodenstrahlenbündel ersterer nach der entgegengesetzten Seite abgestossen wurde.

V.

1896 am 26. November.

Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher empfiehlt die Anschaffung des vom Thierschutzverein herausgegebenen Werkchens »Nützliche Vogelarten« und legte dann ein Stück Kopal vor, welches ihm von Herrn Scheidel übergeben worden war und Insecteneinschlüsse enthielt.

Herr Dr. W. Fresenius sprach über die Anwendung der schwefligen Säure als Conservierungsmittel beim Wein. Auch die Einwirkung der Schwefelsäure auf Denkmäler aus Marmor, die namentlich Prof. Sentling in München nachgewiesen habe, fand eingehendere Besprechung.

Herr Dr. W. Fresenius sprach über Kohlenstoffverbindungen namentlich über das Acetylen und die Calciumcarbit-Lampe.

VI.

1896 am 26. November.

Herr Oberlehrer Klau sprach über elektrische Eisenbahnen. An grossen Zeichnungen wurde der Gramme'sche Ring und das dabei wirkende Lentz'sche Gesetz erklärt, worauf dann ebenso die Hauptstrommaschine mit Anker, die Feldmagneten und die Walze und das

dabei festgestellte Princip von Siemens demonstrirt wurde. Auch die Nebenschlussmaschine und das Kirchhoff'sche Gesetz, sowie die Gleichspannungsmaschine wurden demonstrirt und die verschiedenen Systeme der bis jetzt erbauten elektrischen Bahnen besprochen.

Herr Apotheker Dr. Lenz zeigte der Versammlung photographische Aufnahmen mit Röntgenstrahlen.

## VII.

1897 am 7. Januar.

Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher bat um die Unterzeichnung einer Glückwunschadresse an Prof. Dohrn zum 25jähr. Jubiläum der zoologischen Station in Neapel.

Herr Apotheker Dr. Lenz sprach über ein Verfahren, wie man sogenannte verbrannte Aufnahmen mit Röntgenstrahlen wieder herstellen könne.

Herr Apotheker Vigener sprach über Verbreitungsagentien im Pflanzenreich durch Samen. So wurden solche durch den Wind, namentlich bei Sporenpflanzen, ebenso durch besondere Anpassungen, durch flügelartige Anhänge der Samenkörner geschildert. Auch durch Wasser, Austrocknung, durch Vögel und Säugethiere werden Pflanzensamen verbreitet wie Redner an zahlreichen Beispielen nachwies.

Herr Dr. Mahlinger zeigte der Versammlung zahlreiche Korallen, musste aber wegen vorgeschrittener Zeit die Besprechung derselben für die folgende Sitzung festsetzen.

Herr Sanitätsrath Dr. Florschütz schilderte einen Besuch der zoologischen Station und seine Reise mit Prof. Dohrn nach dessen Besitzungen auf der Insel Ischia.

## VIII.

1897 am 14. Januar.

Herr Oberforstmeister Dr. Borggreve sprach im Anschluss an den Vortrag von Herrn Apotheker Vigener über Verbreitungsagentien der Pflanzensamen. Die Verbreitung der Ahorn- und der Coniferensamen wurde eingehender erläutert und dann die Verbreitung mancher Giftpflanzen namentlich des Fingerhutes beleuchtet. Das Wild sei hauptsächlich der Verbreiter dieser Samen. Auch die mathematischen Gesetze, nach welchen eine so rasche und massenhafte Verbreitung ermöglicht, wurden erläutert.

Herr Dr. Mahlinger sprach über Korallen und schilderte namentlich die Edelkorallen und die Bildung der Koralleninseln, Atollen etc.

IX.

1897 am 21. Januar.

Herr Apotheker Vigener hatte im Anschluss an den Vortrag des Herrn Dr. Mahlinger Spongilla, Korallen etc. mitgebracht und ebenso Bernstein und Kopale mit Insekteneinschlüssen und besprach deren Vorkommen und die Unterscheidungsmerkmale.

Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher sprach über einheimische Eidechsen und Schlangen und zeigte Exemplare in Spirituspräparaten, ebenso zeigte und besprach derselbe ausgestopfte Exemplare von der Steindrossel und dem Wanderfalken.

Herr Apotheker Vigener zeigte und besprach das Vorkommen von 45 der seltensten Phanerogamen aus dem Gebiete zwischen Mainz und Bingen.

Herr Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher besprach Ankylostoma duodenale und die dadurch erregte Ankylostomiasis an der Hand eines Werkchens von Prof. Dr. Löbker in Bochum.

Herr Oberlehrer Dr. Kadesch sprach über elektrische Grundbegriffe und elektrische Maasse. Vielfach sei die Meinung verbreitet, die Elektrizität müsse sich bei ihrer Strömung aufspeichern können, es würde aber kein Stoff verbraucht und der Arbeitsvorrath sei unveränderlich, es käme nur darauf an, Energie einer Art in diejenige einer andern umzusetzen, was Redner eingehender demonstirte und die Spannung in dem Bilde mit dem Gefälle des Wassers verglich.

Herr Oberlehrer Klau sprach über die Messung der Stromstärke.

X.

1897 am 28. Januar.

Herr Dr. Genth sprach über die Entwicklung der Korallen. Zunächst gab Redner eine Uebersicht über die Alcyonarien und deren 4 Familien und entwickelte dann die Bildung der Kalkkörper und die Ansichten von Koch, Vogel etc. über deren Entstehung. An der Tafel wurden die warzigen Kalkkörper und ihre sehr zierlichen Grundformen gezeichnet und dann eingehender an vergrößerten Längen- und Querschnitten der Polypen, deren Bauch- und Schlundhöhle und

die Tentakeln demonstriert. Auch die geschlechtliche Fortpflanzung der Polypen aus Eiern und Knospen und die Entwicklung aus dem Ecto- und Endoderm, zu dem noch das Mesoderm hinzutritt, wurde entwickelt und an zahlreichen Präparaten unter dem Mikroskope gezeigt und veranschaulicht.

## XI.

1897 am 11. Februar.

Herr Dr. Grünhut sprach über Unterscheidungsmerkmale des Pferdefleisches gegenüber anderen Fleischarten. Dem Berliner Thierarzt Niebel sei es gelungen, in einer geistvollen Arbeit darauf hinzuweisen, dass im Pferdefleisch das Glycogen in viel grösserer Menge vorhanden sei als in allen anderen Fleischarten; auch selbst noch einige Zeit nach dem Tode des Pferdes. Dr. Hasterling habe dann eine andere Methode gefunden, nach welcher Unterscheidungsmerkmale festgestellt werden könnten; es sei dies das Fett, in welchem man mit Hilfe von Jod in der grösseren Menge von Oelsäure ein sicheres Unterscheidungsmerkmal besitze. Nur bei gemischten Fleischwaaren (Wurst) versage auch oft diese Methode.

Herr Dr. Laquer hatte sich Erinnerungen an Dubois-Reymond zum Thema seines Vortrags erwähnt. \*)

In der Einleitung hebt Vortragender hervor, dass es weder in seiner Absicht, noch in seinem Können läge, eine erschöpfende Darstellung des verstorbenen Gelehrten zu geben.

Zwei Richtungen sind es, in denen du Bois-Reymond's geistige Entwicklung in Erscheinung getreten, die rein fachliche auf den Kreis der Physiologie, der Lehre vom Leben im engeren Sinne beschränkte und eine zweite, die des naturwissenschaftlichen Denkers und Geschichtsschreibers, die, an ein internationales Publikum sich wendend, die Entwicklung der gesamten Naturwissenschaften der letzten Jahrzehnte beeinflusste. Beide Wirkungsformen gehen natürlich in einander über.

Geboren am 7. November 1818 als Sohn eines aus der Schweiz stammenden höheren preussischen Beamten besuchte du Bois in Neufchâtel die Schule, im Jahre 1836 bezog er die Berliner Universität, zuerst als Hörer der physiologischen Facultät, bei der er planlos Vor-

---

\*) Autoreferat.



lesungen über Aesthetik, Geschichte, sogar über Kirchengeschichte hörte. Zufälliges Hospitiren in den Experimentalvorträgen des Chemikers Eilhard Mitscherlich und die Bekanntschaft mit Ed. Hallmann, dem Famulus des Physiologen Joh. Müllers führte E. du Bois Reymond der Naturwissenschaft in die Arme; nachdem er noch ein Semester in Bonn studirt, liess er sich bei der medicinischen Facultät einschreiben und schloss sich direct an Joh. Müller an und wurde Hallmann's Nachfolger. Müller übergab ihm Matheucci's eben 1841 erschienenen Essay: *Sur les phénomènes électriques des animaux* zur Nachprüfung. Dieser Auftrag wurde das wissenschaftliche Lebenswerk du Bois.

In den Rahmen dieses Lebenswerkes fiel schon die Doctorarbeit (1843) *quae apud veteres de piscibus extant argumenta*.

1848 und 49 erschienen die »Untersuchungen über thier. Electricität«, denen 1860 der Schlussband folgte, die ausserordentliches Aufsehen erregten und insbesondere durch die berühmt gewordene Vorrede die der Lehre von der Lebenskraft die deutliche Absage ertheilte, einen Grenzstein in der Entwicklung der Naturwissenschaften bilden.

Neben der Entdeckung des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft durch H. Helmholtz 1847 und der Schwan-Schleiden'schen Lehre von dem Aufbau des Körpers aus Zellen haben die du Bois'schen Untersuchungen am meisten dazu beigetragen, die Lehre von der Lebenskraft, »jener gemüthlichen Lagerstätte, wo die Vernunft zur Ruhe gebracht wird auf dem Polster dunkler Qualitäten« (J. Kant) für immer zu beseitigen.

1850 ging du Bois nach Paris mit Empfehlungen Alex v. Humboldt's, der den du Bois'schen Forschungen das grösste Interesse entgegenbrachte, 1852 nach London, um den französischen und englischen Fachgenossen seine Resultate zu demonstrieren. 1853 wurde du Bois Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 1855 ausserordentlicher Professor und 1858 der Nachfolger Joh. Müller's auf dem Lehrstuhl der Physiologie, während die zwei andern Disciplinen, die Müller damals noch umfasste, an K. B. Reichert und Rud. Virchow übergingen. Die geradezu klassische Gedenkrede des Schülers auf den Meister war die erste grössere historische Leistung du Bois'; vorangegangen waren kürzere Gedenkreden auf Ed. Hallmann und

Erman\*), noch die letzte demnächst erscheinende Akademierede du Bois' war wiederum ein Nekrolog, gewidmet dem Andenken Herm. Helmholtz'ens. Letzterer, ebenso wie Henle, Brücke ausser den obengenannten waren Mitschüler, Mitassistenten, Mitarbeiter du Bois' zu Füssen Joh. Müller's. Abgesehen von der innigen Freundschaft verband alle der universelle Zug, der du Bois, Helmholtz, Brücke, Virchow und auch Henle nicht in ihrem Fache sich beschränken und ausruhen, sondern grössere, ja die grössten Probleme menschlichen Forschens und Denkens erwägen und bearbeiten liess.

Zu dieser Universalität war für du Bois die äussere Veranlassung seine rhetorischen und schriftstellerischen Fähigkeiten, eine Erbschaft des celtisch-gallischen Blutes, ferner seine Stellung als beständiger Secretär der Berliner Akademie der Wissenschaften. Letztere war es auch, welche du Bois dazu veranlasste, den Stifter der Berliner Akademie Jm. Leibnitz, sowie ihr dem Range nach erstes Mitglied Friedrich den Grossen und dessen geistige Palladine Voltaire, Diderot, La Mettrie, Rousseau in den Kreis seiner Studien zu ziehen (s. u.).

Als Lehrer war du Bois wohl unstreitig nicht nur einer der anregendsten der 60—80 Jahre Berlins — seine öffentlichen Vorlesungen über die neueren Ergebnisse der Naturwissenschaften, sowie über physische Anthropologie (jeden Winter Montags von 6—7 alternierend gehalten) füllten das grösste Auditorium Berlins mit Zuhörern aus allen Ständen — sondern auch der Meister der Form der Darstellung; er als erster wandte sich von der dogmatischen Form ab und lehrte »evolutionistisch« d. h. er zeigte die historische Entwicklung der Lösung eines Problems, er führte seine Zuhörer in den zauberischen Reiz, der im Forschen liegt, ein, er gab die dramatische Spannung lebendig wieder, die zwischen Frage und Antwort liegt. Abgesehen von der sorgfältigen Vorbereitung für jede Vorlesung, die ihn auszeichnete, war du Bois ein glücklicher Experimentator, der auch die Zahl der von Joh. Müller überkommenen Versuche bedeutend erweiterte und vervollkommnete. Die Lehrmethode du Bois' ist vorbildlich für die Art des Lehrens der Physiologie auf allen deutschen Universitäten geworden; seine zahlreichen Schüler und Assistenten, die »aus dem dumpfen Mauerloch« — so konnte du Bois selbst das alte physiologische Institut der Universität bezeichnen — an

---

\*) Abgedruckt in du Bois gesammelten Reden und Vorträgen, Leipzig 1886 und 1887.

die Universitäten als Lehrer der Physiologie berufen wurden, verbreiteten sie im In- und Ausland.

Kurz du Bois war »ein Lehrer im Ideal« (S. Kant).

Chronologisch war die Rede über Thierleben in der Berliner Singakademie 1851 die erste; die Gedächtnissreden auf Erman und Hallmann folgten 1853 und 1855.

Mit Friedrich dem Grossen und seiner Tafelrunde »dem letzten König« nach Carlisle's Ausdruck beschäftigten sich die Reden

Voltaire als Naturforscher . . . . .	1868
La Mettrie . . . . .	1875
Friedrich II. und Rousseau . . . . .	1879
Friedrich II. in englischen Urtheilen . . . . .	1883
Diderot . . . . .	1884
Die Berliner französische Kolonie in der Akademie der Wissenschaften.	

Das Zeitalter Kaiser Wilhelms und die politischen Ereignisse spiegeln die Reden wieder

Aus den Tagen des norddeutschen Bundes . . . . .	1869
Der deutsche Krieg . . . . .	1870 3. Aug.
Das Kaiserreich und der Friede . . . . .	1876 26. Jan.
Ueber eine Kaiser-Akademie der deutschen Sprache . . . . .	1874
Die Einweihung der Humboldt-Denkmäler . . . . .	1883

Endlich als naturwissenschaftlicher Denker rollte er grosse Fragen auf:

Leibnitz'sche Gedanken in der neueren Naturwissenschaft . . . . .	1870
Ueber die Grenzen des Naturerkennens . . . . .	1872
Culturgeschichte und Naturwissenschaft . . . . .	1877
Die sieben Welträthsel . . . . .	1880

kleinere in

Ueber Universitätseinrichtungen. . . . .	1869
Ueber Geschichte der Wissenschaft . . . . .	1872
Darwin versus Galiani . . . . .	1876
Ueber die Uebung . . . . .	1881
Goethe und kein Ende . . . . .	1882

(sämmtlich l. c. abgedruckt).

Vortragender geht auf die Rede über die Grenzen des Naturerkennens und die sieben Welträthsel, Goethe und kein Ende des Näheren ein und beleuchtet besonders die Angriffe, die sie mit Unrecht erlitten.

»In der Gestalt, in der ein Mensch uns verlässt, wandelt er unter den Schatten«, (Goethe auf Winkelmann). So erscheint uns auch in der Erinnerung E. du Bois Reymond als der begeisterte und begeisternde Lobredner und Verkündiger der Platonischen Trias des Edlen, Wahren, Guten, als einer der letzten Encyclopädisten, den auf dem Gebiete der Naturwissenschaften neben einem Alexander v. Humboldt unser Jahrhundert hervorgebracht, als treuer Hüter wissenschaftlicher Lehr- und Lernfreiheit, als glänzender Lehrer, Forscher, Biograph, Historiker und Denker.

»Es kann die Spur von seinen Erdentagen nicht in Aeonen untergehen.«

## XII.

1897 am 18. Februar.

Herr Dr. Grünhut sprach über die Heizungstechnik. Nachdem die chemischen Verbindungen der Grundstoffe der Cellulose entwickelt waren, wies Redner sehr eingehend nach, wie man den Heizeffect mittelst Calorien eingehend messe. Eingehend wurden dann die Verluste beim Heizen der Dampfkessel nachgewiesen.

Herr Oberlehrer Dr. Kadesch sprach im Anschluss an seine Vorträge über Tesla's-Versuche, über weitere von ihm angestellte Versuche mit hochgespannten und hochfrequenten Strömen. Viele von den Versuchen von Tesla und Tomson für hochgespannten und hochfrequenten Wechselstrom lassen sich auch schon lediglich mit einem Funkeninductor von mässiger Schlagweite, wenn auch mit geringerem Glanze, anstellen. So leuchtet ein evacuirter Glaskörper in der Nähe eines Inductorpoles auf. Das Aufleuchten eines solchen Glaskörpers wird verstärkt, wenn man ihn nicht dem Pol selbst, sondern einem mit diesem leitend verbundenen, kugel-, cylinder- oder auch plattenförmigen, auf einem isolirenden Fusse stehenden Conductor nähert (Vergrösserung der Capacität). Eine hübsche Abänderung bezw. Erweiterung dieses Versuches, die natürlich auch für den entsprechenden Versuch mit Teslastrom getroffen werden kann, besteht darin, dass man eine Reihe von isolirten Conductoren in geringen Entfernungen von einander aufstellt und den ersten mit dem einen Pol des Inductors in leitende Verbindung setzt. Dann



leuchtet ein evacuirter Glaskörper, dessen verdünnter Gasinhalt selbst als ein derartiger Conductor betrachtet werden kann, in der Nähe jedes der Conductoren auf, eine Erscheinung, welche nicht beeinträchtigt wird wenn zwischen zwei der Conductoren eine Glas- oder Ebonitplatte gehalten wird (Durchgang elektrischer Wellen durch ein Dielektrikum); wenn man dagegen einen der Conductoren ableitend berührt, so verliert dieser und alle folgenden ihre Wirkung. Man kann auch statt eines evacuirten Glasgefäßes ein Telephon verwenden, dessen eine Klemme man durch einen Draht mit einem der freien Conductoren verbindet, wodurch nur an die Stelle des Auges das Ohr als Beobachtungsorgan tritt. Legt man ferner die eine Hand auf den einen Pol des Inductors und ergreift mit der andern Hand einen evacuirten Glaskörper, so leuchtet dieser auf. Besonders wirkungsvoll nimmt sich hierbei wegen ihrer Länge die Röhre mit dem Aetzkali enthaltenden Ansatz aus. Allerdings geht das Aufliegen einer Hand auf einem Inductorpol nicht wie beim Teslastrom ohne Empfindung ab, doch ist diese, wenigstens bei einem Inductor von der Grösse des unsrigen, bei hinreichend geringer Stromstärke weder unerträglich noch auch nur unangenehm. Die Ableitung des anderen Inductorpols zur Erde erhöht bei allen beschriebenen Versuchen die Wirkung nur unwesentlich. Aus naheliegendem Grunde leuchtet bei dem letzten Versuch das Glasgefäß im allgemeinen intensiver auf, wenn man auf einem Isolirschemel steht. Auch Versuche über Büschelentladungen lassen sich mit dem gewöhnlichen Inductionsstrom machen, wie denn schon aus den Fingerspitzen, mit welchen man über die Umhüllung der secundären Spule eines Inductors hinstreicht, starke Lichtbüschel herausfahren. (Vergl. Zeitschrift für phys. und chemisch. Unterricht X, 2.)

### XIII.

Sitzung am 25. Februar.

Herr Prof. Dr. H. Fresenius sprach<sup>1)</sup> über das Färben von Steinen. Zunächst zeigte derselbe versteinertes Holz aus einem alten Wetterschachte, ebenso ein Rohrstück, Kochbrunnensinter und einen Kieselstein, welcher flüssige Kieselsäure enthielt. Sodann besprach Redner das Färben der Halbedelsteine, das die Römer schon verstanden, indem sie Achate in Honig legten. Neuerdings würde dasselbe Resultat dadurch erzielt, dass man Zucker in concentrirter Schwefelsäure verkohle und den betreffenden Stein damit färbe.



Herr Kölsch zeigte und erklärte der Versammlung einen Apparat, der das Acetylgas herstelle und sprach über Entdeckung, Eigenschaften, Giftigkeit und Nutzen als Leuchtkraft dieses Gases.

Herr Oberlehrer Klau sprach über die Lichterscheinungen in unserer Atmosphäre. Zunächst sprach Redner über »die Bläue des Himmels« und die Hypothesen, die Goethe, Claudius, Brücke über dieselbe aufgestellt hätten. Sodann erklärte derselbe die Erscheinungen bei Sonnen- und Mondfinsternissen, die Erscheinungen der Luftspiegelungen, Fata morgana, »Kimmung.« Auch das Funkeln der Sterne, die Erscheinung des Regenbogens, diejenige der Vorhöfe um Sonne und Mond wurden eingehend demonstriert.

#### XIV.

1897 am 4. März.

Herr Dr. E. Pagenstecher sprach über giftige Schlangen. Redner schilderte den Giftapparat und dessen Wirkungen und die jetzigen Heilmittel gegen Schlangenbiss.

Herr Dr. W. Fresenius sprach über die Versuche, welche die Brüder Lilienthal ausführten, um auch dem Menschen das Fliegen zu ermöglichen. Redner schilderte eingehend die physikalischen Gesetze beim Vogelflug und die nach diesem Vorbilde von den Gebrüdern Lilienthal construirte Segelflugmaschine.

1897 am 11. März war an Stelle der Donnerstags-Sitzung ein Abschiedsessen festgesetzt für den scheidenden Herrn Oberlehrer Klau, der vom 1. April an als Director nach Limburg zieht. Zu dieser Feier hatten sich die Mitglieder sehr zahlreich eingefunden und sie gestaltete sich für Herrn Klau zu einer sehr ehrenvollen.

Güll.

---

# Nekrolog.

## C. Remigius Fresenius.\*)

Am 11. Juni 1897 verschied zu Wiesbaden im 79. Lebensjahre Herr Geheime Hofrath Professor Dr. Carl Remigius Fresenius, der Gründer und Leiter des weltbekannten chemischen Laboratoriums zu Wiesbaden, Ehrenmitglied und früherer langjähriger Director des Nassauischen Vereins für Naturkunde.

Ein an Arbeit und Erfolgen reiches, für die Wissenschaft hochbedeutendes Leben hat damit seinen Abschluss gefunden; ein in allen Kreisen der Bevölkerung hochangesehener und verehrter Mann ist durch einen sanften Tod, der sein harmonisches und abgeklärtes Dasein vor ungewohnter Unthätigkeit und Siechthum bewahrte, uns entrückt worden.

Was C. Remigius Fresenius für seine Familie, der er als würdiger Patriarch vorstand, für seine Freunde, die zu ihm mit höchster Verehrung aufsahen, für die Gemeinde, in der er eine weltberühmte Stätte der Wissenschaft errichtet und nahezu 50 Jahre in gleich mustergültiger Weise geleitet hat, und deren berufener Vertreter er gewesen, was er für die chemische Wissenschaft, als deren bewährter Meister er seit Dezennten gegolten, was er für Kirche und Staat gewesen ist das Alles ist bereits und wird von berufener Seite vielfach erörtert werden.

An dieser Stelle möge Dessen gedacht sein, was der Verstorbene für den Nassauischen Verein für Naturkunde gewesen ist, dem er über 50 Jahre als treues Mitglied

---

\*) Hierzu das Porträt des Verstorbenen, in Lichtdruck nach einer Photographie aus dem Jahre 1896, von Carl Schipper in Wiesbaden, Lichtdruck von Meisenbach, Riffarth & Co. in Berlin.

angehört hat und welcher ihm, dem zielbewussten Forscher, einen nicht geringen Antheil seiner glücklichen Erfolge und der Anerkennung, die ihm geworden, verdankt. Zeuge dessen sind nicht allein die überaus zahlreichen, fast in allen Jahrgängen unserer Vereinsschrift niedergelegten Arbeiten von R. Fresenius, sondern auch die dankbare Erinnerung an die stete werktthätige Theilnahme des Dahingeshiedenen an allen wissenschaftlichen Bestrebungen des Vereins, seine vielfachen anregenden Vorträge und seine langjährige Thätigkeit als Vereinsdirector, wie seine auch als Ehrenmitglied stetig bewährte Fürsorge.

Remigius Fresenius trat 1846, sobald er durch seine Berufung als Professor an das landwirthschaftliche Institut zum Mitbürger Wiesbadens geworden war, in den Verein ein, welcher damals noch den Namen: »Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau« trug. Bereits in demselben Jahre erschien im dritten Hefte der Jahrbücher sein erster wissenschaftlicher Beitrag für dieselben: »Analyse des Schwerspathes im Herzogthum Nassau«, welchem sich im 6. Hefte (1850) die erste Abhandlung aus einer überaus wichtigen Serie anschloss: »Chemische Untersuchung der wichtigsten Mineralquellen des Herzogthums Nassau. I. Kochbrunnen zu Wiesbaden«. 1851 folgte in Heft VI, (Abth. 2/3) die No. II Mineralquellen zu Ems, 1852 (Heft VIII) No. III Quellen zu Schlangenbad, 1855 (Heft IX) No. IV Mineralquellen zu Langenschwalbach, 1856 (Heft X) No. V Mineralquelle zu Weilbach, 1858 (Heft XI) No. VI Mineralquelle zu Geilnau, 1860 (Heft XV) No. VII Natron-Lithionquelle zu Weilbach, 1865/66 (Heft 19/20) No. VIII Mineralquelle zu Niederselters und No. IX Mineralquelle zu Fachingen.

Diesen Abhandlungen folgte 1867/68 im Heft 21/22 die Analyse der Augustaquelle, 1871/72 (Heft 25/26) die Analyse der Victoriaquelle zu Bad Ems und der Römerquelle daselbst, 1873/74 die »Chemische Untersuchung der warmen Quelle der Wilhelmsheilanstalt zu Wiesbaden, sowie des Kränchens, des Fürstenbrunnens, des Kesselbrunnens und der warmen Badquelle zu Bad Ems«. 1876/77 folgte (Heft 29/30) die Analyse der warmen Quelle zu Assmannshausen, 1878/79 (Heft 31/32) die Chemische Analyse der Mineralquellen zu Biskirchen, die Analyse der Wappenquelle in Ems, des Kaiserbrunnens daselbst, die Analyse der warmen Quelle zu Schlangenbad und der Wilhelmsquelle zu Kronthal. 1886 (Heft 39) erschien die Abhandlung: Neue chemische Untersuchung des Kochbrunnens zu Wiesbaden, 1887 (Heft 40) die Analyse der Natron-lithionquelle (Wilhelmsquelle) zu Bad Ems und die Chemische Untersuchung

der kleinen Schützenhofquelle zu Wiesbaden, 1888 (Jahrgang 41) die Chemische Analyse des Warmbrunnens zu Soden, 1890 (Jahrgang 43) »Die Thermalquellen Wiesbadens in chemischer Beziehung«, 1893 (Heft 46) Analyse des Victoriasprudels zu Oberlahnstein, 1894 (Heft 47) »Ueber Schwankungen im Gehalt der Mineralwässer«, 1896 (Heft 49) Chemische Untersuchung der Thermalquelle des Augusta-Victoriabades zu Wiesbaden (mit Dr. Hintz) und 1897 (Heft 50) die mit Prof. Dr. Heinrich Fresenius gemeinsam herausgegebene »Chemische Untersuchung der Adlerquelle zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit der Analyse des Wiesbadener Kochbrunnens«.

Ausser diesen zahlreichen Untersuchungen von Mineralwässern sind in unsern Jahrbüchern nachfolgende Arbeiten von R. Fresenius niedergelegt:

- 1851. Chemische Untersuchung der wichtigsten Kalksteine des Herzogthums Nassau.
- 1852. Ueber Vorkommen der Borsäure im Kochbrunnen zu Wiesbaden.
- 1852. Chemische Untersuchung einiger der wichtigsten nassauischen Thone.
- 1856. Analyse der Asche der Wucherblume (von Bangert) nebst Vorschlag zur Vertilgung derselben auf dem Westerwalde.

Zu erwähnen sind auch zahlreiche auf seine Anregung in seinem Laboratorium ausgeführte und in unsern Jahrbüchern veröffentlichte Arbeiten seiner Assistenten und Schüler, so die von Dollfuss und Neubauer 1854 mitgetheilte Arbeit über Schalsteine, wie die Arbeiten von Philippi, Suchsland, Valentin, Lindenborn, Schuckart, Kerner, Carl u. A.

Zahlreich waren die wissenschaftlichen Vorträge, welche R. Fresenius in den Generalversammlungen des Vereins abhielt:

- 1850 sprach er über die Analyse des Braunsteins mit Experimenten;
- 1855 über die chemische Analyse in ihrer neuen Entwicklung und ihren Einfluss auf die andern Wissenschaften und die Industrie;
- 1858 über die Entwicklung des Arsens bei Vergiftungen;
- 1859 über selbstentzündliche Gase, insbesondere über Siliciumwasserstoffgas;
- 1861 über die Kohlensäure und ihre Rolle in den drei Naturreichen, mit Experimenten;
- 1867 über eine neue Methode zur Prüfung der Dachschiefer;



1868 über Feuererzeugung in alter und neuer Zeit;

1870 über den Schwefel in seiner mannigfachen Beziehung zum praktischen Leben;

1871 über concentrirte Düngemittel in chemischer, landwirthschaftlicher und industrieller Beziehung.

Auch in den Sectionsversammlungen des Vereins, deren Gründung Fresenius bereits durch einen im Jahre 1849 mit andern Mitgliedern eingebrachten Antrag veranlasst hatte, fungirte er vielfach als Vorsitzender oder hielt Vorträge in denselben, so 1862 in Ems, 1865 in Weilburg (Ueber die Selterserquelle), 1871 in Rüdesheim, 1873 in Ems (Ueber Superphosphate), 1876 in Höchst (Ueber den Grindbrunnen in Frankfurt a. M.), 1878 in Biebrich.

Die von dem Verein in früheren Jahren häufig veranstalteten populären Vorträge fanden in R. Fresenius ihren eifrigsten und bewährtesten Förderer. So hielt er im Winter 1846 einen Cyclus von Vorträgen über analytische Chemie, 1859 über Gährungschemie in ihrer Anwendung auf Bier- und Essigbereitung.

Ebenso sprach Fresenius häufig in den wissenschaftlichen Monatssitzungen, wie sie früher üblich waren: 1858 über Salpetersäure, über die Bedeutung malsanalytischer Methoden und einige besondere chemische Erscheinungen, 1859 über den Korneuburger Vergiftungsprozess, 1863 über eine neue Methode der Gerbstoffbereitung u. s. w.

So entwickelte er eine überaus vielseitige wissenschaftliche Thätigkeit im Sinne unserer Vereinsbestrebungen, wie sie kein anderes Mitglied wieder geleistet hat!

In dankbarer Anerkennung solcher Leistungen wurde Fresenius 1861 zum Mitglied des Vorstandes des Vereins und 1864 zum Director desselben gewählt und wurde zu diesem Ehrenamte stets wieder berufen, bis er selbst 1874 wegen Geschäftsüberhäufung jegliche Wiederwahl ablehnte.

Aber sein Interesse an dem Verein erlahmte deshalb in keiner Weise. Bei allen grösseren Veranstaltungen sahen wir den allverehrten Mann in allzeit jugendlicher Frische trotz der weissen Haare in der ihm eigenen gewinnenden und allzeit vermittelnden Art Theil nehmen. In liebenswürdigster Weise übernahm er die Stellvertretung des Vorsitzenden der Generalversammlungen, wenn der zeitige Director am Erscheinen verhindert war, und nahm an den darauf folgenden Festmahlen vielfach Antheil, wobei er die andächtig lauschenden Theilnehmer



stets durch seine humor- und geistvollen Tischreden zu erfreuen wusste. Ueberall bildete er den von selbst gegebenen Mittelpunkt, um welchen sich Jung und Alt freudig zu schaaren pflegte.

Es war natürlich, dass Fresenius als der berufenste Vertreter der Naturwissenschaften bei den Versammlungen Deutscher Naturforscher und Aerzte, die in Wiesbaden tagten, als erster Geschäftsführer fungirte. Dreimal — eine nicht wieder erreichte Auszeichnung bei einem Gelehrten — ward ihm diese zu theil! Und wie wusste er sie auszuführen! Mir, der ich seit meinen Knabenjahren zu ihm, dem gefeierten Gelehrten, aufzusehen gewohnt war und dem es später vergönnt war, in vielseitigen nähern Verkehr mit ihm zu treten, sind besonders jene Tage unvergesslich, in denen ich mit ihm und neben ihm für das Gedeihen der dritten hiesigen Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte thätig sein durfte! Welch hohen, befriedigenden Genuss gewährte es, in fast täglichem Zusammensein während der vielseitigen monatelangen Vorbereitungen zu jenem Feste, in die Werkstätte seines Geistes nähern Einblick zu gewinnen, sein grosses organisatorisches Talent, mit dem er Wissenschaft und Praxis zu vereinigen wusste und alle Veranstaltungen mit sicherem Takte zum Wohlgelingen führte, zu bewundern!

In einer Zeit, in welcher das Ideale mehr und mehr zu schwinden droht, und materielle Genusssucht in den verschiedenen Schichten der menschlichen Gesellschaft sich immer breiter macht, da ist ein Mann, wie Remigius Fresenius doppelt werth gewesen. Ihm war es wie Wenigen vergönnt, sich bis ins hohe Greisenalter mit gleicher Frische für alles Gute, Wahre und Schöne zu entflammen und doch bei aller Begeisterung für die grossen Errungenschaften des Menschenlebens sich jenen kindlich frohen und frommen Sinn zu bewahren, der ihn sich bis zuletzt noch an den einfachen Blumen des Frühlings erfreuen liess.

Die Erlebnisse eines langen, gesegneten Lebens concentrirten sich, wie in einem Spiegel, in seinem für Gott und Vaterland, für Kunst und Wissenschaft, für die Menschheit und die Natur gleich ergebenden Herzen.

So war es ihm ein Bedürfniss, ein ernster Mahner dafür zu sein, das Gegebene festzuhalten und auszubauen in frohem Glauben an das Unzerstörbare Ewige!

Wir aber, die trauernden Ueberlebenden, die zu ihm aufschauten als zu einem erprobten, väterlichen Freunde, wollen sein Denken und Fühlen, sein Wollen und Wirken in treuem Herzen bewahren und uns bestreben, ihm nachzueifern!

Dr. Arnold Pagenstecher.

# Verzeichniss der Mitglieder

des

Nassauischen Vereins für Naturkunde im Juli 1897.\*)

## I. Vorstand.

Herr Regierungspräsident von Tepper-Laski, Director.

- « Geh. Sanitätsrath Dr. Arnold Pagenstecher, Museums-Inspector und Vereinssecretär.
- « Professor Dr. Heinrich Fresenius, Cassirer.
- « Apotheker A. Vigener, Vorsteher der botanischen Section.
- « Rentner Dr. L. Dreyer, Vorsteher der zoologischen Section.
- « Realschuldirector Dr. Kaiser.
- « Garteninspector Dr. L. Cavet.

## II. Ehrenmitglieder.

Herr v. Baumbach, Landforstmeister a. D., in Freiburg i. B.

- « Dr. Bunsen, Geheimerath, in Heidelberg.
- « Dr. Erlenmeyer, Professor, in Frankfurt a. M.
- « Dr. v. Ettinghausen, Professor, in Wien.
- « Graf zu Eulenburg, Ministerpräsident a. D., in Berlin.
- « Dr. Geinitz, Geh. Hofrath, in Dresden.
- « Dr. Ritter v. Hauer, K. K. Hofrath und Director des Hofmuseums, in Wien.
- « Dr. Haeckel, Professor, in Jena.
- « Alexander v. Homeyer, Major z. D., in Greifswald.
- « Dr. v. Kölliker, Professor, in Würzburg.
- « Dr. R. Leuckart, Geh. Rath, in Leipzig.
- « Dr. F. v. Sandberger, Professor, Geh. Rath in München.

---

\*) Um Mittheilung vorgekommener Aenderungen im Personenstand wird freundlichst gebeten.

### III. Correspondirende Mitglieder.

- Herr Dr. O. Böttger, Professor, in Frankfurt a. M.
- « Dr. Buchner, Professor, in Giessen.
  - « Dr. Buddeberg, Rector, in Nassau a. Lahn.
  - « Dr. v. Canstein, Königl. Oeconomierath und General-Secretär, in Berlin.
  - « Freudenberg, General-Consul, in Colombo.
  - « Dr. B. Hagen, Hofrath, in Frankfurt a. M.
  - « Ernst Herborn, Bergdirector, in Sidney.
  - « Dr. L. v. Heyden, Königl. Major a. D., in Bockenheim.
  - « Dr. Hueppe, Professor der Hygiene, in Prag.
  - « Dr. Kayser, Professor der Geologie, in Marburg.
  - « Dr. F. Kinkelin, Professor, in Frankfurt a. M.
  - « Dr. C. List, in Oldenburg.
  - « Dr. Ludwig, Professor, in Bonn.
  - « Dr. Reichenbach, Professor, in Frankfurt a. M.
  - « v. Schönfeldt, Oberst z. D., in Eisenach (Villa Wartburg).
  - « P. T. C. Snellen, in Rotterdam.
  - « Dr. Thomae, Gymnasiallehrer in Elberfeld.

### IV. Ordentliche Mitglieder.

#### *A. Wohnhaft in Wiesbaden und nächster Umgebung.*

- Herr Abegg, Rentner.
- « Ahrens, Dr. med., prakt. Arzt.
  - « Albrecht, Dr. med., prakt. Arzt.
  - « Aufermann, Rentner.
  - « v. Aweyden, Ober-Reg.-Rath.
  - « Berlé, Ferd., Dr., Banquier.
  - « Becker, Dr. med., prakt. Arzt.
  - « Bergmann, J. F., Verlagsbuchhändler.
  - « Bertram, Dr., Appellationsgerichts-Vizepräsident a. D.
  - « Bischof, Professor Dr., Chemiker.
  - « v. Bistram, Baron.
  - « Borggreve, Professor Dr., Oberforstmeister.
  - « v. Born, W., Rentner.
  - « Brauneck, Geh. Sanitätsrath.
  - « Brömme, Ad., Tonkünstler.
  - « Buntebarth, Rentner.
  - « Caesar, Reg.-Rath.
  - « Caspari H., W., Lehrer.

Herr Cavet, Dr., Königl. Garteninspector.

- « Chelius, Georg, Rentner.
- « Clouth, Dr. med., Sanitätsrath.
- « Coester, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Conrady, Dr., Geh. Sanitätsrath.
- « Cramer, Dr. med., prakt. Arzt, Sanitätsrath.
- « Cuntz, Wilhelm, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Cuntz, Friedrich, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Cuntz, Adolf, Rentner.

- « **Dahlen**, Generalsecretär.
- « Doms, Leo, Rentner.
- « Dreyer, L., Dr. phil., Rentner.

- « **Ebel**, Dr. phil.
- « Elgershausen, Luitpold, Rentner.
- « Eiffert, Oberlandesgerichtsrath a. D.

- « **Fiebig**, Georg, Lehrer.
- « Florschütz, Dr., Sanitätsrath.
- « Frank, Dr., Dozent und Abth.-Vorst. am chem. Laboratorium von Fresenius.
- « Fresenius, H., Dr., Professor.
- « Fresenius, W., Dr., Dozent.
- « Frey, Hermann, Dr.
- « Freytag, O., Rentner, Premierlieut. a. D.
- « Fuchs, Dr. med., Frauenarzt.
- « Fuchs, Director a. D.
- « Fuchs, Landgerichtsrath a. D.
- « Funke, Dr., Zahnarzt.
- « Füssmann, E., Rentner.

- « **Gecks**, Buchhändler.
- « Gessert, Th., Rentner.
- « Gleitsmann, Dr. med., Kreisphysikus, Sanitätsrath.
- « Gräber, Commerzienrath.
- « Groschwitz, C., Buchbinder.
- « Gröschwitz, G., Lithograph.
- « Grünhut, Dr., Dozent am chem. Laboratorium von Prof. Fresenius.

Herr Güll, Lehrer.

« Güntz, Dr. med.

« Gygas, Dr. med., Oberstabsarzt a. D.

« Hackenbruch, Dr. med., prakt. Arzt.

« Hagemann, Dr. phil., Archivar.

« Hammacher G., Rentner.

« Hecker, Ewald, Dr. med., prakt. Arzt.

« Heimerdinger, M., Juwelier.

« Heintzmann, Dr. jur., Rentner.

« Hensel, C., Buchhändler.

« Herrfahrdt, Oberstlieutenant z. D.

« Hertz, H., Kaufmann.

« Hess, Bürgermeister.

« Hessenberg, G., Rentner.

« v. Heyden, Dr., Rentner.

« Hintz, Dr. phil., Dozent am chem. Laboratorium.

« Hiort, Buchbinder.

« Hirsch, Franz, Schlosser.

« Hirsch, Heinrich, Schreiner.

« Honigmann, Dr. med., prakt. Arzt.

« v. Ibell, Dr., Ober-Bürgermeister.

« Jessnitzer, Rentner.

« Jordan, G., Lehrer.

« Kadesch, Dr., Oberlehrer.

« Kaiser, Dr., Realschuldirektor.

« Kalle, F., Rentner, Stadtrath.

« Kessler, Landesbank-Directionsrath.

« Kind, Dr., Gewerberath.

« Kirchmair, Rentner.

« Kiesel, Dr. phil.

« Klärner, Carl, Lehrer.

« Knauer, F., Rentner.

« Kobbe, F., Kaufmann.

« Koch, G., Dr. med., Hofrath.

« Kögel, Rentner.

« König, Dr. med., prakt. Arzt.

« Körner, Beigeordneter.

« Koettschau, Oberstlieutenant z. D.

« Kraus, Wilhelm, Buchhalter.

« Kugel, Apotheker.



Herr **L**andow, Dr. med., prakt. Arzt.

« **L**aquer, Dr. med., prakt. Arzt.

« **L**auer, Rentner.

« **L**autz, Professor.

« **L**enz, Dr., Oberstabs-Apotheker im Kriegsministerium a. D.

« **L**eisler, Rechtsanwalt.

« **L**eo, Rentner.

« **L**eonhard, Lehrer a. D.

« **L**eonhardt, Rentner.

« **L**evi, Carl, Buchhändler.

« **L**icht, Baurath a. D.

« **L**öbnitz, Rentner.

« **L**ossen, Dr. phil., Rentner.

« **L**ossen, Dr. med., prakt. Arzt.

« **L**ugenbühl, Dr. med.

« **M**ahlinger, Dr. phil., Hilfslehrer an der Oberrealschule.

« **M**arburg, F., Rentner.

« **M**aus, W., Postsecretär.

« **M**eineke, Dr., Director, Professor.

« **v.** Meyerfeld, Apotheker.

« **M**ichaelis, Fr., Schlachthausdirector.

« **M**ouchall, Director des Gas- und Wasserwerks.

« **M**oxter, Dr. med., prakt. Arzt.

« **N**agel, Apotheker.

« **N**euendorff, W., Badewirth.

« **van** Niessen, Dr. med., prakt. Arzt.

« **O**bertüschen, Dr. med., prakt. Arzt.

« **P**agenstecher, Arnold, Dr. med., Geh. Sanitätsrath.

« **P**agenstecher, Dr. H., Augenarzt, Professor.

« **P**agenstecher, Ernst, Dr., prakt. Arzt.

« **P**eipers, Hugo, Rentner.

« **P**feiffer, Emil, Dr. med., Sanitätsrath.

« **P**lessner, Dr. med., prakt. Arzt.

« **P**reyer, Prof. Dr., Hofrath.

« **P**röbsting, A., Dr. med., prakt. Arzt.

« **P**eucker, Apotheker.

« **R**amdohr, Dr. med., prakt. Arzt.

« **v.** Reichenau, Geh. Regierungsrath, Verwaltungsgerichtsdirector.

Herr Ricker, Dr. med., Sanitätsrath.

- « Ricker jun., Dr., prakt. Arzt.
- « Rinkel, Schulinspector.
- « Ritter, C., sen., Buchdruckereibesitzer.
- « Ritter, C., jun., Buchdrucker.
- « Röder, Ad., Rentner.
- « Römer, August, Conservator am Museum.
- « Romeiss, Otto, Dr., Rechtsanwalt.
- « Roser, K., Dr. med., prakt. Arzt.
- « Rospatt, Geh. Regierungsrath.
- « Rudloff, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Rühl, Georg, Kaufmann.

- « Sartorius, Landes-Director.
- « v. Scheliha, Oberst a. D.
- « Scheinmann, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Schellenberg, Apotheker.
- « Schellenberg, Hof-Buchdruckereibesitzer.
- « Schellenberg, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Schierenberg, E., Rentner.
- « Schlichter, Ad., Rentner.
- « Schnabel, Rentner.
- « Schreiber, Geh. Regierungsrath.
- « Schulte, Rentner.
- « v. Seckendorff, Telegraphendirector.
- « Seip, Gymnasiallehrer.
- « Seyberth, Dr., Sanitätsrath.
- « Siebert, Professor an der Oberrealschule.
- « Sjöström, M., Rentner.
- « Spamer, Gymnasiallehrer.
- « Spieseke, Dr., Oberstabsarzt a. D.
- « Staffel, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Stoss, Apotheker.
- « Strecker, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Stempel, Apotheker.

- « von Tepper-Laski, Regierungspräsident.
- « Thanisch, A., Apotheker.
- « Thönges, H., Dr., Justizrath.
- « Touton, Dr. med., prakt. Arzt.

- « Vigener, Apotheker.
- « Vogelsberger, Oberingenieur.
- « Voigt, Dr. med., prakt. Arzt.
- « Vollmar, Rentner.

Herr **Wachter**, Rentner.

- « **Wagemann**, H., Weinhändler.
- « **Wehmer**, Dr., prakt. Arzt und Frauenarzt.
- « **Weiler**, Rentner.
- « **Weinberger**, Maler.
- « **Werz**, Carl, Glaser.
- « **Westberg**, Coll.-Rath.
- « **Westphalen**, Geh. Regierungsrath.
- « **Wibel**, Dr. med., prakt. Arzt.
- « **Winter**, Kgl. niederl. Oberstlieutenant a. D.
- « **Winter**, Ernst, Baurath, Stadtbaudirector.
- « **v. Winterfeld**, Oberst z. D.
- « **Witkowski**, Dr. med., prakt. Arzt.
- « **Worst**, Seminardirector a. D.
  
- « **Zais**, W., Hôtelbesitzer.
- « **Ziegler**, Ludwig, Rentner.
- « **Zinsser**, Dr. med.

*B. Ausserhalb Wiesbaden (im Regierungsbezirk).*

Herr **Albert**, Heinrich, Fabrikbesitzer, in Biebrich.

- « **Baltzer**, Dr., Reallehrer, in Diez.
- « **Bastelberger**, Dr. med., Eichberg i. Rheingau.
- « **Beck**, Dr., Rheinhütte in Biebrich.
- « **Beyer**, Gräfl. Kielmannsegge'scher Rentmeister, in Nassau.
- « **Blum**, J., Oberlehrer, in Frankfurt a. M.
  
- « **Christ**, Dr. phil., Geisenheim.
  
- « **Dyckerhoff**, R., Fabrikant, in Biebrich.
  
- « **Erhard**, Dr. med., Geisenheim.
- « **Esau**, Realschuldirector, in Biedenkopf.
  
- « **Frank**, Hüttenbesitzer, zur Nieverner Hütte bei Ems.
- « **Frickhöffer**, Dr. med., Hofrath, in Langenschwalbach.
- « **Frohwein**, Grubendirector, in Diez.
- « **Fuchs**, Pfarrer, in Bornich.
  
- « **Gärtner**, Martin, Hüfislehrer, in St. Goarshausen.
- « **Geis**, Bürgermeister, in Diez.
- « **Genth**, Dr. C., in Langenschwalbach, prakt. Arzt.
- « **Gehrenbeck**, Dr. phil., Herborn.

Herr Giebeler, W., Hauptmann a. D., Montabaur.

« Goethe, Director des Königl. Instituts für Obst- und Weinbau in Geisenheim, Oeconomierath.

« Haas, Rudolph, Hüttenbesitzer, zu Neuhoﬀnungshütte bei Herborn.

« Heberle, Bergdirector, Oberlahnstein.

« Hilf, Geh. Justizrath, in Limburg.

« Keller, Ad., in Bockenheim.

« Klau, Director des Progymnasiums Limburg a. d. Lahn.

« Kobelt, W., Dr. med., in Schwanheim.

« Kreckel, Dr. med., prakt. Arzt, in Eppstein.

« Kuhn, A., Kaufmann, in Nassau.

« Kunz, Chr., Reallehrer a. D., in Ems.

« Künzler, L., in Freyendiez.

» Kulisch, Dr., Geisenheim.

« v. Lade, Eduard, in Geisenheim.

« Leyendecker, Professor, in Weilburg.

« Linkenbach, Generaldirector, in Ems.

« Lotichius, Eduard, Dr., in St. Goarshausen.

« v. Matuschka-Greifenclaus, Hugo, Graf, auf Schloss Vollraths.

« Müller, Oberlehrer und Institutsvorsteher, in St. Goarshausen.

« Oppermann, Dr., Reallehrer, in Frankfurt a. M.

« Peters, Dr., Fabrikbesitzer, Schierstein.

« Quehl, Director, in Ems.

« v. Reinach, A., Baron, Frankfurt a. M.

« v. Rössler, Rechtsanwalt, Justizrath, in Limburg.

« Schröter, Dr., Director der Irrenheil- und Pﬂeganstalt Eichberg.

« Schüssler, Seminar-Oberlehrer, in Dillenburg.

« Seitz, Dr., Adalbert, Director des zoologischen Gartens in Frankfurt a. M.

« Siebert, Garten-Director, in Frankfurt a. M.

« Siegfried, Dr., Fabrikant, in Herborn.

« Speck, Dr. med., Sanitätsrath, in Dillenburg.

« Steinmeister, Landrath, in Höchst a. M.

« Sturm, Ed., Weinhändler, in Rüdesheim.

« Thilenius, Otto, Dr. med., Sanitätsrath, in Soden.

Herr **Vogelsberger**, Weinhändler, in Ems.

- « **Winter**, W., Lithograph, in Frankfurt a. M.
- « **Wortmann**, Prof. Dr. in Geisenheim.
- « **Zweifler**, Fachlehrer, Geisenheim.

*C. Ausserhalb des Regierungsbezirks Wiesbaden.*

Herr **Alefeld**, Dr. phil., in Darmstadt.

**Bibliothek**, Königl., in Berlin.

Herr **Dünkelberg**, Dr., Geh. Râth, in Poppelsdorf.

- « **Geisenheyner**, Gymnasiallehrer, in Kreuznach.
- « **Löbbeke**, Hauptmann a. D., in Domaine Machro bei Spremberg, Niederlausitz.
- « **Maurer**, Fr., Rentner, in Darmstadt.
- « **Meyer**, H., Dr., Professor, in Marburg.

**Königliches Oberbergamt**, in Bonn.

Herr **Preiss**, Paul, Eisenbahnbeamter, in Ludwigshafen a. Rh.

- « **Salter**, Sigmund, in Wien.
- « **Schenk**, Professor a. D., in Marburg a. d. Lahn.
- « **Schmidt**, Dr., in Strassburg, zoologisches Institut.
- « **Sommer**, Oberlobentau bei Arnstorf, Kreis Liegnitz, Schlesien.
- « **Steffen**, Apotheker, in Friedrichsthal bei Saarbrücken.
- « **Suffert**, L., Rentner in Berlin (Steglitz).





# SIEBENTER NACHTRAG

ZU DEM

## KATALOGE

DER

### BIBLIOTHEK DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE,

NEBST EINEM VERZEICHNISS d. z. Z. BESTEHENDEN TAUSCH-  
VERBINDUNGEN GEGEN d. JAHRBÜCHER.

VON

**AUG. RÖMER,**

CONSERVATOR DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS ZU WIESBADEN.

---

1897.



# VORWORT.

---

In den Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde Jahrgang 48, 1895 erschien der VI. Nachtrag zur Vereinsbibliothek. Derselbe ergab laut dem am 12. Juli 1895 abgeschlossenen Zugangs-Verzeichnisse einen Bestand von 15900 Nummern. Der nun in diesem Bande, dem 50. Jahrgange der Jahrbücher, erscheinende VII. Nachtrag ergibt laut dem am 26. Mai 1896 abgeschlossenen Zugangs-Verzeichnisse einen Zugang von 1020 Nummern, so dass die Vereinsbibliothek nun mehr **16920** Bücher, Schriften, Karten etc. enthält.

Fast alle mit uns im Tauschverkehr stehenden Gesellschaften, Institute und Staatsstellen setzten ihre Zusendungen regelmässig fort, wofür wir unseren Dank aussprechen mit der Bitte, aus den Anführungen den richtigen Empfang und die Aufnahme in unsere Bibliothek gütigst ersehen zu wollen, wofern nicht schon eine besonders gewünschte Empfangsanzeige ergangen ist.

Durch Schenkungen erhielten wir von Mitgliedern, Autoren und Gönnern des Vereins manchen Zuwachs, insbesondere von den Herren Dr. van Niessen, Coll.-Rath Westberg, Oberforstmeister Professor Dr. Borggreve, Geheime Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher hier, Palaeontologen F. Maurer in Darmstadt, Professor Dr. Kaiser in Marburg, Geheime Rath Professor Dr. F. v. Sandberger in München u. A.

Auch durch Ankauf konnten, namentlich für Zoologie, Botanik und Mineralogie werthvolle Anschaffungen gemacht werden.

Zu den bisherigen 297 Tauschverbindungen kommen als neue Verbindungen hinzu:

1. Brunn, Museum Franciscum.
2. Cincinnati, Museum Association.
3. Colorado, College.

4. Helsingfors, Commission Geologique de la Finland.
5. Kasan, Observatoire magnétique.
6. Leiden, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
7. Lincoln, (Nebr.) University of Nebraska.
8. Mexico, Congreso Americanita.
9. — Observatori meteorológico central.
10. Milwaukee, Public Museum.
11. Paris, Feuilles des jeunes naturalistes.
12. Prag, Deutscher naturwissenschaftlich-medicinischer Verein für Böhmen.
13. Sacramento, Universität of California College of agriculture.
14. Berkeley, Universität of California College, Departement of Geologie.
15. San Salvador, Observatorio Astronomica y Meteorologico.
16. Sion, Société murithienne (Suisse).
17. Tuft, (Mass.) Tuft's College,

so dass der Nassauische Verein für Naturkunde gegen seine Jahrbücher jetzt mit **314** Gesellschaften, Instituten und Staatsstellen im gegenseitigen Austausch steht.

Durch die Aufstellung mehrerer Repositorien in einem kleinen Raume des Museumsgebäudes wird es nun ermöglicht werden von der Doppelstellung der Bücher Abstand nehmen zu können, die die Benutzung so sehr erschwerte, ja fast unmöglich machte, so dass dem Raummangel vorübergehend etwas gesteuert werden wird.

Wiesbaden, den 26. Mai 1897.

Aug. Römer.

---

## I. Zeitschriften von Akademien, Staatsstellen, Gesellschaften, Instituten etc.

(Ein vorgesetztes \* bezeichnet neue Tauschverbindungen).

**Aarau**, naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen VII. 1895. 8°.

**Altenburg**, naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen aus dem Osterlande. Band VII. 1896. 80.

**Amiens**, Société Linnéenne du nord de la France.

Bulletin Tom XII. 1894—1895. (No. 259—282) 80.

**Amsterdam**, Koninklyke Akademie van Wetenschappen.

Eerste Sectie. Deel II. No. 7. 1894.

— — — III. No. 5, 6, 7, 8, 9. 1895—1896.

— — — V. No. 1, 2. 1896.

Tweede Sectie. Deel IV. 12°. No. 7, 8, 9. 1895—1896.

— — — V. 12°. No. 1, 2, 3. 1896.

— —, Jaarboek.

Jahrgang 1894 und 1895. 8°.

— —, Verslagen van de Zittingen der Wis-en Natuurkundige  
Afdeeling.

Deel III. van 26. Mei 1894 tot 18. April 1895. 8°.

— IV. van 25. Mei 1895 tot 18. April 1896. 8°.

— —, Koninklyke natuurkundige Vereeniging in Neder-  
landisch Indie.

Natuurkundige Tijdschrift vor Nederlandisch Indie. Deel LIV  
und LV. 1895—1895. Batavia und S'Gravenhage. 8°.



**Amsterdam**, Boekwerken, Ter Tafel gebracht in de Vergaderingen van de Directie der K. natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie.

Gedurende het Jaar 1895. (Afgeschloten Maart 1896).

— —, Supplement-Catalogus (1883—1893) der Bibliotheek van Batavia. 8<sup>o</sup>.

De Koninkl. natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie Batavia-S'Gravenhage 1895. 8<sup>o</sup>.

— —, Voordrachten No. 1. Bolland J. P. Voordracht gehouden am 12. September 1889. Batavia. 8<sup>o</sup>.

**Annaberg-Buchholz**, Verein für Naturkunde.

Jahresbericht IX. 1893. 8<sup>o</sup>.

**Augsburg**, naturhistorischer Verein.

Berichte XXXII. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Baltimore**, Johns Hopkins University.

Circulars. Vol. XIV, XV und XVI. 1895—1896. 4<sup>o</sup>.

**Basel**, naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen. XI. Band, 1. und 2. Heft. 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

**Berlin**, botanischer Verein für die Provinz Brandenburg.

Verhandlungen. Jahrgang XXXVII und XXXVIII. 1895 und 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, deutsche geologische Gesellschaft.

Zeitschrift. Band XLVI. 4. Heft 1894. Band XLVII und XLVIII. 1895 und 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, entomologischer Verein.

Berliner entomologische Zeitschrift. Band XLI. Heft 2 und 3. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Deutsche entomologische Zeitschrift, herausgegeben in Verbindung mit Dr. Kraatz und der Gesellschaft »Iris« in Dresden.

Jahrgang 1895. II. Heft. Jahrgang 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, landwirthschaftliche Jahrbücher.

Band XXIV. Heft 4, 5, 6. Ergänzungsband II. 1895. Band XXV. Heft 1—6. 1896. Ergänzungsband I, II, III und IV. 1896. Band XXVI. Heft 1. 1897. 8<sup>o</sup>.

**Berlin**, K. preussische geologische Landes-Anstalt und Bergakademie.

Jahrbücher. Band XV. 1894. XVI. 1895. 8°.

**Bern**, naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen aus dem Jahre 1894, No. 1335—1372. 8°.

— —, schweizerische naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen der LXXVII. Jahresversammlung am 30. und 31. Juli 1894 zu Schaffhausen. LXXVIII. Jahresversammlung den 8., 9., 10. und 11. September 1895 in Zermatt. LXXIX. Jahresversammlung den 3., 4. und 5. August in Zürich. 1896. 8°.

— —, schweizerische entomologische Gesellschaft.

Mittheilungen. Vol. IX. Heft 5—9. 1894—1896. 8°.

**Bistritz**, Gewerbeschule.

Jahresberichte XX. 1894/95. XXI. 1895/96. 8°.

**Bologna**, Academia delle scienze dell'Istituto.

Memorie, Serie V. Tomo III und IV. 1893 und 1894. 4°.

**Bonn**, naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westphalen.

Verhandlungen, Jahrgang LI. 2. Hälfte 1894. Jahrgang LII. 1. und 2. Hälfte 1895. Jahrgang LIII. 1. Hälfte 1896. 8°.

**Bordeaux**, Société Linnéenne.

Actes. Tom. XLV. 1892. Tom. XLVI. 1893. Tom. VII. 1894. Tom. IX. 1895. 8°.

Catalogue de la Bibliothèque. 8°.

**Boston**, Society of Natural History.

Proceeding. Vol. XXVI. Par. I—IV. 1893—1895. Vol. XXVII.

Memoires. Vol. V. No. 1 und 2. Vol. XXVII. 1896.

— —, American Academy of Arts and Sciences.

Proceedings. Vol. XXIX, XXX und XXXI. 1884—1896. 8°.

**Bregenz**, Voralberger Museumsverein.

Jahresberichte, XXXIII. 1896. XXXIV. 1897. 8°.

**Bremen**, naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen, XIII. Band. 3. Heft. XXIV. Band. 1. und 2. Heft. 1896 und 1897. 8°.

**Breslau**, schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.  
Jahresbericht LXXII. 1894. Ergänzungsheft 3 zum LXXII.  
Jahresbericht. LXXIII. 1896. Ergänzungsheft 4 zum LXXIII.  
Jahresbericht 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Verein für schlesische Insektenkunde.  
Zeitschrift. 20. Heft 1895. 21. Heft 1896. 8<sup>o</sup>.  
Fest-Schrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Vereins  
für schlesische Insektenkunde. 1847—1897. 8<sup>o</sup>.

**Brünn**, naturforschender Verein.  
Abhandlungen. Band XXXIII. 1894. Band XXXIV. 1895.  
Berichte der meteorologischen Commission des naturforschenden  
Vereins der Beobachtungen in dem Jahre 1893 (XIII), in  
dem Jahre 1894 (XIV). 8<sup>o</sup>.

— —, Museum Franciscum.  
Annales MDCCCXCV. 8<sup>o</sup>.

**Brüssel**, Académie royale des sciences, des lettres et des  
beaux arts de Belgique.  
Bulletins, Tome XXV—XXVIII. Serie III. 63<sup>me</sup> et 64<sup>me</sup> Année.  
1893—1894. 8<sup>o</sup>.  
Annuaire, Années LX. 1894. LXI. 1895. 8<sup>o</sup>.

— —, Société entomologique de Belgique.  
Annales, Tome XXXVIII. 1894. Tome XL. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Société royale de botanique de Belgique.  
Bulletins, Tome XXXIII. 1894. Tome XXXIV. 1895. Tome  
XXXV. 1897. 8<sup>o</sup>.

— —, Société malacologique de Belgique.  
Annales, Tome XXVII. 1892. 8<sup>o</sup>.  
Procès-verbeaux des séances, Tome XXII. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Bucarest**, Institut météorologique de Roumaine.  
Annales, Tom. IX. 1893. Tom. XI. 1895.  
Buletinul Anul. III. 1894. IV. 1895. V. 1896. 4<sup>o</sup>.

**Budapest**, Königlich ungarische geologische Gesellschaft.  
Földtani Közlöny. Band XXV. Heft 4—5 u. 11—12. 1895.  
Band XXVI. Heft 1—4, 5—6, 7—10, 11—12. 1896.  
Band XXXVII. Heft 1—4. 1897. 8<sup>o</sup>.

**Budapest,** Königlich ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn.  
Band X, XI und XII. 1893—1895. 8<sup>o</sup>.

Duday, E. v. *Cypridicola parasitica* n. sp. mit 1. Tafel.  
1893. 8<sup>o</sup>.

Schafarzik, F. Die Pyroxen-Andesite des Cserhát. Eine  
petrographische und geologische Studie. 1895. 8<sup>o</sup>.

Nándor, Filarzky. Die Characeen. Mit besonderer Rück-  
sicht auf die in Ungarn beobachteten Arten. 1893. 8<sup>o</sup>.

Hegyforky, J. Ueber die Windrichtung in den Ländern der  
ungarischen Krone, nebst einem Anhang Barometerstände  
und Regen. 1894. 4<sup>o</sup>.

Madarasz, J. v. Erläuterungen zu der Ausstellung der unga-  
rischen Vogelfauna. 8<sup>o</sup>.

**Cambridge,** Museum of comparative zoology.

Bulletins. Vol. XXIII—XXX. 1893—1897. 8<sup>o</sup>.

Annual Report. Vol. 1894—1895. 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

— —, (England). Philosophical Society.

Proceedings, Vol. VIII. Part. I—V. 1892—1895. Vol. IX.  
Part I—IV. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Cassel,** Verein für Naturkunde.

Berichte, XL. über das Vereinsjahr 1894—1895. XLI. über  
das Vereinsjahr 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

**Carlsruhe,** naturwissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen, 11. Heft. 1888—1895. 8<sup>o</sup>.

**Catania,** Academia Gioenia di scienze naturali.

Atti, Serie quarta. Tomo VIII. 1895. Tomo IX. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Bulletino Mensile, Serie Nuova.

Fasc. XXXIX, XL, XLI, XLII—XLIII, XLIV—XLV. 1895  
bis 1896. 8<sup>o</sup>.

**Chemnitz,** naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Bericht, XIII. vom 1. Juli 1892 bis 31. Decbr. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Christiania,** Kong. Norske Universitæt.

N. Nordhavs-Expedition 1875—1878. Heft XXIII. 1896. Folio.  
Vanstandsobservationer.

Astronomische Beobachtungen. 1895. 4<sup>o</sup>.

Schiötz, E. O. Resultate der im Sommer 1894 in dem nördlichsten Theil Norwegens ausgeführten Pendelbeobachtungen.

**Cherbourg**, Société nationale de sciences naturelles.

Mémoires. Tom. XXIX. 1892—1895. 8<sup>o</sup>.

**Chur**, naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Jahrgang XXXVIII. 1894—1895. XXXIX. 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

**Cincinnati**, Museum Association.

Twelfth Annual Report. 1892. 8<sup>o</sup>.

**Colmar**, Société d'histoire naturelles.

Bulletin, Années 1885—1890. 1891—1894. 1895 et 1896. 8<sup>o</sup>.

**Colorado**, College Studies.

Fifth annual Publication 1894. 8<sup>o</sup>.

**Cordoba**, Academia nacional de ciencias de la República.

Argentina. Tom. XV. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Crefeld**, Verein für naturwissenschaftliches Sammelwesen.

Jahresbericht 1895/96. 8<sup>o</sup>.

**Danzig**, naturforschende Gesellschaft.

Schriften. Band IX. Heft 1. 1896. 4<sup>o</sup>.

**Darmstadt**, Verein für Erdkunde.

Notizblatt, IV. Folge, XVI. Heft. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Donaueschingen**, Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und der angrenzenden Landestheile.

IX. Heft. 1886. 8<sup>o</sup>.

**Dorpat**, naturforschende Gesellschaft.

Sitzungsberichte, X. Band, 3. und 4. Heft. 1894 und 1895.

XI. Band, 1. Heft. 1895. 8<sup>o</sup>.

Schmidt, C. Synchronistische Tabellen über die naturwissenschaftliche Journalliteratur von 1650—1893. 4<sup>o</sup>.

Keenel, J. v. Studien über sexuellen Dimorphismus, Variation und verwandte Erscheinungen I.

**Dresden**, Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Jahresbericht 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

— —, naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis.«

Sitzungsberichte. Jahrgang 1895 und 1896. 8<sup>o</sup>.



**Dresden**, entomologischer Verein »Iris.«

Correspondenzblatt. Band II—VIII. 1889—1895. 8°.

**Dürkheim**, naturwissenschaftlicher Verein »Pollichia.«

Jahresberichte. LII. No. 8. 1894 und LIII. No. 9. 1895. 8°.

**Lilberfeld**, naturwissenschaftlicher Verein.

Jahresberichte, VIII. 1896. 8°.

**Emden**, naturforschende Gesellschaft.

Jahresberichte. LXXIX. 1893/94 und LXXX 1894/95. 8°.

**Erfurt**, Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften.

Jahrbücher. Neue Folge XX. 1894. XXI. 1895. XXII. 1896  
XXIII. 1897. 8°.

**Erlangen**, Physikalisch-medicinische Societät.

Sitzungsberichte. Heft XXVI. 1894. Heft XXVII. 1895. 8°.

**Florenz**, Societa entomologica Italiana.

Bulletino, Anno ventisettesimo. Trimestri I et II. 1895.

— — — — III et IV.

— — ventottesimo — I et II. 1896. 8°.

— — — — III et IV. 1896. 8°.

**Frankfurt a. M.**, Senkenbergische naturforschende Gesellschaft.

Abhandlungen, XIX. Band. Heft 1—4. 1895 u. 1896. XXII.

Band. 1896. XXIII. Band. Heft 1 und 2. 1895 und  
1897. 4°.

Kinkel. Seltene Fossilien des Senkenbergischen Museums.

(Sonderabdruck aus den Abhandlungen der Senkenbergischen  
naturforschenden Gesellschaft, XX. Band. 1. Heft 1896). 4°.

Berichte, 1895 und 1896. 8°.

Führer durch das Museum der Senkenbergischen natur-  
forschenden Gesellschaft. 1896. 8°.

— —, Physikalischer Verein.

Jahresberichte. 1893—1894. 1894—1895. 8°.

Ziegler und König, W. Das Klima von Frankfurt a. M.  
1896. 4°.

— —, Neue zoologische Gesellschaft.

Der zoologische Garten, Jahrgang XXXVII. 1896. Jahrgang  
XXXVIII. 1897. 8°.

**Frankfurt a. d. Oder**, naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen und monatliche Mittheilungen. (Helios, Organ des Vereins).

Jahrgang XIII. 1895. 8°.

**Frauenfeld**, Thurgauische naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen, 12. Heft. 1896. 8°.

**Freiburg i. B.**, naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Berichte, Band IX, Heft 1—3. 1894—1895. 8°.

**Geisenheim**, Königliche Lehranstalt für Obst- und Weinbau.

Bericht für das Etatsjahr 1894/95 und 1895/96. 8°.

**Giessen**, oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Berichte. XX. 1895. XXI. 1896. 8°.

**Görlitz**, oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Neues Lausitzisches Magazin. Band LXXI. 1895. Band LXXII. 1896. 8°.

— —, naturforschende Gesellschaft.

Abhandlungen, Band XXI. 1895. 8°.

**Göttingen**, Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und Georg August-Universität.

Nachrichten der mathematisch-physikalischen Klasse vom Jahre 1895. Heft 2, 3, und 4. 1896. Heft 1—4.

Geschäftliche Mittheilungen vom Jahre 1895. Heft 1 und 2. 1896. Heft 1 und 2. 8°.

**Göteborg**, Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Handlingar, Heft XXX. 1895. XXXI. 1896. XXXII. 1897. 8°.

**Graz**, naturwissenschaftlicher Verein.

Mittheilungen. Jahrgang 1895. (Der ganzen Reihe 32. Band.) 8°.

— —, Verein der Aerzte.

Mittheilungen, Vereinsjahr XXXIII. 1896. 8°.

**Greifswald**, naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen.

Mittheilungen, Jahrgang XXVII. 1895. XXVIII. 1896. 8°.

**Halifax**, Nova Scotian Institute of natural science.

Proceedings, Session of 1893—1894. Vol. VIII. Part IV. Session  
1894—1895. Vol. IX. Part I. 8<sup>o</sup>.

**Halle**, naturforschende Gesellschaft.

Abhandlungen, Band XIX. Heft 3 und 4. 1895. 4<sup>o</sup>.

— —, Verein für Erdkunde.

Mittheilungen Jahrgang. 1895 und 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Leopoldina, amtliches Organ der Kaiserlichen  
Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie  
der Naturforscher.

Heft XXXI. 1895. XXXII. 1896. XXXIII. 1897. 4<sup>o</sup>.

**Hamburg**, naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen, dritte Folge. III. 1897. 4<sup>o</sup>.

— —, naturwissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen III, Folge IV. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Band  
XII 1892. Band XIII 1895. Band XIV 1896. Band XV.  
1897. 4<sup>o</sup>.

— — naturhistorisches Museum.

Mittheilungen aus dem naturhistorischen Museum.

Jahrgang XIII. 1894. (Beiheft zu dem Jahrbuch der Ham-  
burgischen wissenschaftlichen Anstalten 1895). 8<sup>o</sup>.

— —, Verein für wissenschaftliche Unterhaltung.

Verhandlungen, Band IX. 1894—1895. 8<sup>o</sup>.

**Hanau**, wetterauische Gesellschaft für die gesammte  
Naturkunde.

Jahresbericht, 1. December 1892 bis 30. April 1895. 8<sup>o</sup>.

**Harlem**, Société hollandaise des sciences exactes naturelles.

Archives. Tom XXIX. Livraison 2, 3, 4 et 5. 1896. Tom  
XXX. Livraisons 1—5. 1896 und 1897. 8<sup>o</sup>.

— —, Teyler, Genootshap.

Musée Teyler. Archives. Serie II. Vol. IV. Troisième partie  
1894. Quatrième partie 1895.

— —, Serie II. Vol. V. Première et Deuxième partie. 1896. 4<sup>o</sup>.

**Heidelberg**, naturhistorisch-medicinischer Verein.

Verhandlungen. Neue Folge. V. Band. 4. Heft. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Helsingfors**, Societas Scientarium Fennicae.

Forhandlingar XXXVI. 1893—1894. XXXVII. 1894 bis 1895. 8<sup>o</sup>.

Acta. Tom. XV—XX. 1888—1895. 4<sup>o</sup>.

Kännedom af Finlands Natur och Folk. Bidrag. Heft 54. 55 1894. 56. 1895. 8<sup>o</sup>.

Acta societatis pro Fauna et Flora Fennica. Vol. XI und XII. 1894—1895. 8<sup>o</sup>.

Meddelanden.

Heft 21. 1895. Heft 22. 1896. 8<sup>o</sup>.

Observation Météorologiques à Helsingfors. Vol. onzième—quatorzième 1892—1895. 4<sup>o</sup>.

Axel, Arrhenius. Botanische Sitzungsberichte. Jahrgang I. 1887—1888. Jahrgang II, III, IV. 1888—1891.

Selan, v. Th. und Kilmann, O. Herbarium Musei Fennici. Editio secunda.

I. Plantae vasculares. 1889. 8<sup>o</sup>.

Bomansson, O. J. und Brotherius, F. V.

II. Musci curantibus. 1894. 8<sup>o</sup>.

— —, La Société des Sciences de Finlande.

Observation Météorologiques.

Année 1881—1882, 1883—1884. 1885—1886. 1886 bis 1887. 1888 und 1889. 1889—1890. 1881—1890. Tome supplémentaire. Folio.

— —, Finlands geologiska Undersökning.

Beskriefning till Kartbladet.

No. 27, 28, 29, 30 und 31 mit 4 Karten. 1895—96. 8<sup>o</sup>.

— —, Commission Geologique de la Finlande.

Bulletin No. 1, 2, 3, 4, 5. 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

**Hermannstadt**, siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

Verhandlungen, Jahrgang XLV. 1896. 8<sup>o</sup>.

Der siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften nach seiner Entstehung, Entwicklung und seinem Bestande. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Jassy**, Société des Médecins et Naturalistes.

Bulletin, neuvième année. Vol. IX. 1895. Dixième année.  
Vol. X. 1896. 4<sup>o</sup>.

**Innsbruck**, Ferdinandeum für Tyrol und Voralberg.

Zeitschrift, 3. Folge. Heft 39. 1895. Heft 40. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, naturwissenschaftlich-medicinischer Verein.

Berichte, Jahrgang XXII. 1893—1896. 8<sup>o</sup>.

**Kasan**, Observatoire magnétique et météorologique de  
l'Université Imperial.

September—December 1895. Januar—März 1896.

**Kiel**, naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Hol-  
stein.

Schriften, Band X. Heft 2. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Kiew**, Gesellschaft der Naturforscher.

Tom. XIII. 1894. XIV. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Klausenburg**, Siebenbürgischer Musenms-Verein.

Ertesitő Orvos-Termézet. Tud. Szakosztályából. Sitzungsberichte  
der medicinisch-naturwissenschaftlichen Section.

I. Aertzliche Abtheilung.

Jahrgang XX. Band XVII. Heft I, II 1895.

Jahrgang XXI. Band XVIII. Heft I, II, III. 1896.

II. Naturwissenschaftliche Abtheilung.

Jahrgang XX. Band XVII. Heft I, II. 1895.

Jahrgang XXI. Band XVIII. Heft I, II, III. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Klagenfurt**, naturhistorisches Landesmuseum für Kärnthen.

Jahrbuch XXIII. Jahrgang LXI und LXII. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Königsberg i. Pr.**, Königliche physikalisch-ökonomische Ge-  
sellschaft.

Schriften, Jahrgang XXXV. 1894. XXXVI. 1895. XXXVII.  
1896. 4<sup>o</sup>.

**Kopenhagen**, Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs.

Oversigt i Aaret. 1894. No. 3. 1895. No. 1—4. 1896.  
No. 1—6. 1897. No. 1.

— —, naturhistoriske Forening.

Videnskabelige Meddelelser.

For Aaret 1895 und for Aaret 1896. 8<sup>o</sup>.



**Krakau**, K. K. Akademie der Wissenschaften.

Pamiętnik. Zeszyt No. III. 1894. 4<sup>o</sup>.

Matematyczno-przyrodniczego. Rozprawy.

Serya II. Tom. VII—IX. 1895. Tom. XI und XII. 1896 bis 1897. 8<sup>o</sup>.

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften. 1896 u. 1897. 8<sup>o</sup>.

**Landshut**, botanischer Verein.

Jahresbericht XII für das Vereinsjahr 1890—91. XIII für das Vereinsjahr 1892—93. XIV. für das Vereinsjahr 1894 bis 1895. 8<sup>o</sup>.

**La Plata**, Direction générale de statistique.

Revista de la Facultad de Agronomia y Veterinaria, Numeros V und VI. Mai—Juni 1895. 8<sup>o</sup>.

**Lausanne**, Société vaudoise des sciences naturelles.

Bulletin, XXX. No. 116. 1894. XXXI. No. 117. 118. 119. 1895. XXXII. No. 120, 121, 122. 1896. 8<sup>o</sup>.

Index Bibliographique de la Faculté des sciences naturelles. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Leiden**, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Handelingen en Mededeelingen over het Jaar 1894—95.

Levensberichten der afgestorvenen Medeleden van de Maatschappij. (Bilage tot de Hemdelingen van 1894—95). 8<sup>o</sup>.

**Leipzig**, Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften, mathematisch-physikalische Classe.

Abhandlungen. Band XXII. No. I—V. 1895. Band XXIII, No. I—VI. 1896 und 1897. 4<sup>o</sup>.

Berichte, 1895. I—VI. 1896. I—VI. 8<sup>o</sup>.

— —, naturforschende Gesellschaft.

Sitzungsberichte, Jahrgang XIX—XXI. 1893—1894. 8<sup>o</sup>.

— —, Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft der Wissenschaften.

Gekrönte Preisschriften No. XII. 1893. No. XIII. 1896. 8<sup>o</sup>.

Jahresberichte 1896, 1897. 8<sup>o</sup>.

— —, Verein für Erdkunde.

Mittheilungen. 1894, 1895, 1896. 8<sup>o</sup>.

Baumann, O. Die Insel Mafia, mit einer Karte. 1896. 8<sup>o</sup>.

— — Die Insel Sansibar, mit einer Karte. 1896. 8<sup>o</sup>.

- Leipzig**, Wissenschaftliche Veröffentlichungen, Band II 1897. 8<sup>o</sup>  
1895. Anthropologische Beiträge.  
— —, Museum für Völkerkunde.  
Berichte, XXII. 1894. XXIII. 1895. 8<sup>o</sup>.
- Leutschau** (Iglò) Ungarischer Karpathen-Verein.  
Jahrbücher, XXII. Jahrgang. 1895. 8<sup>o</sup>.
- Lincoln**, (Nebr.) University of Nebraska.  
Proceedings and Collections, Vol. I, No. 3. Second Série 1885. 8<sup>o</sup>.
- Liège**, Société royale des sciences.  
Memoires. Deuxième série. Tome XVIII—XIX. 1891 bis  
1897. 8<sup>o</sup>.
- Linz**, Museum Franciso-Carolinum.  
Berichte, LIII und LIV nebst den Beiträgen der Lieferungen  
XLVII und XLVIII. 1895—1896. 8<sup>o</sup>.  
— —, Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der  
Enns.  
Berichte, XXIV. 1895. XXV. 1896. 8<sup>o</sup>.
- London**, Geological society.  
Quarterly Journal. Vol. LI. Part 3 und 4. 1895. Vol. LII.  
Part 1—4, 1896. Vol. LIII. Part 1 und 2. 1897. 8<sup>o</sup>.  
General Index of the First Tiffy Vol. of the Quarterly Journal.  
Part I—A.—La. No. 200<sup>a</sup> Februar 1897. Part II—La—Z.  
No. 200<sup>b</sup> Mai 1897. 8<sup>o</sup>.  
List of the Geological Literature. Juni—December. 1896. 8<sup>o</sup>.  
— —, Entomological Society.  
Transaction for the Year 1896. 8<sup>o</sup>.
- Lund**, Acta Universitatis Lundensis.  
Universitetes Årskrift. Tom. XXXI. 1895. Tom. XXXII.  
1896. 4<sup>o</sup>.
- Lübeck**, Vorsteherschaft der Naturaliensammlung.  
Jahresbericht für 1892. 8<sup>o</sup>.
- Lüneburg**, naturwissenschaftlicher Verein für das Fürsten-  
thum Lüneburg.  
Jahresheft XIII. 1893—1895. 8<sup>o</sup>.
- Luxemburg**, Institut Royal Grand-Ducal, Section naturelles  
et mathématiques.  
Publication, Tom. XXIII. 1894. Tom. XXIV. 1896. 8<sup>o</sup>.

- Luxemburg**, Verein Luxemburger Naturfreunde »Fauna.«  
Mittheilungen aus den Vereinssitzungen, Jahrgang 1895. 8°.
- Lyon**, Société d'agriculture d'histoire naturelle et des  
arts utiles.  
Annales. Septième-Série. Tom. I—III. 1893—1895. 8°.
- Madison**, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and  
Letters.  
Transactions, Vol. X. 1894—1895. 8°.
- Magdeburg**, naturwissenschaftlicher Verein.  
Jahresbericht 1894, II. Halbjahr 1896. 8°.
- Mailand**, R. Istituto Lombardo di scienze e lettere.  
Memorie, Vol. XVII—VIII della Serie III, fasc. V. 1895. 4°.  
Vol. XVII—VIII della Serie III, fasc. VI ed ultimo. 1896. 4°.  
Vol. XVIII—IX della Serie III, fasc. I. 1896. 4°.  
Rendiconti, Serie II. Vol. XXVI—XXVIII. 1893—1895. 8°.  
Indice generali dei Lavori per Autori e per Materie. 1895. 8°.
- —, Società Italiana di scienze naturali.  
Atti, Serie II. Vol. XXXV—XXXVI. 1895—1897. 8°.
- Manchester**, Litterary and philosophical Society.  
Mémoires, Fourth Series. Vol. IX. No. 3, 4, 5, 6. 1894 bis  
1895. Vol. X. No. 1—3. 1895—1896. 8°.  
Proceedings. Vol. XLI. Part I et II. 1896—1897. List of  
the Members et Officers. 1896. 8°.
- Marburg**, Gesellschaft zur Beförderung der gesammten  
Naturwissenschaften.  
Schriften. Band XII. 6. Abhandlung. 1895. 4°.  
Sitzungsberichte 1894 und 1895. 8°.
- Meriden**, (Conn.) Scientific Association.  
Proceedings and Transactions. Vol. VII. 1895. 8°.
- México**, Observatorio meteorológico central.  
Boletín mensual. Año de 1896, 1897. No. 1. 4°.
- —, Congreso Americanistas.  
Reunion en México del 15 al 20 de Octubre 1895. Pro-  
grama. 8°.
- Milwaukee**, Public Museum of the city of Milwaukee.  
Annual Report 1895. 8°.

**Minneapolis**, Minnesota Academy of Natural Sciences.

Ocasional Papers. Vol. I. No. 1. 1894. 4<sup>o</sup>.

**Montpellier**, Academie des sciences et lettres.

Mémoires de la section de médecine.

2<sup>e</sup> Serie. Tome 1<sup>o</sup> No. 1. 1893. 4<sup>o</sup>.

**Moskau**, Société Impériale des naturalistes.

Bulletin. Année 1895. No. 1—4. 1896. No. 1, 2, 3. 8<sup>o</sup>.

**München**, Königliche Akademie der Wissenschaften, mathematisch-physikalische Klasse.

Abhandlungen. Band XIX. Abtheilung 1. 1896. 4<sup>o</sup>.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1895 und 1896. 8<sup>o</sup>.

— —. Gesellschaft für Morphologie und Physiologie.

Sitzungsberichte. Heft X. 1894. Heft XI. 1895. 8<sup>o</sup>

**Nancy**, Société des sciences.

Bulletin, Serie II. Tom. XIII fasc. XXVIII. 1893. fasc. XXIX. 1894.

Catalogue de la Bibliothèque. 1894. 8<sup>o</sup>.

**Neubrandenburg**, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

Archiv, Jahrgang XLIX. 1895. 8<sup>o</sup>.

**New-Haven**, American Journal of Science and Arts.

Vol. L. No. 294—300. 1895. 8<sup>o</sup>.

Vol. I. (Whole No. CLI.) No. 1—6. Vol. II. (Whole No. CLII.) No. 7—12. 1896. 8<sup>o</sup>.

Vol. III. (Whole No. CLIII.) No. 13—17. 1897. 8<sup>o</sup>.

— —, Connecticut Academy of Arts and Sciences.

Transactions, Vol. IX, Part 2. 1895. 8<sup>o</sup>.

**New-York**, Academy of Sciences.

Lyceum of Natural History.

Annals, Vol. VI. Index. Vol. VII. No. 6—12. 1894. Vol. III.

Index. Vol. VIII. No. 4—12. 1895. Vol. VIII. Index. Vol.

IX. No. 1—3. 1896. 8<sup>o</sup>.

Memoir.

Davis, S. H. Declinations and Proper Motions of Tiffy.

Six Stars. 1895. 4<sup>o</sup>.

**New-York, Microscopical Society.**

Journal, Vol. XI. No. 3 und 4. 1895. Vol. XII. No. 1—4.  
1896. Vol. XIII. No. 1. 1897. 8°.

— — **American Geographical Society.**

Bulletin. Vol. XXVII. No. 2, 3. 1895. Vol. XXVIII, No. 1  
bis 4. 1896. Vol. XXIX. No. 1. 1897. 8°.

— — **American Museum of Natural History.**

Annual Report 1894 und 1895. 8°.

Bulletin, Vol. VI. 1894. Vol. VII. 1895. 8°.

**Nürnberg, naturhistorische Gesellschaft.**

Jahresbericht, X. Band. 3. Heft für 1894. X. Band. 4. Heft  
für 1895. 8°.

— — **germanisches National-Museum.**

Anzeiger, Jahrgang 1895.

Mittheilungen, Jahrgang 1895. 8°.

Atlas zum Kataloge der im germanischen Museum zu den Ab-  
bildungen befindlichen Holzstöcke vom XV.—XVIII. Jahr-  
hundert mit XII Tafeln. Folio.

**Offenbach, Verein für Naturkunde.**

Berichte XXXIII, XXXIV, XXXV u. XXXVI für die Vereins-  
jahre 1891—1895. 8°.

**Osnabrück, naturwissenschaftlicher Verein.**

Jahresbericht X für die Jahre 1893—1894. XI für die Jahre  
1895 und 1896. 8°.

**Padova, Società Veneto-Trentina di science naturali.**

Bulletino, Tomo VI. No. 2. 1896. 8°

Atti Série II. Vol. II, fascic. II. 1896.

Atti Série II. Vol. III, fascic. I. 1897. 8°.

**Palermo, Reale Academia di science, lettere e belle arti.**

Torquato Tasso 1895. 4°.

**Passau, naturhistorischer Verein.**

Jahresbericht für die Jahre 1890—1895. 8°.

**Paris, Société zoologique de France.**

Bulletin, Tome XX pour l'année 1895. Tome XXI. 1896. 8°.

Janet, Charles.

Etudes sur les Fourmis les Guêpes et les Abeilles.



Janet, Charles.

— —, Extrait des Mémoires de la Soc. zoologique des France pour l'année 1895.

— —, Observation sur les Frelons. Extr. du C. rendi (6).

— —, Sur la Vespa crabro L.

— —, Études sur les Fourmis. 8<sup>e</sup> Note et 9<sup>e</sup> Note 1895. Saint-Lager, les ânes et le vin. 1893.

— —, La Vingne du Mont Ida et le Vaccinium 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Les nouvelles flores de France Études Bibliographique. 1894. 8<sup>o</sup>.

— —, Les Gentianella du Groupe grandiflora.

Jolyet, F. et Lalesque, F. Travaux des Laboratorres. Société scientifique d'Arcachon Année 1895.

**Paris**, Muséum d'histoire naturelle.

Bulletin, Année 1895, No. 4, 5, 6, 7 et 8. 1896, No. 1, 2, 3, 4, 5. 8<sup>o</sup>.

— —, Feuille des jeunes naturalistes.

Revue Mensuelle d'histoire naturelle.

No. 265—276 1892. No. 277—288 1893. No. 289—300 1894. No. 301—305 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

Dollfus, A. Catalogue de la Bibliothèque. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Perugia**, Academia Medico-Chirurgica.

Atti et Rendiconti.

Vol. VII fasc. 1—4. 1895. Vol. VIII fasc. 1—4. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Philadelphia**, Academy of Natural Sciences.

Proceedings 1894 Part II und III. 1895 Part I—III. 1896 Part I und II.

— —, American philosophical Society.

Proceedings. Vol. XXXII. No. 143. 1893. Vol. XXXIII.

No. 146. 1894. Vol. XXXIV. No. 147, 148, 149. 1895.

Vol. XXXV. No. 150, 151. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Wagner Free Institute of Sciences.

Transaction, Vol. III. Part III 1895. Vol. IV. 1896.

**Pisa**, Società Toscana di scienze naturali.

Vol. XIV. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Porto**, Sciencias Naturaes Annaes.

Anno III. No. 1, 2, 3, 4. 1896.

Anno IV. No. 1. 1897. 8<sup>o</sup>.

**Posen**, naturwissenschaftlicher Verein.

Zeitschrift der botanischen Abtheilung.

Jahrgang II. Heft 3. Jahrgang III. Heft. 1. 1896. 8°.

**Prag**, Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Sitzungsberichte.

Jahrgang 1894, 1895. 8°.

Jahresberichte für 1894 und 1895. 8°.

— —, Deutscher naturwissenschaftlich-medicinischer Verein für Böhmen.

Abhandlungen, Band I. Heft 1. 1896. 4°.

— —, Verein böhmischer Forstwirthe.

Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde.

Jahrgang 1894/95. Heft 5 und 6. 1895/96. Heft 1—6. 1896/97. Heft 1—4. 8°.

Excursionstour des böhmischen Forst-Vereins in die Forsten der Domäne Gratzen den 5., 6. und 7. August 1895. 8°.

Einladung und Programm zur 47. Generalversammlung des böhmischen Forstvereins den 5., 6. und 7. August 1895.

Desgleichen zur 48. Generalversammlung den 3., 4. und 5. August 1896. 8°.

Excursionstour des böhmischen Forstvereins in den Forst der Herrschaft Podubrad. 1896. 8°.

— —, Lese- und Redehalle der deutschen Studenten.

Jahresbericht für 1894 und 1895. 8°.

**Pressburg**, Verein für Naturkunde.

Verhandlungen, Jahrg. 1892—1893. (Neue Folge, 8. Heft.) 8°.

**Raleigh**, N. C. Elisha Mitchell scientific Society.

Journal for 1895 prem. et second Parti. 8°.

**Regensburg**, Königl. bayrische botanische Gesellschaft.

Katalog der Bibliothek. I. Theil 1895. II. Theil 1897. Zusammengestellt von Dr. F. Völlmann. 1897. 8°.

**Reichenberg** (Böhmen), Verein der Naturfreunde.

Mittheilungen, Jahrgang XXVII. 1896. 8°.

**Riga**, naturforschender Verein.

Correspondenzblatt XXXVIII. 1895. XXXIX. 1896.

**Riga**, Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Vereins.  
1895. 8°.

**Rochester**, Academy of Sciences.

Proceedings, Vol. II. Heft 3 und Heft 4. 1894 und 1895.  
Vol. III. Heft 1. 1896. 8°.

**Rom**, R. Comitato geologica d'Italia.

Bolletino, XXV. 1894. XXVI. 1895. 8°.

**Rotterdam**, Société Batave de Philosophie experimentale.  
Programme 1895. 8°.

— —. Bataafsche Genootschap.

Nieuwe Verhandelingen, Breitengewone Aflevering 1895. 4°.

**St. Louis**, Academy of science.

Transaction. Vol. VI. No. 18. Vol. VII. No. 1, 2, 3.  
1895. 8°.

**S'Gravenhage**, Koninklyk Institutut voor de Taal-, Land- en  
Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

Bydragen 6 Volgreeks. I Deel 3 und 4 Aflevering. II Deel  
1., 2., 3. und 4. Aflevering 1896. III Deel 1 Aflevering  
und 2 Aflevering 1897. 8°.

Gronemann, J de und Gareberg, S. The Gaioykarta  
met Photogrammen van Cephas. 4°.

Naamlyst der Leden van het Instituut. 1. April 1896 und  
1. April 1897. 8°.

— —, Nederlandsche entomologische Vereeniging.

Tydschrift voor Entomologie.

36 Deel, Jaargang 1892—1893.

37 Deel, Jaargang 1893—1894.

38 Deel, Jaargang 1894—1895.

39 Deel, Jaargang 1896—1897. 8°.

**San Francisco**, California Academy of Natural Sciences.

Proceedings, Vol. IV und V. 1895 und 1896. 8°.

**Sacramento**, Universitat of California College of agriculture.

Report of the Viticultural Work. Part I. Season 1887—1889.

Report of Work of the Agr. Experiment Stations. Year 1892  
bis 1893 and Part of 1894. 8°.

Annual Report of the Secretary of the Board of Regents.  
Year 1894. 8°.

- A Brief Account of the Lick Observatory 1895. 8<sup>o</sup>.  
 Biennial Report of the President of the University. 1893. 8<sup>o</sup>.  
 List of Recorded Earthquakes in Calif., Lower Calif., Oregon  
 and Washington Territory. 1887. 8<sup>o</sup>.  
 First Annual Report of the Chief Executive Viticultural Officer.  
 For the Year 1881. 8<sup>o</sup>.  
 Second Annual Report. For the Years 1882—83 und 1883  
 bis 1884. 8<sup>o</sup>.  
 Annual Report of the Board of State Viticultural Commissioners  
 for 1889—90, for 1891—92. for 1893—94. 8<sup>o</sup>.  
 Annual Report of the Secretary to the Board of Regents.  
 For the Year 1895. 8<sup>o</sup>.  
 Biennial Report of the President of the University on Behalf  
 of the Board of Regents, to His Exselleney the Governor  
 of the State. 1893. 8<sup>o</sup>.  
 State Viticultural Commission.  
 First Annual Report. Second Edition-Revised 1881. 8<sup>o</sup>.  
 Board of State Horticultural Commissioners of California.  
 First Report. 1882. 8<sup>o</sup>.  
 Contributions of the Larval History of Pacific Coast Coleoptera.  
 1886. 8<sup>o</sup>.  
 The Oaks of Berkeley and Some of Their Insect Inhabitants.  
 1887. 8<sup>o</sup>.  
 State Viticultural Convention, held at Pioneer Hall, San Fran-  
 cisco, March 7, 8, 9, 10. 1888. Report of the Sixth  
 Annual. 1888. 8<sup>o</sup>.  
 Directory of the Grape Growers, Wine Makers and Distillers  
 of California, and of the Principal Grape Growers and Wine  
 Makers of the Eastern States. 1891. 8<sup>o</sup>.  
 Treatise on Wine Production and Special Reports on Wine  
 Examinations, the Tariff and Internal Revenue Taxes, and  
 Chemical Analyses. 1894. 8<sup>o</sup>.  
 Register of the University of California. 1894—95. 8<sup>o</sup>.  
 Berkeley. University of California.  
 Bulletin of the Department of Geology. 8<sup>o</sup>.  
 Lawson, C. Andre. The Geology of Carmelo Bay. 1893. 8<sup>o</sup>.  
 — —, The Post-Pliocene Diastrophism of the Coast of Southern  
 California. 1893. 8<sup>o</sup>.

Lawson, C. André. The Geomorphogeny of the Coast of Northern California. 1894. 8°.

Ransome Leslie, F. The Cruptive Rocks of Point Bonita. 1893. 8°.

— —, The Geology of Angel Island. 1894. 8°.

— —, On Lawsonite a New Rock-Forming Mineral, from the Tiburon Peninsula. Marin. Co., Cal. 1895. 8°.

Palache, Charles. The Soda-Rhyolite North of Berkeley. 1893. 8°.

— —, The Lherzolite-Serpentine and Associated Rocks of the Potrero, San Francisco. On a Rock from the Vicinity of Berkeley containing a New Soda Amphibole. 1894. 8°.

Fairbanks, W. Harold. On Analcite Diabase from San Luis Obispo Co., California 1895. 8°.

Conte, Joseph Le. Critical Periods in the History of the Earth. 1895. 8°.

Rivers, J. J. The Spécies of Amlbychila. 8°.

Hilgard, W. E. The Russian Thistle in california. 1895. 8°

— — Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 105 bis 109. 1894 und 1895. 8°.

Department of Mechanical Engineering. Bulletin No. II, No. III. 1887. 8°.

Berkeley, Library Bulletin No. 9. 1887. 8°.

On the Building Stones of California. Bulletin 1888. 8°.

**San Salvador**, Observatorio astronomico y meteorologico. Annales 1895. 4°.

Alberto Sanchez, La Cornoide 1895. 8°.

**St. Gallen**, naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Berichte. 1893/94. 1894/95. 8°.

**Santiago**, Deutscher naturwissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen, Band III. Heft 1—4. 1896. 8°.

**St. Petersburg**, Académie impériale des sciences.

Bulletin. V. Serie. Tom II. No. 3, 4, 5. Tom III. No. 1, 2, 3, 4, 4. Tom. IV. No. 1, 2, 3, 4, 5. Tom. V. No. 1, 2. Tom. VI. No. 1. 2. 1895—1897. 4°.



**St. Petersburg, Société de Naturalistes.**

Travaux, Section de Zoologie et de Physiologie. Vol. XXII

Livr. 1 und 2. XXVI. Livr. 1. 1895. 8°.

Section de Géologie et de Minéralogie.

Vol. XXI fasc. 2. Vol. XXII. XXIII. XXIV. 1891—1896.

Section de Botanique.

Vol. XXV. XXVI. 1895—1896. 8°.

Comptes rendus. No. 2. 1895. No. 1. 1896. 8°.

— —, Horae Societatis Entomologicae Rossicae.

Tom. XXIX. 1894—1895. Tom. XXX. 1895—1896. 8°.

— —, Direction des Kaiserlichen botanischen Gartens.

Tom. XIII. fasc. 2. 1894. Tom. XIV. fasc. 1. 1895. Tom. XV.

fasc. 1. 1896. 8°.

**Sion, Société Murithienne (Suisse).**

Bulletin des travaux XXI et XXII. 1882 et 1883.

**Stavanger, Museum.**

Aarsberetning for 1890—1895. 8°.

**Stockholm, Kongl. Svenska Ventescaps-Akademien.**

Handlingar. Band XXVI. 1894—1895.

Band XXVII. 1895—1896. Folio

Öfersicht, Förhandlingar.

Band LI, LII. 1894 und 1895. 8°.

Bihang. Band XX und XXI. 1895—1896.

Abtheilung I für Mathematik, Astronomie etc., II für Chemie,

Mineralogie etc., III für Botanik, IV für Zoologie.

— —, Sveriges offentliga Bibliotek. Stockholm, Upsala,

Lund, Göteborg.

Band 9. 1894. 8°.

Hjalmar, Théel. Om sveriges zoologiska Hafstation Kristineberg. 1895. 8°.

Meteorologiska Jakttagelser i Sverige.

Jahrgang 1891. 4°.

Lefnadstekningar. Band III Hälfte 1 1891. Hälfte 2 1894. 8°.

— —, Entomologiska Foreningen.

Entomologisk Tidskrift.

Band XVI und XVII. 1895—1896. 8°.

**Stuttgart**, Verein für vaterländische Naturkunde.

Jahreshefte, LI 1895. LII 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Württembergischer Verein für Handelsgeographie  
und Förderung deutscher Interessen im Aus-  
lande.

Jahresberichte, XIII und XIV. 1896. 8<sup>o</sup>.

Meteorologische Beobachtungen in Württemberg.

Meteorologische Jahrbücher: Jahrgang 1894. 4<sup>o</sup>.

**Tokio**, Kaiserlich-Japanische Universität.

Mittheilungen aus der medicinischen Facultät.

Band III. No. 2. 1895. 4<sup>o</sup>.

**Toronto**, Canadian Institute.

Transaction, Vol. IV. Part. 2. No. 8. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Topeka**, Kansas Academy of Science.

Check List of the Plants of Kansas.

Vol. XIV. 1893—1894. 8<sup>o</sup>.

**Toscana**, Società Toscana di scienze naturali.

Atti. Processi verbali, Vol. X. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Trencsén**, naturwissenschaftlicher Verein des Trencéner  
Comitates.

Jahreshefte, Jahrgang XVII—XVIII. 1894/95. 8<sup>o</sup>.

**Tromsø**, Museum.

Aarshefter, Tom. XVII. 1895. 8<sup>o</sup>.

Aarsberetning for 1893. 8<sup>o</sup>.

**Tufts** (Mass.), Tufts College.

Studies No. III 1894, No. IV 1895. 8<sup>o</sup>.

**Ulm**, Verein für Mathematik und Naturwissenschaften.

Jahreshefte, Jahrgang VII. 1895. 8<sup>o</sup>.

**Upsala**, Societas Regia scientiarum.

Nova acta. Serie Terticae. Vol. XV. fasc. II. 4<sup>o</sup>.

**Utrecht**, Provinzial-Utrecht'sche Gesellschaft für Kunst  
und Wissenschaften.

Verslag, Jahrgang 1887—1895. 8<sup>o</sup>.

Anteckeningen, Jahrgang 1892—1895. 8<sup>o</sup>.

— —, Physiologisch Laboratorium der Utrecht'sche  
Hoogeschool

Onderzoekingen. Vierde Reeks.

III. 2 Aflevering 1895. IV. 1 und 2 Aflevering 1896. 8<sup>o</sup>.

**Venezia,** »Notarisia« commentarium phycologicum.

Anno VIII—XI. 1892—1896. 8<sup>o</sup>.

**Verona,** Accademia d'agricoltura, arti et commercio  
ed arti.

Memorie, Vol. LXVII—LXXII. 1891—1896. 8<sup>o</sup>.

**Washington,** Smithsonian Institution.

Smithsonian contributions to Knowledge.

Langley, E. The internal Work of the Wind. (884.) 1893. 4<sup>o</sup>.

Morley, E. On the Densities of Oxygen and Hydrogen and  
on the Ratio of Their Atomic Weights. (980.) 1895. 4<sup>o</sup>.

Billings, S. F., Weir, S. and Bergey, H. D.

Hodgkins Fund. The Composition of Expired Air and its  
Effects Upon Animal Life. (989.) 1895. 4<sup>o</sup>.

Rayleigh, L. and Ramsay, W.

Hodgkins Fund. Argon, a new Constituent of the Atmosphere.  
(1033.) 1896. 4<sup>o</sup>.

Bergey, H. D. Methods for the Dermination of Organii  
Matter in Air. (1037.) 1896. 8<sup>o</sup>.

Scherbom, D. Charl. Index of the Genera and Species of  
the Foramifera. Part. II. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Smithsonian miscellaneous Collections.

Woodward, S. R. Geographical Tables. (854.) 1894. 8<sup>o</sup>.

Sergi, Guiseppe. The Varieties of the Human Species.  
(969.) 1894.

Seymour, P. K. Bibliographie of Aceto Arctic Ester and  
its Derivatives. (970.) 1894. 8<sup>o</sup>.

Magee, H. W. Indexes of the Literatures of Cerium and  
Lanthanum. (971.) 1895. 8<sup>o</sup>.

Langmuir, C. A. Index of the Literature of Didymium  
(972.) 1892—1893. 1894. 8<sup>o</sup>.

An Account of the Smithsonian Institution its Orgin. History,  
Objects and Achievements. 1895. 8<sup>o</sup>.

— —, Smithsonian Institution.

Annual Report. 1892 und 1893. 8<sup>o</sup>.

Report of the Secretary of Agriculture. 1893. 8<sup>o</sup>.

Report U. S. National Museum. 1893.

**Washington, United States National Museum.**

Bulletin No. 48.

Smith, B. J. Monograph of the Insects of the Lepidopterous Family Noctuedae of boreal N.-America. Revision of the deltoid Moths. 1895. 8<sup>o</sup>.

Proceedings, Vol. XVI. 1893. XVII. 1894.

Division of Ornithology and Mammalogy North American Fauna. No. 8—12. 1895—1896. 8<sup>o</sup>.

— —, United States Geological Survey. Departement of the Interior.

Bulletin, No. 118—134. 1894—1896. 8<sup>o</sup>.

Monographus, Vol. XXIII und XXIV. 1894. 4<sup>o</sup>.

— —, Bureaux of Ethnology.

Annual Report. 1889—1890. 1890—1891. 1891—1892. 4<sup>o</sup>.

Boas, Franz. Chinook, Texts. 1894. 8<sup>o</sup>.

Towke, Gerard. Archeologic Investigations in James and Potomac. Valleys. 1895.

Mooneey, James. The Siouan Tribes of the East. 1894.

Holmes, Henry William. An Ancient Curry in Indian Territory. 1894.

— —, United States Geological Survey.

(J. W. Powell, Director.)

Annual Report. Fourteenth 1892—1893.

Fifteenth 1893—1894. Sixteenth.

Charles D. Walcott 1894—1895. Part. I—IV.

**Wernigerode, naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.**

Schriften, Jahrgang X 1895, Jahrgang XI 1896. 8<sup>o</sup>.

**Wien, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.**

I. Abtheilung: Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete der Mineralogie, Botanik, Zoologie, Anatomie, Geologie und Palaeontologie.

Band CIII. Heft IV und V. VI und VII. VIII und IX. 1894. 8<sup>o</sup>.

Band CIV. Heft I und II. III und IV. V—VII. VIII. IX. X. 1895. 8<sup>o</sup>.

Iia. Abtheilung: Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete der Mathematik, Astronomie, Physik, Meteorologie und Mechanik.

**Wien**, Band CIII. Heft VI. VII. VIII. IX. X. 1895. 8°.

Band CIV. Heft I und II. III und IV. V und VI. VII.  
VIII. IX und X. 1895. 8°.

IIb. Abtheilung: Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete  
der Chemie.

Band CIII. Heft IV und V. VI und VII. VIII—X. 1894. 8°.

Band CIV. Heft I und II. III und IV. V—VII. VIII. IX  
und X. 1895. 8°.

III. Abtheilung: Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete  
der Physiologie, Anatomie und theoretischen Medicin.

Band CIII. Heft V—VII. VIII—X. 1894. 8°.

Band CIV. Heft I—V. VI und VII. VIII—X. 1895. 8°.

**Wien**, K. K. geologische Reichsanstalt.

Jahrbücher, Band XLIV. Heft 2, 3 und 4. 1894. 8°.

Band XLV. Heft 1, 2, 3, 4. 1895. 8°.

Band XLVI. Heft 1, 2. 1896. 8°.

Verhandlungen, Jahrgang 1895. No. 4—18. Jahrgang 1896.

No. 1—18. Jahrgang 1897. No. 1—5. 4°.

Abhandlungen, Band XVIII. Heft 1.

Bittner, A. Die Lamelibranchiaten der alpinen Trias. I. Theil  
Revision der Lamelibranchiaten von St. Casian. 1895. Folio.

— —, K. K. zoologisch-botanische Gesellschaft.

Verhandlungen, Band XLVI. Jahrgang 1896. 8°.

— —, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher  
Kenntnisse.

Schriften, Band XXXV. 1894/95. Band XXXVI. 1895/96. 8°.

— —, K. K. naturhistorisches Hof-Museum.

Annalen, Band X. 1895. Band XI. 1896. 8°.

— —, Oestreichischer Touristenclub, Section für Natur-  
kunde.

Mittheilungen, Jahrgang VII. 1895. Jahrgang VIII. 1896. 8°.

— —, Entomologischer Verein.

Jahresbericht, VI. 1895. 8°.

**Wiesbaden**, Verein für Nassauische Alterthumskunde und  
Geschichtsforschung.

Annalen, Band XXVII. 1895. 8°.

— —, Gewerbeverein für Nassau.

Mittheilungen, Jahrgang XLIX. 1895. Jahrgang L. 1896. 4°.



**Wiesbaden**, Nassauischer Verein für Naturkunde.

Jahrbücher, Jahrgang 48. 1895. Jahrgang 49. 1896. 8<sup>o</sup>.

— —, Verein nassauischer Land- und Forstwirthe.

Amtsblatt der Landwirthschafts-Kammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Zeitschrift. Jahrgang 79. 1897. 4<sup>o</sup>.

**Würzburg**, Physicalisch-medicinische Gesellschaft.

Sitzungsberichte, Jahrgang 1895 und 1896. 8<sup>o</sup>.

**Zürich**, naturforschende Gesellschaft.

Vierteljahrsschrift, Jahrgang XL. Heft 2, 3 und 4. 1895.

Jahrgang XLI. 1896. Supplement. 8<sup>o</sup>.

Festschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 1746 bis 1896. Den Theilnehmern der in Zürich vom 2. bis 5. August 1896 tagenden 79. Jahresversammlung gewidmet. 1. und 2. Theil. 1896. 8<sup>o</sup>.

**Zürich-Hottingen**, Societas Entomologica.

Organ für den internationalen Entomologen-Verein. Jahrgang XI. 1896. 4<sup>o</sup>.

**Zwickau**, Verein für Naturkunde.

Jahresbericht. 1894 und 1895. 8<sup>o</sup>.

---

## II. Zoologie.

---

**Archiv** für Naturgeschichte. Herausgegeben von Dr. F. Hilgendorf.

Jahrgang LVII. Band II. Heft 1. 1895.

» — » — » 3. 1894.

» LVIII. » II. » 3. 1895.

» LX. » II. » 2. 1894.

» LXI. » I. » 1. 1895.

» — » — » 2. —

Register vom 26. bis zum 60. Jahrgang. Berlin. 8<sup>o</sup>.

**Austaut, Léon Jules**, Les Parnassiens de la Faune Palearctique. Leipzig 1889. 8<sup>o</sup>.

- Burmeister, H.**, Description Physique de la Republique Argentine d'après des Observations personnelles et étrangères. Tom. cinquième Lepidoptères Text. Buenos-Ayres 1878. 8°.  
Atlas Planches I—XXIV.
- Boisduval, A. J.**, et **Leconte, Jon**, Histoire générale et Iconographie des Lepidoptères et des Chenilles de l'Amerique septentrionale. Paris 1829. 8°.
- Chenu**, Encyclopedie d'histoire naturelle.  
Vol. I. Papillons. Vol. II. Papillons Nocturnes. Paris. 4°.
- Dalman, J. W.**, Analecta Entomologicae mit 4 Tafeln.  
Ephemerides Entomologicae I. Holmiae 1823 und 1824. 8°.
- Druce, H.**, List of the Collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. Lowe in Borneo. Descriptions of new Species. (Plat. XXXII and XXXIII.) 1873. 8°.
- Eimer, Th. H. G.**, Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmetterlingen. Eine systematische Darstellung der Abänderungen, Abarten und Arten der Segelfalter ähnlichen Formen der Gattung Papilio. II. Theil. Text 8° und Atlas Folio. Jena 1895.
- Holland, W. F.**, Asiatic Lepidoptera of the Diurnal Lepidoptera taken by W. Doherty of Cincinnati 1887. (From the Proceedings of the Boston Society of Nat. Hist. Vol. XXV. 1890.)
- Hofmann, E.**, Isoporien der europäischen Tagfalter.  
Stuttgart 1873. 8°.
- Hampson, F. G.**, The Fauna of British India including Ceylon and Burma. Moths. Vol. IV. 8°.
- Homeyer, E. T. v.**, Deutschlands Säugethiere und Vögel, ihr Nutzen und Schaden. 1877. 8°. (Selbstverlag des Verfassers.)
- —, Die Spechte und ihr Werth in forstlicher Beziehung. Frankfurt 1879. 8°.
- —, Ornithologische Beobachtungen, grösstentheils im Sommer 1869 auf einer Reise im nordwestlichen Russland gesammelt von W. Mewes, ins Deutsche übertragen von Frau Mewes, geb. Lappe. Bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von E. T. v. Homeyer. Stockholm 1871. 8°.

- Homeyer E. T. v.**, Reise nach Helgoland, die Nordseeinseln Sylt, Lyst etc. Frankfurt a. M. 1880. 8<sup>o</sup>.
- —, Verzeichniss der ornithologischen Sammlungen ausgestopfter Vögel, Bälge, Eier und Nester. 1893. 8<sup>o</sup>.
- Indian Museum, Notes.**  
Vol. III. No. 4 und 5. 1895. Calcutta 8<sup>o</sup>.
- Insektenbörse**, Internationales Organ, Offertenblatt für Objekte der gesammten Naturwissenschaften.  
Jahrgang XII. XIII. XIV. 1895—1897. Leipzig. 4<sup>o</sup>.
- Linstow, O. v.**, Die Giftthiere und ihre Wirkung auf den Menschen. Berlin 1894. 8<sup>o</sup>.
- Leukart, R.**, und **Nitsche**, zoologische Wandtafeln.  
Taf. XVIII. XX. LXIV. Coelenterata.
- Lewin, J. W.**, Natural History of the Lepidopterous Insects of New South Wales. London 1822. 4<sup>o</sup>.
- Lorenz, Th.**, Verzeichniss zur Sammlung abnormer und hybrider Wildhühner. Riga 1895. 8<sup>o</sup>.
- Marschal, W.**, Atlas der Thierverbreitung mit 9 kolorirten Karten in Kupferstich mit 45 Darstellungen. Gotha 1887. Folio.
- Möbius, K.**, Die Thierwelt von Ost-Afrika.  
P. Matschik, Die Säugethiere.  
A. v. Reichenow, Die Vögel.  
G. Tournier, Die Reptilien und Amphibien.  
G. Pfeffer, Die Fische.  
H. Simroth, Die Nacktschnecken.  
H. Stadelmann, Die Hymenopteren.  
E. v. Martens, Die beschalteten Weichthiere.
- Engler, A.**, Die Pflanzenwelt.  
Grundzüge der Pflanzenverbreitung, Nutzpflanzen. Verzeichniss der bekannt gewordenen Pflanzen. Register. Berlin 1895. 4<sup>o</sup>.
- Möbius, K.**, Die Thiergebiete der Erde, ihre kartographische Abgrenzung und museologische Bezeichnung. Mit 1 Karte. Berlin 1891. 8<sup>o</sup>.  
(Sonderabdruck aus dem Archiv für Naturgeschichte. 1891. 3. Heft.)

- Niesen, v.**, Der Syphilisbacillus mit 4 lithographirten Tafeln.  
Wiesbaden 1896. 8°.
- Oppenheim, Paul**, Die Ahnen unserer Schmetterlinge in der  
Sekundär- und Tertiärperiode.  
(Berliner Entomologische Zeitschrift. Band LXXIX. 1885.  
Heft 2.) 1885. 8°.
- Packard, S.**, Niew of the Lepidopterous Fauna of Labrador.  
**Novitates Zoologicae.** Journal of Zoologie.  
Edited by the Hon Walter Rothschild, Ernst Hartert  
and K. Jordan. Vol. II. No. 3 und 4. 1895. Vol. III.  
No. 1—4. 1896. Vol. IV. No. 1. London 1897. 8°.
- Petersen, W.**, Die Lepidopteren-Fauna des arktischen Ge-  
bietes von Europa und die Eiszeit. St. Petersburg. 8°.
- Radde, G.**, Orn. caucasica.  
(Sonderabdruck aus No. 2 der Mittheilungen des mitteldeutschen  
Ornithologen-Vereins.) Wien 1885. 8°.
- Smith Grosse, H.**, and **Kirby, F. W.**, Rhopalocera Exotica being  
Illustrations of Newe, Rare and Unfigured Species  
of Butterflies. Vol. II. Part 33—39. 1895—1897. 4°.
- Standfuss, M.**, Handbuch der palarktischen Gross-Schmetter-  
linge für Forscher und Sammler.  
2. umgearbeitete und durch Studien zur Descendenztheorie er-  
weiterte Auflage. Jena 1896. 8°.
- Trybom, F.**, Tagfjarilar insamlade of Svenska Expedition  
till Jenisee. 1870. 8°.
- Wagner, M.**, Die Darwin'sche Theorie und das Migrations-  
gesetz der Organismen. Leipzig 1868. 8°.
- —, Ueber die Darwin'sche Theorie in Bezug auf die  
geographische Verbreitung der Organismen.  
(Separatabdruck aus den Sitzungsberichten der K. B. Academie  
der Wissenschaften. 1868. 1. Heft.)
- Westberg, G.**, Einiges über Bisone und die Verbreitung des  
Wisent im Kaukasus. Riga 1895. 8°.
- Westwood, O. J.**, Observation on the Uranidae.  
(From the Transactions of the Zoological Society.) Vol. X.  
Part. XII. 1879. 4°.

- Wollaston, V.**, Notes on the Lepidoptera of S. Helena. Description of nives Species. London 1879. 8<sup>o</sup>.
- Zacharias, O.**, Forschungsberichte aus der biologischen Station zu Plön. Theil 4. Berlin 1896. 8<sup>o</sup>.
- Zeitschrift** für wissenschaftliche Zoologie. Herausgegeben von Albert v. Kölliker und E. Ehlers.  
Band LIX. Heft 2, 3, 4. 1895. Band LX. LXI. LXII.  
Heft 1, 2, 3, 4. 1896—1897. Leipzig. 8<sup>o</sup>.
- Zeitschrift**, Entomologische. Centralorgan des Internationalen Entomologischen Vereins.  
Jahrgang IX—X. 1895—1896. Guben. 4<sup>o</sup>.
- Zoologisches Centralblatt**. Herausgegeben von Dr. A. Schuberg.  
Jahrgang 1896, 1897. Leipzig. 8<sup>o</sup>.
- 

### III. Botanik.

---

- Borggreve, B.**, Waldschäden im Oberschlesischen Industriebezirk, nach ihrer Entstehung durch Hüttenrauch, Insektenfrass etc.  
Eine Rechtfertigung der Industrie gegen folgenschwere falsche Anschuldigungen. Mit 25 Licht- und Farbendrucktafeln nach der Natur. Frankfurt a. Main 1895. 4<sup>o</sup>.
- Drude, O.**, Handbuch der Pflanzengeographie mit 4 Karten.  
Stuttgart 1890. 8<sup>o</sup>.
- Geisenheyner, L.**, Eine eigenartige Monstrosität von Polypodium vulgare L. mit Holzschnitt.  
(Sonderabdruck aus den Berichten der deutschen botanischen Gesellschaft.) Jahrgang 1896. Band XIV. Breslau 1896. 8<sup>o</sup>.
- Vilmorin**, Blumengärtnerei, Beschreibung, Kultur und Verwendung des gesammten Pflanzenmaterials für deutsche Gärten.  
Dritte neubearbeitete Auflage mit 1000 Holzschnitten im Text und 400 bunten Blumenbildern auf 100 Farbendrucktafeln.  
Berlin 1894—1895. Lieferung 1—46. Berlin 1896. 4<sup>o</sup>.
-



#### IV. Mineralogie, Geologie und Paläontologie.

---

- Bauer, M.**, Edelsteinkunde. Eine allgemein verständliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben für Mineralogen, Steinschleifer, Juweliere etc. Mit 20 Tafeln. Leipzig 1896. 4<sup>o</sup>.
- Kayser, E.**, Die Fauna des Dalmanitensandsteins von Kleinsindeln bei Giessen. Mit 5 Lichtdrucktafeln. Marburg 1896. 8<sup>o</sup>.
- Kunze, Otto**, Geognostische Beiträge mit 7 Textbildern und 2 Profilen. Leipzig 1895. 8<sup>o</sup>.
- Maurer, F.**, Palaeontologische Studien im Gebiete des rheinischen Devon: 10 Nachträge zur Fauna und Stratiographie der Orthocerasschiefer des Rubachthales. Mit Tafel XV—XVIII.  
Separatabdruck aus dem neuen Jahrbuch für Mineralogie und Palaeontologie. Band X. Stuttgart 1896. 8<sup>o</sup>.
- Sandberger, F. v.**, Die Bohrung auf dem Giesshügel bei Gerbrunn.  
(Separatabdruck aus den Sitzungsberichten der Physikalisch-Medicinischen Gesellschaft in Würzburg.) 1895. 8<sup>o</sup>.
- Reichenau, v. W.**, Der Alpensteinbock (*Capra ibex* L), ein Bewohner des Rheingauens während der Glacialperiode. (Separat-Abdruck aus dem neuen Jahrbuch für Mineralogie etc.) 1896. Bd. I.
- Römer, Aug.**, Ueber ein neues Vorkommen des Riesenhirsches (*Megaceros giganteus* Ow) zu Schierstein im Rheingau. (Separat-Abdruck aus dem neuen Jahrbuch für Mineralogie etc.) 1896. Bd. II.
-

## V. Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie und Meteorologie.

---

**Römer, Aug.**, Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden in den Jahren 1895 und 1896.

— —, Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden in den Jahren 1870—1895 incl.

(Sonderabdrücke aus den Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrgang 49, 1896 und Jahrgang 50, 1897.)

---

## VI. Vermischte Schriften.

---

**Balawelder, A.**, Abstammung des Allseins. Wien 1894. 8°.

**Christ, H.**, Notice biographique sur Alph. de Candolle Genève 1893. 8°.

**Lorenz, P.**, Die Ergebnisse der sanitärischen Untersuchungen der Rekruten des Kantons Graubünden in den Jahren 1875—1879. Mit 4 Karten. Bern 1893. 4°.

**Dana, Charles**, Journal der Medicin und Heilkunde. Vol. XI. No. 7. New-York 1896. 8°.

---

---



# VERZEICHNISS

DER

ACADEMIEN, STAATSSTELLEN, GESELLSCHAFTEN,  
INSTITUTEN etc.

MIT WELCHEN DER

NASSAUISCHE VEREIN FÜR NATURKUNDE GEGEN SEINE  
JAHRBÜCHER IM TAUSCHVERKEHR STEHT.

---

AUFGESTELLT IM MAI 1897.

---

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations

2. The second part of the paper is devoted to a detailed analysis of the case of a linear system of equations

3. The third part of the paper is devoted to a detailed analysis of the case of a nonlinear system of equations

4. The fourth part of the paper is devoted to a detailed analysis of the case of a nonlinear system of equations



# Verzeichniss

der

Academien, Staatsstellen, Gesellschaften, Institute etc., deren Druckschriften der Nassauische Verein für Naturkunde gegen seine Jahrbücher im Austausch erhält. \*)

(Aufgestellt im Mai 1897.)

Ein vorgesetztes \* bezeichnet neue Tauschverbindungen.

1. **Aarau**, naturforschende Gesellschaft.
2. **Agram**, Kroatischer Naturforscher-Verein.
3. **Altenburg**, naturforschende Gesellschaft.
4. **Amiens**, Société Linnéenne du Nord de la France.
5. **Amsterdam**, Koninklijke Academie van Wetenschappen.
6. — —, Koninklijke Zoölogisch Genootschap »Natura Artis Magistra«.
7. — —, Vereeniging voor Volksvlijt.
8. **Annaberg**, **Buchholz**, Verein für Naturkunde.
9. **Augsburg**, naturhistorischer Verein.
10. **Baden** (bei Wien), Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse.
11. **Baltimore**, Johns Hopkins University.
12. **Bamberg**, naturforschende Gesellschaft.
13. — —, Gewerbeverein.
14. **Basel**, naturforschende Gesellschaft.
15. **Batavia**, Koninklijke naturkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië.
16. **Berlin**, botanischer Verein für die Provinz Brandenburg.
17. — —, Deutsche geologische Gesellschaft.

---

\*) Zum Schriftentausch gegen unsere Jahrbücher sind wir gerne bereit und bedarf es hierzu nur einer schriftlichen Anzeige.

18. **Berlin**, Entomologischer Verein.
19. — —, K. Pr. Landes-Oeconomie-Collegium.
20. — —, K. Observatorien für Astrophysik, Meteorologie und Geodäsie bei Potsdam.
21. — —, K. Pr. geologische Landesanstalt und Berg-academie.
22. — —, balneologische Gesellschaft.
23. — —, Märkisches Provinzial-Museum.
24. — —, Central-Kommission für wissenschaftliche Landeskunde in Deutschland.
25. **Bern**, allgemeine schweizerische naturforschende Gesellschaft.
26. — —, naturforschende Gesellschaft.
27. — —, schweizerische entomologische Gesellschaft.
28. **Bistritz**, Gewerbeschule.
29. **Bologna**, Accademia delle Scienze delle Istituto.
30. **Bonn**, naturhistorischer Verein für die preussischen Rheinlande und Westphalen.
31. — —, landwirthschaftlicher Verein für Rheinpreussen.
32. — —, Königl. Universitäts-Bibliothek.
33. **Bordeaux**, Société Linnéenne.
34. **Boston**, Society of Natural History.
35. — —, American Academy of Arts and Sciences.
36. **Braunschweig**, Verein für Naturwissenschaften.
37. — —, Herzoglich naturhistorisches Museum.
38. **Bregenz**, Voralberger Museums-Verein.
39. **Bremen**, landwirthschaftlicher Verein.
40. — —, naturwissenschaftlicher Verein.
41. **Breslau**, schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.
42. — —, Verein für schlesische Insektenkunde.
43. — —, Königl. Universitäts-Bibliothek.
44. **Brünn**, Kaiserl. Königl. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.
45. — —, naturforschender Verein.
46. — —, mährisches Gewerbe-Museum.

- \*47. **Brünn**, Museum Franciscum.
- 48. **Brüssel**, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique.
- 49. — —, Société entomologique de Belgique.
- 50. — —, Société royale de botanique de Belgique.
- 51. — —, Société malacologique de Belgique.
- 52. **Bucarest**, Institut météorologique de Roumanie.
- 53. **Budapest**, Königliche ungarische geologische Gesellschaft.
- 54. — —, Königlich ungarischer naturwissenschaftlicher Verein.
- 55. **Buenos-Aires**, Revista Argentina de Historia Natural.
- 56. **Cambridge**, Mass., Museum of Comparative Zoologie.
- 57. — —, (England), Philosophical Society.
- 58. **Carlsruhe**, naturwissenschaftlicher Verein.
- 59. **Cassel**, Verein für Naturkunde.
- 60. **Catania**, Accademia Gioenia di scienze naturali.
- 61. **Chemnitz**, naturwissenschaftliche Gesellschaft.
- 62. **Cherbourg**, Société nationale des sciences naturelles.
- 63. **Christiania**, Kong. Norske Universitet.
- 64. — —, N. Nordhavs-Expedition.
- 65. **Chur**, naturforschende Gesellschaft Graubündens.
- 66. **Clausthal**, naturwissenschaftlicher Verein »Maja«.
- 67. **Colmar**, Société d'histoire naturelle.
- 68. **Córdoba**, Academia nacional de ciencias de la República Argentina.
- \*69. **Cincinnati**, Museum Association.
- \*70. **Colorado**, College.
- \*71. **Crefeld**, naturwissenschaftliches Sammelwesen.
- 72. **Danzig**, naturforschende Gesellschaft.
- 73. **Darmstadt**, Verein für Erdkunde und mittelhessischer geologischer Verein.
- 74. — —, Grossherzoglich Hessische geologische Landesanstalt.
- 75. **Davenport**, Iowa, Academy of Natural Sciences.
- 76. **Dessau**, naturhistorischer Verein für Anhalt.
- 77. **Dijon**, Académie des sciences, arts et belles-lettres.

78. **Donaueschingen**, Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und der angrenzenden Landestheile.
79. **Dorpat**, Naturforscher-Gesellschaft.
80. **Dresden**, Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
81. — —, naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«.
82. — —, entomologischer Verein »Iris«.
83. **Dürkheim a. H.**, naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz »Pollichia«.
- \*84. **Düsseldorf**, naturwissenschaftlicher Verein.
85. **Ebersbach**, Humboldt-Verein.
86. **Elberfeld**, naturwissenschaftlicher Verein.
87. **Emden**, naturforschende Gesellschaft.
88. **Erfurt**, Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften.
89. **Erlangen**, physikalisch-medicinische Societät.
90. **Florenz**, Società entomologica Italiana.
91. **Frankfurt a. M.**, Senkenbergische naturforschende Gesellschaft.
92. — —, physikalischer Verein.
93. **Frankfurt a. d. O.**, naturwissenschaftlicher Verein des Regierungsbezirks Frankfurt.
94. **Frauenfeld**, Thurgauische naturforschende Gesellschaft.
95. **Freiburg i. B.**, Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften.
96. **Fulda**, Verein für Naturkunde.
97. **Geisenheim**, Königliche Lehranstalt für Obst- und Weinbau.
98. **Gera**, Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.
99. **Giessen**, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
100. **Görlitz**, oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
101. — —, naturforschende Gesellschaft.
102. **Görz**, Società agraria.
103. **Göttingen**, Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.

104. **Gothenburg**, Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.
105. **Graz**, naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
106. — —, Verein der Aerzte in Steiermark.
107. **Greifswald**, naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen.
108. — —, Königliche Universitäts-Bibliothek.
109. **Halifax**, Nova Scotian Institute of natural science.
110. **Halle a. d. S.**, naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.
111. — —, landwirthschaftlicher Verein der Provinz Sachsen.
112. — —, Verein für Erdkunde.
113. — —, Kaiserliche Leopoldinische-Carolinische Deutsche Academie der Naturforscher.
114. — —, Königliche Universitäts-Bibliothek.
115. **Hamburg**, naturwissenschaftlicher Verein.
116. — —, Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung.
117. — —, naturhistorisches Museum.
118. **Hanau**, wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde.
119. **Hannover**, naturhistorische Gesellschaft
120. — —, Gesellschaft für Microscopie.
121. **Harlem**, Société hollandaise des sciences exactes et naturelles.
122. — —, Teyler Genootschap.
123. **Heidelberg**, naturhistorisch-medicinischer Verein.
124. **Helsingfors**, Societas Scientarium Fennica.
- \* 125. — —, Commission Geologique de la Finland.
126. **Hermannstadt**, siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.
127. **Jassy**, Société des Médecins et Naturalistes.
128. **Jena**, medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft.
129. **Innsbruck**, Ferdinandeum für Tyrol und Voralberg.
130. — —, naturwissenschaftlich-medicinischer Verein.
131. **Jowa-City**, Laboratory of Physical Science.



- \*132. **Kasan**, Observatoire magnétique.
- 133. **Kharkow**, Société des Sciences expérimentales, annexée à l'Université imp. de Charkow.
- 134. **Kiel**, naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.
- 135. **Kiew**, Société des naturalistes.
- 136. **Klagenfurt**, naturhistorisches Landesmuseum für Kärnthen.
- 137. **Klausenburg**, Siebenbürgischer Museumsverein.
- 138. **Königsberg**, Königliche physikalisch-öconomische Gesellschaft.
- 139. — —, Königl. Universitäts-Bibliothek.
- 140. **Kopenhagen**, Königl. Danske Videnskabernes Selskab.
- 141. — —, naturhistoriske Forening.
- 142. **Krackau**, K. K. Academie der Wissenschaften.
- 143. **Laibach**, Krainischer Museumsverein.
- 144. **Landshut**, botanischer Verein.
- 145. **La Plata**, Direction générale de statistique.
- 146. **Lausanne**, Société vaudoise des sciences naturelles.
- \*147. **Leiden**, Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappi der Nederlandsche Letterkunde.
- 148. **Leipzig**, Königlich sächsische Gesellschaft der Wissenschaften; mathematisch-physikalischen Klasse.
- 149. — —, naturforschende Gesellschaft.
- 150. — —, Museum für Völkerkunde.
- 151. — —, Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft der Wissenschaften.
- 152. — —, Verein für Erdkunde.
- 153. **Leutschau**, Ungarischer Karpathen-Verein.
- 154. **Liège**, Société royale des sciences.
- 155. — —, Société géologique de Belgique.
- \*156. **Lincoln** (Nebr.), University of Nebraska.
- 157. **Linz**, Museum Francisco-Carolinum.
- 158. — —, Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Ens.
- 159. **London**, Geological Society.
- 160. — —, Linnean Society.

161. — —, Entomological Society.
162. **Lund**, Acta Universitatis Lundensis.
163. **Lübeck**, Vorsteherschaft der Naturalien-Sammlung.
164. **Lüneburg**, naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstenthum Lüneburg.
165. **Luxemburg**, Institut Royal Grand-Ducal, section des sciences naturelles et mathématiques.
166. — —, Société de botanique du Grand-Duché de Luxembourg.
167. — —, »Fauna«, Verein Luxemburger Naturfreunde.
168. — —, Observations Météorologiques à Luxembourg.
169. **Lyon**, Société d'agriculture d'histoire naturelle et des arts utiles.
170. **Madison**, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Lettres.
171. **Magdeburg**, naturwissenschaftlicher Verein.
172. **Mailand**, R. Istituto Lombardo di scienze et lettere.
173. — —, Societa Italiana di scienze naturali.
174. **Mainz**, Rheinisch naturforschende Gesellschaft.
175. **Manchester**, Literary and philosophical Society.
176. **Mannheim**, Verein für Naturkunde.
177. **Marburg**, Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften.
178. **Meriden**, Conn., Scientific Association.
- \*179. **Mexico**, Congreso Americanita.
- \*180. — —, Observatori météorologico central.
181. **Minneapolis**, Minn. U. S. A., Minnesota Academy of Natural Sciences.
182. **Modena**, Societa dei naturalisti.
183. **Montpellier**, Academié des sciences et lettres.
184. **Moskau**, Société Impériale des Naturalistes.
185. **München**, Königl. bayerische Academie der Wissenschaften.
186. — —, Gesellschaft für Morphologie und Physiologie.
187. — —, Central-Commission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland.

188. **Münster**, westphälischer Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst.
189. **Nancy**, Société des sciences.
190. **Neisse**, Philomathie.
191. **Neubrandenburg**, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
192. **Neuchâtel**, Société des sciences naturelles.
193. — —, Société Murithienne du Valais.
194. **New-Haven**, American Journal of Science and Arts.
195. — —, Connecticut Academy of Arts and Sciences.
196. **New-York**, Lyceum of Natural History.
197. — —, American Museum of Natural History.
198. — —, Academy of Sciences.
199. — —, Academy of Medicine.
200. — —, Microscopical Society.
201. — —, American Geographical Society.
202. **Nürnberg**, naturhistorische Gesellschaft.
203. — —, germanisches Nationalmuseum.
204. **Odessa**, Neurussische naturforschende Gesellschaft.
205. **Offenbach**, Verein für Naturkunde.
206. **Osnabrück**, naturwissenschaftlicher Verein.
207. **Padova**, Società veneto-trentina di scienze naturali.
208. — —, R. Istituto Botanico.
209. **Palermo**, Società di acclimazione di agricoltura in Sicilia.
210. — —, R. Academia di scienze et lettere et belle arti.
211. **Paris**, Société zoologique de France.
212. — —, Feuilles des jeunes naturalistes.
213. — —, Muséum d'histoire naturelle.
214. **Passau**, naturhistorischer Verein.
215. **Perugia**, Accademia Medico-Chirurgica.
216. **Philadelphia**, Academie of Natural Sciences.
217. — —, American Philosophical Society.
218. — —, American Medical-Association.
219. — —, Wagner Free Institute of Sciences.
220. **Pisa**, Società Toscana di scienze naturali.
221. **Porto**, Sciencias Naturaes Annaes.

222. **Posen**, naturwissenschaftlicher Verein, botanische Abtheilung.
223. **Prag**, Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.
224. — —, naturhistorischer Verein »Lotos«.
225. — —, Verein böhmischer Forstwirthe.
226. — —, Rede- und Lesehalle deutscher Studenten.
227. — —, Deutscher naturwissenschaftlich-medicinischer Verein für Böhmen.
228. **Pressburg**, Verein für Naturkunde.
229. **Raleigh**, N. C., Elisha Mitchell scientific Society.
230. **Regensburg**, Königlich bayerische botanische Gesellschaft.
231. — —, naturwissenschaftlicher Verein.
232. **Reichenbach** (Sachsen), voigtländischer Verein für allgemeine und specielle Naturkunde.
233. **Reichenberg** (Böhmen), Verein für Naturkunde.
234. **Riga**, naturforschender Verein.
235. **Rio de Janeiro**, Musée nacional.
236. **Rochester**, Academy of Science.
237. **Rom**, R. Accademia dei Lincei.
238. — —, R. Comitato geologico d'Italia.
239. **Rotterdam**, Société Batave de Philosophie expérimentale.
240. — —, Bataafsche Genootschap.
- \*241. **Sacramento**, Universitat of California College of agriculture.
- \*242. **Berkeley**, Universitat of California College, Department of Geologi.
243. **Salem**, Mass., Essex Institute.
244. — —, Peabody Academy of Science.
245. **San Francisco**, California Academy of Natural Sciences.
246. **San José**, Museo nacional.
- \*247. **San Salvador**, Observatorio Astronomico y Meteorologico.
248. **Santiago**, de Chile, deutscher wissenschaftlicher Verein.

249. **S'Gravenhage**, Koninklyk Institut voor de Taal-Landen en Volkenkunde van Nederlandsch Indië.
250. — —, Nederlandsche entomologische Vereenigung.
251. **St. Gallen**, naturwissenschaftliche Gesellschaft.
252. **St. Louis**, Miss., Academie of sciences.
253. — —, Missouri Botanical Garden.
254. **St. Petersburg**, Kaiserliche Academie der Wissenschaften.
255. — —, Direction des Kaiserl. botanischen Gartens.
256. — —, Kaiserl. russische entomologische Gesellschaft.
257. — —, Société géographique Impérial de Russie.
258. — —, Société des naturalistes.
- \*259. — —, **Sion**, Société murithienne (Suisse).
260. **Sondershausen**, Verein zur Beförderung der Landwirthschaft.
261. — —, Irmischia, Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen.
- \*262. **Stavanger**, Museum.
263. **Stettin**, entomologischer Verein.
264. — —, Verein für Erdkunde.
265. **Stockholm**, Kongl. Swenska Vetenscaps-Academie.
- \*266. — —, Entomologiska Föreningen, Entomologisk Tidskrift.
267. **Stuttgart**, Verein für vaterländische Naturkunde.
268. — —, K. statistisches Landesamt.
269. — —, Württembergischer Verein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.
270. **Schweinfurt**, naturwissenschaftlicher Verein.
271. **Topeka**, Kansas, U. S. A., Kansas Academy of Science.
272. **Toronto**, Canadian Institute.
273. **Toscana**, Società Toscana di scienze naturali.
274. **Trenton**, New-Jersey, U. S. A., Natural History Society.
275. **Trier**, Gesellschaft für nützliche Forschungen.
276. **Triest**, Società Adriatica di Scienze naturali.
277. **Tromsö**, Museum.
278. **Tübingen**, Königl. Universitäts-Bibliothek.



- \*279. **Tuft** (Mass.), Tufts College.
- \*280. **Trentschin**, Naturwissenschaftlicher Verein des Trentschiner Comitates.
- 281. **Ulm**, Verein für Mathematik und Naturwissenschaften.
- 282. **Upsala**, Regiae Societatis Scientarium.
- 283. **Utrecht**, Provinzial-Utrecht'sche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft.
- 284. — —, Physiologisches Laboratorium der Utrecht'sche Hoogeschool.
- 285. **Venezia**, Notarisia Commentarium Phycologicum.
- 286. **Verona**, Academia d'agricoltura di commercio ed arti.
- 287. **Washington**, Smithsonian Institution.
- 288. — —, Quarterly report of de chief of the bureau of statistics.
- 289. — —, United States geological and geographical survey of the Territories.
- 290. — —, United States Departement of agriculture. Division of Ornithology and Mammalogy.
- 291. — —, United States National Museum.
- 292. — —, Bureau of Ethnology.
- 293. **Wernigerode**, naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.
- 294. **Wien**, Kaiserliche Academie der Wissenschaften.
- 295. — —, Prähistorische Commission.
- 296. — —, K. K. geologische Reichsanstalt.
- 297. — —, K. K. geographische Gesellschaft.
- 298. — —, K. K. zoologisch-botanische Gesellschaft.
- 299. — —, K. K. naturhistorisches Hof-Museum.
- 300. — —, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.
- 301. — —, Oesterreichischer Touristen-Club. Section für Naturkunde.
- 302. — —, Entomologischer Verein.
- 303. **Wiesbaden**, Verein für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung.
- 304. — —, Gewerbeverein.

305. — —, Amtsblatt der Landwirthschafts-Kammer  
für den Regierungsbezirk Wiesbaden und  
Zeitschrift des Vereins nassauischer Land- und  
Forstwirthe.
306. — —, Königliche öffentliche Bibliothek.
307. **Wisconsin**, Natural History Society.
308. — —, Public Museum of the City of Milwaukee.
309. **Würzburg**, Physikalisch-medicinische Gesellschaft.
310. — —, Unterfränkischer Kreisfischerei-Verein.
311. **Zürich**, naturforschende Gesellschaft.
312. — —, **Hottingen**, Societas entomologica.
313. **Zwickau**, Verein für Naturkunde.
-






## II.

# Abhandlungen.

---





CHEMISCHE UNTERSUCHUNG  
DER  
ADLER - QUELLE  
ZU  
WIESBADEN

UND  
VERGLEICHUNG DER RESULTATE MIT DER ANALYSE DES  
WIESBADENER KOCHBRUNNENS

VON  
DR. C. REMIGIUS FRESENIUS,  
GEHEIMEM HOFRATHE UND PROFESSOR, DIRECTOR DES CHEMISCHEN LABORATORIUMS  
ZU WIESBADEN

UND  
DR. HEINRICH FRESENIUS,  
PROFESSOR, VORSTAND DER AGRICULTUR-CHEMISCHEN VERSUCHSSTATION, SOWIE  
DOCENT UND STELLVERTRETENDER DIRECTOR DES CHEMISCHEN LABORATORIUMS  
ZU WIESBADEN.



Die Adlerquelle entspringt im Garten des Hôtels und Badhauses »Zum Adler« in Wiesbaden und ist Privateigenthum von

1. Hôtel und Badhaus »Zum Adler« (Besitzer Wolfgang Büdingen) zu  $\frac{3}{5}$ . (Der frühere Antheil des eingegangenen Badhauses »Zum Schwarzen Bären« ist im Jahre 1890 von Herrn Büdingen angekauft worden.)
2. Badhaus »Zum Goldenen Brunnen« (Besitzer Simon Ullmann) zu  $\frac{1}{5}$ ,
3. Hôtel und Badhaus »Zur Goldenen Krone« (Besitzer Georg Herber) zu  $\frac{1}{5}$ .

Die Fassung\*) der Adlerquelle besteht, wie auch bei dem Kochbrunnen, aus einer einfachen Umfassungsmauer, innerhalb welcher die Quellen dem Boden entspringen. Die Wasseroberfläche liegt 119,03 *m* über Amsterdamer Pegel, die Sohle liegt ca. 1,50 *m* tiefer und ist, wie auch in dem Kochbrunnen, ziemlich unregelmässig gestaltet. Die ganze Wassermenge beträgt 147,5 *l* per Minute. Die Theilung des Quellergebnisses wird, wie bei dem Kochbrunnen, durch gleich grosse und in gleicher Höhe befindliche Ausläufe bewirkt. Die betreffenden Thermalwasserantheile werden den unmittelbar neben der Quelle gelegenen theilhaftigen Badehäusern direct zugeführt.

Im Auftrage der Eigenthümer haben wir eine genaue chemische Analyse des Mineralwassers der Adlerquelle zu Wiesbaden ausgeführt und theilen die Ergebnisse im Nachstehenden mit. Die Entnahme des für die Analyse erforderlichen Thermalwassers aus der Adlerquelle be-

---

\*) Die Angaben über die Fassung der Adlerquelle und die von derselben gelieferte Wassermenge entnehmen wir der Schrift des Stadtbaudirectors, Bau-rathes Ernst Winter, „Die Thermalquellen Wiesbadens in technischer Beziehung, München, Theodor Ackermann 1880“.

werkstelligte Professor Dr. Heinrich Fresenius am 13. Juni 1896. Derselbe führte am genannten Tage auch die sonst noch an der Quelle selbst vorzunehmenden Arbeiten und Beobachtungen persönlich aus.

## A. Physikalische Verhältnisse.

Das Mineralwasser der Adlerquelle erscheint, gerade wie das Wasser des Kochbrunnens, in einem Trinkglase fast eben so durchsichtig und farblos wie gewöhnliches Wasser. Betrachtet man es aber in grossen weissen Glasflaschen, die unter dem Wasserspiegel gefüllt sind, so erkennt man, dass es nicht absolut klar ist; doch ist man nicht immer im Stande einen bestimmten Niederschlag als Ursache der Trübung zu unterscheiden, nur bisweilen erkennt man einzelne Flöckchen. Betrachtet man das Wasser im Quellenbecken, so überzeugt man sich ebenfalls leicht, dass es nicht so durchsichtig ist wie reines Wasser, auch erscheint es alsdann gelblich, zumal da das Quellenbecken durchweg mit röthlichem Ocker überzogen ist.

Aus der Adlerquelle steigen fortwährend zahlreiche Gasblasen auf, sodass es aussieht, als ob das Wasser der Quelle koche.

Die Temperatur der Adlerquelle wurde am 13. Juni 1896 in einer Tiefe von 1,10 *m* unter dem Quellenspiegel zu 64,4° C. ermittelt bei einer Lufttemperatur von 16,88° C. und einem Barometerstand von 754 *mm*. E. Winter gibt in seiner Schrift »Die Thermalquellen Wiesbadens« Seite 27 die Temperatur der Adlerquelle zu 64,6° C. an.

Lässt man das Mineralwasser der Adlerquelle in ganz gefüllten, fest verschlossenen Flaschen längere Zeit stehen, so setzt sich ein geringer, röthlich braungelber Niederschlag ab. Lässt man es in offenen Gefässen, z. B. in Badewannen, stehen, so scheiden sich, indem die freie Kohlensäure des Wassers allmählich durch die Luft verdrängt und ausgetrieben wird, die nur durch Vermittlung der freien Kohlensäure gelösten Bestandtheile nach und nach in Form einer Haut (Badehaut) auf der Oberfläche ab.

Der Geschmack des Thermalwassers der Adlerquelle ist, ebenso wie der des Kochbrunnenwassers, dem einer gleich warmen, verdünnten Kochsalzlösung sehr ähnlich. Der Geruch des Wassers ist sehr gering. Schüttelt man es in einer grossen, etwa 6 Liter haltenden, halb gefüllten Flasche, so ist ein schwacher Geruch nach Schwefelwasserstoff zu erkennen.



Die Bestimmung des specifischen Gewichtes des Thermalwassers der Adlerquelle wurde nach der von R. Fresenius angegebenen Methode\*) ausgeführt. Die betreffenden Flaschen wurden direct in dem Quellenbecken gefüllt. Es wurde gefunden:

1. bei 19° C. . . . .	1,006362
2. bei 19° C. . . . .	1,006158
Mittel . . . . .	1,006260.

## B. Chemische Analyse des Thermalwassers der Adlerquelle.

Die quantitative Analyse wurde im allgemeinen nach den in R. Fresenius, Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse, 6. Auflage, § 206—213 angegebenen Methoden ausgeführt, und zwar in allen wesentlichen Theilen doppelt.

Nachstehend sind mitgetheilt

- unter I. die Originalzahlen,
- « II. die Berechnung der Analyse,
- « III. die Controle der Analyse und
- « IV. die Zusammenstellung der Resultate.

### I. Originalzahlen in Grammen.

#### 1. Bestimmung des Chlors.

a) 100,670 g Wasser lieferten 1,9002 g Chlor-, Brom- und Jodsilber, entsprechend . . . . .	18,875534 p. M.
b) 100,700 g Wasser lieferten 1,9012 g Chlor-, Brom- und Jodsilber, entsprechend . . . . .	18,879841 « «
Mittel . . . . .	18,877688 p. M.

Zieht man hiervon ab das dem Brom und Jod entsprechende Brom- und Jodsilber, nämlich:

für Brom Bromsilber nach 2 b . . . . .	0,008972 p. M.
für Jod Jodsilber nach 2 a . . . . .	0,000059 « «

Summe . . . . .	0,009031 « «
so bleibt Chlorsilber . . . . .	18,868657 p. M.
entsprechend Chlor . . . . .	4,666173 « «

---

\*) Zeitschrift für analytische Chemie 1, 178 und Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse, 6. Auflage, Bd. 2, Seite 202.

## 2. Bestimmung des Broms und Jods:

a) 57500 g Wasser lieferten so viel freies, in Schwefelkohlenstoff gelöstes Jod, dass zu dessen Ueberführung in Jodnatrium 3 cc einer Lösung von unterschwefligsaurem Natron erforderlich waren, von welcher 2,28 cc 1,404 mg Jod entsprachen. Hieraus berechnet sich ein Gehalt an Jod von 0,001848 g, entsprechend 0,000032 p. M.  
entsprechend Jodsilber 0,000059 « «

b) Die vom Jod getrennte Lösung gab, mit Silberlösung gefällt, 2,1858 g Chlor-Bromsilber.

α) 0,9554 g desselben ergaben im Chlorstromes geschmolzen eine Gewichtsabnahme von 0,0534 g. Die Gesamtmenge des Chlor-Bromsilbers hätte somit abgenommen um . . . . . 0,122170 g

β) 1,0000 g Chlor-Bromsilber nahmen ab um 0,0559 g, demnach die Gesamtmenge um . . . . . 0,122186 g

Abnahme des Chlor-Bromsilbers im Mittel 0,122178 g

Hieraus berechnet sich der Bromgehalt der 57500 g Wasser zu 0,219558 g Brom oder . . . . . 0,003818 p. M.  
entsprechend Bromsilber 0,008972 « «

## 3. Bestimmung der Schwefelsäure.

a) 503,15 g Wasser lieferten 0,0826 g schwefelsauren Baryt, entsprechend Schwefelsäure . . . . . 0,056366 p. M.

b) 503,14 g Wasser lieferten 0,0821 g schwefelsauren Baryt, entsprechend Schwefelsäure . . . . . 0,056026 « «

Mittel . . . . . 0,056196 p. M.

## 4. Bestimmung der Kohlensäure.

a) 154,32 g Wasser lieferten in Natronkalkröhren aufgefangene Kohlensäure 0,0913 g, entsprechend . . . . . 0,591628 p. M.

b) 167,28 g Wasser lieferten 0,0997 g Kohlensäure, entsprechend . . . . . 0,596007 « «

c) 176,73 g Wasser lieferten 0,1049 g Kohlensäure, entsprechend . . . . . 0,593561 « «

Mittel . . . . . 0,593732 p. M.

### 5. Bestimmung der Kieselsäure.

a) 1855,8 g Wasser lieferten 0,1162 g Kieselsäure, entsprechend . . . . .	0,062615 p. M.
b) 1899,6 g Wasser lieferten 0,1176 g Kiesel- säure, entsprechend . . . . .	0,061908 « «
Mittel . . . . .	0,062262 p. M.

### 6. Bestimmung des Kalks.

a) Das in 5a erhaltene Filtrat wurde, nachdem das Eisenoxyd abgeschieden, wiederholt mit oxalsaurem Ammon gefällt. Die oxalsauren Salze ergaben in kohlen-saure Verbindungen übergeführt 1,6903 g kohlen- sauren Kalk und Strontian, entsprechend . . . . .	0,910820 p. M.
b) Das Filtrat von 5b lieferte 1,7316 g, ent- sprechend . . . . .	0,911560 « «
Mittel . . . . .	0,911190 p. M.

Zieht man hiervon ab die nach 12c vorhandene Menge kohlen-sauren Strontians mit . . . . .	0,019303 « «
so bleibt kohlen-saurer Kalk . . . . .	0,891887 p. M.
entsprechend Kalk . . . . .	0,499457 « «

### 7. Bestimmung der Magnesia.

a) Das Filtrat von 6a lieferte 0,4068 g pyro- phosphorsaure Magnesia, entsprechend Magnesia . . . . .	0,078992 p. M.
b) Das Filtrat von 6b lieferte 0,4120 g pyro- phosphorsaure Magnesia, entsprechend Magnesia . . . . .	0,078158 « «
Mittel . . . . .	0,078575 p. M.

### 8. Bestimmung der Chloralkalimetalle.

a) 503,150 g Wasser lieferten 3,5400 g vollkommen reine Chloralkalimetalle, entsprechend . . . . .	7,035675 p. M.
b) 503,140 g Wasser lieferten 3,5382 g vollkommen reine Chloralkalimetalle, entsprechend . . . . .	7,032238 « «
Mittel . . . . .	7,033957 p. M.

### 9. Bestimmung des Kalis.

Aus den in 8 erhaltenen Chloralkalimetallen wurde das Kali als Kaliumplatinchlorid abgeschieden:

a) 503,15 g Wasser lieferten 0,2850 g Kaliumplatinchlorid, entsprechend Kali . . . . .	0,109366 p. M.
b) 503,14 g Wasser lieferten 0,2830 g Kaliumplatinchlorid, entsprechend Kali . . . . .	0,108600 « «
Mittel . . . . .	0,108983 p. M.
entsprechend Chlorkalium . . . . .	0,172481 « «

### 10. Bestimmung des Lithions.

15100 g Wasser lieferten reines basisch phosphorsaures Lithion 0,3585 g, entsprechend Lithion . . . . .	0,009217 p. M.
oder Chlorlithium . . . . .	0,026068 « «

### 11. Bestimmung des Eisenoxyduls.

5366,2 g Wasser lieferten 0,0240 g Eisenoxyd, entsprechend Eisenoxydul . . . . .	0,004025 p. M.
--	----------------

### 12. Bestimmung des Manganoxyduls, des Baryts und Strontians.

57500 g Wasser lieferten:

a) 0,0534 g wasserfreies Mangansulfür, entsprechend Manganoxydul . . . . .	0,000758 p. M.
b) 0,0273 g chromsauren Baryt, entsprechend Baryt . . . . .	0,000287 « «
c) 1,3808 g schwefelsauren Strontian, entsprechend Strontian . . . . .	0,013545 « «
entsprechend kohlen-saurem Strontian . . . . .	0,019303 « «

### 13. Bestimmung des Ammons.

1892,0 g Wasser wurden unter Zusatz von etwas Salzsäure in einer Retorte eingekocht, dann nach Zufügen von gebrannter Magnesia abdestillirt und das Destillat in einer etwas Salzsäure enthaltenden Vorlage aufgefangen. Der entstandene Salmiak, in Ammoniumplatinchlorid und dieses durch Glühen in metallisches Platin übergeführt, lieferte 0,0494 g Platin, entsprechend Ammonium . . . . . 0,004778 p. M.

#### 14. Bestimmung der Borsäure.

14630 g Wasser wurden mit kohlensaurem Kali bis zur deutlich alkalischen Reaction versetzt und durch Abdampfen stark concentrirt. Der sich hierbei abscheidende Niederschlag wurde abfiltrirt und ausgewaschen, bis er sich bei vorgenommener Prüfung nicht mehr als borsäurehaltig erwies. Das Filtrat wurde bis zur feuchten Salzmasse eingedampft, die Borsäure durch Ansäuern mit Salzsäure in Freiheit gesetzt und mit Alkohol von 96 Volumprocent extrahirt.

Auf diese Weise ergab sich eine alle Borsäure enthaltende alkoholische Lösung, die, mit Kalilauge im Ueberschusse versetzt, abdestillirt und auf einen kleinen Rest eingedampft wurde. Den Rückstand säuerte man wieder mit Salzsäure an, extrahirte mit Alkohol, behandelte die alkoholische Lösung wie zuvor und verfuhr mit dem sich hierbei ergebenden Abdampfungsrückstande noch ein drittes Mal in gleicher Weise. Die schliesslich erhaltene geringe Salzmasse wurde in einen kleinen Destillationsapparat gebracht und nach dem Ansäuern mit Salzsäure wiederholt mit Methylalkohol destillirt, bis sich der Destillationsrückstand als frei von Borsäure erwies. Das Destillat wurde in chemisch reiner Kalilauge aufgefangen, nach dem Verjagen des Methylalkohols in einer Platinschale mit Fluorwasserstoffsäure im Ueberschuss versetzt und zur Trockne verdampft, der Rückstand mit einer Auflösung von einem Theil essigsäurem Kali in vier Theilen Wasser behandelt und der zurückbleibende Niederschlag zunächst mit derselben Lösung, dann mit Weingeist von 84 Volumprocent ausgewaschen. Die Menge des erhaltenen reinen Borfluorkaliums betrug 0,0520 g, entsprechend Borsäure . 0,000986 p. M.

#### 15. Bestimmung der Arsensäure und der Phosphorsäure.

a) 58060 g Wasser, der Inhalt eines grossen Ballons, wurden auf etwa 5 Liter eingedampft und mit Salzsäure bis zur deutlich sauren Reaction versetzt. Man fügte nun etwas Eisenchlorid, dann überschüssigen gefällten reinen kohlensauren Kalk zu, mischte wiederholt und liess schliesslich den entstandenen ockerfarbenen Niederschlag sich absetzen. Derselbe musste neben überschüssigem Eisenoxydhydrat alle Arsensäure und Phosphorsäure enthalten. Man filtrirte ihn ab, wusch ihn aus, löste in Salzsäure und behandelte mit Schwefelwasserstoff unter Erwärmen. Nach längerem Stehen in der Kälte wurde der entstandene Niederschlag abfiltrirt, ausgewaschen und in Bromsalzsäure gelöst. Die



Lösung versetzte man mit Eisenchlorür, brachte sie in einen Destillir-  
apparat, destillirte bis auf einen kleinen Rest ab, fügte zum Rückstand  
Salzsäure von 1,19 spec. Gew., destillirte neuerdings und wiederholte  
dies, bis das letzte Destillat durch Schwefelwasserstoff nicht mehr  
gefällt wurde. Die vereinigten Destillate, mit Schwefelwasserstoff gefällt,  
ergaben nach dem Behandeln mit Alkohol, Schwefelkohlen-  
stoff und wiederum mit Alkohol 0,0074 g Arsensulfür,  
entsprechend Arsensäure . . . . . 0,000119 p. M.

b) Das in a bei der Fällung mit Schwefelwasser-  
stoff erhaltene Filtrat wurde nach Abscheidung der  
Kieselsäure wiederholt mit Salpetersäure im Wasserbade  
verdampft, die Phosphorsäure als phosphormolybdän-  
saures Ammon gefällt und dieser Niederschlag in phos-  
phorsaure Ammonmagnesia übergeführt. Nach dem  
Glühen erhielt man daraus pyrophosphorsaure Magnesia  
0,0027 g, entsprechend Phosphorsäure . . . . . 0,000030 p. M.

#### 16. Bestimmung des Natrons.

Chloralkalimetalle sind vorhanden (nach 8) . . 7,033957 p. M.

Davon geht ab:

Chlorkalium (nach 9) . . . . . 0,172481 p. M.

Chlorlithium (nach 10) . . . . . 0,026068 « «

Summe . . 0,198549 « «

Rest: Chlornatrium 6,835408 p. M.

entsprechend Natron 3,626856 « «

17. Bestimmung der beim Abdampfen mit Schwefel-  
säure und Glühen des erhaltenen Rückstandes in einer  
Atmosphäre von kohlensaurem Ammon sich ergebenden  
Sulfate etc.

a) 100,87 g lieferten Sulfate etc. 1,0162 g, ent-  
sprechend . . . . . 10,074819 p. M.

b) 103,52 g lieferten Sulfate etc. 1,0434 g, ent-  
sprechend . . . . . 10,079212 « «

Mittel . . 10,077016 p. M.

## II. Berechnung der Analyse.

### a) Schwefelsaurer Baryt.

Baryt ist vorhanden (nach 12 b)	0,000287 p. M.
bindend Schwefelsäure	0,000150 « «
zu schwefelsaurem Baryt	0,000437 p. M.

### b) Schwefelsaurer Strontian.

Strontian ist vorhanden (nach 12 c)	0,013545 p. M.
bindend Schwefelsäure	0,010470 « «
zu schwefelsaurem Strontian	0,024015 p. M.

### c) Schwefelsaurer Kalk.

Schwefelsäure ist vorhanden (nach 3)	0,056196 p. M.
Davon ist gebunden:	
an Baryt (a)	0,000150 p. M.
an Strontian (b)	0,010470 « «
Summe	0,010620 p. M.
Rest Schwefelsäure	0,045576 p. M.
bindend Kalk	0,031903 « «
zu schwefelsaurem Kalk	0,077479 p. M.

### d) Phosphorsaurer Kalk.

Phosphorsäure ist vorhanden (nach 15 b)	0,000030 p. M.
bindend Kalk	0,000035 « «
zu dreibasisch phosphorsaurem Kalk	0,000065 p. M.

### e) Arsensaurer Kalk.

Arsensäure ist vorhanden (nach 15 a)	0,000119 p. M.
bindend Kalk (2 Aequivalente)	0,000058 « «
zu arsensaurem Kalk	0,000177 p. M.

f) Borsaurer Kalk.

Borsäure ist vorhanden (nach 14)	0,000986 p. M.
bindend Kalk	0,000789 « «
zu borsurem Kalk	0,001775 p. M.

g) Bromnatrium.

Brom ist vorhanden (nach 2b)	0,003818 p. M.
bindend Natrium	0,001101 « «
zu Bromnatrium	0,004919 p. M.

h) Jodnatrium.

Jod ist vorhanden (nach 2a)	0,000032 p. M.
bindend Natrium	0,000006 « «
zu Jodnatrium	0,000038 p. M.

i) Chlornatrium.

Natron ist vorhanden (nach 16)	3,626856 p. M.
--------------------------------	----------------

Davon ist gebunden:

als Natrium an Jod (h)	0,000008 p. M.
als Natrium an Brom (g)	0,001483 « «
Summe	0,001491 « «
Rest Natron	3,625365 p. M.
entsprechend Natrium	2,690993 « «
bindend Chlor	4,141606 « «
zu Chlornatrium	6,832599 p. M.

k) Chlorkalium.

Kali ist vorhanden (nach 9)	0,108983 p. M.
entsprechend Kalium	0,090484 « «
bindend Chlor	0,081997 « «
zu Chlorkalium	0,172481 p. M.

l) Chlorlithium.

Lithion ist vorhanden (nach 10)	0,009217 p. M.
entsprechend Lithium	0,004308 « «
bindend Chlor	0,021760 « «
zu Chlorlithium	0,026068 p. M.

m) Chlorammonium.

Ammonium ist vorhanden (nach 13)	0,004778 p. M.
bindend Chlor	0,009392 « «
zu Chlorammonium	0,014170 p. M.

n) Chlорcalcium.

Chlor ist vorhanden (nach 1)	4,666173 p. M.
------------------------------	----------------

Davon ist gebunden:

an Natrium (i)	4,141606 p. M.
« Kalium (k)	0,081997 « «
« Lithium (l)	0,021760 « «
« Ammonium (m)	0,009392 « «

Summe . . 4,254755 « «

Rest Chlor	0,411418 p. M.
bindend Calcium	0,232046 « «
zu Chlorcalcium	0,643464 p. M.

o) Kohlensaurer Kalk.

Kalk ist vorhanden (nach 6)	0,499457 p. M.
-----------------------------	----------------

Davon ist gebunden:

als Calcium an Chlor (n)	0,324864 p. M.
« « « Phosphorsäure (d)	0,000035 « «
« « « Arsensäure (e)	0,000058 « «
« « « Borsäure (f)	0,000789 « «

Summe . . 0,325746 « «

Rest Kalk	0,173711 p. M.
bindend Kohlensäure	0,136487 « «
zu einfach kohlensaurem Kalk	0,310198 p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurem Kalk	0,446685 « «

p) Kohlensaure Magnesia.

Magnesia ist vorhanden (nach 7) . . . . .	0,078575 p. M.
bindend Kohlensäure . . . . .	0,086433 « «
zu einfach kohlensaurer Magnesia . . .	0,165008 p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurer Magnesia . . .	0,251441 « «

q) Kohlensaures Eisenoxydul.

Eisenoxydul ist vorhanden (nach 11) . . . . .	0,004025 p. M.
bindend Kohlensäure . . . . .	0,002460 « «
zu einfach kohlensaurem Eisenoxydul . . .	0,006485 p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurem Eisenoxydul . . .	0,008945 « «

r) Kohlensaures Manganoxydul.

Manganoxydul ist vorhanden (nach 12 a) . . . . .	0,000758 p. M.
bindend Kohlensäure . . . . .	0,000470 « «
zu einfach kohlensaurem Manganoxydul . . .	0,001228 p. M.
entsprechend doppelt kohlensaurem Manganoxydul . . .	0,001698 « «

s) Kieselsäure.

Kieselsäure ist vorhanden (nach 5) . . . . .	0,062262 p. M.
--	----------------

t) Freie Kohlensäure.

Kohlensäure ist vorhanden (nach 4) . . . . .	0,593732 p. M.
--	----------------

Davon ist gebunden zu neutralen Salzen:

an Kalk (o) . . . . .	0,136487 p. M.
« Magnesia (p) . . . . .	0,086433 « «
« Eisenoxydul (q) . . . . .	0,002460 « «
« Manganoxydul (r) . . . . .	0,000470 « «

Summe . . .	0,225850 « «
-------------	--------------

Rest . . .	0,367882 p. M.
------------	----------------

Davon ist mit den einfach kohlensauren Salzen zu

Bicarbonaten verbunden . . . . .	0,225850 « «
----------------------------------	--------------

völlig freie Kohlensäure . . .	0,142032 p. M.
--------------------------------	----------------



### III. Controle der Analyse.

Berechnet man die einzelnen Bestandtheile des Wassers auf den Zustand, in welchem sie in dem Rückstande enthalten sein müssen, der in 17 durch Abdampfen mit Schwefelsäure und Glühen in einer Atmosphäre von kohlensaurem Ammon erhalten wurde, so erhält man folgende Zahlen:

Gefunden	Natron 3,626856 p. M., berechnet als	
	schwefelsaures Natron . . . . .	8,300640 p. M.
«	Kali 0,108983 p. M., berechnet als	
	schwefelsaures Kali . . . . .	0,201479 « «
«	Lithion 0,009217 p. M., berechnet als	
	schwefelsaures Lithion . . . . .	0,033763 « «
«	Baryt 0,000287 p. M., berechnet als	
	schwefelsaurer Baryt . . . . .	0,000437 « «
«	Strontian 0,013545 p. M., berechnet als	
	schwefelsaurer Strontian . . . . .	0,024015 « «
«	Kalk 0,499457 p. M., berechnet als	
	schwefelsaurer Kalk . . . . .	1,212967 « «
«	Magnesia 0,078575 p. M., berechnet als	
	schwefelsaure Magnesia . . . . .	0,235725 « «
«	Eisenoxydul 0,004025 p. M., berechnet	
	als Eisenoxyd . . . . .	0,004472 « «
«	Manganoxydul 0,000758 p. M., berechnet	
	als schwefelsaures Manganoxydul . .	0,001612 « «
«	Arsensäure . . . . .	0,000119 « «
«	Phosphorsäure . . . . .	0,000030 « «
«	Borsäure . . . . .	0,000986 « «
«	Kieselsäure . . . . .	0,062262 « «
	Summe . .	10,078507 p. M.
Direct gefunden wurden (nach 17)		10,077016 « «

#### IV. Zusammenstellung der Resultate.

Bestandtheile der Adlerquelle zu Wiesbaden.

a) Die kohlensauen Salze als einfache Carbonate berechnet.

α) In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

In 1000 Gewichtstheilen:

Chlornatrium . . . . .	6,832599
Chlorkalium . . . . .	0,172481
Chlorlithium . . . . .	0,026068
Chlorammonium . . . . .	0,014170
Chlorcalcium . . . . .	0,643464
Bromnatrium . . . . .	0,004919
Jodnatrium . . . . .	0,000038
Schwefelsaurer Kalk . . . . .	0,077479
« Strontian . . . . .	0,024015
« Baryt . . . . .	0,000437
Kohlensaurer Kalk . . . . .	0,310198
Kohlensaure Magnesia . . . . .	0,165008
Kohlensaures Eisenoxydul . . . . .	0,006485
« Manganoxydul . . . . .	0,001228
Arsensaurer Kalk . . . . .	0,000177
Phosphorsaurer Kalk . . . . .	0,000065
Borsaurer Kalk . . . . .	0,001775
Kieselsäure . . . . .	0,062262

Summe . . . 8,342868

Kohlensäure, mit den einfachen Carbonaten zu

Bicarbonaten verbundene . . . . . 0,225850

Kohlensäure, völlig freie . . . . . 0,142032

Summe aller Bestandtheile . . . 8,710750

β) In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

Rubidium, Caesium, Kupfer, Titansäure, Salpetersäure, Schwefelwasserstoff, organische Substanzen, sämmtlich in sehr geringen Spuren.

b) Die kohlensauen Salze als wasserfreie Bicarbonate berechnet:

α) In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

	In 1000 Gewichtstheilen
Chlornatrium . . . . .	6,832599
Chlorkalium . . . . .	0,172481
Chlorlithium . . . . .	0,026068
Chlorammonium . . . . .	0,014170
Chlorcalcium . . . . .	0,643464
Bromnatrium . . . . .	0,004919
Jodnatrium . . . . .	0,000038
Schwefelsaurer Kalk . . . . .	0,077479
« Strontian . . . . .	0,024015
« Baryt . . . . .	0,000437
Doppelt kohlensaurer Kalk . . . . .	0,446685
« kohlensaure Magnesia . . . . .	0,251441
« kohlensaures Eisenoxydul . . . . .	0,008945
« « Manganoxydul . . . . .	0,001698
Arsensaurer Kalk . . . . .	0,000177
Phosphorsaurer Kalk . . . . .	0,000065
Borsaurer Kalk . . . . .	0,001775
Kieselsäure . . . . .	0,062262
Summe . . . . .	8,568718
Kohlensäure, völlig freie, . . . . .	0,142032
Summe aller Bestandtheile . . . . .	8,710750

β) In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

Siehe a.

## C. Charakter der Adlerquelle und Vergleichung derselben mit dem Kochbrunnen.

Die Adlerquelle gehört, wie alle warmen Wiesbadener Mineralquellen, zu den Kochsalzthermen.

Nachstehend geben wir eine vergleichende Zusammenstellung der Analyse des Kochbrunnens mit derjenigen der Adlerquelle.

Bestandtheile der Quellen in 1000 Gewichtstheilen Wasser, die kohlensauren Salze als einfache Carbonate berechnet.

	Kochbrunnen. R. Fresenius 1885.	Adlerquelle. R. Fresenius und H. Fresenius 1896.
Temperatur der Quelle . . . .	68,75° C.	64,4° C.
Specifisches Gewicht . . . . .	1,006627 bei 15° C.	1,006260 bei 19° C.
Chlornatrium . . . . .	6,828976	6,832599
Chlorkalium . . . . .	0,182392	0,172481
Chlorlithium . . . . .	0,023104	0,026068
Chlorammonium . . . . .	0,017073	0,014170
Chlorcalcium . . . . .	0,627303	0,643464
Bromnatrium . . . . .	0,004351	0,004919
Jodnatrium . . . . .	0,000017	0,000038
Schwefelsaurer Kalk . . . . .	0,072480	0,077479
„ Strontian . . . . .	0,021929	0,024015
„ Baryt . . . . .	0,001272	0,000437
Kohlensaurer Kalk . . . . .	0,213180	0,310198
Kohlensaure Magnesia . . . . .	0,177614	0,165008
Kohlensaures Eisenoxydul . . . . .	0,006730	0,006485
„ Manganoxydul . . . . .	0,000894	0,001228
Arsensaurer Kalk . . . . .	0,000225	0,000177
Phosphorsaurer Kalk . . . . .	0,000028	0,000065
Borsaurer Kalk . . . . .	0,001039	0,001775
Kieselsäure . . . . .	0,062714	0,062262
Summe . . . . .	8,241321	8,342868
Kohlensäure, völlig freie . . . . .	0,296600	0,142032

Die Adlerquelle übertrifft den Kochbrunnen um ein Geringes in Bezug auf die Gesamtmenge der fixen Bestandtheile, den Gehalt an Kochsalz, Chlorkalium, Chlorcalcium, Bromnatrium, Jodnatrium, schwefelsaurem Kalk, schwefelsaurem Strontian, kohlensaurem Manganoxydul, phosphorsaurem Kalk und borsaurem Kalk, in etwas höherem Grade bezüglich des Gehaltes an kohlensaurem Kalk, während der Kochbrunnen etwas reicher ist an Chlorkalium, Chlorammonium, schwefelsaurem Baryt, kohlensaurer Magnesia, kohlensaurem Eisenoxydul, arsensaurem Kalk, Kieselsäure und in etwas höherem Grade an freier Kohlensäure.

Die Unterschiede zwischen der Adlerquelle und dem Kochbrunnen sind aber nur unerhebliche, so dass das Thermalwasser der Adlerquelle sowohl zur Badekur, als auch zur Trinkkur in ganz gleicher Weise geeignet ist wie das Kochbrunnenwasser.

---





# VERZEICHNISS

DER IN DEN JAHREN 1893—95 VON MIR IN

## KAISER-WILHELMSLAND

UND

## NEUPOMMERN

## GESAMMELTEN TAGSCHMETTERLINGE

(MIT AUSSCHLUSS DER FAMILIEN DER LYCAENIDEN UND HESPERIIDEN.)

VON

**HOFRATH DR. B. HAGEN,**  
FRANKFURT AM MAIN.

MIT EINER KARTEN-SKIZZE.

---



Im Jahre 1893 hatte das bisher so unbekannte und unbeachtete Neu-Guinea plötzlich die entomologische Welt in staunenden Aufruhr versetzt durch die Entdeckung des *Troides paradiseus*, dieser wunderbarsten aller bisher bekannten Ornithopteren, und das bestärkte meinen Entschluss, diese Zauberinsel, die noch so viel naturwissenschaftliche Ueberraschungen und Wunder in ihrem Schoosse bergen mochte, zu besuchen. Als Arzt der tabakpflanzenden Astrolabe-Compagnie schiffte ich mich am 28. August in Genua, und, nach einem mehrwöchentlichen Abstecher nach Deli auf Sumatra, meiner alten Heimath, am 26. Oktober 1893 in Singapore nach Stephansort an der Astrolabe-Bucht ein. Die Fahrt ging quer durch die Molukken, und man kann sich denken, welche Tantalusqualen mein Entomologen-Herz ausstand, wie ich so eine nach der andern dieser klassischen, grünen Schmetterlingsinseln in fast greifbarer Nähe, und doch so unerreichbar, an meinen sehnsüchtigen Blicken vorüberziehen lassen musste. Am 9. November landeten wir in Friedrich-Wilhelmshafen, wo uns, gleichsam zum Willkommen, eine grosse Tenaris an Bord besuchte, und wo ich gleich bei den ersten Schritten in dem neuen Land einen ganzen Citronenbusch voll fingergrosser grüner Papilioraupen (*P. ormenus*) fand, und im Wald hinter den Häusern noch 2 schwarz und gelbgeringte Cethosienraupen (*C. damasippe*). *Hypolimnas bolina* und *misippus*, diese kosmopolitischen Strolche, und *Junonia vellida*, das waren die häufigsten Erscheinungen, die Gassenjungen sozusagen, die sich überall umhertrieben. Mehrere kurze Ausflüge während unseres dreitägigen Aufenthalts in das flache, buschige und sumpfige Hinterland gaben eine bereits ziemlich reichhaltige Uebersicht über den Lepidopterenreichthum meiner neuen Heimath. Es wimmelte förmlich von Individuen, namentlich aus der Gattung *Euploea* und *Papilio*. Auch Satyriden (*Tenaris*, *Hypocysta*) und besonders die grösstentheils wunderbar gefärbten *Lycaniden* waren sehr häufig, auffallend jedoch das fast gänzliche Fehlen der *Pieriden* und *Hesperiid*en.

Am 12. November brachte mich die Dampfbarkasse hinüber nach Stephansort, das nur einige Stunden Dampfens von Friedrich-Wilhelms-hafen entfernt liegt, und mir zum Wohn- und Amtssitz bestimmt war. Berufsgeschäfte und die bald als unwillkommener, aber sehr beständiger Gast sich einstellende Malaria beschränkten die Stunden, welche ich der lepidopterologischen Erforschung meiner neuen Heimath widmen konnte, leider nur allzusehr, und namentlich die Malaria zwang mich, Kaiser Wilhelmsland schon im Februar 1895 wieder zu verlassen; immerhin glaube ich, dass ich im Grossen und Ganzen die Tagfalter, welche die Ebenen der Astrolabebucht bevölkern, in einiger Vollständigkeit erhalten habe, mit Ausnahme vielleicht der Lycaeniden und Hesperiden, die manche Lücken aufweisen mögen. Das liegt eben daran, dass ich die wenigste Zeit selbst auf den Fang gehen konnte, sondern auf die sehr mangelhafte Geschicklichkeit einiger eingeborenen, halbwüchsigen Jungen angewiesen war; ein Javane, der mir in Sumatra gute Dienste geleistet, und den ich mit nach Stephansort genommen hatte, erkrankte bald an Beriberi und war zum Fang draussen nicht mehr zu verwenden; doch hatte ich immerhin Zeit gehabt, ihn nach einigen Localitäten zu senden, wo ich selbst nicht hinkommen konnte, so z. B. nach der Missionsstation Simbang, in der Nähe der früheren, jetzt aufgegebenen Station Finschhafen, wo er im December 1894 und Januar 1895 sammelte, u. A. auch auf dem benachbarten, ca. 2000 Fuss hohen Sattelberg, und dann nach der Station Herbertshöhe auf der Gazellehalbinsel Neupommerns, wohin ich ihn im Mai 1894 auf einer Erholungsreise mitnahm und bis Mitte Juni dort sammeln liess\*). In Folge dessen erhielt ich von diesen beiden Orten sehr hübsche Suiten, wovon mir namentlich die Simbanger Sammlung zur Vergleichung mit der Stefansorter sehr werthvoll war. Die im nachfolgenden Verzeichniss gegebenen Fundorte und Daten sind vollkommen zuverlässig. Der Vertreter der Firma HERNSHEIM & Co. auf Matupi, einer kleinen Insel in der Blanche-Bay bet Herbertshöhe, Herr Thiel, sandte mir ausserdem eine kleine Anzahl dort gefangener Tagfalter, und ebenso der Missionar VETTER von Simbang. Von der am Eingang der Astrolabebucht gelegenen Insel Dampier, von wo meines Wissens bisher noch nie Schmetterlinge nach Europa gekommen sind, erhielt ich aus dem Nachlass eines

---

\*) Anmerkung. Die bei Herbertshöhe erbeuteten Arten sind in der Liste mit kleinerer Schrift und ohne Nummern aufgeführt.



dort verstorbenen Missionars ebenfalls einige Exemplare. Dieselben zeichnen sich durch starke Tendenz zu Melanismus aus. (S. No. 1, 6, 11.)

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sei es mir nun zunächst gestattet, eine kurze geographisch-klimatische Schilderung des Landes zu geben, wobei ich zum besseren Verständniss auf die beigegebene Kartenskizze von Kaiser-Wilhelmsland verweise. Es handelt sich ausschliesslich um die beiden Endpunkte der sogenannten Maclayküste, nämlich die Astrolabebucht westlich und den Hüongolf östlich.

Zunächst will ich die Astrolabebucht schildern, an der ausser mir zwei tüchtige Sammler von Beruf, nämlich die Herren Kubary (in Constantinhafen) und Wahnes (in Bongu) jahrelang mit so grossem Eifer und Erfolg gesammelt haben, dass »Neuguinea-Schmetterlinge« in den Verkaufslisten der Händler zu ganz billigen Preisen figuriren.

Ein ganz wunderbares Panorama thut sich vor uns auf, wenn der Dampfer zwischen der Dampierinsel und dem flachen Cap Croisilles hindurch in die grosse weite Astrolabebucht hineinfährt. Da thürmen sich ganz nahe an der Küste links die 2000 Meter hohen Bergzüge des schroffen, wildgezackten Finisterre-Gebirges in fünf Reihen hintereinander empor, eine imposante Alpenlandschaft, während zur Rechten die niedrigeren und sanfteren Hänge des Oertzengebirges sich hinziehen. Beide Gebirgssysteme, von denen das letztere in direkt nördlicher, das Finisterregebirge aber in südöstlicher Richtung streicht, stossen mit ihren Vorbergen im hinteren Winkel der Astrolabebucht zusammen, und lassen durch das schmale, vielgewundene Thal des Minjimflusses an hellen Morgen die Aussicht frei auf die klassischen Conturen des majestätischen Bismarck-Gebirges, das nach den Messungen der erst im letzten Dezember nach Europa zurückgekehrten deutschen Forschungs-expedition, welche bis zu seinem Fusse vorgedrungen ist und deutlich Schneeflächen an seinen Gipfelhängen beobachtet hat, ca. 4300 Meter hoch ist. Diese ganze Hochgebirgswelt mit allen ihren botanischen, zoologischen und mineralogischen Schätzen ist der Forschung bis heute noch verschlossen geblieben; auch mir war es versagt, sie zu betreten, und ich habe nur ein einziges Mal die erste Kette der Vorberge hinter Stefansort bis zum 1200 Fuss hohen Scheitelkamme erstiegen. Welche naturwissenschaftlichen Wunder, speziell in lepidopterologischer Hinsicht, dort noch einer glücklichen Entdeckerhand harren, wir wissen es nicht, können es nicht einmal ahnen. Die Engländer, Mc. Gregor an der

Spitze, haben durch ihre Expedition im letzten Jahre, wobei sie Neu-Guinea als die Ersten durchquerten und Höhen von 11000 Fuss überschritten, vielleicht einen Theil des Schleiers gelüftet; jedenfalls darf man auf die lepidopterologischen Ergebnisse ihrer Reise äusserst gespannt sein.

Doch kehren wir zu unserer Beschreibung zurück. Den beiden Gebirgszügen, welche die Astrolabebucht umsäumen, sind alluviale Ebenen vorgelagert, welche im Westen, also vor dem Oertzengebirge, ziemlich breit und weitläufig sind und augenblicklich von der Astrolabe-Compagnie zum Zweck des Tabaksbaus allmählich entwaldet und cultivirt werden. Dort liegt die Ansiedelung Stefansort und die benachbarte Pflanzung Erima, deren nähere und fernere Umgebungen den Hauptschauplatz meiner entomologischen Thätigkeit bildeten. Die Küstenebene vor dem Finisterre-Gebirge jedoch, also im Süden und Osten, wird sehr schmal, da das Gebirge hier sehr nahe an die See herantritt, und mit seinen Vorbergen theilweise direkt in dieselbe hinabfällt. Dort liegt die, nach Kubarys Weggang, 1895, soviel ich höre, aufgegebene Station Constantinhafen, und gleich daneben das Eingeborenen-Dorf Bongu, wo Miclucho-Maclay seinerzeit wohnte, und in dem zuletzt Wahnes sich aufhielt.

Alles, was nun das Auge ringsum erblickt, die Bergzüge, die Thäler, die Schluchten und die vorgelagerte Ebene, von der höchsten Spitze bis herunter zu dem blendendweissen Sandgürtel, welcher die wunderbar tiefblaue See umsäumt, das Alles ist bedeckt von dem strahlenden, glänzenden Grün dichten, schweren Urwaldes, nur selten unterbrochen von kleineren, savanenähnlichen Grasflächen, die häufig von Cycadeen durchsetzt sind. Jeder dieser auf den Grasflächen zerstreuten Cycadeenbäume dient ganzen Familien der bekannten *Lycaena arruana* Feld. zum Aufenthalt und Sammelplatz; ich habe das Thierchen ausschliesslich dort gefunden.

Die Flora der Astrolabebucht ist ganz indomalaisch, und hat nur blutwenig oder eigentlich gar keine australischen Formen. Ich war ganz erstaunt, überall in Wald und Feld Pflanzen zu begegnen, die mir von Sumatra her bekannt und geläufig waren. Wenn die Thierwelt und die Eingeborenen nicht gewesen wären, so hätte man sich ganz gut nach der Ostküste Sumatras versetzt fühlen können. Dieser indische Charakter der Neuguinea-Flora ist ja längst bekannt und durch

die klimatischen Verhältnisse auch erklärt, ich durfte aber nicht verfehlen, hier nochmals darauf aufmerksam zu machen, da dies die Erklärung für das Vorkommen so ausserordentlich vieler malaischer und so ausserordentlich weniger australischer Schmetterlinge gibt.

Die Küste bei der Station Simbang weicht insofern von der an der Astrolabebucht ab, als sie keine vorgelagerte Ebene hat, sondern das etwa 1000 Meter hohe Gebirge tritt hier mit seinen Vorbergen direkt an die See heran. Darum wäre dieser Platz auch als ein für die Erforschung der Schmetterlingswelt viel günstigerer zu bezeichnen — man lese nur nach, welche seltenen und interessanten Arten mein Fänger schon in den paar Wochen seines Aufenthalts dort erbeutet hat — und ich möchte nicht versäumen, etwa hinausgehende Sammler auf diese Localität, wo sie an den dortigen Missionaren überdies noch eine freundliche und hilfsbereite Stütze hätten — die ca. 2000 Fuss hoch gelegene Station auf dem Sattelberg wird wohl die höchste europäische Niederlassung in ganz Neu-Guinea sein — aufmerksam zu machen.

Was nun die klimatischen Verhältnisse betrifft, so ist es zunächst begreiflich, dass es in einem Land, das unter dem 6. Grad s. Br. liegt, ziemlich warm ist. Die Durchschnittstemperatur des Jahres beträgt  $26^{\circ}$  C., mit mittleren Monatsschwankungen bis  $35^{\circ}$  Mittags nach oben und  $19^{\circ}$  Morgens nach unten. Die Nächte können, namentlich in der Regenzeit, recht kühl werden, kühler als in Sumatra, so dass man sich hie und da mal gerne des Nachts in seine Decke wickelt.

Die Regenzeit setzt etwa mit dem November, oft schon Mitte October, ein und dauert bis in den April. In dieser Zeit kommen etwa auf einen trockenen zwei Regentage und es fällt im Monatsdurchschnitt 373 mm Regen. Stürme und Gewitter sind während dieser Zeit sehr häufig.

Die trockene Saison ist die Zeit von Juni bis August; da fällt oft mehrere Wochen lang kein Tröpfchen Regen. Auf vier trockene Tage ist hier etwa ein Regentag zu rechnen und die monatliche Durchschnittsmenge beträgt nur 88 mm, meistens locale Gewitterniederschläge.

Der Unterschied zwischen trockener und Regenzeit ist also auf Kaiser-Wilhelmsland ein viel bedeutenderer als z. B. auf der Ostküste Sumatras, das selbst in der trockenen Periode noch 11 Regentage im

Monat hat gegen 18 in der nassen. Das spricht sich natürlich auch in den Erscheinungszeiten der Schmetterlinge aus; dieselben sind in Neuguinea, d. h., um correct zu sein, in Kaiser-Wilhelmsland, viel mehr an die Saison gebunden, als in Sumatra. Ich werde im Nachfolgenden noch darauf zu sprechen kommen.

Die relative Feuchtigkeit der Luft beträgt 85% im Mittel, d. i. 5% mehr als in Deli-Sumatra (80%); die Luft muss also in Deutsch-Neuguinea als ausserordentlich feucht bezeichnet werden. Diese Feuchtigkeit sinkt in den trockenen Monaten Mittags bis 61 (in Deli bis 50!) und steigt in den Regenmonaten Abends bis 94% (in Deli nur bis 87%!).

Es herrschen in Kaiser-Wilhelmsland überhaupt sehr interessante meteorologische Verhältnisse, in Folge zweier hier auf einander treffender Windströmungen. Man vergegenwärtige sich an der Hand der beigegebenen Kartenskizze die geographische Lage: Die Küste unseres Gebietes streicht ziemlich genau von Nordwest nach Südost und besitzt zwei tiefe Einbuchtungen: die Astrolabebucht und den Hüongolf, welche beide durch das ca. 6000—7000 Fuss hohe Finisterre-Gebirge getrennt werden. Dieses Gebirge schützt also den Hüongolf vor nordwestlichen, und die Astrolabebucht vor südöstlichen Winden; diese ist gegen Süden ausserdem noch durch das Massiv des Bismarck-Gebirges gesichert. Nun wehen aber gerade die herrschenden Winde aus diesen beiden Richtungen, nämlich der Nordwestmonsun und der Südostpassat. Die Astrolabebucht steht demnach dem ersteren offen und ist vor letzterem geschützt, während die Verhältnisse beim Hüongolf gerade umgekehrt liegen. Jeder dieser beiden Winde gibt beim Anprallen an die Flanke des Finisterre-Gebirges den grössten Theil seiner Feuchtigkeit ab und wird beim Niedersteigen auf der anderen, im Windschatten liegenden Seite zu einem verhältnissmässig trockenen Wind. Der Südostpassat also z. B., der mit Feuchtigkeit beladen in voller ungehemmter Kraft in den Hüongolf hereinstürmt und seinen Wassergehalt an der Ostflanke des Gebirges bei Finschhafen als Regenwind niederschlägt, bewirkt auf der anderen Seite des Gebirges in Stefansort die trockene Zeit. Er weht etwa von Mai bis October und die Station Finschhafen hat thatsächlich die stärkste Regenzeit im Juli und August, wenn an der Astrolabebucht die trockenste Zeit herrscht. Und umgekehrt wird es zur Zeit des Nordwestmonsuns von November bis April.



Das sind sehr wichtige klimatologische Verhältnisse, die uns für das Verständniss der Verbreitung und Variation der Schmetterlingswelt ausserordentlich werthvolle Fingerzeige geben, und ohne deren Berücksichtigung gar Vieles unerklärt bleiben würde, z. B. die Thatsache, dass in Simbang, das doch nur wenige Meilen von der Astrolabebucht entfernt liegt, eine solche Menge ganz anderer Formen vorkommen können. Die nachfolgende Liste zeigt fast auf jeder Seite den Unterschied beider Schmetterlingsfaunen. Wenn ich zum Vergleich Sumatra wieder heranziehen darf, das lepidopterologisch ja nahe verwandt ist mit Neu-Guinea, so treffen wir hier eine ziemlich gleichmässige Vertheilung der Schmetterlingswelt über die ganze grosse Insel, abgesehen natürlich von den Elevationsdifferenzen. Local beschränkte Thiere finden sich verhältnissmässig wenige; ob ich in Deli sammle oder Palembang, Orte, die fast dreimal so weit von einander entfernt sind als die Astrolabebai von Simbang, das bleibt sich fast ganz gleich. Die diametral entgegengesetzten meteorologischen Verhältnisse im Osten und Westen von Kaiser-Wilhelmsland bewirken eben hier diese Localisirung. Die Betrachtung der Luftströmungen gibt uns aber auch noch die Erklärung für etwas Anderes, nämlich dass wir bei Simbang unter den Schmetterlingen mehr Formen aus Australien und Süd-Neuguinea antreffen als an der Astrolabebucht. Hier finden wir nämlich: *Troides priamus euphorion*, *Delias ornytion*, die ihren nächsten Verwandten in der australischen *D. nigrina* hat, *Danais petilia*, *Euploea resarta*, *nox*, die *E. spec. No. 69*, *Elymnias agondas var. glaucopis* Stgr., *Parthenos sylvia* etc. Denn, wie wir eben gesehen haben, steht der Hüongolf und Simbang ausschliesslich dem Südostpassat offen, und die Verbreitung der leichtbeschwingten Bewohner der Luft hängt ja zum grossen Theil von den Windströmungen ab. Die Astrolabebucht ist wiederum ausschliesslich den Einflüssen von Nordwesten her ausgesetzt. Ich bin zufällig in der Lage, ein ausserordentlich lehrreiches und schlagendes Beispiel für die Richtigkeit dieser Behauptungen beizubringen durch das Vorkommen des kosmopolitischen *Danais chrysippus*, der in Australien in einer so abweichenden und dunkeln Form auftritt, dass er sogar hie und da als eigene gute Art betrachtet wird. Nun habe ich an der Astrolabebucht ein Stück von der gewöhnlichen typischen Form gefangen, wie sie im Westen vorkommt, und von Simbang ein anderes von der dunkeln australischen Form *petilia*! (*S. No. 46 und 47*).

Ich habe oben gesagt, dass die Schmetterlingswelt in Neu-Guinea,



präciser ausgedrückt an der Astrolabebucht, woher ja doch mein Hauptmaterial stammt, in ihrem Erscheinen viel mehr an die Jahreszeit gebunden sei als z. B. in Sumatra. Es war eine der ersten Erfahrungen, welche ich beim Beginn der trockenen Zeit dort machte, dass das Pflanzen- sowohl wie das Thierleben sich fast ganz auf die Monate der Regenzeit concentrirt. Von November bis April, da grünen und blühen und wachsen die Pflanzen, da legt die Vogelwelt ihr neues Kleid an und singt und girrt, da schwirrt und summt und flattert es aller Orten von Insecten, und mein schwarzer Schmetterlingsfänger kommt allabendlich freudegrinsend mit gefüllter Büchse nach Hause.

In den heissen, trockenen Monaten dagegen ist Alles wie todt und erstorben, kein Thier, kein Vogel, kaum ein Insect lässt sich sehen, der Wald steht leer und der Schmetterlingsjunge schleicht sich betrübt und ängstlich ob der zu erwartenden Schelte mit seiner Tagesbeute von 10—12 Exemplaren geräuschlos zur Hinterthür herein und sagt bedauernd: Master, bebek he no stop = es gibt keine Schmetterlinge draussen!

Wie aus den nachfolgenden Fangdaten zu ersehen, fliegen nur wenige Arten in gleicher Häufigkeit das ganze Jahr hindurch. Die allermeisten sind entweder ausschliesslich in der Regenzeit (October bis April) gefangen, oder kommen wenigstens zu dieser Zeit weitaus am häufigsten vor. Leider habe ich bei Abfassung Dieses nicht mehr mein ganzes gesammeltes Material zur Verfügung, da ich schon viele Doubletten abgegeben habe; es ist also möglich, dass unter den abgegebenen Sachen sich noch Stücke auch aus anderen Monaten noch als den jedesmal angegebenen befinden; die betreffenden Herren Empfänger haben dann vielleicht die Güte, die Fangdaten gelegentlich zu completiren; diese Nachträge werden aber wohl an dem aus dem Hauptmaterial sich ergebenden Resultate, dass die Monate October bis April die fast ausschliessliche Flugzeit der Tagschmetterlinge an der Astrolabebucht bilden, nichts ändern.

Sodann muss ich zugestehen, dass ich während der trockenen Zeit — ich habe nur eine einzige, die von 1894, dort mitgemacht — durch zeitweisen Mangel eines geeigneten Fängers nicht in der Lage war, so intensiv sammeln zu lassen, wie sonst, so dass die grellen Gegensätze der nachfolgenden Liste bei längerem Verweilen und intensiverem Sammeln wohl etwas ausgeglichen werden würden. Das bitte ich bei Beurtheilung des Werthes derselben im Auge zu behalten.

Tabelle der Hauptflugzeit der häufigeren Arten.

Es fliegen:

Während des ganzen Jahres, aber in der Regenzeit am häufigsten.	Nur in der Regenzeit und dann wieder im Juni oder Juli oder August.	Nur in der Regenzeit ausschliesslich.	Während des ganzen Jahres gleich häufig.
Tr. priamus	Pap. euchenor	Pap. beccarii	Ter. virgo
" papuanus	" autolytus	" ormenus	" hecabe
Pap. godartianus	" eurypilus	" parmatius	Del. aruna
Tach. ada	Eled. egnatia	" medon	Myc. eminens
Danaïs sobrina	Pier. dohertyana	" ambrax	" phidon
Ham. zolus	" euryxantha	" choredon	Ceth. damasippe
Hypol. misippus	Mel. constantia	" macfarlanei	
Char. papuanus	" leda	" agamemnon	
	Myc. durga	" wallacei	
	" fulviana	" thule	
	" elia	Ter. spec. No. 26	
	" mucia	Catops. flava	
	" medus	Del. gabia	
El. thryallis	El. thryallis	" cruentata	
Hy. hodeva	Hy. hodeva	Tach. celestina	
Ten. catops	Ten. catops	Dan. purpurata	
Ap. papuana	Ap. papuana	" plexippus	
Nept. shepherdii	Nept. shepherdii	Eupl. perdita	
" dorcias	" dorcias	" swierstrae	
" satina	" satina	" salabanda	
Dich. ninus	Dich. ninus	" treitschkei	
Cyr. achates	Cyr. achates	" confusa	
Dol. norna	Dol. norna	" netscheri	
Proth. hewitsonii	Proth. hewitsonii	Mel. crameri	
Dan. mytilene	Dan. mytilene	Mycal. aethiops	
Cynth. arsinoë	Cynth. arsinoë	" mineus	
Mess. turneri	Mess. turneri	Hypoc. osiris	
		Ypth. arcous	
		Ten. staudingeri	
		" dimona	
		" gorgo	
		" charonides	
		" sekarensis	
		Acr. meyeri	
		Rhin. algina	
		Jun. antigone	
		Prec. zelima	
		Hyp. bolina	
		" alinena	
		" pithōka	
		" deois	
		Parth. aspila	
		Symph. aeropus	
		Euth. aethion	
		Cyr. acilia	
		Dol. bisaltide	
		" dascon	
		" dascylus	
		Myn. quérini	
		Proth. australis	
		Char. jupiter	

Man sieht also, wie ausserordentlich wenige Arten das ganze Jahr hindurch gleich häufig sind und durch die Jahreszeit nicht beeinflusst werden: Sechs im Ganzen! Etwas mehr fliegen schon in der Weise, dass sie in der trockenen Zeit spärlicher werden. Noch mehr Arten pausiren aber förmlich, indem sie nach der Regenzeit für einige Monate verschwinden, im Juni oder (allermeistens) im Juli oder August für kurze Zeit und in geringer Anzahl wieder erscheinen, um ebenso schnell bis zum Eintritt der Regenzeit wieder zu verschwinden. Die überwiegende Anzahl jedoch fliegt ausschliesslich in der Regenzeit. Von 92 beobachteten Arten kommen alle in grosser Häufigkeit in der Regenzeit, dagegen nur 41 und in meistens sehr geringer Häufigkeit in einzelnen Monaten der trockenen Zeit vor!

Der einzige *Messaras turneri* scheint seine Hauptflugzeit in den trockenen Monaten zu haben.

Wenn wir auch nun in Rücksicht auf die obengenannten Fehlerquellen unserer Flugliste annehmen wollten, dass das wahre Verhältniss so sei, dass alle Arten in einzelnen, oder sagen wir, wenigen Individuen auch während der ganzen trockenen Zeit vorkommen, so genügt das immerhin nicht zur Erklärung der Thatsache, dass plötzlich, wie mit einem Schlage, mit dem Eintritt der nassen Zeit, eine solche Menge von Raupen und bald darauf auch Schmetterlingen erscheint, und zwar mit stets wiederkehrender grosser Regelmässigkeit; denn die paar Weiber, die vielleicht ein kümmerliches Dasein während der Sommermonate gefristet haben oder sich aus einer Sommergeneration entwickelten, können unmöglich im Stande sein, eine solche Menge von Eiern zur gegebenen Zeit zu produciren. Und dann bin ich für gewisse Arten durch meine Erfahrungen geradezu gezwungen, jede Entwicklung während der trockenen Monate zu negiren. Diese Erfahrungen betreffen in erster Linie die *Agamemnon*-Gruppe der *Papilio*'s, speciell *P. macfarlanei* (*aegistus*), *P. agamemnon* und *P. wallacei*. Von diesen drei häufigen Arten habe ich Exemplare nur in der Regenzeit und zwar von der ersten und letzten ausschliesslich im November und Dezember, von *agamemnon* auch bis in den April hinein gefangen, während der ganzen übrigen Zeit von keinem auch nur ein einziges Stück. Die Raupen dieser drei leben auf der durch uns in Neu-Guinea erst neu eingeführten *Anona muricata*, die ihrer herrlichen Früchte wegen längs der Strassen und Häuser cultivirt ward. Diese Büsche wurden von mir während der ganzen Zeit meines Aufenthaltes genau und intensiv

beobachtet, und ich kann darum für das Nachfolgende einen hohen Grad von Zuverlässigkeit beanspruchen, namentlich was *P. macfarlanei* anbetrifft; die übrigen beiden Arten waren bedeutend weniger gemein. Von Mai ab bis in den October nun, also 6 Monate lang, hatte ich grosse Mühe, ab und zu mal nach langem Suchen, eine Raupe der genannten Arten zu entdecken; ob und wann diese vereinzelt Vorläufer oder Nachzügler, wie man will, der Hauptsaison sich entwickelten, das habe ich mir nicht näher notirt — leider; unter meinen Vorräthen jedenfalls habe ich keine Stücke aus den fraglichen Monaten datirt gefunden. Kaum jedoch erschien der October, und mit ihm die Regenzeit, so wimmelten alle *Anona*-Büsche plötzlich von jungen Räupchen, ohne dass ich vorher eierlegende Weiber beobachtet hätte; von jedem einzelnen Busch konnte ich oft ein Dutzend zu gleicher Zeit abnehmen. Im November erschienen dann die frischen Falter, machten in kurzer Zeit eine oder zwei Generationen durch und verschwanden dann ebenso spurlos, wie sie gekommen waren.

Leider habe ich es versäumt — und meine Ueberhäufung mit Geschäften und intensive Malaria gerade während dieser Zeit mag als Entschuldigung dienen — in der trockenen Zeit nachzusehen, ob ich nicht die abgelegten Eier irgendwo auffinden könnte; die Entdeckung übersommernder, wenn der Ausdruck erlaubt ist, Eier hätte ja sofort Aufschluss über die Art und Weise der Fortpflanzung gegeben. Meine Aufmerksamkeit blieb eben nur auf die besser wahrzunehmenden Raupen gerichtet. Ich kann es darum nur als Vermuthung aussprechen, und als persönliche Ueberzeugung, dass die zahlreiche erste Herbstgeneration von übersommernden, und nicht von den durch etwaige spärliche Sommerexemplare deponirten Eiern herrührt.

Saisonvarietäten habe ich nicht wahrnehmen können; das Kleid der das ganze Jahr über fliegenden Schmetterlinge bleibt sich sowohl in der Regen- als der trockenen Zeit stets gleich.

Nach dem vorher Gesagten möchte es vielleicht Manchen erstaunen, dass mein Fänger in Simbang, wo er im December und Januar sammelte, zu welcher Zeit doch dort der Culminationspunkt der trockenen Zeit ist, so viele Arten in zahlreichen Individuen erbeutete. Die jährliche Regenmenge ist in Simbang (2882 mm) fast die gleiche, wie an der Astrolabebucht (Constantinhafen 2964 mm) und in gleicher Weise auf nasse und trockene Zeit, nur eben gerade umgekehrt, vertheilt. Ich wage keine bestimmte Meinung hierüber zu äussern, da ich selbst



nicht an Ort und Stelle gewesen bin; vielleicht hat die mehr bergige Beschaffenheit des Landes mit der Sache zu thun.

Es sei mir erlaubt, hier noch kurz dreier anderer Localitäten von Neu-Guinea zu gedenken, von wo ich datirte Fanglisten kenne\*). Die eine ist die von Grose Smith (Nov. Zool. Vol. I, 1894) über die Doherty'schen Sammelergebnisse während der Monate September und October 1892. In diesen beiden Monaten hat Doherty 134 Tagfalter (ohne Lycaeniden und Hesperiden) gefunden, durchgehends Arten, die auch an der Astrolabebucht vorkommen, oder höchstens locale Varietäten, mit Ausnahme der *Terinos tethys* Hew., welche ich weder von der Astrolabebucht, noch Simbang erhalten habe, und meines Wissens auch nicht Kubary und Wahnes. Obwohl also die Humboldt Bay über doppelt so weit von der Astrolabebucht entfernt ist als Simbang, steht sie doch mit derselben in viel innigerer lepidopterologischer Beziehung als die letztere; sie hat eben mit der Astrolabebucht das Gemeinsame, dass sie dem Einfluss des Nordwestmonsuns offen steht und vor dem Südostpassat geschützt ist. Die Sammelmonate Doherty's fallen gerade in den Beginn der Regenzeit, des Nordwestmonsuns, der sich vielleicht in der Humboldt Bay noch etwas eher bemerklich macht als an der Astrolabebucht.

Noch weiter im Westen, an der Geelvinkbai, sammelte in den Monaten Mai bis Juli 1873 A. B. Meyer und erhielt 61 Arten, worunter schon eine ziemliche Anzahl Molukkenformen, und bezeichnender Weise gerade unter den guten Fliegern, den *Papilios* (z. B. *P. polytes*, *albinus*, *telegonus*, *lorquinianus*) und *Pieriden* (*P. aspasia*, *Tachyris albina*). Nach der Humboldt Bay schlägt nur eine Molukkenform hinüber, der *Pap. albinus* (*severus*), der an der Astrolabebucht nicht mehr vorkommt, abgesehen von der Localform des *P. fuscus beccarii*, der an der Humboldt Bay häufig ist, und den ich als Flüchtling auch an der Astrolabebucht gefangen habe. Ich will nebenbei be-

---

\*) Anmerkung. Zwei Listen, die mir noch zur Verfügung stehen, tragen beide kein Datum, aber wohl die genaue Localitätsangabe.

Die eine ist von P. C. T. Snellen, dem berühmten holländischen Entomologen, und enthält 22 Arten aus der Geelvinkbai. (Tijdschr. v. Entom. deel XXXII, pag. 377 ff. Pl. 8—10).

Die andere Liste (Proc. Zool. Sec. London Nov. 1880. p. 609, Pl. LVI) enthält von den Herren Godman und Salvin eine Beschreibung und Abbildung von 10 neuen, 30 englische Meilen landeinwärts vom Port Moresby durch Mr. Goldie gefangenen *Rhopaloceren*.



merken, dass längs der geschützten Südküste Neu-Guineas das Vordringen von Molukkenformen nach Osten gemächlicher und leichter zu sein scheint als längs der rauheren und durch einen tiefen Einschnitt — die Geelvinkbay — unterbrochenen Nordküste; denn wir finden in Britisch-Neu-Guinea mehrfach modifizierte Molukkenformen, z. B. *Pap. nicanor*, *Elymnias agondas*, *Parth. sylvia* u. A., die an der Nordküste schon von der Humboldtby an nicht mehr vorkommen.

Die grünen *Papilios* (*agamemnon*, *macfarlanei*, *wallacei*) fing Meyer dort gerade in den Monaten, wo sie an der Astrolabebucht nicht vorkommen; ich nehme darum an, dass dort andere klimatische Verhältnisse herrschen.

Die dritte Localität betrifft Britisch-Neuguinea, und zwar liegen mir von dort zwei verschiedene datirte Listen vor. Die erste ist von Fürbringer nach Professor Semons Ausbeute in der Nähe von Port Moresby (cf. Semon, Forschungsreisen, Bd. V) aufgestellt und enthält 58 Arten, gesammelt in den Monaten April und Mai 1892.

Nach den Regenlisten zu schliessen ist das Klima von Port Moresby sehr trocken (wegen der Nähe Australiens?), doch sind die Beobachtungslisten jedenfalls sehr unzuverlässig geführt, so dass man über den Wechsel der Jahreszeiten kein richtiges Bild gewinnen kann; die trockene Zeit scheint von Juni bis December zu sein. Danach wären also die Semon'schen Sammlungen zu Ende der Regenzeit gemacht.

Die Fangzeit war zu kurz und Semon wahrscheinlich ein zu ungetübter Fänger, als dass man auf diese unvollständige Liste irgendwelche Schlüsse bauen könnte.

Die zweite Liste enthält 8 Arten, die der Stabszahlmeister Matthew (Tr. Ent. S. London 1888) ebenfalls bei Port Moresby gesammelt hat, aber, und das ist wichtig, zu einer anderen Jahreszeit, im November. Die Schmetterlinge\*, fast alle als »most abundant« bezeichnet, sind mit Ausnahme der *Melan. leda* und *Junon. vellida* sämtlich Arten, die weder Semon noch der gleich zu erwähnende Tryon (von April bis Juli) aufführt. Es scheint also auch dort ein saisonweises Erscheinen und Verschwinden der Schmetterlinge stattzufinden.

---

\*) *Acraea andromache*, *Melanitis leda*, *Junonia vellida*, *Pieris teutonia*, *Pieris latilimbata*, *Pap. erithonius*, *Pap. indicatus*, *Pap. lycaon*.

Eine dritte Liste enthält 64 Arten, auf verschiedenen Expeditionen in Britisch-Neuguinea (St. Josephriver- und Manu-Manu-District, Milne- und Bentley-Bay) während der Monate Mai bis Juli 1889 zusammengebracht, und von Henry Tryon, Assistant-Curator am Queensland-Museum beschrieben in 1890. New South Wales. Annual report an Britisch New-Guinea from 1th July 1889 to 30th June 1890 with appendices. (Die Liste steht in appendix V.).

Den Semon'schen und Tryon'schen Listen gemeinsam ist die Häufigkeit des *O. poseidon* gegen Ende der Regenzeit, und die relative Seltenheit des *P. agamemnon*. Des *P. macfarlanei* (*aegisthus*) und *wallacei* erwähnen beide nicht. Merkwürdig in der Tryon'schen Liste ist noch das Vorkommen einer neuen *Terinos novae Guineae* Tryon. Auch die Herren Godman & Salvin erwähnen in ihrer Liste von im Hinterland von Port Moresby gesammelten *Rhopaloceren* einer neuen *Terinos alurgis* (Proc. Z. S. London 1880), so dass es eigentlich verwunderlich ist, dass noch keine *Terinos*-Art in Deutsch Neu-Guinea gefunden wurde.

Betrachten wir nun einmal die *Rhopaloceren*fauna im Allgemeinen. Ich habe im Ganzen gefunden 160 Arten; hierzu kommen noch 5 Arten, die von anderen Sammlern in unserm Gebiet erbeutet wurden, zusammen 165 Arten. Auf Sumatra haben Martin und ich 327 Arten gefunden, also gerade doppelt so viel; hierbei ist jedoch zu bedenken, dass unter den Sumatra-Schmetterlingen auch die ausschliesslichen Bergthiere aufgeführt sind, die selbstverständlich bei Vergleichung der beiden Listen in Abzug zu bringen sind. Es sind dies etwa 92 Arten; sonach bleiben von der Sumatrafauna zur Vergleichung mit meinen Kaiser-Wilhelmsland *Rhopaloceren* nur 235 übrig. Deutsch-Neuguinea hat also vorläufig 70 Tagfalterarten (die *Lycaeniden* und *Hesperiiden* stets ausgenommen) weniger als die gleiche Höhenzone Sumatras. Nehmen wir nun einen näherliegenden District, ein Zwischenglied zwischen den grossen Sunda-Inseln und Neu-Guinea, nämlich die Molukken. Von der grössten derselben, Ceram, liegt ein ziemlich reichhaltiges Verzeichniss aus der Feder des Herrn C. Ribbe (Iris Bd. II, pag. 187—265) vor. Es enthält 95 Arten, also noch bedeutend (fast um die Hälfte) weniger als Neu-Guinea.

Es ist interessant, diese drei Faunen in Bezug auf die Reichhaltigkeit der einzelnen Familien mit einander zu vergleichen.

Es hat	Papilionidae.	Pieridae.	Danaidae.	Satyridae.	Elymniidae.	Morphidae.	Acraeidae.	Nymphalidae.	Libytheidae.	
Sumatra . . .	36	24	22	23	7	11	1	98	10	Arten
Ceram . . . .	16	20	17	7	1	3	0	29	2	Arten
D. Neuguinea .	20	18	31	19	4	15	2	47	4	Arten

Sumatra übertrifft also Neuguinea an absoluter Artenzahl. bedeutend nur in 4 Familien, den Papilioniden, Nymphaliden, Libytheiden und Elymniiden, fast überall um das Doppelte; in den Satyriden, Pieriden und Morphiden stehen sich beide fast gleich, und nur in den Danaiden überwiegt Neuguinea um ein Beträchtliches, wenn man die Acraeiden wegen ihrer geringen Anzahl ausser Acht lassen will.

Im Verhältniss zu der Gesamtartenzahl betrachtet, hat Ceram die meisten Papilioniden und Pieriden; jede 6. Art ist ein Papilio, auf Sumatra erst jede 7., und in Neuguinea jede 8.; jede 5. Art ist eine Pieride, auf Neuguinea jede 9., und auf Sumatra erst jede 10.

Neuguinea hat die meisten Danaiden, Satyriden, Morphiden und Acraeiden. Hier ist jede 5. Art eine Danaide, auf Ceram jede 6., und in Sumatra erst jede 11. Jede 9. Art ist eine Satyride, auf Sumatra jede 10., und auf Ceram jede 13. Jede 11. Art ist eine Morphide, in Sumatra jede 21., und auf Ceram erst jede 31. Jede 82. Art ist eine Acraea, in Sumatra erst jede 235., und in Ceram kommt gar keine vor.

Sumatra hat die meisten Nymphaliden, Elymniiden und Libytheiden. Jede 2. Art ist eine Nymphalide, auf Ceram jede 3., und auf Neuguinea jede 4. Jede 34. Art ist eine Elymniide, auf Neuguinea jede 41., und auf Ceram jede 95. Jede 24. Art ist eine Libytheide, auf Neuguinea jede 41., auf Ceram jede 48. —

Obige Liste zeigt uns demnach, dass diejenigen Familien der Tagfalter, welche wir als die phylogenetisch ältesten zu betrachten gewohnt sind, nämlich die Satyriden und Morphiden, im austromalaischen Gebiet, von dem Ost-Sumatra, Ceram und Deutsch-Neuguinea gewissermassen Stichproben sind, am reichlichsten auf Neuguinea vertreten sind; es beweisen somit auch die Rhopaloceren geradeso wie die Säugethiere und

die Schlangenvelt den archaistischen Charakter der Fauna unserer Insel. Das reichliche Vorhandensein der Familie der Danaiden, die vielerseits für die jüngsten Sprösslinge des Tagfalterstammes gehalten werden, spricht nicht dagegen. Erstlich herrscht auf Neuguinea infolge klimatischer Ursachen die Tendenz zu Localvariationen, wie wir oben gesehen haben, in viel höherem Grade als z. B. in Sumatra, und das ist auf das leicht veränderliche Kleid der Danaiden gewiss von grossem Einfluss gewesen; es haben sich also auf Neuguinea mehr Arten herausgebildet wie auf Sumatra. Sodann aber sind diese neuesten aller Tagfalterfamilien mit allen Mitteln zu einem erfolgreichen Kampf ums Dasein ausgerüstet, und werden sich dort, wo sie nur einigermaßen günstige Bedingungen vorfinden, schrankenlos ausbreiten, so sehr, dass manche Entomologen sogar fürchten, die zählebigen übelriechenden Danaiden würden mit der Zeit noch die ganze übrige Rhopalocerenwelt im wahren Sinne des Wortes überflügeln und ersticken. Neuguinea liefert aber diese Bedingungen im höchsten Grade. Ueberdies will ich nicht vergessen darauf hinzuweisen, dass noch nicht alle Lepidopterologen der Ansicht huldigen, dass die Danaiden auch wirklich der jüngste Zweig am Stamme sind.

Der verringerten Artenzahl im Vergleich mit Sumatra\*) steht in Neuguinea gegenüber die vermehrte Individuenzahl. Die Schmetterlinge sind fast alle bedeutend häufiger in Neuguinea; wirklich seltene Arten, die man alle Jahre oder alle paar Jahre nur einmal fängt, wie einem das in Sumatra häufig passiren kann, giebt es fast gar nicht in Kaiser-Wilhelmsland. Beweis ist, dass ich in der Zeit von einem Jahre mit meinen unzulänglichen Hilfsmitteln bis auf fünf oder sechs Arten die ganze Rhopalocerensuite zusammenfangen konnte, und in solcher Anzahl, dass ich verschiedene meiner entomologischen Freunde mit ziemlich complete Sammlungen versehen konnte, obwohl ich für meine eigene Sammlung ganze Serien zurückbehielt.

Merkwürdig ist, wie sehr die Häufigkeit verschiedener Arten in

---

\*) Welche besonders drastisch in den hier nicht behandelten Familien der Lycaeniden und Hesperiden hervortritt. Ich habe in Neuguinea kaum 60 bis 70 Arten Lycaeniden und ca. 30 Hesperiden erbeutet, gegenüber ca. 134 Lycaeniden und 97 Hesperiden in Sumatra, die Bergthiere abgerechnet. Während die Lycaeniden jedoch in ungemein grosser Individuenzahl vorhanden sind, so dass die Artenarmuth einigermaßen verdeckt wird, sind die Hesperiden ausserordentlich spärlich und erscheint ihre Artenarmuth in um so grellerem Licht.



einzelnen Jahren auf und abschwankt, viel mehr als ich dies je in Sumatra wahrgenommen hatte. Ich will nur einige Beispiele anführen.

Der eine Fall betrifft die *Catopsilia flava*. Ich war schon ein ganzes Jahr auf Neuguinea und hatte nur ein einziges Mal einen ♂ aus der Ferne beobachtet. Da ich die Futterpflanze der Raupe von Sumatra her kannte und hier in Neuguinea dieselbe in einigen spärlichen Sträuchern wiederfand, welche ich allwöchentlich gewissenhaft absuchte, so kann ich, da die von mir controlirten Sträucher die einzigen in weitem Umkreis, vielleicht die einzigen überhaupt\*), waren, mit ziemlicher Bestimmtheit die Versicherung abgeben, dass nicht eine einzige Raupe in der ganzen Zeit dort aufgewachsen war. Im December 1894 nun wimmelten plötzlich alle Sträucher von jungen Räupchen, sie wurden förmlich kahl gefressen, namentlich nachdem ich den Chinesen verbot, die Pflanzen abzuraupen, und bald darauf flogen die Schmetterlinge so massenhaft, dass man ihnen auf Schritt und Tritt begegnete.

In Simbang scheint das Thier jahraus jahrein häufig zu sein und lebt die Raupe dort wahrscheinlich an der in der Flora von Kaiser-Wilhelmsland von Finschhafen aufgeführten *Cassia glauca* Lam. Die englischen Sammler Webster und Cotton fingen dasselbe im Februar und März 1893, und mein eigener Sammler im December und Januar 1894/95 massenhaft.

Der andere Fall betrifft *Symphædra aeropus*. Der bekannte Sammler Wahnes versicherte mich, dass er die Raupen und Puppen des Thieres, welche auf *Calophyllum inophyllum* leben, kurze Zeit bevor ich ankam, körbevollweise habe aufsammeln können; und ich habe in den fast 1½ Jahren meiner Anwesenheit dort keine 10 Stück mehr gesehen.

---

\*) Da alle mir bekannten *Cassia alata*-Sträucher, von den Chinesen zu Gemüse- oder medicinischen Zwecken gepflegt und gehegt, in den Gärten derselben oder unmittelbar nebenan standen, so habe ich Verdacht, dass die Pflanze durch die chinesischen Kulis überhaupt erst dort eingeführt wurde. In der Flora von Kaiser-Wilhelmsland von Schumann und Hollrung wird die Pflanze nicht aufgeführt. Das plötzliche massenhafte Auftreten der *C. flava*, die, wie mir von kundigen dort lebenden Europäern bezeugt wurde, vorher in Stefansort nur in sehr seltenen und spärlichen Exemplaren auftrat, könnte demnach eventuell mit der Einführung eines zusagenden neuen Futtergewächses zusammenhängen. Auf eine briefliche Anfrage schreibt mir Dr. Lauterbach soeben, dass er *C. alata* L. im Schutzgebiet auch nur im angepflanzten Zustand kenne.



Auch *Euthalia aethion* Hew., deren Raupe mit der vorigen zusammenlebt, machte es ähnlich. In der Regenzeit 1893/94 erhielt ich kaum 4 elende abgeflogene Stücke, und in derselben Saison 1894/95 an derselben Localität etwa hundert.

Vergl. auch meine Bemerkung zu *Cirrochroa regina* Feld No. 112.

Wenn ich vorhin sagte, dass der verringerten Artenzahl in Neuguinea die vermehrte Individuenzahl gegenüber stehe, so muss ich eine Familie davon ausnehmen, und das sind die Pieriden. Da ich von *Catopsilia flava* nicht weiss, welches die Regel ist, das fast totale Fehlen in 1893/94 oder das massenhafte Auftreten in 1894/95, so lasse ich diese Art einstweilen in suspenso, glaube jedoch nicht fehl zu gehen in der Annahme, dass das massenhafte Erscheinen der abnorme Zustand war. Abgesehen also von der *Catopsilia* sind die übrigen Pieriden (deren Artenzahl im Verhältniss zu der sumatranischen doch eigentlich grösser ist) allerwege nicht gemein, und nur die *Elodina* treibt sich noch in ziemlicher Häufigkeit in den Wäldern umher. Solche Wolken von Weisslingen, wie man sie in Sumatra an jedem heissen Vormittag an den feuchten Wegpfützen sitzen sehen kann, die sind in Neuguinea geradezu undenkbar, und die Weisslinge tragen hier — abgesehen von der für den Neuguineawald bezeichnenden *Elodina* — absolut Nichts zur Charakteristik der Landschaft bei.

Interessant war für mich die Beobachtung, wie rasch und total sich Schmetterlinge an ein neues Futter gewöhnen können. Die oben-erwähnte Frucht *Anona muricata* ward zweifellos erst vor wenigen Jahren an der Astrolabebucht eingeführt. Etwas weniger zweifellos ist der Umstand, dass *Pap. macfarlanei* (aegistus) schon vor dem Einführen dieser Pflanze an der Astrolabebucht gelebt hat\*); falls diese Annahme richtig ist, so muss der Schmetterling sein ursprüngliches Futter ver-

---

\*) Ich will meine Zweifel in dieser Hinsicht nicht verschweigen. *P. macfarlanei* ist ein Molukken-thier, das auf Neuguinea ausser an der Astrolabebucht nur noch im äussersten Westen vorzukommen scheint, wo es A. B. Meyer bei Rubi gefangen hat. Keine einzige der oben erwähnten mir bekannten Sammlisten erwähnt desselben, und auch auf Simbang hat mein Sammler dasselbe, so viel ich mich erinnere, nicht gefunden. Die Astrolabebucht bildet also für den Schmetterling die einzige Oase auf der ganzen grossen Insel östlich der Geelvinkbai, wo er Fuss gefasst hat, und hier lebt die Raupe auf einem nachweislich erst seit Kurzem eingeführten Fruchtbaum. Dagegen ist wieder zu berücksichtigen, dass er auf Neupommern in einer Varietät als *P. macfarlanei* seminiger wieder erscheint.

lassen und sich ganz und ausschliesslich der neuen, ihm besser zusagenden *Anona* zugewandt haben. Oder benutzt er die *Anona* nur zur Zeit, wenn sie in Saft und Blüthe steht, und macht seine Entwicklung während der heissen Zeit auf der früheren, gegen die Sonnenhitze besser acclimatisirten Futterpflanze durch, die vielleicht tief im Wald steht und uns darum die Sommergenerationen nicht vor Augen bringt, da der Schmetterling keine Ursache hat, aus dem schattigen Waldesdunkel heraus in die dürren, blüthenlosen Felder zu fliegen? Quien sabe? Das wäre auch eine Möglichkeit der Erklärung für das saisonweise Erscheinen der grünen *Papilios*. Für *Pap. agamemnon* und *wallacei*, die sicher schon vor Einführung der *Anona* dort gelebt haben, kommt mir dieselbe sogar sehr verlockend vor, denn im Verhältniss zu der Häufigkeit des *P. agamemnon* z. B. ist die Anzahl der auf der *Anona* gefundenen Raupen ausserordentlich klein; das Gros lebt wahrscheinlich auf der früheren Futterpflanze weiter und entwickelt sich dort.

Eine zweite Beobachtung, die mich höchlich interessirte, war, zu sehen, wie sich die Schmetterlinge neuen, ihnen unbekannten Blüthen gegenüber verhalten würden, und hatte ich zu dem Zwecke hauptsächlich Stecklinge der bekannten und bei den Schmetterlingen — jedoch nicht allen — beliebten *Lantana*, sowie Samen von *Zinnia elegans* mitgenommen. Beide gediehen sehr gut und namentlich die *Zinnia* bildete zuletzt, verwildernd, ganze Wiesen. Leider traf meine Krankheit und Abreise gerade in die Zeit, wo beide im schönsten Flor standen; ich konnte also nicht lange und intensiv genug beobachten, habe aber doch gesehen, dass der erste und einzige Schmetterling, der sofort beide Blumen besuchte und eifrig annahm, der *Papilio ulysses autolyces* war. Auf den *Zinnia*wiesen hielten sich oft 8—10 Stück gleichzeitig auf; auch die *Hypolimnas bolina* beehrte die Blumen nicht selten mit ihrem Besuch.

Auf den *Lantanablüthen* hatte sich ausser dem *Ulysses* nur noch ein Thier, und zwar merkwürdigerweise ein Waldthier, zu einem Versuch herbeigelassen, nämlich die *Cethosia damasippe*. Die übrigen Schmetterlinge, auch die sonst überall häufigen und gemeinen, hatten von diesen neuen Sachen bis zu meiner Abreise noch gar keine Notiz genommen.

Nun noch eine kurze Bemerkung über die Nomenclatur. Bei den Papilioniden habe ich mich ganz und voll der Rothschild'schen Terminologie in seiner wundervollen Arbeit über die östlichen *Papilios* angeschlossen, und es stieg bei Abfassung dieser Zeilen mehr als einmal

der sehnstüchtige Wunsch in mir auf, bezüglich der anderen Familien mich ebenfalls an eine solche Arbeit anlehnen zu können. Der Uebergang von dem Kapitel der Papilioniden zu dem der Pieriden oder gar der Danaiden erweckte in mir unwillkürlich das Gefühl, als ob ich aus einem schönen, wohlgeordneten und gebahnten Garten hinausträte in ein verwachsenes Dickicht, dessen enge Pfade von umgestürzten Baumleichen versperrt und von Gestrüpp überwuchert sind. Wo ist der Gärtner, der Zeit und Mittel und Kraft genug hat, auch hier Klarheit und Uebersicht zu schaffen?

Zum Schlusse sage ich noch meinen verehrten Freunden, den Herren Geheimen Sanitätsrath Dr. A. Pagenstecher in Wiesbaden, der mir seine grosse Erfahrung und Kenntniss so selbstlos zur Verfügung stellte und mir die Bibliothek des nassauischen Vereins für Naturkunde erschloss, Director Dr. Seitz vom zoologischen Garten in Frankfurt, Hauptmann Richelmann in Halberstadt und Hofrath Dr. L. Martin in München, die mir so bereitwillig die Datenlisten ihrer Neuguinea-Schmetterlinge übersandten, meinen herzlichsten Dank.

## A. Papilionidae.

### I. Troides.

1. *Priamus poseidon* Dbd. Viele Exemplare, ♂♂ und ♀♀. In den Monaten November bis März am häufigsten.

Ein ausserordentlich variables Thier, von dem Rothschild in seiner prächtigen Papilioniden-Arbeit 14 Synonyme aufführt. Die meisten ♂♂ von der Astrolabebay gleichen mehr oder minder dem Felder'schen Typus pegasus, indem sie gewöhnlich auf den Hinterflügeln oben nur 2 kleine, oft kaum sichtbare, also der Var. *cronius* Feld. sich nähernde schwarze Flecke — von gelben ist nur bei einem einzigen ein Rudiment vorhanden — zeigen. Jedoch sind auch Exemplare vorhanden, welche einen Uebergang zu der Felder'schen Var. *arruanus* zeigen.

Auch von der Localität Simbang erhielt ich solche ♂♂. Darunter befand sich jedoch ein Exemplar, welches vollkommen die Merkmale der australischen Varietät *euphorion* Gray (*cassandra* Butl.) zeigt, nämlich schwache, grüne Bestäubung der Adern auf den Vorderflügeln oben und auf den Hinterflügeln 4 schwarze Flecken, wovon der oberste fast die ganze Zelle zwischen Costal- und Subcostalader ausfüllt, sowie ein

grosser goldgelber Fleck in grünem Hofe inmitten genannter Zelle, und drei kleine ebensolche längs des Aussenrandes. Diese goldgelben Flecke sind auf der Unterseite grösser und complet (5) bis zum 2. Medianast. Der grüne Fleck in der Zelle der Vorderflügel unten ist kaum halb so gross wie bei allen übrigen Exemplaren und steht im unteren vorderen Ende der (Mittel-)Zelle.

Es ist dies das einzige derartige Exemplar unter einem halben Dutzend ♂♂ aus jener Gegend und ich erwähne es deshalb besonders, weil es die erste in der Reihe australischer Formen ist, welche die Finschhafener Gegend vor jener der Astrolabebay auszeichnen.

Zwei ♂♂ von der am Eingang der Astrolabebucht gelegenen Insel Dampier sind kenntlich durch ein etwas bläulicheres Grün und geringere grüne Bestäubung der Adern der Vorderflügel.

Von Herbertshöhe auf der Gazelle-Halbinsel Neupommerns habe ich einen ♂ von der ausgesprochenen Varietät bornemanni Pagenst., der jedoch, auch von der Seite betrachtet, beinahe keinerlei Bronze- oder Orangeglanz zeigt, auch hat das Grün keinerlei bläulichen Schimmer.

Von der kleinen Insel Matupi, nahe bei Herbertshöhe, hat mir der liebenswürdige Vertreter der Firma HERNSHEIM & Cie., Herr Thiel, zwei Pärchen von der durch Pagenstecher ebenfalls beschriebenen\*) grünlichen Varietät des Tr. urvillianus gesandt, einer Uebergangsform zu der var. bornemanni. Der eine ♂ ist völlig seegrün und hat einen grossen gelben Fleck in der Mitte des Vorderrandes der Hinterflügel oben, dem andern, etwas mehr bläulich schimmernden ♂ fehlt derselbe. Die Adern der Vorderflügel sind bei keinem bestäubt.

Die Localität Matupi, so nahe und fast ganz umschlossen von der Gazelle-Halbinsel Neupommerns — ich habe keinen Grund, nach der ausdrücklichen brieflichen und mündlichen Versicherung des Herrn Thiel an der Richtigkeit der Provenienz zu zweifeln — ist hochinteressant. Neupommern selbst scheint nur die grüne Varietät bornemanni zu besitzen, und so dürfte Matupi wohl der westlichste Punkt sein, bis zu dem die blaue urvilliana geht. Der nächste Fundort ist Mioko, und es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, dass die urvilliana durch den regen Verkehr zwischen beiden Orten und die geringe Entfernung (20 Seemeilen) von Mioko nach Matupi herübergekommen ist.

Die ♀♀, welche in der Grösse sehr variiren — das kleinste misst 74, das grösste 102 mm Vorderflügelänge — stimmen in der Astro-

\*) cf. Beiträge zur Lepidopterenfauna des malaischen Archipels (X.) über Schmetterlinge aus dem Schutzgebiete der Neuguinea-Compagnie, von Dr. Arnold Pagenstecher (Jahrbücher d. Nassauischen Vereins f. Naturkunde, Jahrg. 47, 1894).



labebay zu allermeist mit der Abbildung Felder's von arruanus ♀, verschiedene auch mit seinem pegasus ♀ überein. In Finschhafen scheinen etwas mehr dunkle Formen vorzukommen, die sich der Abbildung Kirsch's\*) nähern. Doch habe ich gerade von dorthier auch ein ♀, welches das meiste und reinste Weiss von allen auf den Vorderflügeln zeigt.

Ein weisser Fleck in der Mittelzelle der Vorderflügel findet sich bei allen, mit Ausnahme des eben erwähnten dunkelsten Finschhafener ♀, und auch das hat noch eine leichte Spur desselben. Einen weissen Fleck oder do. Färbung in der Mittelzelle der Hinterflügel besitzt kein einziges Exemplar.

Ein ♀ von Matupi zeigt in der Zeichnung einen Uebergang der arruanus — zu den urvilliana — ♀♀, indem die subapicalen Längsflecke der Vorderflügel vollkommen ausgebildet sind.

Ein ♀ von der Dampier-Insel ist beträchtlich kleiner als die ♀♀ vom Festland und nähert sich in der ziemlich reducirten, verwaschenen, bräunlich angehauchten Fleckenzeichnung und dem fahlen verschossenen Braun der Grundfarbe viel mehr den urvilliana-♀♀ als den kräftig schwarzbraunen arruana-♀♀.

Bei einem ziemlich dunkeln ♀ von Stefansort (ex larva) ist die Zeichnung der Hinterflügel oben und unten orangegelb statt weiss. ♀♀ mit grünem Schimmer, wie Kirsch eines abbildet, wurden nicht beobachtet.

Die Raupen, welche sich in genügender Häufigkeit an einer Aristolochia (momandul K. Sch.?) finden, sind leicht zu ziehen; bei nur einiger Sorgfalt liefert jede Raupe ihren Schmetterling — ein merkwürdiger Gegensatz zu den Raupen von Tr. paradiseus. Bemerkenswerth ist, dass sie, sowie die Raupen der Tr. papuensis und paradiseus, welche ich ebenfalls gezogen habe, nach jeder Häutung die abgestreifte Haut sofort mit Stumpf und Stiel auffressen. Die Puppenruhe dauert zwischen 14 Tagen und 6 Wochen, letzteres jedoch nur ausnahmsweise und, wie mir scheint, mit Vorliebe gegen Ende der Saison, im Januar und Februar. Raupen und Puppen findet man wohl das ganze Jahr über, aber in den Monaten November bis Februar weitaus am häufigsten.

Aus dem Hinterleib gefangener ♀♀, auch von papuensis und para-

---

\*) cf. Beitrag zur Kenntniss der Lepidopterenfauna von Neuguinea. Von Th. Kirsch. Mittheil. aus d. Kgl. zool. Museum Dresden, 1877.



diseus, lassen sich leicht 1—3 meist befruchtete Eier ausquetschen, welche nach 8—10 Tagen die jungen Rämpchen liefern.

2. ? **Goliath** Oberth. Der Sammler Wahnes fand ganz in der letzten Zeit seines Aufenthaltes an der Astrolabebay den ♂ zu einer neuen Troides (Ornithoptera-)Art, den Herr Röber, wie ich höre, neuerdings als *O. schönbergi* beschrieben hat, den Pagenstecher jedoch für den gesuchten ♂ zu Oberthür's *goliath* hält. Die Zukunft wird lehren, was das Richtige ist. Das ♀ hierzu, wenigstens ein Troides-♀, das weder zu *poseidon* noch zu *paradiseus* zu gehören schien, habe ich einmal 1894 in ca. 800 Fuss Meereshöhe an einem blühenden Jambosa-Baum auf einer Berglehne im Astrolabe-Hinterland fliegen sehen, mitten unter einer Schaar von *poseidon*-♂♂ und ♀♀ und *Pap autolyceus*, und habe das auch s. Z. an Dr. Staudinger berichtet.

3. **Paradiseus** Stdg. 3 ♂♂ und 2 ♀♀, wovon 2 ♂♂ ex larva, erhielt ich aus Constantinhafen und dem benachbarten Bongu durch die Herren Kubary und Wahnes; 1 ♂♀ im Hochzeitsflug habe ich selbst bei Erima an der Astrolabebay beobachtet, und 1 ♀ hat mein Schmetterlingsjäger ebendort erbeutet. Ein anderes ♀ ward während der Zeit meiner Anwesenheit in Stefansort gefangen. Die Localitäten, wo *paradiseus* vorkommt, sind also nicht bloss das Finisterre-Gebirge 2 Tage-reisen weit von Constantinhafen in 500 m Höhe, wie man in Dr. Staudinger's Aufsatz (nach den Angaben Kubary's) in der *Iris* Bd. VI, H. 2, p. 351 lesen kann, sondern auch unmittelbar an der See bei Constantinhafen und Stefansort, also in der Astrolabe-Ebene.

Die ♀♀, welche ich von Kubary und Wahnes habe, differiren insofern von den Beschreibungen Pagenstecher's und Staudinger's, als beide im Ende der Mittelzelle der Hinterflügel oben einen stecknadelkopfgrossen weissen Fleck besitzen. Da das Material beider Forscher von den gleichen Sammlern und aus den gleichen Localitäten stammt wie das meine, so kann man dieses in Hinsicht auf die ♀ *archideus*-Form von *priamus* nicht uninteressante Weisswerden der Mittelzelle der Hinterflügel zwar nicht als Local-Varietät, aber wohl als eine durch Namen zu fixirende Aberration — vielleicht ab. *punctata* — betrachten.

Die beiden in Rede stehenden Exemplare haben auch noch den von Staudinger erwähnten dritten weissen Discalfleck unterhalb der dritten Mediana der Vorderflügel. Die helle Aussenhälfte der Hinterflügel ist lange nicht so stark bestäubt wie die Pagenstecher'sche

Abbildung und reicht zwischen unterer Discoidalis und dritter Mediana überall direct bis an die Mittelzelle.

Das Exemplar, welches mein Fänger bei Erima erbeutet hat, zeigt den weissen Fleck in der Mittelzelle der Hinterflügel nicht und nähert sich dadurch dem von Pagenstecher so trefflich abgebildeten Typus\*). Doch zeigt es einige sehr bemerkenswerthe Unterschiede: Erstlich ist der Apex der Vorderflügel nicht länglich ausgezogen, sondern auffallend stumpf und rund, was ich jedoch, weil auf beiden Flügeln nicht ganz gleichmässig, vorläufig nur als Hemmungsbildung auffassen will. Die Subcostalis 3 der Vorderflügel entspringt ferner nicht genau im Apex der Mittelzelle, wie Rothschild als Characteristicum angiebt und wie es auch bei den andern beiden ♀♀ der Fall ist, sondern entspricht mehr dem Pagenstecher'schen Exemplar (auf der rechten Seite), indem sie rechts zwei, links einen Millimeter vom Stiel des 4. und 5. Astes entfernt entspringt. Es mag dies auch noch eine Hemmungserscheinung sein, und gerade das Pagenstecher'sche Exemplar sowie nach Rothschild's Bemerkung p. 896 die ♀♀ von *Tr. victoriae* zeigen uns, dass auf solche kleinen Structurdifferenzen nicht viel zu geben ist.

Was nun die Färbung betrifft, so gehört das Exemplar zu den dunkelsten ♀♀. Von dem dreitheiligen weissen Fleck der Mittelzelle der Vorderflügel fehlt der mittlere Theil gänzlich und der unterste ist sehr reducirt. Reducirt ist auch die subapicale aus 4 Flecken bestehende Querbinde und von den submarginalen Flecken des Aussenrandes ist nur ein einziger schwach vorhanden, in der Zelle zwischen 2. und 3. Medianast. Die Discalflecke in den beiden durch die 1. und 3. Mediana begrenzten Zellen sind so schwach und verwaschen wie in der Pagenstecher'schen Abbildung. Die Hinterflügel zeichnen sich dadurch aus, dass die dunkle Basalhälfte weit —  $\frac{1}{2}$  cm — über die Spitze der Mittelzelle hinausgeht, wie dies Staudinger von seinem *tithonus*-♀ sagt. Die dunkle Bestäubung der hellen Aussenhälfte ist fast so stark wie bei der Abbildung Pagenstecher's, ohne Spur von Gelb. Auf der Unterseite ist der Hauptunterschied der, dass das lebhaftes Gelb, womit die helle Binde der Hinterflügel bei allen Staudinger'schen und dem Pagenstecher'schen, sowie meinen beiden *punctata*-Stücken nach aussen begrenzt wird, hier fast ganz zu Rahm-

---

\*) l. c. Jahrg. 46, T. IV.

gelb verblasst ist. Es kann dies nicht eine Folge längeren Fliegens sein, denn das Exemplar ist ganz frisch, und die Fransen völlig intact.

Durch die hellen Schienen kennzeichnet sich das Thierchen übrigens sofort als zu paradiseus gehörig und stellt meiner Meinung nach nur eine zufällige pathologische Aberration dar.

Ei, Raupe (die Raupe zuerst erwähnt bei Pagenstecher, Nass. Jahrb. f. Nat. 1894, p. 70) und Puppe dieser merkwürdigsten aller Troides-Arten sind bereits von Kubary in der Iris Bd. VIII, 1895 beschrieben und abgebildet.

4. **Oblongomaculatus** Goeze **papuensis** Wall. Die häufigste aller Arten, sowohl ♂♂ als ♀♀. Hauptflugzeit October bis Februar.

Von den ♀♀ hat kein einziges die subdiscale schwarze Fleckenreihe der Hinterflügel oben frei, sondern dieselbe ist mehr oder weniger mit dem schwarzen Aussenrand verbunden und geht häufig ganz in ihm auf, sodass die Zeichnung dadurch nahezu die des ♂ erreicht.

Einige Exemplare weisen sich durch lebhaft weissliche Vorderhälfte der Vorderflügel als die ♀ var. *papuanus* Oberth. aus; sie sind aber nicht sehr häufig und gehen durch Zwischenglieder in die dunkle Form über.

Die Raupe, etwas heller als die von *priamus*, mehr bräunlich, mit weissem Schrägstreif in der Mitte, ist auf der auch bei den Raupen der vorhergehenden Arten beliebten *Aristolochia momandul* K. Sch. überall häufig.

Von Simbang erhielt ich das Thier nicht; ob aus Zufall?

## II. **Papilio.**

5. **Polydorus godartianus** Luc. In ganz Deutsch-Neuguinea gemein, in beiden Geschlechtern und in der von Rothschild beschriebenen Form. Das ganze Jahr hindurch, aber von Dezember bis Juni am häufigsten.

Bei manchen meiner Exemplare sind die schwarzen Zwischenaderstreifen sehr deutlich und scharf und auf den Hinterflügeln oben ist in der Regel nur der letzte Submarginalfleck angedeutet. Der weisse Mittelzellenfleck auf den Hinterflügeln oben ist durchweg gross und stark und nie zu einem schmalen Fleck reducirt, wie Rothschild bei einem Theil seiner Exemplare angiebt. Viele Exemplare, aber nur ♂♂, weisen sich durch schwärzliche Schattirung der Flecke der Hinterflügel als die aberr. *papuanus* Oberth. aus.

Von Simbang-Finschhafen habe ich eine etwas dunklere Form mit stark beschränkten und angerussten weissen Flecken der Hinterflügel, welche den Uebergang bildet zu einer ganz dunkeln Form, welche ich in 1 ♂ Exemplar von der Insel Dampier erhielt und darum

6. **Polydorus dampierensis** nennen will. ♂ Kopf und Thorax schwarz. Flügel oben mit ziemlich starkem bläulichem Schiller wie godartianus.

Oberseite: Vorderflügel blauschwarz, in der vorderen Hälfte heller, halb durchsichtig, ohne jede Spur von Weiss. Während das Schwarz der Basalhälfte bei all meinen ♂♂ von godartianus nach vorn kaum über den Ursprung der 3. Mediana hinausgeht, reicht dasselbe bei dem Dampier-Exemplar bis an den Ursprung der zweiten Mediana.

Auf den Hinterflügeln ist der weisse Zellfleck bis auf wenige gelbliche Stäubchen in der Spitze ganz verschwunden und die Discalflecken ausserordentlich reducirt und dunkel bestäubt. Der erste namentlich zwischen den beiden Discoidaladern ist nur noch als verwaschenes, dicht bestäubtes Strichelchen am Ursprung des unteren Discoidalastes zu erkennen. Die rothen Submarginalflecken der Unterseite scheinen oben nirgends durch.

Auf der Unterseite der Vorderflügel ist die weisse Zeichnung wie bei godartianus vorhanden, mit dem Unterschied, dass die Zelle ganz schwarz bleibt, und sich nur gegen die Spitze hin durch wenige weisse Stäubchen aufhellt, und dass das Schwarz der Basalhälfte auch auf der Unterseite bis zum Ursprung des 2. Medianastes reicht, was sonst bei keinem meiner ♂♂, und von den ♀♀ nur bei meinen drei Exemplaren von Simbang (und in schwachem Grad auch bei einem ♀ aus Erima an der Astrolabebay) stattfindet.

Auf der Unterseite der Hinterflügel sind sämmtliche weisse Flecke gross, scharf und deutlich wie bei gewöhnlichen godartianus-Exemplaren; der Melanismus erstreckt sich somit nur auf die Oberseite der Flügel. Die rothen Submarginalflecken sind aussergewöhnlich gross und stark, und ebenso der rothe Wisch vor dem weissen Fleck in der Zelle zwischen letzter Mediana und Submediana.

Von Herbertshöhe auf der Gazellehalbinsel Neupommerns habe ich 3 ♂♂ und 2 ♀♀ von der Rothschild'schen subspecies novobritannicus. Bei 2 ♂♂ fehlt auf der Oberseite der Hinterflügel der zweite und dritte weisse Discalfleck; bei den ♀♀ sind sie vorhanden.

Der dritte ♂ weicht vom Typus insofern ab, als der oberste Submarginalfleck auf der Unterseite der Hinterflügel anstatt roth weiss ist und



nur nach vorn leicht roth begrenzt wird. Infolge dessen ist derselbe auch oben nicht roth, sondern rechts weiss, und links weiss und rosa sichtbar. Auch der nachfolgende zweite Submarginalfleck ist nach hinten noch weiss bestäubt, während der dritte starke und der vierte leichte schwärzliche Bestäubung haben. Die Farbe dieser Submarginalflecke ist auch nicht das hübsche frische Dunkelrosa der übrigen Exemplare, sondern ein gelbliches Lackroth. Das mag jedoch eine Abblassungserscheinung sein, denn das Stück ist etwas abgefliegen.

7. **Fuscus beccarii** Oberth. Nur 3 Exemplare, 1 ♂ und 2 ♀♀, im December, Januar und Februar 1894/95 zu Stefansort gefangen. Der ♂ (ex larva) hat einfarbig dunkle Vorderflügel, die in der Basalhälfte und im Apex breit, aber fein gelblich bestäubt sind. Das crème-weisse Band auf der Oberseite der Hinterflügel ist sehr breit und geht ganz durch vom Vorder- bis zum Hinterrand; nach aussen vor demselben stehen leicht blau bestäubte Flecke. Auf der Unterseite der Hinterflügel ist dieses Band durch die breit dunklen Adern mehr in einzelne Flecke aufgelöst, die blauen Flecke sind schärfer und es findet sich auch eine Andeutung in allen Zellen von röthlichen Submarginalflecken. Auf der Unterseite der Vorderflügel stehen ca.  $\frac{1}{2}$  cm von der Zelle zwei weissliche Wische, an die gegen den Apex hin eine gelbliche Bestäubung sich anschliesst, welche sich bis zum 1. Medianast herab fortsetzt.

Die 2 ♀♀ sind stark geflogen und zerrissen, keines hat mehr die Schwänze vollständig.

Die weisse Binde der Hinterflügel ist so vollständig und breit wie beim ♂, die grossen mittleren Flecke derselben sind dunkler gelb, die blauen Wische davor nicht so stark wie beim ♂. Im Analwinkel ein bei dem einen Exemplar mehr, bei dem andern weniger deutliches rothgekerntes Auge. Das erstere hat auch auf den Vorderflügeln ein schmales, aber deutliches, hellbräunliches, subdiscales Transversalband, gegen die costa hin mit weisslichen Wischen, die unten schärfer und zahlreicher sind; das andere Exemplar hat einfarbige Vorderflügel ohne Spur eines Bandes auf der Oberseite. Auf der Unterseite stehen nahe der costa 2 weissliche Wische, in den von den letzten Subcostal-Aesten begrenzten Zellen.

Sowohl die blauen als die bleichröthlichen Submarginalflecke auf der Unterseite der Hinterflügel sind schärfer als beim ♂, und das weisse Querband ist ebenso wie bei diesem in Flecke aufgelöst.



Die Raupe lebt auf Citronen und gleicht der des *Pap. ormenus* in ihrem Jugendkleide; sie behält jedoch die kurzen Dornen derselben bis zur Verpuppung. Die Puppe ähnelt sehr der des *Pap. indicatus* Butl (cf. Mathew, Tr. E. S. L. 1888 T. VI, F. 3 b), gleicht der von *ormenus* nicht im mindesten. Die Eier sind ziemlich klein, hellgrün und werden an die Spitze des Blattes auf die Unterseite gelegt, einzeln, aber immer 6—8 an einen Busch.

Ich selbst habe nur 2 ganz abgeflogene ♀♀ erhalten (und aus deren Eiern 1 ♂) von denen ich vermuthete, dass sie mit dem Nordwest-Monsun aus der Gegend der Humboldt-Bay herübergekommen sind, wo Doherty »a long series« fing, denn weder Kubary noch Wahnes, welche doch berufsmässig jahrelang jene Gegenden absammelten, hatten Kenntniss von dem Vorkommen des Schmetterlings dort.

—Aus der Herbertshöhe auf Neu-Pommern erhielt ich durch meinen Sammler ein Exemplar des *P. cilix* G. & S. und aus Matupi ward mir durch Herrn Thiel ein ♀ von *P. woodfordi* G. & S. zugesandt.

8. **Aegeus ormenus** Quér. Häufig, von October bis März. Die bei Stefansort, also an der Astrolabe-Bay fliegenden ♂♂ gehören zum kleineren Theil der Grose-Smith'schen Form *othello* mit ganz schwarzer Oberseite der Vorderflügel, zum grösseren jedoch der Form *pandion* Wall. mit der Andeutung eines weissen subapicalen Bandes an. Beide Formen habe ich aus ein und derselben Brut Raupen gezogen.

Von Simbang erhielt ich ausschliesslich den typischen *ormenus* Quér. mit breitem weissem Subapicalband. Bei allen diesen ♂♂ Formen fehlt der rothe Analfleck der Hinterflügel auf der Oberseite.

Während bei allen meinen *pandion*- und *othello*-♂♂ von der Astrolabe-Bay das weisse Band der Hinterflügel sich constant bis zur submediana und darüber hinaus fortsetzt, reicht dasselbe bei den *ormenus*-♂♂ aus Simbang nur bis knapp hinter die 3. Medianader, bildet also damit einen gewissen Uebergang zu den Formen *aegeus* und *adrastus*.

Die gewöhnliche Form der ♀♀ an der Astrolabe-Bay entspricht etwa der Form, welche Haase *polydorus* nennt und welche Staudinger in seinem Buche als ♀ von *aegeus* abbildet, jedoch mit dem Unterschied, wie Rothschild bereits bemerkt, dass der weisse Discalfleck der Hinterflügel sich nicht bis an die costa, sondern nur bis zum unteren Subcostal-Ast erstreckt. Auch sind bei meinen ♀♀ nie 3,

sondern höchstens 2 blaue Flecke hinter dem rothen Analleck auf der Oberseite vorhanden. Thorax und Leib sind oben einfarbig braun.

Eine zweite, seltenere Form der Astrolabe-♀♀ ist hell, beinahe ganz weiss, mit mehr oder minder breitem dunkeltem Vorder- und Aussenrand. Im Analwinkel der Hinterflügel steht ein grosses Analauge, dem sich noch zwei längliche, blau oder gelb umflossene Augenflecke anreihen; der Thorax ist vorn hellbräunlich, und geht nach hinten in Ledergelb über, welche Farbe sich über den ganzen Hinterleib, mit Ausnahme der Unterseite, erstreckt. Die Aftergegend ist ganz gelb.

Im Fliegen — die helle Form fliegt mit Vorliebe in lichtem buschigem Wald, mag das Thier von Unerfahrenen trotz seiner bedeutenderen Grösse manchenmal mit einer Tenaris verwechselt werden, wozu der gelbe Hinterleib nicht wenig beitragen mag. Mir ist das nie passirt, selbst beim ersten Exemplar nicht, und den scharfäugigen Vögeln und Eidechsen wirds wahrscheinlich auch nicht passiren.

Aus Simbang, also zusammen mit den typischen ormenus-♂♂, erhielt ich neben der gewöhnlichen polydorus- und einem Stück der ganz hellen Form (die man am besten mit tenarides-Form bezeichnen würde) noch eine andere in mehreren Exemplaren, welche Rothschild in seiner Arbeit nicht erwähnt und welche etwa als Zwischenform zwischen den beiden ersterwähnten betrachtet werden kann. Ich will deshalb auch für dieselbe den Namen aberr. intermedia vorschlagen. Bei Stefansort habe ich diese Form nie gefunden.

Ich will dieselbe kurz charakterisiren:

Beide Flügelpaare verlieren den dunklen Basaltheil. Die Vorderflügel sind gleichmässig weisslich-braun, mit dunkleren Adern und Zwischenaderstreifen, nach der Basalhälfte der costa, dem apex und Aussenrand hin nur wenig dunkler werdend. Durch diese Einfarbigkeit der Vorderflügel nähert sich die Form der Rothschild'schen aberr. inornatus. Leider sagt er Nichts über das Verhalten der Hinterflügel, so dass ich nicht weiss, ob meine Exemplare diesbezüglich mit seinem Typus von inornatus übereinstimmen. Bei meinen Stücken wird oben der Basaltheil und der Analrand bis zum Analauge herab ebenfalls weiss, die costa bleibt dunkel, ebenso der Aussenrand. Von den submarginalen rothen Flecken sind nur die beiden obersten vorhanden. Der Aussenrand ist heller als bei polydorus. Das Analauge ist ebenso wie die beiden submarginalen Flecke, bleicher, mehr ockergelb.

Die Unterseite gleicht ganz der hellen Form, nur bleibt der Aussenrand der Hinterflügel bis zu der completeen Augenreihe hin dunkel. Thorax und Leib wie bei der hellen Form, also ledergelb.

Die Raupe auf Citronenbäumen zu Dutzenden, so gemein, wie etwa die memnon-Raupen in Sumatra. Die Abbildung im 8. Band der Iris T. II, F. 12 ist nicht besonders naturgetreu.

9. **Euchenor** Quér. Häufig, auch in Simbang, in lichtem, sonnigem Wald, den er in langen, wellenförmigen Sätzen rastlos durchheilt. December bis April und wieder im Juli.

Ein ♂ von Dampierinsel hat den schwarzen Basaltheil der Vorderflügel oben etwas breiter und die beiden untersten Flecken des gelben Bandes schmaler als meine Astrolabe-Exemplare. Ein ♂ von Stefansort hat dicht vor der Zelle noch ein stecknadelkopfgrosses gelbes Fleckchen.

Das Thier variirt sehr in der Grösse; mein grösster ♂ (von Dampier) misst 67, mein kleinster 52 mm; mein grösstes ♀ 75, mein kleinstes 54 mm Vorderflügelänge.

10. **Laglaizei**. Depuisset. Ein einziges Exemplar, ein ♀, von einer eingeborenen Frau mit der Hand gefangen, als es frühmorgens einsam um einen Citronenbusch flog. Ich vermuthe, dass das Thierchen in der Eierablage begriffen war, und dass die — jedenfalls grüne — Raupe auf Citronen lebt.

Das Exemplar gleicht durchaus dem von Ribbe in der Iris, Bd. I, als *P. alcidinus* Butl. beschriebenen und abgebildeten Exemplar.

11. **Ulysses autolycus** Feld. Häufig, mit grossen, bogigen Wellensätzen überall Feld und Wald absuchend, das Neue, Unbekannte mit grosser Neugier beaugenscheinend. So war der Ulysses, wie im Vorwort schon hervorgehoben, das erste Thier, welches die für Neu-Guinea neuen Blüten von Lantana und Zinnia elegans besuchte. Zwei Haupterscheinungszeiten: October bis April und Juni, Juli.

Von meinen 4 gespannten ♀♀ aus Stefansort und Simbang ist bei dreien auf der Oberseite der Hinterflügel das blaue Basalfeld zwischen den beiden Discoidaladern ausgezogen und mit dem dortigen submarginalen blauen Halbmond verbunden — aberr. conjuncta; dies Verhalten zeigen auch 2 von meinen 3 ulysses-♀♀ aus den Molukken, jedoch nicht so stark, wie die autolycus-♀♀. Bei einem sehr dunkeln ♀ aus Stefansort fehlt dies; hier ist das Blau der Hinterflügel von vorn und aussen her sehr eingeeengt und die oberen Randhalbmonde fast ganz verschwunden. Auch das Blau ist nicht so hell silbern wie bei den anderen autolycus-

♀♀, sondern kommt mehr mit der Farbe der Molukken (ulysses ==) ♀♀ überein; ausserdem besitzt es noch eine weitere Eigenthümlichkeit, welche es als eine Zwischenform zwischen ulysses- und autolycus-♀♀ erscheinen lassen. Rothschild sagt nämlich, dass ein bemerkenswerthes Kennzeichen der ulysses-♀♀ das Vorhandensein eines bräunlichen Flecks hinter der Zelle auf der Oberseite der Vorderflügel ist, der aus langen, nicht sehr dicht stehenden Haaren besteht; mit dem blossen Auge ist dieser Fleck nicht immer sichtbar, unter der Lupe jedoch stets. Bei den anderen ♀♀, mit Ausnahme von orsippus, ist dieser Haarfleck nicht vorhanden, sondern höchstens durch einige Härchen bei dem einen oder anderen Individuum angedeutet. Derselbe steht, wie ich mich bei meinen ulysses-♀♀ überzeugt habe, nahe der Zelle zu beiden Seiten der letzten mediana, mit Vorliebe jedoch unterhalb derselben. Nun findet sich bei diesen ♀♀ auch eine ähnliche Behaarung mehr oder minder ausgedehnt in den Zellen rund um die Spitze der Mittelzelle der Hinterflügel oben, deren Rothschild nicht Erwähnung thut; sie ist bei allen sehr deutlich mit der Lupe, meist aber auch schon mit blossem Auge bei seitlicher Beleuchtung wahrzunehmen.

Diese Behaarung nun sowohl der Vorder- wie der Hinterflügel fehlt bei meinen normalen autolycus-♀♀ von der Form conjuncta. Dagegen hat das eben besprochene dunkle ♀ aus Stefansort die Behaarung der Hinterflügel sehr stark und deutlich, mit blossem Auge leicht zu erkennen; auf den Vorderflügeln dagegen fehlt sie bis auf wenige Härchen in der Nähe des vorderen Randes des blauen Feldes unterhalb der letzten mediana. Ich betrachte dies Stück darum als einen Uebergang zu ulysses — aberr. transiens.

Von der Insel Dampier, welche der Astrolabebay gerade gegenüber liegt, habe ich ein ♀ (leider nur dies einzige Stück und keinen ♂ dazu) erhalten, welches nun merkwürdiger Weise diese Haarflecke auf beiden Flügelpaaren sehr stark, dem blossen Auge gut sichtbar, zeigt, und desshalb nach Rothschild entschieden als ulysses-♀ angesprochen werden muss. Dasselbe ist ausserdem noch ausserordentlich dunkel. Auf den Vorderflügeln erstreckt sich das blaue Feld verloschen kaum bis zur Hälfte der Mittelzelle, in deren beiden Ecken noch je ein blauer, verwaschener Fleck steht, in der oberen klein und undeutlich, in der unteren grösser und deutlicher. In der Randzelle unterhalb der submediana erstreckt sich das (etwas schwärzlich angeflogene) Blau so weit



wie bei normalen ulysses-♀♀, oberhalb derselben nur bis zum Ursprung der unteren mediana.

Auf den Hinterflügeln beschränkt sich das Blau nur auf die Mittelzelle und den Hinterrand. Von den blauen Randhalbmonden sind nur die beiden letzten zwischen den Medianadern vorhanden, der dritte angedeutet.

Ein fast ganz gleich gefärbtes Exemplar, dem jedoch die Flecke in den Spitzen der Zelle der Vorderflügel fehlen, das jedoch dafür auf den Hinterflügeln die Randhalbmonde bis auf den obersten complet besitzt, habe ich aus den Molukken. Der Beschreibung nach stimmt das in Rothschilds Sammlung befindliche orsippus-♀ von Alu mit dieser Form überein, die am besten mit dem Namen aberr. melanotica zu belegen wäre. Das Vorkommen dieser Form über einen so weiten Inselraum (Molukken bis Salomonsinseln) ist jedenfalls sehr merkwürdig und eine eingehende monographische Bearbeitung wäre ein höchst dankenswerthes Unternehmen.

Ich habe den Eindruck bekommen, dass die Entwicklung der Haarflecke mit dem Auftreten der Tendenz zu Melanismus in einer gewissen Correlation steht; je dunkler die Farbe, desto stärker die Behaarung.

Von Herbertshöhe auf der Gazellehalbinsel Neupommerns habe ich 3 ♂♂, leider kein einziges ♀, von der Rothschild'schen subspecies ulysses ambiguus erhalten.

12. **Aristeus parmatius** Gray. Ziemlich selten. Ich erhielt nur wenige Stücke, ♂♂, im October und November, von der Astrolabebay und Simbang.

13. **Codrus medon** Feld. Nicht sehr häufig, in den Regenmonaten, meist October bis Januar. Beide Geschlechter. Sitzt sehr gern auf dem kahlen, feuchten Sande des Meeresgestades. An der Astrolabebay und bei Simbang. Ziemlich rapider, gerader Flug.

Aus Herbertshöhe erhielt ich einige ♂♂ des *P. segonax* G. & S.

14. **Ambrax** Boisd. ist zusammen mit der hellen Form *ambracius* Wall. sehr häufig und aus einer Brut von mir gezogen. November bis April. Die Raupen leben oft bis zu einem Dutzend beisammen auf einem kleinen, kaum für so viele Fresser ausreichenden Citronenstrauch. Puppenruhe 8—10 Tage, 1 ♂ jedoch verblieb 3 Wochen in der Puppe.

Von Simbang habe ich ♂♂ erhalten, die durchweg einen sehr



starken, weissen Wisch im apex der Vorderflügel haben und dadurch sich als zur Form *ambracia* gehörig erweisen.

Aus Matupi in der Blanchebay Neupommerns erhielt ich in einem sehr schlecht erhaltenen und zerfressenen Exemplar den *P. phestus* Quér. (*parkinsoni* Honr.).

15. **Eurypilus lycaonides** Rothsch. Selten, ich habe in den 1 $\frac{1}{2}$  Jahren nur 7 ♂♂ erhalten. Die Raupe habe ich zweimal an einem niedrigen Strauch mit grossen, dicken, glänzenden Blättern in je einem Exemplar gefunden.

October und wieder im April und Mai.

16. **Sarpedon choredon** Feld. Gemein, von December bis Mai, in beiden Geschlechtern.

Auch von Herbertshöhe habe ich das Thier bekommen, v. *imparilis* Rothsch.

17. **Macfarlanei** Butl (*aegistus* Cr.). Sehr häufig, in beiden Geschlechtern. Die Raupe massenhaft auf der erst in den letzten Jahren eingeführten *Anona muricata*, im November und December.

Siehe meine Bemerkungen über das Thier in der Vorrede.

18. **Agamemnon ligatus** Rothsch. Gemein, die Raupe auf derselben Futterpflanze wie die vorige und ihr sehr stark gleichend. Bei der Zucht habe ich mehr ♀♀ als ♂♂ erhalten. Die Schwänze der letzteren sind kürzer als die der ♀♀, jedoch besitzen einige ♀♀ von Batjan und Halmahera in meiner Sammlung noch kürzere. November bis April.

Von Herbertshöhe auf Neupommern habe ich in 2 ♂♂ ♀♀ die Varietät *neopommeranus* Honr. mit fast einfarbig dunkler Oberseite der Hinterflügel erhalten.

19. **Wallacei** Hew. In beiden Geschlechtern bei Stefansort an der Astrolabebai nicht besonders selten, im November und December. Die Raupe gleicht stark den vorigen und lebt ebenfalls auf *A. muricata*.

Von Neupommern erhielt ich ♂♂ und ♀♀ von der Varietät *browni* G. & S., welche Röthschild als eigene Art ansieht. Ich kann ihm darin nicht folgen. Auf Neupommern besitzen aus irgend einer Ursache alle die grün gebänderten *Papilio*s der *wallacei-agamemnon-* und *codrus-*Gruppe eine starke Tendenz zu Melanismus. So wird *Papilio macfarlanei* Butl. auf Neupommern zu der Varietät *seminiger* Butl., *P. agamemnon* L. zu *neopommeranus* Honr. *P. wallacei* zu *browni* G. & S. und *P. codrus* zu *segonax* G. & S. Auch in der *eurypilus-*Gruppe ist dies an *P. sarpedon imparilis* Rothsch. zu bemerken, bei *P. eurypilus extensus* Rothsch., wie es scheint, jedoch nicht.

20. **Thule** Wall. 4 ♂♂ und 2 ♀♀ in der Regenzeit. Die ♂♂ haben nur 1 oder 2 undeutliche grünliche Wische in und vor dem Ende der Mittelzelle der Vorderflügel oben, und die discalen Streifen schmal und berusst bis auf das äussere Ende.

Von den beiden ♀♀ hat eines den Habitus des ♂, das andere trägt das ausgesprochene Kleid der aberr. goldiei S. & G.

## B. Pieridae.

### I. Elodina.

21. **Egnatia** Godt. In allen Wäldern gemein in beiden Geschlechtern von September bis December, dann im März und April und im Juli. Ein rastloser, aber ziemlich schwacher, etwas taumelnder Flieger.

Eine ♀ Varietät hat auf den Adern der Hinterflügel sowohl oben als unten, am stärksten auf den beiden letzten Medianästen, spärliche schwarze Punkte.

Von Herbertshöhe erhielt ich ein geflogenes ♀, welches ich für *E. primularis* Butl. halte.

### II. Terias.

22. **Virgo** Woll. Gemein, in allen Monaten, aber nur im Wald, niemals im freien Feld. Schwacher, taumelnder Flug, nicht hoch über dem Boden. Auch in Simbang.

23. **Harina** Hersf. Wenn ich dieses Thierchen, nur ein einziges Exemplar, nicht eigenhändig in dem Wald bei Erima an der Astrolabebucht gefangen hätte, im December 1893, würde ich nie an das Vorkommen desselben dort geglaubt haben. Uebrigens ist es auch, laut Kirsch, von A. B. Meyer bei Ansus gesammelt worden.

24. **Hecabe** L. Gemein, aber nur im freien Feld, den Wald meidend. Sämmtliche Exemplare ohne irgend welche Färbung des apex der Vorderflügel auf der Unterseite. November bis April. Die Raupen massenhaft auf feinblättrigen Cassia-Arten.

25. **Pumilaris** Butl. Seltener, im November bei Friedrich-Wilhelmshafen gefangen.

26. **Sp.** Eine sehr kleine, von mir nicht näher diagnosticirte Art, die vielleicht identisch ist mit der *Terias* sp., welche Grose Smith in den Novit. Zoolog. No. 1, April 1894, pag. 338 als No. 38 erwähnt. Nur 3 Exemplare, 2 ♂♂, 1 ♀, im November. Das Thier-

chen fand sich nur ganz local in Stefansort an der Astrolabebucht an den Lalanggrasstengeln längs des Weges nach der Pflanzung Erima.

Von Herbertshöhe auf Neu-Pommern erhielt ich:

*Terias hecabe* L., *T. xanthomelaena* G. & S., häufig in beiden Geschlechtern, welche im Wald dorten für *T. virgo* vicariirte, und eine dritte Art, welche der *hecabe* gleicht, aber bleicher ist, und die Oberseite, namentlich die Vorderflügel, schwärzlich bestäubt hat.

### III. *Catopsilia*.

27. **Crocale** Cr. var. *flava* Butl. Ueber das Vorkommen dieses Thieres siehe meine Bemerkungen im Vorwort.

Die ♀♀ erscheinen in 2 Formen, den Fig. 12 und 15 auf Tafel XXV in Distant's *Rhopalocera malayana* entsprechend, die letztere Form öfters mit den grossen irregulären braunen Flecken auf der Unterseite.

Die ♂♂ kommen mit und ohne ocellen auf der Unterseite hinter der Zelle der Hinterflügel vor. Beide Formen habe ich aus einer Brut Raupen gezogen, die ocellen sind also kein Artenunterschied. Die Raupe lebt, wie in Sumatra, so auch hier auf *Cassia alata* L., im December und Januar.

### IV. *Delias*.

28. **Aruna** Boisd. Nicht häufig, und stets einsam fliegend in lichtem Wald, meistens im Juli. Besucht gerne die Blüten von *Jambosa*, an denen ich das Thier noch in 1000 Fuss Höhe getroffen habe. Die Grössendifferenzen der einzelnen Exemplare scheinen ziemlich beträchtlich zu sein, von 36 bis 45 mm Vorderflügelänge bei den ♂♂; mein (einziges) ♀ hat 43 mm.

29. **Ornytion** G. & S. Nur in 2 ♂♂ vom Sattelberg (ca. 2000 F. hoch) bei Simbang, einer mit 29, der andere mit 32 mm Vorderflügelänge. Bei dem grösseren Exemplar ist die rothe submarginale Linie längs des Aussenrandes der Hinterflügel unten nur in Spuren angedeutet. Januar.

30. **Ladas** Gr. Sm. und Kirby. *Rhop. Exot.* T. V, F. 4 und 5, pag. 17. 1 ♂ vom Sattelberg bei Simbang, im Januar.

31. **Gabia** Boisd. Nicht sehr selten, im Januar und Februar, von Stephansort und Simbang. Ich erhielt ca. 15 Exemplare, darunter 5 ♀♀. Bei letzteren ist das Weiss auf der Oberseite gelblich angeflogen.

Die ♂♂ variiren auf der Unterseite, indem sie in der dunkeln Randbinde der Hinterflügel zwischen den Adern bald weissliche (var. albipunctata), bald orange gelbe (var. flavipunctata), bald gar keine Flecken haben (var. impunctata). Die ♂♂ haben 31, die ♀♀ 27 bis 32 mm Vorderflügelänge. Ein Exemplar von Simbang, ein ♂ der var. impunctata, bei dem auch auf der Oberseite die Vorderflügel die dunkle Apicalbinde längs des Aussenrandes nur bis in die Mitte zwischen der 2. und 3. mediana reicht, ist beträchtlich kleiner als die ♂♂ von Stefansort; er misst nur 28 mm Vorderflügelänge. Das ist bemerkenswerth, da gewöhnlich die Localität Simbang bedeutend grössere Exemplare liefert als die Astrolabebay.

32. **Lara** Boisd. var. *cruentata* Butl. 7 ♂♂ und 2 ♀♀. Etwas seltener als die vorige Art und mit Vorliebe in lichtem Wald, bei Stefansort und Simbang. Das ♀ ist von Grose Smith in den Nov. zool. Vol I, April 1894 pag. 334 beschrieben worden. Meine beiden ♀♀ haben die verloschenen Apicalfleckchen auf der Oberseite der Vorderflügel gelblich statt weiss.

October bis December; ♂ 35, ♀ 32—34 mm Vorderflügelänge.

33. **Geraldina**, welche Grose Smith in den Rhop. ex. Tab. V vom Sattelberg bei Finschhafen beschreibt und abbildet, habe ich nicht erhalten.

## V. **Pieris**.

34. **Abnormis** Wall. Von Simbang. 2 ♂♂, 1 ♀, im December und Januar. Diese Form kommt an der Astrolabebucht nicht vor; ich kann das mit ziemlicher Sicherheit behaupten, und Kubary, der ebenfalls an der Astrolabebucht sammelte, sandte Herrn Staudinger nur die dort häufige *euryxantha* Honr. ein. Wenn Staudinger durch Herrn v. Schönberg beide Formen zusammen erhielt, so ist das sehr leicht zu erklären. Dieser Herr erhielt sein Material durch den Sammler Wahnes, und dieser sammelte, wie ich aus seinem eigenen Munde weiss, an beiden Orten; da wurde wohl die Ausbeute von beiden durcheinander gemengt.

An der Astrolabebucht fliegt ausschliesslich die

35. var. **Euryxantha** Honr. Nicht besonders selten, in beiden Geschlechtern. Von October bis April und wieder im Juni.

Merkwürdiger Weise scheinen, nach Doherty's Ausbeute in der Humboldt bay, beschrieben von Grose Smith in den Novit. zool.

Vol. I, April 1894, pag. 334 und 335, zu schliessen, euryxantha und abnormis dort durcheinander zu fliegen.

Sehr wahrscheinlich ist abnormis eine Höhenform, denn die Küste bei Simbang ist bergig und die an der Humboldtbai, soviel ich weiss, auch — Doherty könnte hier am besten Aufschluss geben — und euryxantha die Form der Ebene. Eine Zeitform, wie Staudinger vermuthet, ist keine von beiden, denn Doherty war nur im September und October an der Humboldtby. Vergl auch meine Zeitangaben.

36. **Dohertyana** Gr. Sm. Die Beschreibung Grose Smiths passt genau auf das vorliegende Thier. Die Originalbeschreibung von P. rahel Boisd. ist mir leider nicht zur Hand.

Häufig, in beiden Geschlechtern, von November bis April und im Juli, bei Stefansort und Simbang.

Von Herbertshöhe auf Neupommern erhielt ich in grosser Anzahl ein Thierchen, welches sich mit Vorliebe an den Blüthen einer gelben rankenden Composite und auf dem feuchten Ufersand des Meeresgestades herumtrieb, aber unter ca. 100 ♂♂ nur 4 oder 5 ♀♀. Ich halte dasselbe für eine Local-Varietät der durch Salvin & Godman in den Proc. Zool. Soc. of London, 20. Febr. 1877, pag. 147 beschriebenen und T. XXIII, F. 3, 4 abgebildeten *Pieris quadricolor* von Duke of York-island, welche sich von der letzteren Art nur dadurch unterscheidet, dass sie constant im dunkeln Aussenrand der Unterseite der Hinterflügel verwaschene graue oder gelbe Flecken hat. Falls diese Localrasse noch nicht beschrieben ist, könnte man sie var. *maculata* nennen.

## VI. Tachyris.

37. **Ada** Cr. Häufig, in beiden Geschlechtern. In Stefansort flogen die ♂♂ im November und März bis Mai, die ♀♀ im April, Juni und Juli. In Simbang flogen beide im December. Die grösste Häufigkeit der Exemplare war in der Regenzeit, November, März und April.

38. **Liberia** Cr. Ich sah nur bei dem Sammler Wahnes ein einziges Stück, welches er bei Bongu gefangen hatte.

39. **Celestina** Boisd. Nicht selten, an kiesigen, schattigen Bachufern, am feuchten Sande saugend, im November und April (nur ♂♂) März (1 ♀). Mehrere andere ♀♀, die ich noch erhielt, sind leider nicht datirt.



## C. Danaidae.

### I. Danais.

40. **Purpurata** Butl. Häufig, in beiden Geschlechtern von December bis März. Die Raupe einzeln auf einer windenartigen Schlingpflanze. Das ♀ legt die grünlichen Eier einzeln an die Spitze der Unterseite der Blätter.

Ich habe das Thier auch von Dampierinsel und von Herbertshöhe erhalten.

41. **Sobrina** Boisd. Gemein, hauptsächlich in der Regenzeit, bei Stefansort, von September an.

In Simbang eine leichte Varietät.

Von Herbertshöhe erhielt ich die Butler'sche var. *sobrinoides*,

42. **Citrina** Feld., ausschliesslich in Simbang und nicht gerade selten, in der Regenzeit. In Stefansort vicariirt für dieselbe die viel hellere und weniger intensiv gelbe

43. **var. Kirbyi** Gr. Sm., die dort ebenfalls nicht selten, in beiden Geschlechtern, aber immer vereinzelt, vorkommt.

(cf. Gr. Sm. Novit. Zool. I, p. 339 und Gr. Sm. u. Kirby, Rhop. ex. Part. 37, 1896 Tab. Danainae *Asthipa* II Fig. 4—6.)

Auf dem Sattelberg in der Nähe von Simbang-Finschhafen kommt eine nahe verwandte Art vor, die Herr Gr. Sm. (l. c. p. 586 und Fig. 1—3 als

44. **Melusine** Gr. Sm. beschrieben und abgebildet hat. Oberflächlich betrachtet, gleicht das Thierchen, das in beiden Geschlechtern gleich gefärbt und gezeichnet ist, dem ♀ von *D. Kirbyi*, ist jedoch ein wenig grösser (39 mm Vorderflügelänge, gegen 38 bei *Kirbyi*-♀). 1 ♂, 6 ♀♀ gefangen im December und Januar.

Das ♂ hat keinen Duftfleck oder -tasche oder sonstige ♂-Marke, und unterscheidet sich nur durch den ganz schwach eingebuchteten Aussenrand der Vorderflügel. Da eine deutsche Beschreibung dieses offenbar sehr localen Thieres noch nicht existirt und ich dieselbe schon niedergeschrieben hatte, bevor ich entdeckte, dass Grose Smith das Thier bereits beschrieb, mag sie hier stehen bleiben.

Farbe bei allen dunkelschwarz-braun, nur bei länger geflogenen Stücken mehr bräunlich wie bei frisch ausgekrochenen ♀♀ von *Kirbyi*. Auf den Vorderflügeln ist der Discaltheil von der zweiten *mediana* an

abwärts bis zum Hinterrand, und eine submarginale Reihe von 7 runden Flecken durchscheinend perlweiss, ebenso eine subapicale Reihe von 4 länglichen Flecken, deren vorderster durch die breit schwarze zweite und dritte Subcostalader in 3 Fleckchen aufgelöst ist. Der vierte, zwischen unterem Discoidal- und 1 Medianast, ist kürzer und mehr rundlich.

Die Hinterflügel sind perlweiss, die Wurzel nur ganz schmal schwärzlich angeflogen, mit sehr breiter, bei manchen Exemplaren die Zellenspitze eben erreichender schwarzbrauner Aussenrandsbinde, deren innerer Rand von der costa bis zur 1. Mediana herab durch die schwarz berussten Subcostal- und Discoidaladern stark gezähnt und gebuchtet erscheint, während die hintere Hälfte von der 1. Mediana ab ziemlich gerade und verloschen zur Mitte des Analrandes verläuft. Bei den ♀♀ zeigt sich in der Zelle zwischen unterer Subcostalis und Discoidalis ein subapicaler, mehr oder minder deutlicher Fleck bei abgeflogenen Stücken auch noch in den oben und unten angrenzenden Zellen, von der Unterseite her durchscheinend, und längs des Aussenrandes vom apex herab eine undeutliche und nur bis höchstens zur 2. Mediana reichende Reihe feiner marginaler, weisser Punkte (bis zu 6).

Die weissen Zeichnungen haben keine Spur von gelblichem Anflug wie bei Kirbyi, dagegen durchaus einen opalisirenden, perlmutterartigen Glanz.

Die Unterseite ist gleich gezeichnet wie die Oberseite, nur ist hier die marginale Punktreihe längs des Aussenrandes beider Flügelpaare bei beiden Geschlechtern complet und auf den Hinterflügeln finden sich in den Zellen zwischen 1. Subcostalis und 1. Mediana 3 grössere submarginale Flecke, denen sich in den Zellen bis zum Analrand hin manchmal noch einige anschliessen; bei einem Exemplar ist hierdurch auch diese submarginale Reihe nahezu complet.

Kopf und Thorax schwarz, beiderseits weiss getupft, auf dem Rücken ein weisser Längsstrich. Hinterleib oben braun, dunkler als bei Kirbyi, unten weisslich, nach hinten zu bräunlich angeflogen, welcher Anflug bei Kirbyi-♀♀ fehlt; an den Seiten fein weiss getupft, was ebenfalls bei Kirbyi fehlt. Die Seiten des ersten Hinterleibssegments weiss, und oben in der Mitte ein weisser Fleck, der wiederum bei Kirbyi nicht vorhanden ist.

Fühler und Beine braun, dunkler als bei Kirbyi, die Palpen schwarz, beiderseits weiss gestreift.

45. **Mytilene** Feld. Sehr häufig. Variirt stark in der Grösse der weissen Flecken, namentlich der Hinterflügel. December bis April und wieder im Juni bis August.

Von Herbertshöhe habe ich die dunkle. var. *biseriata* Butl. erhalten, welche auf der röthlich-braunen Oberseite nur eine oft unvollständige marginale und submarginale weisse Punktreihe hat.

46. **Plexippus** L. Dieser amerikanische Vagabund kommt, nicht gerade sehr häufig, sowohl in der Astrolabebay, als in Simbang und auch auf Herbertshöhe vor, in den Monaten der Regenzeit.

47. **Chrysippus** L. Ein einziges Exemplar, im März gefangen bei Stefansort. Ich weiss nicht, ob bisher schon dieser Kosmopolit überhaupt in Neuguinea gefangen wurde. Das vorliegende Stück hat die gewöhnliche *chrysippus*-Zeichnung.

Nun erhielt ich von Simbang ein anderes Stück, welches ganz der dunkeln australischen Form

48. **Petilia** Stoll. angehört, mit sehr reducirter, weisser Zeichnung der Vorderflügel, ganz dunklem, bis in die Zelle hinein berusstem Apicaltheil derselben und breit dunkler Aussenrandsbinde der Hinterflügel oben. Semon (Zool. Forschungsreisen in Australien u. d. mal. Archipel, Jena 1895, Bd. V, pag. 230) hat 3 Exemplare dieser Form in Südost-Neuguinea bei Port Moresby gefangen.

Auf Grund dessen stehe ich nicht an, zu behaupten, dass *D. chrysippus* von zwei Seiten her in Neu-Guinea einzudringen begriffen ist, in der gewöhnlichen Form von den Molukken her nach der Astrolabebucht, und in der australischen Form von Süden her nach dem Hüongolf und Simbang.

## II. **Hamadryas.**

49. **Zoilus** Fabr. Ueberall in lichtigem Wald gemein. Ein schlechter und schwacher Flieger. Am häufigsten in den Regenmonaten: November und December, März, April und wieder im Juni.

Fast kein Exemplar gleicht exact dem andern, sondern alle zeigen die Zahl und Ausdehnung der Flecke verschieden. Diese Art ist offenbar erst in der Consolidirung begriffen.

Nur bei zweien unter 11 gespannten Exemplaren fehlt der von Staudinger als Characteristicum von *H. moorei* MacL. angegebene weisse Streif am Vorderrande der Hinterflügel unten; bei den übrigen

Stücken ist er stets, jedoch meist nur als kleiner ovaler Fleck, oft auch nur als weisses Pünktchen, vorhanden. Der weisse Fleck vor der Mitte des Vorderrandes oberhalb der Spitze der Zelle der Vorderflügel unten kann oben durchscheinen oder nicht, ebenso der weisse von der Basis ausgehende Längsstreif der Mittelzelle der Vorderflügel; meist ist nur seine Spitze oben als weisser Fleck markirt. Dieser Längsstrich kann auch, wie bei Staudinger's *Waigen-Form fallax*, ganz kurz sein und von der Wurzel getrennt.

Das weisse Feld der Hinterflügel kann die Form eines rundlichen, nach aussen convexen, grossen Fleckens, oder einer langen, ziemlich schmalen und nach aussen fast concaven Binde haben; bei einem Exemplar ist der Analrand durch eine bis zur Submediana reichende dunkle Bestäubung getrennt, ein Uebergang zu der Form

*aequicincta* G. u. S. aus dem Bismarckarchipel — ich habe ein Stück von Herbertshöhe.

Ebenso kann der dritte weisse Fleck am Vorderrand der Hinterflügel fehlen, wie Staudinger bei einem Exemplar von *Waigen* erwähnt.

Aus einer Serie von mehreren hundert Stück aus Deutsch-Neuguinea würde man sicherlich alle Uebergänge zwischen den verschiedenen bis jetzt beschriebenen Arten zusammenstellen können, volle Artberechtigung kann man denselben daher nicht zuprechen.

### III. *Euploea*.

Diese artenreiche und weitverbreitete Gattung, die mit allen Mitteln ausgerüstet für den Kampf ums Dasein wohl zuletzt von allen Schmetterlingsfamilien ins Dasein getreten ist, müsste ebenfalls einmal wieder von berufener Hand monographisch bearbeitet werden, ähnlich dem Rothschild'schen Papilionidenwerk, denn Butler's höchst verdienstvoller Versuch ist bereits veraltet. Ich war vollkommen ausser Stande, eine Anzahl meiner Neuguinea-Arten mit Sicherheit zu bestimmen und auch meinem verehrten Freund, Herrn Pagenstecher, erging es so, dem ich dieselben zugesandt hatte. Ich gebe deshalb die Liste der Gattung *Euploea* nur mit aller Reserve.

50. (*Salpinx*) *perdita* Butl. Hierunter verstehe ich die *Leucostictos*-Form mit einfarbig braunen Vorderflügeln und einem ovalen, violetten Fleck unterhalb der letzten mediana. November, December, Februar, April.



Ein ♂ hat 6 bläulich violette Submarginalflecke auf den Vorderflügeln oben, die etwas kleiner sind, als bei nachfolgendem, zu dem er offenbar einen Uebergang bildet.

In Simbang nämlich vicariat für den vorigen eine Form, welche noch 7 submarginale, weisslich violette Flecke längs des Aussenrandes der Vorderflügel oben hat, wovon der 2. und 3. stets am grössten. Den ♂ bestimmte mir Pagenstecher als

51. **Nemertes** Hbn., das ♀ als **E. dolosa** Butl.

52. (**Salpinx**) **swierstrae** Snell. Nicht häufig. 4 ♂♂, 2 ♀♀, im October, December und März. Auch diese Art geht durch Zwischenformen in die erste (*perditá*) über. Pagenstecher hat ganz Recht, wenn er diese Formen nur als verschiedene Kleider von *Leucostictos* ansieht. Die Arten dieser wohl neuesten aller Gattungen sind eben noch nicht genügend consolidirt, um sie in den starren Rahmen der Systematik hineinpressen zu können.

Die Raupe ist gelblich-weiss mit schwarzen Ringen, die nach dem Bauche zu bräunlich werden und auf dem Rücken je einen gelblich-weissen Querstreif tragen. Auf dem 1., 2., 3. und letzten Segment je 2 schwarze, lange, an der Wurzel rothbraune Stachelfäden. Lebt auf einem niedrigen Strauch mit harten, gelappten Blättern (*Delima sarmentosa* L.?), auf dem auch die Raupe von *Cyrestis acilia* lebt.

53. (**Salpinx**) **callithoë** Boisd. 1 ♂ und 2 ♀♀ von Simbang. Die beiden ♀♀ entsprechen genau der Abbildung Honrath's (Berl. Ent. Z. Bd. XXXII, Taf. V, Fig. 1), die er als *E. hansemanni* ebenfalls von Simbang-Finschhafen beschreibt, später aber wieder zu *callithoë* zieht und der ♂ der Staudinger'schen Abbildung in der Iris (Bd. VIII, Taf. IV, Fig. 1).

Diese Form habe ich an der Astrolabebucht nie gefangen, dagegen war dort die var. *hansemanni-durrsteini*, die man wohl besser nur als

54. (**Salpinx**) **var. hansemanni** Honr. bezeichnet, denn Honrath hat zweifellos das Thier früher beschrieben als Staudinger; ziemlich häufig, in beiden Geschlechtern, in der Regenzeit. Beide variiren ziemlich stark, am meisten das ♀, welches vom einfachen braunen Kleid fast ohne jegliches Blau (also noch viel dunkler, als das von Staudinger in der Iris Bd. VIII abgebildete ab. *nera*-♀) durch alle Formen in das bunte helle übergeht, welches noch heller ist, als das von Honrath 1888, Taf. V, Fig. 1 als *E. hansemanni* ursprünglich beschriebene, indem die äussere Hälfte der Hinterflügel oben von der



Mittelzelle ab ganz hell weisslich wird mit bläulichem Schimmer und do. Wischen in und um die Spitze derselben herum.

Dieses Weisswerden der Hinterflügel bei der hellen ♀♀-Form ist das einzige Merkmal, woran ich meine hansemanni-♀♀ v. d. Astrolabebay von den callithoë-♀♀ von Sinbang unterscheiden kann, indem die letzteren stets braun bleiben, was trotz aller Variation bei den Astrolabe-♀♀ (ich hatte etwa 30 Stück zur Vergleichung) nie der Fall ist.

Das von Honrath als hansemanni vera ♀ abgebildete Stück ist bereits ein Uebergang zu den Staudinger'schen ab. nera.

Dass hansemanni nur eine Varietät, und zwar eine Localvarietät von callithoë Boisd. ist, wird auch noch dadurch bewiesen, dass die Jugendstadien beider so gleich sind, dass der Sammler Wahnes sie beide (in Butaueng, von wo ich nur callithoë, und an der Astrolabebucht, von wo ich nur hansemanni erhielt, ahnungslos als ein Thier gezogen hat [s. Iris Bd. VIII, H. 1, p. 113]).

55. (**Calliploea**) **salabanda** Kirsch var. (dorica?). Häufig, an der Astrolabebucht, von October bis December, und wieder im April. Pagenstecher schreibt mir, dass Snellen das Thier so bestimmt habe, obwohl es nicht ganz mit Kirsch's Beschreibung und Abbildung stimmt. Es fehlt ihm nämlich auf der Oberseite der Vorderflügel der hellblaue Punkt im apex und der grössere blauweisse Fleck im Discus der Vorderflügel unten constant; die weissen Aussenrandspunkte auf der Unterseite der Vorderflügel sind nur bei den wenigsten Exemplaren in Spuren zu erkennen und auf der Oberseite der Hinterflügel nimmt das helle Feld des Männchenflecks meist die ganze Zelle ein. Ausserdem ist das Thierchen viel heller braun und ist kleiner als salabanda — es hat nur 25—30 mm Vorderflügelänge — zu der es jedenfalls als Localrasse gehört.

Fast alle ♂♂ Exemplare tragen auf der Oberseite der Vorderflügel diffuse blaue Stäubchen, welche bei einem Exemplar sich sogar in der Spitze der Zelle und darüber hinaus zu einem leichten, diffusen, bläulichen Fleck verdichten. Dies Exemplar ward mir von Pagenstecher als *E. jamesii* bestimmt; ich finde jedoch, dass es, sowie die 3 ♀♀, grosse Aehnlichkeit mit *E. lucinda* Gr. Sm. hat. Dasselbe Exemplar hat auch auf der Unterseite der Hinterflügel eine fast complete Reihe von bläulichen Randpunkten, welche auch eines von meinen 3, beträchtlich helleren, ♀♀ hat, bei dem überdies noch die 4 submarginalen Punkte vor dem Apex der Hinterflügel nach oben durchschlagen.

Auf Simbang tritt für diese Art eine andere, nur wenig dunklere, von derselben Grösse ein, welche von dem Apex der Vorderflügel oben und unten eine Querreihe von 4—6 weissen, auf der Oberseite blaugesäumten Flecken bis zur 2. Mediana herab hat, von denen der zwischen oberer Discoidalis und letzter Subcostalis am grössten ist. Der 1. und 6. fehlen bei einem Stück, der 5. bei einem andern, und nur eines von meinen 3 ♂♂ hat 6 Flecke, denen sich zwischen letzter mediana und submediana noch ein siebenter Doppelpunkt, ganz bläulich, anschliesst. Auch steht bei diesem an der Spitze der Zelle am Vorderande oben und unten ein bläulicher Punkt. Ausserdem schlagen auch noch die 4 submarginalen Punkte vor dem Apex der Hinterflügel unten nach oben durch, was bei den anderen beiden Exemplaren nicht der Fall ist.

Der Färbung der Oberseite entsprechend hat die Unterseite des betreffenden Stückes eine complete Reihe bläulicher Randpunkte beider Flügel, welche bei dem 2. Exemplar kleiner wird und bei dem Exemplar mit nur 4 Flecken vor dem Apex der Vorderflügel ganz fehlt. Von der submarginalen Punktreihe im Apex der Hinterflügel ist nur ein einziges Pünktchen vorhanden. Dieses letztere Exemplar hat mir Pagenstecher als

56. (*Calliploea*) *pumila* Butl. bestimmt.

57. (*Calliploea*) sp., vielleicht *dudgeonis*? Gr. Sm. oder *saundersi* Feld.?

2 ♂♂. Vorderflügelänge 35 mm. Oberseite dunkel-sammtbraun, gegen den Aussenrand hin auf den Vorderflügeln schmal, auf den Hinterflügeln breit heller. Der ♂ Duftfleck auf den Hinterflügeln bis in die halbe Zelle gehend. Die ganze Oberseite beider Flügel, mit Ausnahme der helleren Aussenränder, von der Seite gesehen mit zartem Violett übergossen. Auf den Vorderflügeln längs des Aussenrandes in den Zellen 5 submarginale violette Flecke, an die sich oberhalb des 1. Discoidalastes ein gleichgefärbter länglicher Fleck anschliesst, der quer vor dem apex zum Vorderrand läuft und durch die Gabel des 4. und 5. Subcostalastes in einen grösseren unteren und zwei kleinere obere getheilt wird.

Hinterflügel oben mit Ausnahme des bräunlichen Filzflecks ohne Zeichnung.

Unterseite einfarbig heller braun mit einem bläulichen Fleck zwischen den beiden letzten Medianästen nahe der Zelle auf den Vorder-

flügeln und einer Reihe kleiner (3—4) submarginaler Flecke in den Zellen zwischen Costalis und erster Mediana. Bei einem Exemplar ist auf den Vorderflügeln eine complete Reihe feiner Marginalpunkte längs des Aussenrandes der Vorderflügel, sowie eine incomplete zwischen den Medianästen der Hinterflügel vorhanden, bei dem andern fehlt jede Andeutung auf beiden Flügeln.

58. (**Saphara**) **treitschkei** Boisd. Sehr häufig, von September bis December, und im April.

Die *Saphara olivacea* Gr. Sm. ist nur eine Varietät des Vorigen, zu der sich unter den Stefansorter Exemplaren Uebergänge finden. Ein weisser Fleck (nie zwei) findet sich bei 1 ♂♀ im Apex der Vorderflügel oben. Der ♂ hat auf der Oberseite der Vorderflügel ausserdem nur einen weissen Fleck in der Spitze der Zelle und einen minimalen vor derselben; der grauweisse Streif unterhalb des 3. Medianastes fehlt wie bei *olivacea*.

Einige ♂♂, die ich von Simbang erhielt, sind auf der Oberseite der Vorderflügel einförmig grünlich schwarz ohne Flecken — var. *unicolor* —; nur 1 ♂ hat eine leichte Andeutung des grauweissen Streifens unterhalb der 3. Mediana und ein anderer auf der Oberseite des linken Vorderflügels ein minimales weisses Fleckchen im Discus zwischen 1. und 2. Mediana, sowie auf den Hinterflügeln oben beiderseits des Discoidalastes.

59. (**Trepsichrois**) **midamus** L. Ein kleines ♂, das einzige, welches mir in Neuguinea je zu Gesicht kam, fing ich im April 1894 zu Stefansort. Es hat 40 mm Vorderflügelänge, ist also noch etwas kleiner als mein aus hunderten ausgesucht kleinstes Sumatra-♂ (41 mm). Die hellen Flecken sind an Zahl nicht reducirt, nur etwas kleiner.

Ein noch kleineres Stück als das meinige — nur 32 mm — hat, laut Kirsch, A. B. Meyer bei Dore gefangen.

60. (**Sarobia**) **confusa** Butl. Nicht selten, in der Regenzeit.

61. (**Patosa**) **resarta** Butl.? Drei Exemplare, welche ich von Simbang erhielt, gleichen der Abbildung von *resarta*-♀ auf Taf. XIII, Fig. 14 in Bd. V der Semon'schen Forschungsreisen (Jen. Denkschr. Bd. VIII).

62. **Spec. bei resarta** Butl., ob *squalida* Butl.? Ein Exemplar von Stefansort solcherart von Pagenstecher bestimmt. Zur Erleichterung der Identification will ich hier die Beschreibung des Stückes geben.

♂. Ohne Seidenstreif auf den Vorder- oder Seidenfleck auf den Hinterflügeln. Innenrand der Vorderflügel nur sehr wenig gebogen.

Vorderflügel ziemlich lang und spitz am Apex, 42 mm lang. Farbe oben dunkel sammtbraun, nach den Rändern zu viel heller, mit Ausnahme des Innenrandes der Vorderflügel.

Im hinteren Winkel der Vorderflügel von der Submediana an aufwärts einige allmählig verlöschende, bräunlich-weiße Flecke. Auf den Hinterflügeln steht vor dem Aussenrand eine weiße, bräunlich angeflogene Binde aus 6 langovalen, paarweise in den Zellen stehenden Doppelflecken, die unterhalb des 2. Subcostalastes beginnt. Die mittleren zwei Doppelflecken sind am längsten.

Auf der Unterseite sind sämtliche Flecke deutlicher und weisser, auf den Vorderflügeln steht in der Spitze der Mittelzelle ein bläulicher Punkt, in den Zellen zwischen 1. und 3. Mediana zwei andere. Auf den Hinterflügeln steht ebenfalls in der Spitze der Mittelzelle ein blauer grösserer Fleck, umgeben von einem Kranz von 5 ebensolchen in den Zellen ringsum.

Das Braun der Unterseite ist fahler, als das der Oberseite.

63. **Palla** Butl. (payeni Feld.)? Ein ♂ von Dampier-Insel, der mir von Pagenstecher also bestimmt wurde.

Da Felder von seiner payeni 2 Seidenflecke am Innenrand der Vorderflügel angiebt, so kann das vorliegende Thier diese Art nicht sein. Dieselbe steht jedenfalls nahe der Gamatoba nox Butl. (S. Jenaer Denkschr. Bd. VIII, Semon, Forschungsreisen Bd. V, Taf. XIII, Fig. 15 ♂).

Ich beschränke mich auch hier darauf, eine Beschreibung des Stückes zu geben:

Vorderflügel ohne Seidenfleck, ziemlich gestreckt, Aussenrand ziemlich convex, Innenrand mässig gebogen. Sammtbraun, nach Aussen wenig heller. Eine submarginale aus neun weissen Flecken bestehende, vor dem Apex gebogene Fleckenreihe, von denen die 3 obersten, dem Vorderrande fast parallel stehenden die kleinsten und der 4. am grössten ist. Nach unten nehmen sie an Grösse ab. Der unterste, unterhalb der letzten Mediana, ist doppelt. Am hinteren Winkel einige marginale weiße Punkte.

Hinterflügel am Vorderrande breit hellbraun. Eine submarginale Reihe weisser Flecken, am Analwinkel beginnend, die hintersten länglich oval und in den Zellen doppelt stehend, die oberen mehr rund,



die beiden obersten in den Zellen beiderseits der Discoidalis einzeln stehend. Eine incomplete Reihe weisser Marginalpunkte. Auf der Unterseite sind die Marginalpunkte beider Flügel complet. Auf den Vorderflügeln in der Spitze der Mittelzelle ein blauer Punkt und in den Zellen beiderseits der 2. Mediana ein ebensolcher, wovon der unterste am grössten. Auf den Hinterflügeln in der Spitze der Zelle und zwischen 1. und 2. Subcostalis je ein blauer Punkt. An der Basis zwei weisse Punkte.

64. (**Gamatoba**) **aethiops** Butl. Nicht selten, in beiden Geschlechtern.

65. **sp.?** Ein ♂ vom Sattelberg bei Simbang-Fischhafen ist dunkler und kleiner und der auf der Unterseite der Vorderflügel stehende, den Seidenstreif der Oberseite, der nicht zu sehen ist, vertretende weissliche Streif länger und schmaler. Vielleicht nur eine Varietät des Vorigen.

66. **sp.?** Ein ♀, aus Erima an der Astrolabebucht, im December gefangen, gleicht dem ♀ v. **aethiops**, hat aber gestrecktere und spitzere Vorderflügel mit weniger convexem Aussenrand beider Flügelpaare. Oberseite sammtbraun, die Aussenränder heller, besonders die der Hinterflügel. Vor der Mittelzelle der Vorderflügel ein weisses Fleckchen zwischen letzter Subcostalis und 1. Discoidalis.

Unterseite ebenso, etwas heller, Innenrand der Vorderflügel und Aussenrand der Hinterflügel von der Discoidalis ab sehr hell, weisslich, der Fleckenstreif unterhalb der 3. Mediana nach hinten mit dem Randfeld zusammenfliessend.

Die gewöhnlichen Mittelzellenflecke und die dieselbe von der 1. Subcostalis bis hinter die letzte Mediana umgebenden Flecke ziemlich gross, hellviolett. Keine Marginal- oder Submarginalflecke.

67. (**Chirosa**) **netscheri** Snell. Zwei Pärchen von der Astrolabebucht, im December, Februar, April.

68. (**Chirosa**) **tenebrosa** Gr. Sm. 1 ♂ und 3 ♀♀, wovon eines der Beschreibung Grose Smiths in den Nov. Zool. V. I 1894 April, p. 341 ganz entspricht, während die beiden anderen die „additional spots“ beiderseits des oberen Discoidalastes auf der Unterseite der Vorderflügel nicht haben, und eines auch weder die marginale, noch die submarginale Punktreihe auf der Unterseite der Hinterflügel.



Diese und die nachfolgende Form sind auf der Oberseite bis zum hellen Aussenrand hin mit einem schwach dunkelvioletten Schiller über-gossen, der aber nur unter einem bestimmten Winkel sichtbar ist.

69. **(Chirosa) bruno** Gr. Sm.? Verwandt mit *E. guérini* Feld. Ein ♂♀, das in Grösse, Flügelschnitt und Brandfleck ganz mit der voranstehenden Art übereinstimmt und nur vielleicht eine Abart derselben ist.

Der ♂ ist in Simbang im December, das ♀ bei Stefansort im November gefangen. Ich gebe hier die Beschreibung beider:

♂. Oberseite dunkel sammtbraun, die Vorderflügel nach dem Aussenrand hin lichter, ebenso die Hinterflügel, welche namentlich am Analwinkel sehr viel heller sind. Der Seidenstreif lang und stark. Vor dem Apex eine Querreihe von 5 weisslich violetten Fleckchen, die bis zum 1. Medianast herabgehen. Vorderrand der Hinterflügel bräunlichgrau.

Unterseite braun, der Vorderflügel hat die Subapicalflecken wie oben, aber mehr weisslich. In der Spitze der Zelle ein blauer, weiss gekernter Punkt, vor dem in den Zellen zwischen unterer Discoidalis und letzter Mediana noch 3 weitere blaue, weiss gekernter Punkte stehen.

Hinterflügel mit blauem Fleck in der Spitze der Mittelzellē, umgeben von 5 weiteren in den Zellen ringsum.

♀. Oberseite aller Flügel mehr rothbraun, an den Aussenrändern breit heller mit leicht purpurviolettem Schimmer auf dem Aussenrand der Vorderflügel. Die bläulichen Subapicalflecken der letzteren sind um einen unterhalb des ersten Medianastes vermehrt. Auf der Unterseite der Vorderflügel sind von den subapicalen Flecken nur die 3 obersten sichtbar.

70. **sp.?** 2 ♂♂, 1 ♀ von Simbang, im December gefangen. Sammtartig schwarzbraun, unten nur wenig heller. Auf beiden Flügel-paaren auf der Oberseite eine weisse breite, submarginale Binde, deren Ränder verwaschen sind. Auf den Hinterflügeln läuft sie dem Aussenrand parallel und wird am Apex etwas verloschen; auf den Vorderflügeln beginnt sie am Innenwinkel und läuft etwas divergirend vom Aussenrand in einer Curve nach dem Vorderrand. Ueberall ist sie auf beiden Flügeln von den dunkeln Adern durchzogen und in Flecke zerlegt. Auf den Vorderflügeln unterhalb des 3. Medianastes befindet sich ein langer, ziemlich breiter Seidenstreif.

Unterseite: Farbe braun, ohne Sammtglanz, die Binden schärfer, auf den Hinterflügeln weiter an den Saum heranreichend. In der Mittelzelle beider Flügelpaare je ein blauer Fleck nahe der Spitze, vor dem beiderseits des ersten Medianastes auf den Vorderflügeln je ein blauer Punkt steht, während er auf den Hinterflügeln von 5 in den Zellen stehenden blauen Punkten umgeben ist.

Der Seidenstreif der Vorderflügel oben präsentirt sich unten als weisser länglicher, bei dem einen Exemplar sehr kleiner Streif.

Das ♀ hat nur etwas hellere und breitere Binden. Vorderflügel-länge des ♂ 41 mm.

Von den Cloudy-mountains in Britisch-Neuguinea erhielt ich dieses Thier ebenfalls.

71. (*Stictoploea*) *melina* Godt. So wurde mir von Pagenstecher eine bei Stefansort in beiden Geschlechtern sehr häufige Art mit 2 Seidenstreifen auf den Vorderflügeln bestimmt. Ich wage nicht auszumachen, welcher der Melina-Formen die vorliegende angehört, sondern beschränke mich auf eine kurze Beschreibung.

Oberseite einfarbig dunkel sammtbraun, nur auf den Hinterflügeln breit heller.

Die Unterseite sehr variabel gefleckt, mit oder ohne Fleck in der Zelle der Vorderflügel und von 2 bis 7 (bis zur Mitte der Costa hinauf) ebensolchen umgeben, Hinterflügel mit constant 5, nur bei 1 Exemplar 6 bläulichen Flecken, die ganz minim werden können.

Bei den ♂♂ fehlen überall, oben und unten, sowohl Marginal- als Submarginal-Punkte.

Die ♀♀ haben auf der Unterseite der Vorderflügel manchmal 3 subapicale Punkte und auf den Hinterflügeln unten eine mehr oder minder deutliche Reihe marginaler und dazu vor dem Apex bis zu 4 submarginaler Punkte.

Ein ♂ hat auf der Oberseite der Vorderflügel einen grösseren, violetten Fleck und längs des Aussenrandes noch Andeutungen von mehreren anderen, so dass er damit einen Uebergang bildet zu einer

72. sp., welche ich aus Simbang habe und welche eine Reihe submarginaler, lebhaft blauer, weissgekernter Flecke besitzt bis zur 3. Mediana herunter und dadurch der *St. thyrianthina* Moore ähnlich wird, welche ich von Sumatra habe.

Unterseite wie bei dem Vorigen, die Oberseite jedoch dunkler, mehr schwarzbraun.

Vorderflügelänge 42 mm, bei dem vorigen (♂♂) nur 38—41 mm.

Von Herbertshöhe auf der Gazellenhalbinsel Neupommerns habe ich erhalten:

*Crastia illudens* Butl., *Patosa obscura* Pagst., *Salpinx browni* S. u. G., *S. unibrunea* S. u. G., *S. perdita* Butl., eine *Vadebra* species, welche der *V. macleari* Butl. von Christmas Island nahe steht, und *Saphara treitschkei* Boisd. var. *caerulescens* Pagst.

## D. Satyridae.

### I. Melanitis.

73. **Leda** L. Häufig, doch nicht so sehr, wie in Sumatra, von November bis März, und wieder im Juli.

Auch in Neuguinea ist *Leda* ein halbes Nachtthier, das am liebsten spät Abends und früh Morgens fliegt.

Nur bei einem einzigen ♂ fehlen die 2 Augen auf der Oberseite der Vorderflügel, unten sind stets Ocellen vorhanden, wenn auch klein. Die ♀♀ sind ziemlich bunt und hell gefärbt. Man könnte diese Form als in der Mitte stehend zwischen *leda* und *ismene* betrachten.

74. **Constantia** Cram. Ebenfalls nicht selten, von October bis Januar und wieder im Juni. Auch bei Simbang.

75. **Crameri** Butl. Nicht selten, von October bis März. Auch bei Simbang. Das orange Querband auf den Vorderflügeln des ♂ ist bei vielen Exemplaren stark angedunkelt, die Ocellen auf der Oberseite der Vorderflügel bei den ♀♀ oft verkümmert und zu schwarzen Fleckchen reducirt.

### II. Mycalesis.

76. **Mucia** Hew. Gemein, in lichtem Wald und an schattigen Stellen überhaupt. Die ♀♀ etwas seltener, als die ♂♂. November bis August. Die weissgekernten Ocellen auf der Oberseite der Vorderflügel sind durchgehends klein und verschwinden bei manchen Exemplaren ganz.

77. **Eminens** Stgr. Häufig in beiden Geschlechtern, in lichtem Wald; Januar bis März, Mai, Juli, August, October. Auch in Simbang.

78. **Durga** Gr. Sm. u. Kirby (Rhop. exot. Part 35, Jan. 1896, Satyridae, Mycalesis, Taf. II, Fig. 7, 8, 9). Nicht selten, in schattigem

Wald nahe dem Boden fliegend. Viele ♂♂, nur 1 ♀. Fast alle im Juli gefangen, nur 1 Exemplar im December.

Meine Exemplare von Stefansort unterscheiden sich von den Grose Smith'schen Abbildungen nur im ♀-Geschlecht insofern, als die Aussenränder aller Flügel oben nicht so lebhaft ockergelb sind. Auch ist die schwarze Linie nach Aussen dicht vor den Augen nicht so scharf und gerade, wie in den Abbildungen, sondern mehr verwaschen, etwas breiter und etwas mehr gebogen und gewellt.

Durga ist in der Humboldtby auch von Doherty gefangen (September bis October 1892) und ist offenbar nur eine geringe Localform von *M. shiva* Boisd. von Salawatti.

Meine Exemplare sind ein Uebergang von *durga* (♀ mit einem Auge im Apex der Vorderflügel, die Augen der Hinterflügel mehr separirt) zu *shiva* (♀ mit einem sehr kleinen, aber deutlich gekernten zweiten Auge unten am Apicalauge der Vorderflügel und mehr zusammenhängenden Augen der Hinterflügel, deren Gelb sich berühren soll), indem sie ein rudimentäres zweites Apicalauge besitzen.

*M. Lorna* Gr. Sm. (Nov. Zool. I, p. 362) ist eine ähnliche Art.

79. **Fulviana** Grose Smith *ibid.*, p. 360. 3 ♂♂, 1 ♀. Selten, in schattigem Wald, im April, Mai und Juli. Von Doherty in der Humboldtby im September und October gefangen.

80. **Comes** Gr. Sm. habe ich nicht erhalten.

81. **Aethiops** Butl. Sehr häufig, in schattigem Wald, im November, December und April. Auch von Simbang und aus Herbertshöhe.

82. **Elia** Grose Smith (*l. c.*, p. 361). Häufig in schattigem Buschwald, März und Juni. Von Doherty an der Humboldtby im September und October gefangen.

83. **Cacodaemon** Kirsch. 5 ♂♂ ausschliesslich in Simbang gefangen, im December und Januar. Von A. B. Meyer ursprünglich im Westen bei Dore gefunden, im März.

84. **Barbara** Gr. Sm. und Kirby. 5 ♂♂. Ausschliesslich auf dem Sattelberg bei Simbang-Finschhafen gefangen, im December und Januar.

85. **Sirius** Fabr. Nur 4 ♂♂, 2 von Stefansort, 2 von Simbang, von November bis Januar. Liebt feuchte, schattige Bachufer im Wald.

86. **Phidon** Hew. Gemein, bei Stefansort und Simbang. Januar, April bis August, November. Von Doherty im September und October an der Humboldtby gefangen.

87. **Medus** Fabr. Nur 2 ♂♂ von Stefansort und 2 von Simbang, auch einige von Herbertshöhe, im Mai und December; Doherty sammelte das Thierchen auch an der Humboldt-bay im September und October.

Meine Exemplare sind kleiner als solche von Sumatra.

88. **Mineus** L. Nicht häufig, nur 6 Exemplare, davon 5 im November, 1 im April gefangen.

### III. **Lamprolenis.**

89. **Nitida** S. und G. 1 ♂, im März im Wald bei Erima an der Astrolabebay gefangen.

### IV. **Hypocysta.**

90. **Osyris** Boisd, **isis** Stgr. Häufig, im Wald bei Stefansort und Simbang, von November bis April.

91. **Hygea** Hew. Ebenfalls an beiden Localitäten, aber selten, im Januar. Nur 6 Exemplare, davon 5 ♂♂ aus Simbang, 1 ♀ aus Stefansort. Das Thierchen scheint bergige Strecken zu bevorzugen.

### V. **Ypthima.**

92. **Arctous** Fabr. An dem Gras der Wegränder bei Erima an der Astrolabebucht nicht selten, aber nur local, im Dezember und März.

## E. **Elymniidae.**

### I. **Elymnias.**

93. **Thryallis** Kirsch (**glauconia** Stdgr.) In lichtem Wald. Die ♂♂ häufig, die ♀♀ ziemlich selten. November, Januar (die meisten Stücke), März, Juli.

Die von Staudinger in der Iris Bd. VI, H. 2, p. 362 beschriebene dimorphe ♀ Form, für die man den Namen *glauconia* bestehen lassen kann, erhielt ich nur in einem einzigen Stück, dagegen 4 Stück der von Kirsch als *thryallis* beschriebenen Form. Die letztere scheint also wenigstens für die Astrolabebucht — Doherty hat an der Humboldt-bay im September und October in einer langen Reihe von Exemplaren die Uebergänge von einer Form in die andere gefunden — die normale zu sein. Sie differirt nur von der Kirsch'schen Abbildung insofern, als sie die blauen submarginalen Punkte auf der Unterseite beider



Flügelpaare auch oben mehr oder minder deutlich hat, und dass das weissbraune Feld mehr verwaschen und etwas ausgedehnter ist.

In Simbang vicariirt für *thryallis* die in Stefansort nicht vorkommende

94. **Bioculatus Ww. (agondas** Boisd.) in einer Varietät, die sehr wahrscheinlich identisch ist mit der Staudinger'schen **glaucopis**, die ebenfalls aus der Gegend Simbang-Finschhafen stammt. (Abbild. bei Kirby und Grose Smith Rhop. ex. Part 36, April 96, Tab. Elymniinae Fig. 1, 2, 3.)

Da Staudinger den ♂ damals noch nicht kannte, und Grose Smith die Art als *glaucopis* Stgr. nur nach 2 ♂♂♀♀ beschreibt, meine Exemplare aber in beiden Geschlechtern etwas in der Art der Augenbildung auf den Hinterflügeln von den G. Smith'schen Abbildungen abweichen, so mag auch meinerseits noch eine kurze Beschreibung stattfinden. Im Analwinkel der Hinterflügel des ♂ auf der Oberseite stehen nämlich in den beiden Zellen zwischen Submediana und Mediana zwei grosse schwarze, gross blau gekernte Augen, welche nach innen breit gelb gerandet sind. Oberhalb des ersten Medianastes findet sich eine sehr verloschene und spärliche blaue Bestäubung. Das gelbe Feld auf der Unterseite der Hinterflügel ist schmaler als in der Staudinger'schen Abbildung von *agondas* und gleicht mehr einem ♂, den ich von den Aru-Inseln besitze.

Das ♀ hat den Vorder- und Aussenrand der Vorderflügel oben viel stärker und breiter schwarz als die Staudinger'sche Abbildung. Die Hinterflügel sind oben schwarz, nach der Wurzel zu bräunlichgrau. In den Zellen zwischen zweiter Mediana und Submediana 2 blaugekernte Augen, wovon das untere doppelt gekernt ist. In der Zelle oberhalb der ersten Mediana eine ganz verloschene streifenförmige blaue Bestäubung.

Unterseite: Vorderflügel wie oben. Hinterflügel viel breiter schwärzlich berusst, als die Staudinger'sche Abbildung, namentlich längs des Aussenrandes bis über die Ocellen hinaus. Diese selbst sind mehr rund, nicht so ausgezogen wie bei Staudinger. An sie schliessen sich nach oben zu beiden Seiten der oberen Mediana noch verkümmerte Rudimente solcher an, von denen das untere noch kaum sichtbar blau gekernt ist. Das hinterste Auge ist wie auf der Oberseite, aber stärker, ebenfalls doppelt gekernt. Das gelbe Feld ist gegen die Staudinger'sche Abbildung sehr eingengt.

Die Grundfarbe des ganzen Thieres ist weiss mit etwas perlmutterartigem Glanz.

Zwei ♂♂♀♀, von denen eines in den Besitz Dr. Staudinger's übergegangen ist. Die vorstehende Beschreibung ist nach dem in meiner Sammlung verbliebenen ♂♀ gemacht. *Elymnias glaucopsis* ist ein von Süden her eingewandertes und local modificirtes Thier, das in Britisch-Neuguinea als *E. agondas* von April bis Juli nicht selten ist. Es kommt an der Humboldtby nicht vor, wenigstens hat es Doherty nicht gefangen.

95. **Paradoxa** Stgr., Iris Bd. VII., pag. 116. Gr. Smith, Kirby Rhop. ex. Part 36, April 96, Taf. *Elymniinae*, Fig. 4, 5. Ich habe dieses merkwürdige Thierchen nicht selbst bekommen. Staudinger erhielt sein Exemplar (♀) von Kubary aus Constantinhafen, also von der Astrolabebucht, Grose Smith vom Sattelberg bei Finschhafen.

## II. *Dyctis*.

96. **Viridescens** Gr. Sm. var. **kakarona**. Ein ♂ im December gefangen am Sattelberg, in der Eingeborenen-sprache Kákaro genannt. Ich kann denselben nur für eine Localvarietät der durch Grose Smith von der Humboldtby beschriebenen *Elymnias viridescens* halten, die ich allerdings nur aus der Beschreibung und Abbildung, nicht in natura, kenne. *E. papua*, Wall. der *viridescens* nahe stehen soll, ist mir unbekannt. Form der Flügel rundlich, gedrungen. Vorderflügel-länge 32 mm. Oberseite dunkel sammtbraun, die Costa leicht stahlblau schimmernd. Vorderflügel mit einem schmalen, am vorderen Drittel des Vorderrandes beginnenden, quer vor dem Apex vorbei und längs des Aussenrandes, immer feiner und verloschener werdend, nach der Spitze des Hinterrandes herabziehenden bläulich-weissen, verwaschenen und durch die breitbraunen Rippen getrennten Streif.

Hinterflügel vor dem Aussenrand mit einem verwaschenen schmalen hellbräunlichen submarginalen Band.

Unterseite dunkelbraun ohne Samtglanz; dieselbe Zeichnung wie oben, aber heller, mehr weisslich und am Apex der Vorderflügel etwas breiter. Vor dem Vorderrande der Hinterflügel steht in den Zellen beiderseits der zweiten Subcostal-Ader je ein kleiner blauer Fleck, dem sich auf dem rechten Flügel in der nächstfolgenden Zelle zwischen *Discoïdalis* und ersten Medianast noch ein paar blaue Stäubchen als Rudiment eines dritten anschliessen.

Körper, Palpen und Beine braun, Fühler oben dunkelbraun, unten gelblichweiss. Bezüglich der secundären Geschlechtscharactere ist zu bemerken, dass sowohl in der gelblichen Tasche am Innenrand der Vorderflügel oben, wie auf der gelblichen Männchenmarke im Costalthail der Hinterflügel oben je ein langer, dichter, brauner Haarpinsel steht.

Von Herbertshöhe erhielt ich in mehreren Exemplaren *E. holofernes* Butl.

## F. Morphidae.

### I. Morphopsis.

97. **d'Albertisi.** Mehrere ♂♂ und ♀♀, im Februar bei Erima an der Astrolabebucht. Selten.

### II. Hyantis.

98. **Hodeva** Hew. 2 ♂♂ und 1 ♀ von der typischen hellen Art, und 2 ♂♂ und 1 ♀ von der Staudinger'schen dunkeln Varietät melanomata, erstere im Dezember und Februar, letztere im Februar und Juli gefangen. Das ♀ der melanomata-Form hat das Weiss auf den Hinterflügeln oben fast ganz verloren. Der Analfleck ist oben verloschen, aber deutlich gelb umrandet. Das übrige wie beim ♂.

Von der typischen hellen Art hat ein ♂ das Analauge der Hinterflügel oben breit, der andere nur schmal gelb umrandet; beim ♀ scheint dasselbe nur von der Unterseite her durch.

Das Exemplar mit breit gerändertem Analauge, welches vom Sattelberg bei Simbang stammt, zeigt auch den ♂ Duftschuppenfleck auf den Hinterflügeln oben etwas anders als das zweite Exemplar; derselbe ist etwas beschränkter und dunkel schwarzbraun, bei dem andern ganz hellbräunlich. Es ist mir in Folge dessen sehr wahrscheinlich, dass diese beiden ♂♂ zwei verschiedene Arten, mindestens aber Localrassen repräsentiren; ein grösseres Material aus beiden Lokalitäten wird hierüber Aufschluss geben.

### III. Tenaris.

Die Tenariden sind echte Waldthiere und als solche schlechte, etwas taumelnde Flieger, die rastlos mit langen, schwerfälligen Flügelschlägen dahineilen.

99. **Catops** Ww. Die häufigste Art. October bis April und Juni. Auch auf Simbang und auf Dampierinsel.

Bei den ♂ kann das Analauge der Unterseite gross oder klein nach oben durchschlagen, als einfache gelbe Scheibe oder gelb mit bald schmaler, bald breiter schwärzlicher Umrandung, ferner gelb mit schwarzer oder schwarz mit gelber oder schwarz mit bläulicher Pupille. Nicht selten findet sich das Apicalauge auf der Unterseite der Hinterflügel entweder einseitig oder auf beiden Seiten symmetrisch durch ein kleines ungekerntes Nebenauge verdoppelt, das oberhalb oder unterhalb des grossen Auges stehen kann.

Bei den ♀♀ schlägt das Analauge seltener nach oben durch. (V. selene Ww.)

100. **Staudingeri** Honr. Nicht selten, von October bis April. Variirt ebenfalls stark. Eine Varietät, deren auch Staudinger (Iris VI, H. 2, pag. 365) kurz erwähnt, hat in beiden Geschlechtern den breiten grauen Innenrandstreif der Vorderflügel oben verloren; nur die Wurzel bleibt röthlich — var. *albicans*. Dunkle, stark schwärzlich angerusste Exemplare (var. *nigricans* in Staudinger's Preisliste?) sind häufig. Ein ♂ hat die Hinterflügel bis auf das Basaldrittel ganz dunkelbraun. Das Analauge der Hinterflügel schlägt in den allermeisten Fällen nach oben durch und ist meist complet, d. h. auf die weisse Pupille folgt ein blauer, dann ein schwarzer, dann ein gelber und ganz aussen wieder ein schwärzlicher Ring, die einzelnen Ringe und Farben jedoch in verschiedener Breite und Vollständigkeit.

Auf der Unterseite der Hinterflügel treten oft noch eine Anzahl kleiner irregulärer Augen theils selbstständig auf, am liebsten in der Zelle zwischen Discoidal- und erstem Medianast, bei einem Exemplare auch in der Zelle zwischen Submedian- und unterem Medianast, complet, d. h. mit Kern und allen Ringen, oder nur als schwärzliche, weiss gekernte Ocellen, theils als Anhängsel des Analauges, bei einem Exemplar sogar doppelt. Die Anordnung ist theils symmetrisch auf beiden Seiten, theils auch nur einseitig.

101. **Wahnesi** Heller. Nicht selten. Variirt ebenso stark wie die Vorigen.

102. **Kubaryi** Stgr. 2 ♂♂♀♀ von der Astrolabebay. Selten. Der eine ♂ hat den Innenrand der Vorderflügel oben breit grau (bis zum untern Medianast) angefliegen. Ein ♂♀ hat die Analaugen, das andere nicht. Diese Art variirt ebenfalls sehr, wie schon Staudinger sagt.



103. **Cyclops** Stgr. Von dieser Art habe ich nur ein einziges Stück, einen ♂, erhalten von der Astrolabebay.

104. **Schönbergi** Fruhst. Ein ♂♀. Selten.

105. **Dimona** Hew. 6 ♂♂ 4 ♀♀. Nicht häufig. November bis Februar, von Stefansort und Simbang. Einem ♂ von letzterer Localität fehlt der ockergelbe Anflug an der Wurzel der Hinterflügel oben und unten, auch ist das Schwarz der Flügel bedeutend dunkler als bei Stefansorter Stücken. Die von Grose Smith als Ten. dinora beschriebene Form halte ich angesichts der grossen Variabilität der Ocellen bei den Tenaris-Arten nur für eine aberrirende Form von Dimona und nicht für eine gute Art.

106. **Dina** Stgr. Nur ein einziges Stück, ein ♀.

107. **Gorgo** Kirsch. 2 ♂♂ und 4 ♀♀. Seltener als Dimona, im November, Januar, März. Die Raupe ist röthlich mit zwei hellen Seitenstreifen und ziemlich langer heller Behaarung. Auf dem Kopf stehen zwei starke, stumpfe, kurze Hörner, die in einen Kranz von 5—6 Stacheln auslaufen. Der Sammler Wahnes fand einst während meines Aufenthaltsortes in Stefansort ein Nest von nahezu 50 Stück dieser Raupen auf der Unterseite eines Pisangblattes.

108. **Bioculatus** Guér. var. **Charonides** Stgr. Nicht selten, in beiden Geschlechtern von November bis März und wieder im Mai (♀). In Simbang vicariirt für diese Form die

109. var. **Charon** Stgr. Im December gefangen.

110. **Onolaus** Kirsch (mit welcher wohl Honraths T. honrathi var. ida, B. E. Z. 1889, S. 164, aus Butaueng-Fischhafen identisch sein dürfte?) Ein ♂♀ aus Simbang, welches mehr mit der Staudinger'schen, als mit der Kirsch'schen Abbildung übereinstimmt. An der Astrolabebucht kommt diese Form nicht vor, dort tritt an deren Stelle die

111. **Honrathi** Stgr. var. **Sekarensis** Stgr. Sehr häufig, von September bis April. Diese Art variirt ebenfalls sehr in der Zahl der Augen auf der Unterseite. Auf den Vorderflügeln tritt öfters in der Zelle zwischen den beiden unteren Medianästen ein gut ausgebildetes Auge auf, das bei einem ♀ als schwarzer, weissgekernter Ocellus durchschlägt. Von diesem Auge zieht nach dem Vorderrand hin öfters eine, wenn complet, aus fünf weissen Punkten bestehende Punktreihe. Eben solche Punkte stehen auch öfters auf den Hinterflügeln zwischen Apical-



und Analauge. Das letztere ist öfters verdoppelt, indem sich analwärts noch ein kleineres Auge an dasselbe ansetzt.

Von Herbertshöhe auf Neupommern habe ich *T. anableps* Snell. v. Voll. erhalten.

## G. *Acraeidae*.

### I. *Acraea*.

112. **Sanderi** Rothsch. (*hades* Stgr. in lit.) Kommt an der Astrolabebucht nicht vor, ist jedoch bei Simbang häufig. Es ist gewiss eine Localform von *A. andromacha* Fabr., die in Britisch-Neuguinea und Australien (Sydney) sehr häufig ist.

113. **Meyeri** Kirsch. An der Astrolabebay recht selten, häufiger dagegen bei Simbang, wo mein Fänger das hübsche Thierchen aus der Raupe, die nach seiner Aussage auf Cycadeen lebt, gezogen hat. Merkwürdiger Weise hat A. B. Meyer das Thier an der Geelvinkbay gefangen, also ganz im Westen, während es meines Wissens in den zwischenliegenden Strecken noch nicht gefunden ward.

Auf Herbertshöhe fing ich in der Nähe des auf einem Hügel gelegenen Hauses des Stationsvorstehers die seltene *A. fumigata* Honr. in 4 Stücken.

## H. *Nymphalidae*.

### I. *Cethosia*.

114. **Cydippe** var. **damasippe** Feld. Häufig und überall in lichten Buschwäldern, von December bis März, Juni, Juli und October. Kommt auch in Simbang vor, dessen Exemplare sehr oft beträchtlich grösser sind als die von der Astrolabebucht. Die ♀♀ kommen dimorph vor, theils mit rother Grundfarbe wie der ♂, theils mit fahlbrauner wie das ♀ der var. *bernsteini*. *Damasippe*, obwohl ein Waldthier, war einer der ersten Schmetterlinge, welche die Blüthen der neu von mir in Neuguinea eingeführten Lantana, welche freilich kaum 300 Meter vom Waldrand abstand, besangte.

### II. *Cirrochroa*.

115. **Regina** Feld. Bei Simbang häufig, aber, wie es scheint, nicht in jedem Jahr, denn mein Sammler brachte von seinem zweimonatlichen Sammelaufenthalt daselbst kein Stück mit, während ein Jahr vorher, zur selben Zeit fast, im Februar, die englischen Sammler

Webster und Cotton eine Menge, ich glaube hunderte, fingen. An der Astrolabebucht habe ich nur ein einziges Mal ein Pärchen auf dem ersten Höhenzug im Hinterland in 1000 Fuss Höhe gefangen, im Juli.

### III. Messaras.

116. **Turneri** Butl. Nicht selten, in beiden Geschlechtern, aber vereinzelt, in lichten Wäldern, bei Stefansort und Simbang, im November, December, Mai bis August.

Von Herbertshöhe erhielt ich eine Art, welche mit der von Pagenstecher (von Kinigunang) in den Jahrb. des Nassauischen V. f. Naturkunde Jahrg. 47, 1894, pag. 75 beschriebenen identisch zu sein scheint und jedenfalls nur eine insulare Varietät der vorigen ist.

### IV. Cynthia.

117. **Arsinoë** Cr. Häufig, in beiden Geschlechtern, im October bis April und wieder im Juni. Von Stefansort und Simbang, die Exemplare von letzterer Localität oft grösser als die von der ersteren.

### V. Atella.

118. **Alcippe** Cr. Selten, in lichtem Wald, im December bei Erima an der Astrolabebucht. Nur 3 Exemplare im Ganzen.

Auch von Herbertshöhe erhielt ich 3 Exemplare mit etwas dunkleren Aussenrändern — var. *arruana* Feld?

119. **Egista** Cr. Nur ein einziges Stück, bei Stefansort im April gefangen.

### VI. Rhinopalpa.

120. **Algina** Boisd. Nicht selten, von Stefansort und Simbang, von December bis April. Die Simbang-♀♀ sind etwas grösser, die submarginalen verloschenen violetten Flecke vor den Aussenrändern der Oberseite deutlicher. Die Ocellenreihe auf der Oberseite der Hinterflügel ist nach aussen viel breiter gelb begrenzt als bei Stefansorter Exemplaren; bei einem der letzteren verbreitert sich der dunkle Aussenrand wie beim ♂, so dass die Ocellen noch innerhalb desselben stehen.

Von Herbertshöhe auf Neupommern erhielt ich einen ♂ und zwei ♀♀. welche ich nachfolgend beschreiben will:

Gleicht im Allgemeinen der vorigen Art.

♂. Oberseite sammtschwarz, die Querbänder wie bei der Vorigen, aber mehr gerade und feuriger braungelb, der schwarze Basaltheil, längs der Submediana gemessen, breiter. Auf der Unterseite sind diese Querbänder weisslichrosa, heller wie bei den Neuguineathieren, die Ocellenreihen beider Flügelpaare sehr deutlich und complet, die einzelnen Augen fast gleich gross, die der Hinterflügel gleichmässig blau gekernt und fein gelb umzogen, die Reihe auf den Vorderflügeln etwas undeutlicher mit kaum sichtbarer blauer Kernung. Ein Hauptunterschied von *algina* besteht noch darin, dass die Ocellen zu beiden Seiten der Medianader, namentlich aber die der Vorderflügel, nicht stärker blau oder weiss gekernt sind als die übrigen, und zwar bei beiden Geschlechtern.

Die submarginale braune Linie beider Flügel ist beiderseits mit bräunlichvioletten Wischen eingefasst. Ferner ist die Ocellenreihe der Vorderflügel stark geschwungen, dem Rande parallel, was bei den Neuguineathieren nicht der Fall ist; hier ist sie mehr gerade.

♀ Die gelben Binden der Oberseite sind schmaler, die der Vorderflügel läuft mehr gerade, so dass der dunkle basale Theil breiter wird. Der innere Rand der gelben Binden ist bei *algina* wenig gezackt und namentlich auf den Hinterflügeln ganz gerade, bei den Herbertshöher ♀♀ jedoch unregelmässig stumpf gezackt. Die gelbe Binde der Hinterflügel berührt mit ihrem äusseren Rande gerade die (nicht gekernt) Ocellenreihe. Die weisslichen Wische und Flecken im Apicaltheil der Vorderflügel verloschen und undeutlich.

Auf der Unterseite steht auf den Hinterflügeln die helle Querbinde näher an der Ocellenreihe und folgt mit ihrem äusseren Rand dem Bogen derselben, während derselbe bei *algina* gerade verläuft und gewissermaassen die Sehne des Ocellenbogens bildet.

Salvin und Godmann erwähnen dieses Thier von Duke of York „and its Neighbourhood“ als *algina*? Sollte diese Form, die ich für eine gute Art halte, noch keinen Namen besitzen, so möchte ich sie nach dem inländischen Namen für Herbertshöhe, Kókopo, Kokopona nennen.

## VII. *Symbrenthia*.

121. *Hippoclus* Cr. var. *Hippocrates* Stgr. (Iris Bd. IX, p. 234). Nur ein einziges Stück, ein ♂, aus Simbang, das auf der Unterseite nicht von saftig gezeichneten Stücken von *hippoclus* Cr. abweicht. Auf der Oberseite sieht das Thierchen jedoch aus, als sei es ein *hippoclus*, dem bedeutende Theile der schwarzen Zeichnung verloren gegangen sind, und ich kann es bei der bekannten Variabilität der Art desswegen allein noch nicht mit Staudinger für eine gute Art, sondern nur für eine Varietät halten.

Auf den Vorderflügeln hängen die drei vom Vorder- und Innenrand und von der Wurzel ausgehenden gelbbraunen Theile unter sich

breit zusammen. indem weder die von der Basalhälfte des Innenrandes ausgehende schwarze Zeichnung, die nur bis zur mittleren mediana geht, noch die schwarze Zeichnung der basalen Hälfte des Vorderrandes bis zum breit schwarzen Aussenrande heranreicht.

Staudinger hat seine 3 Stücke durch Walnes von der Astrolabe-bucht erhalten. Grose Smith führt in dem Verzeichniss der von Doherty in der Humboldtby gemachten Sammlungen nur *S. hippocla* Feld. an.

### VIII. *Junonia*.

122. *Orithyia* L. var. *Novae Guineae*. Selten, bei Stefansort, (wo das in rapider Flucht dahineilende Thierchen all meiner Fangversuche spottete) und Simbang. Das einzige an letzterem Ort erbeutete Exemplar, ♂, hat die Unterseite der Hinterflügel viel lebhafter und bunter gezeichnet als meine zahlreichen Exemplare von andern Localitäten und erinnert dadurch an die var. *celebensis* Stgr. Die helle discale Querbinde, welche vom Vorderrand zum Analwinkel zieht, ist reinweiss und die feine braune Linie, welche sie aussen begrenzt ist fast gerade, bei den übrigen Exemplaren von den Sundainseln, Ceylon etc. stark gewellt und gebogen. Die Ocellenreihe ist von viel mehr Orange umgeben.

Ich weiss nicht, ob das Thierchen schon früher auf Neuguinea gefunden wurde. Grose Smith, Kirsch und die andern mir bekannten Autoren, welche Neuguinea-Schmetterlinge bearbeitet haben, führen dasselbe nicht auf. Kirby erwähnt dasselbe nur von Ambon und den Molukken, Staudinger auch von Nordaustralien.

123. *Vellida* Fabr. var. *Astrolabiensis*. Gemein auf allen Wegen, das ganze Jahr hindurch. Die Neuguineathiere unterscheiden sich von einem Pärchen, welches ich aus Australien habe, nur durch die Unterseite der Hinterflügel, welche deutlicher und bunter gezeichnet sind und eine Reihe von Ocellen haben, von denen die oberhalb des Discoidal- und des dritten Median-Astes stets blau gekernt und grösser sind als die übrigen. Fürbringer (s. Semon Forschungsreisen, Bd. V, p. 240) gibt von einem bei Port Moresby gefangenen ♂ an, er sei nicht so scharf gezeichnet, wie die beiden andern Stücke von Queensland.

Da das Thierchen in einem beträchtlichen Theil der Südseeinseln vorkommt und überall, wie Matthew (*Life-histories of Rhopalocera*, Tr. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 146) sagt, „considerably vary in different

localities“, so wäre es höchst wünschenswerth, wenn Jemand sich der Mühe unterziehen wollte, diese Formen ebenfalls monographisch zu sichten und festzulegen.

Aus Herbertshöhe auf Neupommern habe ich drei Exemplare, die ich als var. *bismarckiana* bezeichnen will, bei denen die zwei Augen auf der Oberseite der Hinterflügel durch den rothen Hof zusammenhängen; nur bei einem Exemplar sind sie durch die dunkle 1. Mediana fein getrennt. Bei meinen Neuguinea-Stücken sind sie immer getrennt. Ausserdem tritt bei meinen Neuguineathieren vor den beiden Ocellen der Vorderflügel oben in der Mitte noch ein gelblichweisser Fleck auf, als Fortsetzung der schmalen discalen aus drei gelblichweissen Flecken bestehenden Querbinde, welche vor dem Ende der vorderen Hälfte des Vorderrandes quer zu dem rothen Feld zwischen beiden Ocellen zieht. Dieser gelblichweisse Fleck fehlt bei den Herbertshöher Exemplaren, die Binde endigt also am Innenrand des die Ocellen einschliessenden rothen Feldes. Die Unterseite gleicht der Neuguineaform.

124. *Antigone* Feld. var. *Jona* Gr. Sm. Nicht selten. Im November, December und März, bei Stefansort und Simbang.

### IX. *Precis*.

125. *Ida* var. *Zelima* Fabr. Häufig, an der Astrolabebucht und bei Simbang. November, December.

Von Herbertshöhe habe ich zwei Exemplare, die sich nur dadurch von den Neuguineathieren unterscheiden, dass sie vor dem Aussenrand der Hinterflügel unten zwei, resp. drei weissliche Flecke haben, während bei den Neuguineastücken nur einer, und dieser selten, auftritt.

### X. *Apaturina*.

126. *Erminea* var. *Papwana* Ribbe (Iris Bd. III, p. 84) 10 ♂♂, 2 ♀♀. Nicht selten, im Wald bei Friedrich-Wilhelmshafen und Stefansort. Der Schmetterling setzt sich mit grosser Vorliebe mit stets geschlossenen, zusammengeduckten Flügeln, oft kopfabwärts, an die Baumstämme und ist recht scheu, ein rapider Flieger, der aber nur aufgescheucht von seiner Kunst Gebrauch zu machen scheint, und gerne wieder zu seinem alten Platz zurückkehrt. November, Februar, Juli.

Bei Herbertshöhe auf Neupommern habe ich eine Art in 4 ♂♂ und 1 ♀ erhalten, die von der typischen *erminea* nur wenig verschieden ist, indem die Querbinde der Vorderflügel rein weiss ist und das ♀ keine Spur von Rothbraun auf der Oberseite der Flügel zeigt. Doch sind leichte Differenzen vorhanden, welche die Fixirung dieser Localrasse unter eigenem Namen — var. *neopommerania* — gestatten.



Erstlich ist auf der Unterseite der Apicaltheil des Vorderflügels und der Hinterflügel gelbbraun und nicht graubraun; nur bei einem einzigen papuana-♂ aus Stefansort wird die Farbe ebenfalls gelbbraunlich. Ferner steht in der Mittelzelle der Vorderflügel unten ein s-förmig gekrümmter schwarzer Querfleck; derselbe ist bei neopommerania stets in 2 Flecke getrennt, bei papuana, ribbei und erminea nur hie und da bei den ♀♀, bei meinen ♂♂ nie.

Das constanteste Merkmal bietet jedoch der Fleck oberhalb des ersten Medianastes in der weissen Querbinde der Vorderflügel. Derselbe ist bei den drei genannten Arten stets kürzer und verkümmerter — am stärksten bei ribbei, am wenigsten bei erminea — als der unmittelbar oberhalb zwischen den Discoidalästen befindliche; bei neopommerania ist er jedoch constant länger und oben durch die gelbbraune Grundfarbe eigenthümlich eingekerbt. Ferner reicht er hier so weit nach innen wie der oberhalb stehende Fleck und ragt über den untenan befindlichen hinaus; bei den drei vorgenannten Arten erreicht sein Innenrand jedoch kaum die Mitte des oberen Flecks und steht mit dem Innensaum des unteren gleich. Er scheint dadurch bei diesen wie nach vorn aus der Reihe gedrückt und der Rand der weissen Fleckenbinde erscheint dadurch stark nach aussen gebuchtet; bei neopommerania steht er in der Reihe und sowohl Innen- als Aussenrand erscheinen dadurch gerade.

## XI. Hypolimnas.

127. **Bolina** L. Häufig, von November bis März, überall, auch in Simbang, und Herbertshöhe (im Mai). Die ♀♀ sind wie die javanischen auf den Vorderflügeln mit Braungelb und an den Rändern der weissen Zeichnungen breit mit hellblauem Schiller geschmückt. Ein einziges ♀, eine melanotische Aberration, hat die Oberseite einfarbig dunkel mit blaugrünlichem Schiller ohne weisse oder gelbe Zeichnung, nur die subdiscale weisse Flecken- und Punktreihe ist auf den Vorderflügeln vorhanden.

128. **Misippus** L. Gemein, am häufigsten in den Regenmonaten.

129. **Alimena** L. Gemein, besonders an buschigen Waldrändern. Es kommen die beiden von Grose Smith (Nov. Zool. V. I 1894, p. 350) erwähnten ♀♀ Formen vor. November bis März, auch in Simbang.

Von Herbertshöhe erhielt ich 2 ♂♂ und 1 ♀ von *H. inexpectata* S. u. G.

130. **Anomala** Wall. var. **Lutescens** Butl.? Vier braune Stücke oben mit bleichem Aussenrand der Hinterflügel und eines auch mit bleichem breitem Apex der Vorderflügel gehören dieser Form an. Auf

der Unterseite wird der Aussenrand der Hinterflügel fast weiss, nur von den dunkeln Rippen durchzogen. Im December und Mai.

Die Raupe gesellschaftlich zu hunderten auf einem Strauch, im Mai. Sie ist schwarz, mit zwei langen, schwarzen dornigen Stacheln auf dem gelben Kopfe, gelben Seitenflecken und gelben, ästigen, gegen die Spitze hin breit schwarzen Dornen.

Die Misippus-Raupe ist braun, mit gelbem Kopf und zwei langen, ebenfalls gelben Stacheln darauf. Beide sind mit langen, starren, dornartigen Haaren besetzt. Auf den Leibesringen stehen hellbräunliche, mit schwarzen langen Dornen besetzte Stacheln.

Lebt auf Bataten und einer kleinen, überall unkrautartig wuchernen Portulacae.

Die Raupe der nachfolgenden Art ist ähnlich der letzteren, aber grösser und hat zwei ockergelbe, breit am Kopf beginnende Seitenstreifen.

131. **Pithöka** Kirsch. Selten, bei Stefansort, im October, Februar und März. Meine 6 Exemplare, 4 ♂♂ und 2 ♀♀, welche mir von Kubary als *H. cinnamomea* (Autor?) bezeichnet wurden, stimmen mit der Kirsch'schen Beschreibung überein; nur sind die von ihm angegebenen 3 weissen Pünktchen vor dem Apex bei 3 ♂♂ verschwunden, und bei dem 4. nur ganz schwach sichtbar; bei dem einen ♀ schlägt die ganze Reihe bis zum Innenrand von der Unterseite her incomplet durch. Ferner haben die ♂♂ den hinteren Winkel der Vorderflügel und den Aussenrand der Hinterflügel oben leicht, bei einem Exemplar sogar sehr stark und lebhaft, braungelb. Auch die ♀♀ sind etwas mehr ins Gelbliche spielend als die Kirsch'sche Abbildung, ja das eine hat den Aussenrand der Hinterflügel oben und unten breit weisslichbraun gefärbt.

Salvin und Godman beschreiben von „Duke of York and its neighbourhood“ eine *H. unicolor* ♂, welche offenbar nur eine Localform der vorigen ist und deshalb nur Anspruch auf den Rang einer Localvarietät gegenüber der (älteren) Kirsch'schen *pithöka* hat. Der ♂ unterscheidet sich nur durch die einfarbig braune Oberseite, welche jedoch die submarginale bläuliche Punktreihe der Unterseite aller Flügel auch auf der Oberseite zeigt. Das ♀ hat ihnen nicht vorgelegen; ich habe 2 Exemplare desselben aus Herbertshöhe erhalten; sie gleichen ganz dem ♂, nur sind die Punkte vor dem Aussenrand weiss statt bläulich.

132. **Deois** Hew. v. **Panopion** Gr. Sm. Von der Astrolabebay und Simbang, in beiden Geschlechtern, nicht sehr häufig, im December,

Februar bis April. Die ♂♂ etwas häufiger als die ♀♀. Die Ocellenreihe auf der Oberseite der Hinterflügel beim ♀ kann complet sein oder, wie beim ♂ stets, beiderseits des 1. Medianastes fehlen.

## XII. *Parthenos*.

133. **Aspila** Honr. Hauptsächlich im November. An der Astrolabebucht fast gemein — die Raupen in grösseren Gesellschaften zusammenlebend —, fehlt jedoch bei Simbang vollkommen und wird dort ersetzt durch

134. **Sylvia** Cr. var. **Salentia** Hopff. Ein offenbar von Süden her eingewandertes Thier, das von den Engländern in Br. Neu-Guinea auf Kiwai island und am Flyriver gefangen ward. An der Humboldt bay hat Doherty nur *aspila* gefunden.

Ein ♂ von Herbertshöhe derselben Art gleicht mehr der var. *brunnea* Stgr.

## XIII. *Heleyra*.

135. **Chionippe** Feld. 2 ♂♂, von Simbang, wahrscheinlich vom Sattelberg. Bei Stefansort habe ich das Thierchen nicht beobachtet.

## XIV. *Neptis*.

136. **Consimilis**, Boisd. Häufig.

Von Herbertshöhe erhielt ich in 1 ♂ Exemplar ein nahe verwandtes Thierchen, und ausserdem eine grosse, schwarz-weiße, mit *heliopolis* Feld. verwandte Art.

137. **Shepherdi** Moore. Häufig, im November, April, Juli.

138. **Dorcas** Gr. Sm.? Ich wage nicht bestimmt die Identität dieses Thierchens mit der Grose Smith'schen Art zu behaupten. Sie unterscheidet sich von *N. praslini* hauptsächlich durch das weisse Band auf den Hinterflügeln anstatt des ovalen Discalflecks. Die Art variirt sehr.

Gemein. November, Juni, Juli.

139. Ein (einziges) Exemplar — von Simbang — hat statt der weissen Binde auf den Hinterflügeln einen ovalen, von allen Seiten von den breit schwarzen Bändern umgebenen Fleck und könnte darum die echte *praslini* oder wegen des breit schwarzen Vorderrandes der Hinterflügel unten die *brebissonii* Boisd. sein.

140. **Venilia** L. Die gemeinste aller Neptisarten an der Astrolabebucht. October, November, April, Juni, Juli.

141. **Satina** Gr. Sm. Nicht selten. Juni, Juli, December. Ein Exemplar hat die weisse Zeichnung auf der Oberseite sehr schmal und beschränkt.

142. Eine nahe verwandte Art, etwas kleiner und von etwas spitzerem Flügelschnitt habe ich aus Simbang in 2 ♂♂. Oberseite genau gezeichnet wie *satina*. Die Unterseite jedoch zeigt bemerkenswerthe Verschiedenheiten: In der Mittelzelle der Vorderflügel befindet sich kein bläulicher, durch 2 feine Linien, manchmal auch gar nicht, getrennter Längswisch, sondern drei durch breite Zwischenräume getrennte, scharf umschriebene stahlblaue Flecke; der innerste an der Basis strichförmig, der mittlere quadratisch, der äusserste dreieckig mit der Spitze nach vorn.

Auf den Hinterflügeln reicht die weisse Mittelbinde nicht wie bei *satina* bis zum Vorderrand, sondern nur bis zwischen die beiden Costaladern; der Vorderrand bleibt schwarz. Die beiden bläulichen Aussenrandsbinden bestehen aus viel kleineren und durch grössere Zwischenräume von einander getrennten Flecken.

Ich glaube nicht, dass diese Art die *N. brebissonii* Boisduval's sein kann, von der mir augenblicklich weder Exemplare noch Originalbeschreibung zur Verfügung stehen, weil sie Dr. Staudinger in seinem Buch mit *N. praslini* als »sehr nahestehend« vergleicht; *praslini* hat jedoch so eigenthümlich geschnittene und abgestumpfte Vorderflügel, dass *brebissonii* für unser Thier zur Vergleichung nicht in Betracht kommen kann, denn dasselbe hat noch spitzere Vorderflügel als *satina*.

Vorderflügelänge 29 mm, *N. satina* hat 32 mm.

Falls die Art neu sein sollte, mag sie nach ihrem Fundort **Sim-banga** heissen.

## XV. **Symphaedra.**

143. **Aeropus**. Hew. In dem Jahre vor meiner Ankunft in Neu-Guinea war der Schmetterling und dessen Raupe bei Stefansort so gemein, dass, wie mir Herr Wahnes erzählte, man die Raupen und Puppen körbevollweise von den *Calophyllum*-Bäumen hätte abnehmen können. In den ersten Monaten nach meiner Ankunft, November und December 1893, sah ich auch noch ziemlich viele Exemplare in dem Strandwald, dann war und blieb das Thier bis zu meiner Abreise im Februar 1895 selten und vereinzelt. November, December, März. Ich habe das Thier auch von Dampier-Insel erhalten.



Die ♀♀ fanden sich mit weisser und gelber Zeichnung, die letzteren waren die häufigeren.

### XVI. Dichorrhagia.

144. **Ninus** Feld. var. **Distinctus** Rüb. (Ent. Nachr. 1894, No. 23, p. 365 f). Nicht häufig, im Wald. Ein rapider Flieger, der aber gewöhnlich nicht weit sich entfernt. Juni, Juli, November.

### XVII. Euthalia.

145. **Aethion** Hew. October und Januar. In manchen Jahren sehr häufig, in manchen kaum 1 Stück zu sehen. Nach Wahnes soll die Raupe mit der Aeropus-Raupe zusammen an Calophyllum leben und sich verpuppen.

Die ♀♀ variiren auf der Unterseite der Hinterflügel in Betreff des gelben Flecks an der Zellenspitze beträchtlich; bald fehlt er völlig, bald ists nur ein undeutlicher Wisch, bald ein oder mehrere grössere, scharf umschriebene, schwefelgelbe Flecke.

### XVIII. Cyrestis.

146. **Acilia** Godt. Gemein, im November, December, Februar bis April. Die Raupe lebt auf demselben rauhblättrigen Strauch wie *S. swierstrae* (S. N. 51). Auch von Dampier-Insel und Simbang.

Von Herbertshöhe habe ich 3 Expl. der var. *fratercula* S. & G. erhalten.

147. **Achates** Butl. (*nedymnus* Feld). Nicht selten, auf dem Kies schattiger Waldbachufer, im December, April, Mai, Juli.

### XIX. Doleschallia.

148. **Bisaltide** var. **nacar** Boisd. Häufig. Viele ♂♂, jedoch nur 3 ♀♀. December bis Februar. Auch von Simbang.

Alle *Doleschallia*-Arten von Neu-Guinea, die ich vielfach beobachtet und gefangen habe, sind ausserordentlich kräftige und rapide Flieger, rascher als die Thiere in Sumatra und Java. Ich habe sie auch niemals sich an Baumstämme, Holzwände u. dergl. Gegenstände setzen sehen, wenn dieselben aufrecht standen, wohl aber, wenn sie auf dem Boden lagen. Am liebsten setzten sich die Thiere auf die Erde selbst.

149. **Dascon** S. & G. Nicht selten, in Stefansort und Simbang, auch die ♀♀. October bis Februar.

150. **Dascylus** S. & G. Häufig, an denselben Orten. Viele ♂♂, aber nur 2 ♀♀. October bis Februar.



Die Raupe ist bräunlichgrau mit helleren Längsstreifen, stahlblauem, zwei dornige Stacheln tragendem Kopf und stahlblauen gedornen Stacheln.

151. **Noorna** Gr. Sm. u. Kirby. Häufig, in beiden Geschlechtern an denselben Orten. November bis April und wieder im Juli.

Aus Hubertshöhe habe ich einen *Doleschallia*-♂ erhalten, der nur der ♂ zu der von den Herren Salvin und Godmann nach 1 ♀ beschriebenen *D. browni* sein kann. Es folgt hier die Beschreibung:

Ein grosses Thier von 44 mm Vorderflügelänge. Grundfarbe oben ein feuriges Gelbbraun, das gegen die Wurzel der Vorderflügel und auf den Hinterflügeln nur wenig dunkler wird. Apicalhälfte der Vorderflügel von etwa der Mitte des Vorderrandes an bis breit zum Innenwinkel herab sammtschwarz. Vorderrand gelbbraun, im vordersten Drittel schwarz. Vor dem Apex steht eine convex nach aussen gebogene Reihe von 4 weissen Fleckchen parallel zum Aussenrand und dahinter vor der Zellenspitze zwei gelbbraune Flecke.

Hinterflügel genau gezeichnet wie beim ♂ von *gurelca* Gr. Sm. Unterseite der Flügel wie beim ♀ (s. d. Abb. b. S. u. G. Pr. z S. 1877, p. XXII cf. 4), jedoch mit viel dunklerer und lebhaft mit Bleichviolett gemischter Grundfarbe, wodurch sich die grellweissen Zeichnungen und Flecken viel schärfer hervorheben als beim ♀.

Ferner erhielt ich von dort noch 2 ♂♂ und 1 ♀ von *D. gurelca* Gr. Sm.

## XX. *Mynes*.

152. **Geoffroyi** Quér. Ein einziges ♂ von Stefansort. Die *Mynes*-Arten sind alle Waldthiere und haben keinen besonders kräftigen, etwas dem der Pieriden ähnlichen Flug. Nur die ♀♀ gehen auf der Suche nach der Nahrungspflanze hie und da auch auf das freie Feld hinaus.

153. **Guèrini** var. **Semperi** Stgr. 4 ♂♂, 3 ♀♀, wovon eines mit schwarzer Unterseite der Hinterflügel. November, Januar, April.

154. Ein ♀ von Stefansort, ziemlich klein (31 mm Vorderflügelänge), hat oben die schwarze Randbinde der Vorderflügel wie das *semperi*-♀; dieselbe wird jedoch — der einzige Fall unter meinen zehn Stücken obiger Arten — am Hinterflügel vom Discoidalast ab nach hinten sehr schmal, fast fadenförmig und ist nach innen breit blau schattirt. Auch ist der rothe Basalfleck der unten bis auf den Aussenrand ganz schwarzen Hinterflügel sehr klein. Zu welcher Art dies ♀ gehört, kann ich nicht ausmachen.

155. **Websteri** Gr. Sm. u. Kirby. In einem Pärchen von Simbang woher auch die Herren Autoren ihr ♀, das sie irrthümlich als ♂ be-

schreiben, erhielten. Ihre Beschreibung und Abbildung stimmt nämlich ganz genau mit meinem ♀ überein.

Der ♂ hat auf der Unterseite die schwarzen Querbinden auf den Vorderflügeln am Vorderrande etwas breiter und die bräunlichen Längsstreifen der Hinterflügel sind heller und deutlicher. Die submarginale Aussenrandsbinde der letzteren, in welcher die blauen Flecke stehen, ist metallisch golden.

Von Herbertshöhe erhielt ich ein ♀, das ich für das noch unbeschriebene ♀ zu *M. cottonis* Gr. Sm. u. Kirby (Rhop. ex. Nymph. T. II. Mynes T. 5, 6, p. 6) halte.

Oberseite: Vorderflügel in der Basalhälfte weiss, in der Zelle, an der Wurzel und nach aussen breit milchblau übergossen. Aussenhälfte schwarz, verloschen in die weisse Basalhälfte übergehend. Vor dem Apex eine breite weisse Querbinde mit verwaschenen, ebenfalls bläulich schimmernden Rändern.

Hinterflügel weissgelblich mit breiten schwarzen, nach innen breit, nach aussen schmal und verloschen bläulich eingefasstem Aussenrand.

Unterseite: Vorderflügel schwarz. Innenrand und Discus bis zur zweiten Mediana hinauf und von deren Ursprung an schräg bis zum hinteren Winkel herab weiss. Die subapicale Querbinde der Oberseite breiter und schärfer und sich längs des Aussenrandes schmal zum Innenwinkel herabziehend. Am Ende der Zelle, etwas in diese hineingreifend, ein weisser und vor der Mitte des Aussenrandes in dem schwarzen Feld ein rother Fleck.

Hinterflügel leuchtend chromgelb, mit schwarzer Aussenrandsbinde, welche die gewöhnliche grüngelbe Mynes-Zeichnung einschliesst. Vor dem Rand eine feine weissliche Linie. Der Vorderrand von der Basis bis zur schwarzen Aussenrandsbinde lebhaft gelbroth.

Herr Röber in den Entomol-Nachr. XX 1894, No. 23, p. 360 bis 66 beschreibt noch von Constantinhafen an der Astrolabebay eine 156. *M. Schönbergi* und 157. *M. Wahnesi*, die ich beide nicht selbst erhalten habe.

## XXI. *Prothoe*.

158. *Hewitsonii* Wall. Seltener als die nächstfolgende Art, von November bis Januar und wieder im Juli.

Die *Prothoes* sind echte Waldthiere, die nie ins Freie herausgehen und ziemlich schlechte Flieger, viel schlechter, wie z. B. die *Pr. angelica* Butl. in Sumatra. Ich habe die Neuguineathiere auch niemals an die Baumrinde aufrechtstehender Bäume sich setzen sehen, wie ihre sumatranischen Verwandten, mit dem Kopf nach abwärts, sondern immer nur an die Zweige oder Blätter der Büsche.

Die ♀♀ kommen in drei Formen vor:

Bei der einen Form sind die Zeichnungen auf der Oberseite rein rahmgelb mit grünlichem, bei der zweiten milchweiss mit stark bläulichem Schimmer. Die dritte Form ist eine merkwürdige Combination zwischen beiden: Die Zeichnungen der Vorderflügel sind weiss wie bei der zweiten und die der Hinterflügel rahmgelb wie bei der ersten Form.

Ein kleiner ♂ aberriert insofern, als er die Binde der Vorderflügel, namentlich unterhalb des ersten Medianastes kaum halb so breit hat wie gewöhnliche Exemplare; auch fehlt ihm die submarginale Punktreihe. Er nähert sich also etwas der von Grose Smith beschriebenen var. *dohertyi*, welche im Röber'schen Sinn einen Uebergang bildet zu der folgenden Art. (S. Röber's Aufsatz l. c. p. 360—63).

159. **Australis** Quér. Nicht häufig, von November bis März. Röber hat bei 24 ♂♂ und 9 ♀♀ Uebergänge zwischen beiden Arten gefunden, auch Staudinger (s. Iris Bd. VII H. 1, p. 120), der die Uebergangsstücke als Hybriden anzusehen geneigt ist; ich selbst jedoch an einem ebenso starken Material nicht, wenn man den ebenerwähnten sich der Form *dohertyi* nähernden ♂ nicht als solchen betrachten will, oder einen *australis*-♂, der zwischen der *submediana* und 3. *mediana* der Vorderflügel einen unregelmässigen länglichen, schmal mit dem untersten Submarginalfleck zusammenhängenden Fleck besitzt. Eine rudimentäre Binde ist nirgends vorhanden. Wohl aber finden sich bei den *australis*-♀♀ alle Uebergänge zwischen dem typischen ♀ und der var. *schönbergi* Honr.

## XXII. Charaxes.

160. **Affinis** var. **Papuensis** Butl. Viele ♂♂, 5 ♀♀. Februar, April, Juli, August, October, December. Das Thier scheint sonach sehr regelmässige zweimonatliche Generationen zu besitzen.

161. Von Simbang erhielt ich ein ♂♀, das mit keiner der mir zugänglichen Beschreibungen von braunen Charaxesarten stimmt.

Der ♂ hat etwa den Habitus des Vorigen, jedoch sind die Vorderflügel am Apex etwas spitzer und mehr ausgezogen, der Aussenrand etwas mehr concav. Ch. *papuensis* hat 44 mm, der Simbang-♂ 46 mm Vorderflügelänge.

Die schwarze Aussenrandsbinde der Vorderflügel oben ist kaum  $\frac{2}{3}$  so breit wie bei *affinis*. Vor dem Apex dicht am Innensaum stehen vom unteren Discoidalast aufwärts drei verloschene, gelbbraune Halbmonde. Die schwarze, aus 2 feinen, nach oben stark verdickten

schwarzen Linien bestehende Makel am Ende der Mittelzelle wie bei affinis. In der Mitte zwischen ihr und der schwarzen Aussenrandsbinde befindet sich noch ein schwarzer, breit strichförmiger Fleck in der Zelle zwischen den Discoidalästen, an welchen sich oberhalb noch ein zweiter pfeilförmig dreieckiger, mit der Spitze nach hinten gerichteter Fleck anschliesst. Vor der Zelle schlägt die auf der Unterseite in der Mitte des Flügels befindliche, vom unteren Discoidalast gegen die Mitte des Innenrandes herabziehende Linie fein durch, was bei keinem meiner papuensis-♂♂ sonst der Fall ist.

Auf den Hinterflügeln ist die schwarze Randbinde ebenfalls viel schmaler und besteht eigentlich nur aus ovalen schwarzen Flecken, die nach hinten zu regelmässig kleiner und durch die dunkel gelbbraun bestäubten Rippen getrennt werden. Eine undeutliche, gelbbraun gewellte Linie scheidet sie von dem dunkeln Rand, der nach hinten hin ebenfalls lichter wird, so dass vom 1. Medianast ab die klein gewordenen runden Flecken ganz im gelben Feld stehen. Im Analwinkel zwei weisse Fleckchen wie bei papuensis, auch der schwarze Strich in der Mitte des Vorderrandes.

Die Unterseite ist heller als bei papuensis, mehr gelbbraun und der bei den meisten papuensis-♂♂ sehr starke stahlblaue Schiller fehlt fast vollständig.

Das ♀ unterscheidet sich vom papuensis-♀ nur durch etwas hellere Farbe auf beiden Seiten, verloschenere Zeichnung, hauptsächlich aber durch die bedeutendere Grösse, weshalb ich auch für diese Form den Namen **Gigantea** vorschlagen möchte. Die Vorderflügelänge beträgt 55 mm, bei meinen papuensis-♀♀ nur 49 mm.

162. **Jupiter** Butl. Ziemlich selten. Aus Stefansort erhielt ich nur ♂♂, die zwischen 40 und 42 mm Vorderflügelänge messen, aus Simbang nur (2) ♀♀, die im Vergleich mit den Astrolabe-♂♂ sehr gross genannt werden müssen; sie messen 50 und 47 mm. December, Januar und April.

Aus Herbertshöhe erhielt ich ebenfalls ein ♀, das 47 mm misst.

## J. Libytheidae.

### I. Libythea.

163. **Geoffroyi** Godt. var. **Antipoda** Boisd. Nicht selten, von Stefansort und Simbang, in den Regenmonaten. Das Thierchen setzt sich gern, oft schaarenweise, mit zusammengefalteten Flügeln auf den feuchten



von den Wellen bespülten Sand des Seestrandes. Auf 5 bis 6 ♂♂ kommt 1 ♀.

Aus Herbertshöhe habe ich die var. *neopommerana* Pagst. (Ueber die Lepidopteren von Sumba und Sumbawa, Jahrb. d. nass. Ver. f. Naturk. Jahrg. 49, 1896) in 3 ♂♂ erhalten.

## II. *Dicallaneura*.

164. **Decorata** Hew. Nicht selten, in Wäldern, an der Astrolabe-bucht, in beiden Geschlechtern..

165. **Pulchra** Quér. Nur ein einziges Pärchen, von Stefansort.

Die beiden vorstehenden Arten sind echte Waldthiere, die sich ganz in der Art und Weise wie die *Abisara*-Arten benehmen.

## III. *Abisara*.

166. **Satraps** Gr. Sm. var. **Simbangana** Jord. in lit. Zwei Exemplare vom Sattelberg bei Finschhafen, welche ziemlich genau der Beschreibung entsprechen, welche Grose Smith von dem ♀ seiner *satraps* von der Humboldt Bay giebt. Ich hatte meine beiden Thiere für ein Pärchen gehalten, mag mich aber wohl geirrt haben, da das ♀ nach Gr. Smith's Beschreibung oben keine weissen Flecken oder Bänder hat.

Die Varietät resp. Localform *Simbangana* unterscheidet sich, wie mir Herr Dr. Jordan, der liebenswürdige Lepidopterologe des Tring-Museums, das sich nunmehr im Besitz meiner Sammlung befindet, mittheilt, von der typischen *Satraps*-Form dadurch, dass letztere mehr Weiss hat. Die Flecken der Mittelbinde der Vorderflügel sind bei *Simbangana* kleiner und breiter von einander getrennt. Auf den Hinterflügeln oben ist dagegen das Weiss vor der oberen Discocellulare (Ader 5) ca. 3 mal so ausgedehnt wie bei *Satraps*. Der zwischen den beiden unteren Medianästen befindliche weisse submarginale Fleck fehlt.

Leib oben bräunlich, unten weiss, nach hinten zu leicht gelblich; Beine und Palpen stark ockergelb, erstere aussen und gegen die Klauen hin braun, Fühler bräunlich mit ockergelben Kolben; Augen an der Innenseite zwischen Fühleransatz und Palpen weisslich eingefasst.

Vorderflügelänge 27 resp. 31 mm.

Nahe verwandt mit *A. albiplaga* Rüb. (Iris III, 1886, p. 49, T. V, f. 12).

---



# CATALOG

DER

## COLEOPTEREN VON JAPAN.

VON

**H. v. SCHOENFELDT,**  
OBERST A. D.

---

**Dritter Nachtrag.**

---



Auch in den letzten Jahren hat Herr G. Lewis eifrig und unermüdlich entweder selbst einzelne Familien der japanischen Coleopteren bearbeitet, oder mit bestem Erfolge sein kostbares Material bewährten Händen zu erfolgreicher Bearbeitung anvertraut.

Dadurch, dass diesmal zum ersten Male die politisch zu Japan gehörenden Liu-kiu-Inseln in ihren nördlichen und mittleren Gruppen Berücksichtigung gefunden haben, sind sehr interessante Formen zur Aufnahme gelangt, welche sich, da dort jetzt sachverständig gesammelt wird, bald mehren werden.

Der Zuwachs an neuen Arten ist wieder bedeutend gewesen. Wenn man die einzelnen Familien berücksichtigt, die eine Neubearbeitung erhalten haben, so ist bei fernerer Durchführung der Bearbeitung des vorliegenden Materials zu erwarten, dass in kurzer Zeit die Zahl der aus Japan bekannt gewordenen Arten bald das fünfte Tausend beginnen wird. So sind z. B. die Staphyliniden von 218 auf 472 Arten gestiegen, zu den Lamellicorniern sind 33 Arten, zu den Buprestiden 25 Arten, zu den Elateriden 108 Arten gekommen, die Scolytiden incl. Platypiden von Blandford bearbeitet, zählen statt 21 Arten jetzt 109 Arten.

Im Ganzen sind 556 Arten neu aufgeführt, dagegen sind 32 Arten abzurechnen, weil sie theils fraglich für Japan, theils mehrfach beschrieben sind.

Die Zahl der für Japan bekannten Käfer steigt demnach von 3259 Arten (Abschluss des II. Nachtrags zum Catalog von Japan vom Jahre 1891) auf 3783 Arten.

Eisenach, Marienhöhe, Villa Martha den 15. Jan. 1897.

---

**Cicindela Ferriei Fleutiaux.** Ann. France Bull. 94.281.

— Oshima, Najé.

**Eustra Batesi Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.330.

— Kiushiu, Kashiwagi, Mayasan bei Kobé.

- Trechus ovipennis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.330. — Ontake.  
**Pheropsophus agnatus Chaudoir.** Ann. Soc. Ent. Belg. 76.43. Lewis  
 Ann. Mag. Nat. Hist. 96.331. — Oshima.  
**Crepidogaster bicolor Bohem.** = **Styphromerus Batesi Chaud.** Ann. Soc.  
 Ent. Belg. 76.87. — Nagasaki.  
**Pentagonica daimiella Bates.** Ann. Mus. Civ. Genov. XII. 426.  
 — Nagasaki.

### **Camioleum** Lewis (Staphylin. n. g.)

- C. loripes Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.355. (Fig.)  
 — Ins. Main, Kashiwagi.

### **Lyrosoma** Ménétries.

- L. ovipenne Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.355. — Ketoi.  
**L. Snowi Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.355. — Ketoi.  
**L. suturale Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.355. — Ketoi.  
**L. tripartitum Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.354. — Ketoi.

### **Pteroloma** Gyllenhal.

- Pt. discicolle Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.356.  
 — Ins. Main, Nantaisan.

### **Pelastes** Horn.

- P. striatipennis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.356.  
 — Ins. Main, Nikko.

### **Ascaphium** Lewis.

- A. apicale Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.290.  
 — Miyanoshita, Subashiri, Nikko, Oyayama.  
**A. sulcipenne Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.289.  
 — Nikko, Miyanoshita.  
**A. tibiale Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.289.  
 — Miyanoshita, Subashiri, Nikko, Oyayama.

### **Scaphium** Kirby.

- S. obtabile Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.290. — Ichiuchi, Higo.

### **Episcaphium** Lewis.

- E. ruficolle Lewis** var.? Ann. Mag. Nat. Hist. 93.291.  
 — Kiuchi, Yuyama, Ichiuchi, Konosé.

- E. semirufum Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.291.  
— Nikko, Miyanoshita, Kiga.
- Scaphidium emarginatum Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.291.  
— Kiushiu, Chiuzenji, Ontaki-san.
- Sc. femorale Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.292. — Ins. Main, Kiushiu.
- Sc. incisum Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.294.  
— Mayebashi, Miyanoshita, Nikko.
- Sc. japonicum Reitter adde** — Ins. Main, Kiushiu.
- Sc. longipes Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.292.  
— Higo, Kiga, Miyanoshita.
- Sc. Reitteri Lewis adde** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.293.  
— Vries Ins. Kashiwagi, Higo, Chiuzenji, Mayasan.
- Sc. rufopygum Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 93.293.  
— Yuyama, Kiga, Nikko.
- Cyparium sibiricum Solsky adde** — Süd Jezo, Chiuzenji, Higo.
- Hister japanus Motsch. adde** = **H. succicoca Thoms.** Scand. Col. 62.224.  
Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 95.188. — Japan.
- H. niponicus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.188.  
— Japan, Yezo, Kiushiu.
- H. navus Mars.** Nach Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 95.188. Wahr-  
scheinlich nur in Syria gefunden.
- H. quinquestriatus Motsch.** = **H. quatuordecimstriatus Mars.** Lewis,  
Ann. Mag. Nat. Hist. 95.188. — Japan.
- Paromalus complanatus Panzer.** Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 92.33.  
— Yezo.
- P. fujisanus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 92.34.  
— Kiga, Subashiri, Nikko.
- P. mendicus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 92.33. — Kashiwagi, Higo.
- P. montivagus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 92.37. — Fujisan.
- P. musculus Mars. adde** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 92.37.  
— Nara, Kiushiu.
- P. omineus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 92.36. — Omimesan.
- P. parallelopipedus Herbst.** Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 92.36.  
— Sapporo, Nikko, Miyanoshita, Nishimura.
- P. tardipes Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 92.35.  
— Miyanoshita, Kiga, Kashiwagi, Nara.
- P. vernalis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 92.35.  
— Nara, Oyayama, Yuyama.



**P. viaticus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 92.33.

— Nikko, Oyama, Nara, Kashiwagi, Kumamoto, Yuyama.

**Abraeus micado Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX. 356.

— Kiga, Konose, Nara, Yezo.

**Acritus shogunus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX. 357. — Sapporo.

**Epuraea Argus Reitter.** Best. Tab. Heft XXVII. 94.9. = Verh. Nat.

Ver. Brünn 94.24. nicht *E. variegata* Herbst, welche zu streichen. — Kumamoto, Nagasaki, Kobé Miyanoshita.

**E. submicrurula Reitter.** Wien. Ent. Zeit. 84.261, 85.15. Best. Tab.

Heft XXVII. 94.16. = Verhandl. Nat. Ver. Brünn 94.31.

— Miyanoshita, Hiogo.

**Rhizophagus nobilis Lewis.** Ent. Mo. Mag. 93.83. — Kashiwagi.

**Thymalus laticeps Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.33.

— Chiuzenji, Oyama, Fujisan, Sawara, Junsai.

**Th. parviceps Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.33.

— Junsai, Sawara, Ontaki, Chiuzenji.

**Th. punctidorsum Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.33. — Yuyama.

**Ostoma Higonia Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.34. — Yuyama.

**O. valida Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.34.

— Komagatake, Junsai, Ishikiri, Yezo.

**Tenebrioides ocularis Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.34. — Sapporo.

**Ancistria Reitteri Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.83. — Yuyama, Higo.

### **Atritomus** Reitter.

**A. Reitteri Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.331.

— Suyama (Sagami), Ichiuchi, Higo.

### **Panelus** Lewis.

**P. parvulus Waterh.** = *Temnoplectron parvulum* Waterh. Lewis. Ann.

Mag. Nat. Hist. 95.375. Fig. 1. 2. — Nagasaki, Hiogo.

### **Maraxes** Lewis.

**M. dentifrons Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.376. Fig. 3. 4.

— Oshima.

**Copris acutidens Motsch. adde Lewis,** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.377.

**C. Ochus Motsch.** = *Catharsius Ochus* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag.

Nat. Hist. 93.377. — Simabara, Kobé, Nikko, Hakodate.

**C. pecuarius Lewis.** Wien. Ent. Zeit. III. Heft 1, p. 17. 84.

— Nikko, Nakasendo.

**Onthophagus nikkoensis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.378.

— Nikko, Nara.

*O. ocellato-punctatus* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.379.

— Hiogo, Hakodate.

**O. vacerosus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.378. — Awomori.

*Aphodius brevisculus* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.380.

— Hakodate.

*A. eccoptus* Bates. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.380.

— Nikko, Mikuni-togé.

*A. lividus* Oliv. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.380.

— Awomori, Oyayama, Hakodate.

*A. ovalis* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.381. — Nagasaki.

*A. Solskyi* Har. = *diversus* Waterh. = *castaneipennis* Waterh. =  
*rectus* Motsch. = *vitta* Motsch. (*Chilo thorax vitta* Motsch.  
conf. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.379.

*A. urostigma* Harold adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.381.

— Nagasaki, Nikko, Awomori, Oyayama.

*A. variabilis* Waterh. = *nigrotessulatus* Motsch. conf. Lewis. Ann.  
Mag. Nat. Hist. 95.381. — Nagasaki, Kobé, Yokohama.

### **Caelius** Lewis.

*C. denticollis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.382. Fig. 5.

— Miyanoshita, Kiga, Nikko.

*Saprosites narae* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.382. — Nara.

### **Oxyomus** Laporte.

**O. jugosus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.383. fig. 6. — Nagasaki.

*Rhyssenus asperulus* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.384.

— Kobé, Yokohama, Nikko.

**Psammobius ainu** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.384. — Hakodate.

**Ps. comis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.384. — Nikko.

*Ps. convexus* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.384.

— Kioto, Niigata, Sapporo.

*Ps. japonicus* Harold. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.384.

— Hagi, Nagasaki, Enoshima.

*Aegialia nitida* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.385.

— Hakodate.

*Ochodaeus maculatus* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.385.

— Oyama prope Yokohama.

## Phaeochrous Casteln.

- Ph. asiaticus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.332. — Okinawa.  
*Bolboceras nigroplagiatum* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
 95.385. — Tokio, Yokohama, Kobé.  
*Geotrupes auratus* Motsch. = *purpurascens* Waterh. conf. Lewis. Ann.  
 Mag. Nat. Hist. 95.386.  
*G. laevistriatus* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.386.  
 — Hiogo.  
*Trox chinensis* Bohem. = *obscurus* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag.  
 Nat. Hist. 95.386. — Simabara.  
**T. niponensis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.387. — Hakodate.  
*T. opacotuberculatus* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.387.  
 — Ebene des Fujisan, Nikko.  
*T. setifer* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.387.  
 — Simabara, Nikko, Hakodate.

## Anthypnia Latreille.

- A. pectinata** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 97.383. — Tokio.  
*Ectinohoplia obducta* Motsch. Et. Ent. 57.33. = *sabulicola* Motsch.  
 l. c. p. 34 = *variolosa* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat.  
 Hist. 95.388. — Hitoyoshi, Nikko.  
**Hoplia gracilipes** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.389. — Oshima.  
*H. maculata* Bates. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.389. fig. 7.  
 — Satsuma, Mitsudake, Hitoyoshi.  
*H. Reinii* Heyden. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.389.

## Sericania Motschulsky.

- S. fuscolineata** Motsch. Schrencks Reis. 60.136. Tab. IX. fig. 10.  
 Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 95.391.  
 — Yokohama, Chiuzenji (Ins. Ascold).  
*S. mimica* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.390.  
 — Miyanoshita, Nikko, Hakone, Subashiri, Ontake, Yokohama.  
**Serica angulata** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.392. — Oyayama.  
**S. brevicornis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.393.  
 — Nikko Shinkano.  
*S. grisea* Motsch. adde Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 95.392.  
 — Kiushiu.

**S. higonía Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.394.

— Hitoyoshi, Konosé, Yuyama.

**S. nigrovariata Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.392. — Mayebashi.

**S. quadrifoliata Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.393. — Nikko.

### **Aserica Lewis.**

**A. japonica** Motsch = *Serica japonica* Motsch = *piceorufa* Fairm. conf.  
Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.395. — Süd-Japan.

**A. orientalis** Motsch = *Serica orientalis* Motsch. conf. l. c.

**Apogonia amida Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.332. — Nagasaki.

**A. bicarinata Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.333.

— Japan, Oshima.

**A. cupreoviridis** Kolbe. Arch. f. Nat. 86.193 = *A. fusana* Kolbe  
l. c. 193. conf. Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.334.

— Gotoshima, Korea.

**A. niponica Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.395.

— Japan.

**Holotrichia Hankowiensis Brenske.** Mem. Soc. Ent. Belg. II. 94.19.

— Hankow.

**H. Kiotonensis Brenske.** Mem. Soc. Ent. Belg. II. 94.19. — Kioto.

### **Lachnosterna Hope.**

**L. diomphalia Bates.** Proc. Zool. Soc. 88.373. Lewis Ann. Mag.  
Nat. Hist. 95.397. — Japan.

**L. inelegans Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.396 = *Ancylonycha*  
*parallela*. — Japan.

**L. morosa** Waterh. adde Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.397.

— Nagasaki.

**L. niponensis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.398.

— Nagasaki, Gotoinsel.

**L. picea** Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.397.

— Nagasaki, Chiuzenji, Yokohama.

**Heptophylla picea** Motsch. adde Brenske Ent. Nachr. 92.155. Lewis  
Ann. Mag. Nat. Hist. 95.399 = *Holotrichia transversa* Motsch.

— Nipon, Yezo.

### **Rhizotrogus Latreille.**

**Rh. niponicus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.399. — Gotoshima.

## **Polyphylla** Harris.

*P. laticollis* Lewis. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.399.

— Provinz Sakami.

*Granida albolineata* Motsch. Conf. et adde: Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.

95.400 = *Polyphylla Schönfeldti* Brenske Ent. Nachr. 90.198.

— Nagasaki, Kobé, Niigata, Akita, Oshima.

*Phyllopertha irregularis* Waterh. = *yezoensis* Waterh. c. l. conf. Lewis,  
Ann. Mag. Nat. Hist. 95.400.

*Ph. conspurcata* Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.400.

— Nagasaki.

*Anomala difficilis* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.401.

— Kobé, Nikko, Chiuzenji.

*A. geniculata* Motsch. = *daimiana* Har. = *triangularis* Schönf. Ent.  
Nachr. 90.171. conf. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.400.

— Ganz Japan, Oshima.

*A. holosericea* Fabr. Mant. Ins. I. 21. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
95.401.

— Chiuzenji, Süd-Yezo.

*A. mongolica* Fald. = *Euchlora mongolica* Fald. Mém. Ac. Petersb.  
35, 379. Lewis, Mo. Mag. 93.151. Bates Proc. Zool. Soc.  
88.374.

— Niigata, Akita.

*A. orientalis* Waterh. = *Phyllopertha xanthogastra* Har. Mittheil. d.  
Münch. Ent. Ver. 81.90. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.401.

*A. pubicollis* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.402.

— Yokohama, Nagasaki, Kobé, Miyanoshta, Nikko.

*A. rufocupera* Motsch. = *lucidula* Motsch. = *lucens* Ball. = *Motschulskyi*  
Har. conf. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.401.

*A. Siversii* Heyden. Hor. Ent. Ross. 87.266. Lewis, Ann. Mag. Nat.  
Hist. 95.401.

— Tsushima.

*Euchlora gracilis* Schönfeldt. Ent. Nachr. 90.71. Lewis, Ann. Mag.  
Nat. Hist. 95.402.

— Oshima.

*Eu. multistriata* Motsch. = *Anomala puncticollis* Har. Lewis, Ann. Mag.  
Nat. Hist. 95.402.

*Mimela lucidula* Hope. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.402.

*Popilia insularis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Nat. Hist. 95.403.

— Oshima.

*P. japonica* Newm. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.403.

*Adoretus tenuimaculatus* Waterh. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
95.403.



*Cetonia brevitarsis* Lewis. adde Ann. Mag. Nat. Hist. 99.405.

*Gnorimus septemdecimguttatus*. Sn. v. Voll. Adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.405.

### **Paratrichius** Janson.

**P. duplicatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.406. — Oshima.

**P. Doenitzi** Har = *P. longicornis* Jans. conf. Lew., Ann. Mag. Nat. Hist. 95.406.

**Chrysochroa alternans** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 88.264. Lewis, Linn. Soc. Journ. 92.328. — Riukiu.

### **Chrysodema** Laperte et Gory.

**Chr. Lewisii** Saund. adde Lewis, Linn. Soc. Journ. 92.328 = *Chr. oshimana* Nonfr. Berl. Ent. Zeit. 95.297. conf. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.335.

— Oshima, Kiushiu, Riukiu, Nagasaki.

*Chalcophora japonica* Gory.

**Var. Oshimana** Schönfeldt. Ent. Nachr. 90.172. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.406. — Oshima.

**Ch. satzuma** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.334. — Satzuma.

### **Dicerea** Eschscholz.

**D. aino** Lewis. Linn. Soc. Journ. 92.328. — Ishikarifluss Yezo.

**D. tibialis** Lewis. Linn. Soc. Journ. 92.328.

— Insel Main, Kashiwagi.

### **Poecilonota** Eschscholz.

**P. bellula** Lewis. Linn. Soc. Journ. 92.329. — Yezo, Junsai.

**P. vivata** Lewis. Linn. Soc. Journ. 92.329.

— Insel Main, Kashiwagi.

### **Eurythyrea** Solier.

**E. tenuistriata** Lewis. Linn. Soc. Journ. 92.330.

— Insel Main, Atami, Chichiba.

### **Melanophila** Eschscholz.

**M. obscurata** Lewis. Linn. Soc. Journ. 92.331.

— Yezo, Kiushiu, Otaru, Higo, Yokohama.

- Coraebus niponicus Lewis.** Ent. Mo. Mag. 94.244.  
— Riukiu, Insel, Oshima.
- C. Oberthüri Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.335. — Oshima.
- C. quadriundulatus Motsch.** Adde Lewis, Linn. Soc. Journ. 92.321.
- C. rusticanus Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.321. — Junsai, Yezo.
- Agrilus alazon Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.333.  
— Kiushiu, Yuyama, Higo.
- A. brevitarsis Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.336.  
— Insel Main, Chiuzenji.
- A. cupes Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.336.  
— Insel Main, Numata, Chiuzenji.
- A. cyaneoniger Saunders.** adde Lewis, Linn. Soc. Journ. 92.331.
- A. discalis E. Saunders.** adde Lewis, Linn. Soc. Journ. 92.335.  
— Kiushiu, Insel Main, Bukenji, Yokohama.
- A. fortunatus Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.333.  
— Insel Main, Kiga, Nikko, Chiuzenji.
- A. gracilipes Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.335.  
— Insel Main, Nikko, Nara, Miyanoshita.
- A. imitans Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.332.  
— Insel Main, Kashiwagi.
- A. sospes Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.334. — Kiushiu, Yuyama.
- A. spinipennis Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.332.  
— Insel Main, Yokohama, Oyama.
- A. tempestivus Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.334.  
— Insel Main, Usuitogé, Fukui, Chiuzenji.
- A. tibialis Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.335.  
— Yezo, Junsai, Sapporo.
- Trachys eximia Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.337. — Kiushiu, Higo.
- Tr. Saundersi Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.337.  
— Insel Main, Subashiri.

### **Brachys Solier.**

- Br. salicis Lewis.** Linn. Soc. Journ. 92.337.  
— Insel Main, Subashiri, Kioto, Miyanoshita.
- Adelocera antennata Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 94.27. — Sapporo.
- A. Maecklinii Cand.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.27.  
Kobé, Sapporo, Junsai, Wadatogé.
- A. parallela Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 94.28. — Sapporo.

- Lacon brunneus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.29. — Oyama.
- L. difficilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.29. — Nagasaki.
- L. quadrinotatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.28. — Oyayama.
- L. scutellaris** Candèze Mém. Soc. des sc. Liège. 93.9. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.336.  
— Süd-Japan, Liukiu, Oshima, Yokohama.
- L. trifasciatus** Cand. Zu streichen, nach Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 94.29.
- Meristhus niponensis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.30.  
— Niigata, Nagasaki.
- M. scobinula** Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.30.  
— Nagasaki.
- Alaus pini** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.30.  
— Nagasaki, Konose, Kumamoto, Hagi.
- Tetrigus Lewisi** Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.31.  
Nagasaki, Kobé, Sapporo.
- Pectocera Fortunei** Cand. adde  
— Nagasaki, Kumamoto, Nikko, Chiuzenji.
- Anchastus mus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.31. — Miyanoshita.
- A. rufipes** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.32. — Nikko, Yuyama.
- Elater ainu** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.35. — Ichikari.
- E. canalicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.38.  
— Bukenji, Oyama, Miyanoshita.
- E. chlamydatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.36.  
— Kadzusa (Insel bei Yokohama).
- E. convexicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.34. — Nikko.
- E. fagi** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.34. — Subashiri, Hakone.
- E. gracilipes** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.42. — Chiuzenji.
- E. miles** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.37. — Oyayama.
- E. montanus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.36. — Nikko.
- E. nigroventris** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.38.  
— Miyanoshita, Oyayama.
- E. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.32.  
— Chiuzenji, Miyanoshita, Kiga, Oyayama.
- E. optabilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.33.  
— Subashiri, Fujisan, Omine, Oyayama.
- E. orientalis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.33.  
— Miyanoshita, Kashiwagi, Hakone, Nikko.

- E. parvulus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.41. — Yuyama.  
*E. pauxillus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.42. — Nikko.  
*E. rufipes* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.40.  
 — Miyanoshita, Hakone, Oyama, Konosé, Yuyama.  
*E. rugipennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.41. — Kioto, Oyama.  
*E. scutellaris* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.45.  
 — Chiuzenji, Niohozan, Sapporo.  
*E. tenuistriatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.39.  
 — Miyanoshita, Kiga, Chiuzenji, Nikko, Yuyama.  
*E. vestitus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.39.  
 — Miyanoshita, Hakone, Hitoyoshi, Yuyama.  
*Megapenthes bicarinatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.43.  
 — Nagasaki.  
*M. bifoveolatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.45.  
 — Oyayama, Ichiuchi, Oyama, Chiuzenji, Nikko, Miyanoshita.  
*M. cariniceps* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.45. — Kiga.  
*M. fujisanus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.44.  
 — Subashiri, Fujisan.  
*M. gracilis* Cand. adde — Kiga, Yokohama, Kioto, Kumamoto.  
*M. higonius* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.45.  
 — Ichibosayana, Ogouma.  
*M. insidiosus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.44.  
 — Chiuzenji, Niohozan.  
*M. insignatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.46.  
 — Miyanoshita, Yokohama.  
*M. opacus* Cand. adde — Kobé, Junsai.  
*M. ornatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.47. — Yuyama.  
*M. pallidus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.46.  
 — Nataksugawa, Nikko.  
*M. versipellis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.47.  
 — Chiuzenji, Junsai, Kaschiwagi, Sapporo, Otaru.

### **Melanoxanthus** Eschscholz.

- M. pictipennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.48.  
 — Fukushima, Nataksugawa.  
*M. similis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.182.  
 — Fukushima, Nikko, Osaka.





- Sph. restrictus* Cand. = *Melanotus restrictus* Cand. conf. Schwarz Wien.  
Ent. Zeit. 92.132. *Melanotus annosus* Candèze adde  
— Nagasaki, Kumamoto.
- M. caudex* Lewis. adde, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.194.  
— Kumamoto, Wakayama.
- M. investitus* Cand. = *M. Fortnumi* Cand. Lewis, Ann. Mag. Nat.  
Hist. 94.193. adde — Miyanoshita, Kiga, Hakone, Kobé.
- M. longipennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.192. — Kobé, Kioto.
- M. ocellato-punctatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.193.  
— Junsai.
- M. senilis* Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.193.  
— Kobé.
- M. seniculus* Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.194.  
— Nagasaki, Yuyama.
- M. spernendus* Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.192.  
— Hitoyoshi, Yuyama.
- Limonius approximans* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.198.  
— Nikko.
- L. atricolor* Lewis. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.197.  
— Wakayama (Kii), Miyanoshita.
- L. brunneus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.195. — Nikko.
- L. eximius* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.318. — Main-Island.
- L. ignicollis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.197. — Nikko.
- L. imitans* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.196. — Miyanoshita.
- L. marginicollis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.196.  
— Oyayama, Nikko, Miyanoshita, Kashiwagi.
- L. marginipennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.195. — Nikko.
- L. montivagus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.194 — Nikko.
- L. niponensis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.194. — Junsai.
- L. rufipennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.197.  
— Hitoyoshi, Oyumayama.
- Athous comes* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.200. — Sapporo.
- A. desertor* Cand = *Psephus desertor* Cand. Lewis. Ann. Mag. Nat.  
Hist. 94.200. — Kobé, Mayasan.
- A. inornatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.255.  
— Junsai, Sapporo.
- A. jactatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.255. — Nara.
- A. porrecticollis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.201. — Junsai.

- A. prae nobilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.407, Fig. 9 = *A. virens* Cand. — Chiuzenji, Oyama, Oyayama, Junsai.
- Var. brunnipes** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.200.  
— Wadatogé, Chiuzenji, Mayasan, Shimonosawa.
- A. sanguinicollos** Friwaldsky. Trem. füzetek. 92.124. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.200. — Ost-Japan, Oyama.
- A. secessus* Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.199.  
— Kioto, Osaka, Nara, Nikko, Junsai.
- A. singularis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.201. — Junsai.
- A. sinuatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.199.  
— Wadatogé, Fukushima, Yumoto, Nishimura, Nowata.
- A. subcyaneus* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.199.  
— Chiuzenji, Oyayama, Oyama, Junsai.
- A. suturalis* Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.200.  
— Kobé, Fukushima, Fukai.
- A. umbratilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.198.  
— Junsai, Chiuzenji (Niohozan), Oyayama.
- A. undosus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.256. — Nikko.
- Corymbites chlamydatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.263.  
— Yuyama.
- C. concolor** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.263. — Yuyama.
- C. daimio** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.256.  
— Yuyama, Chiuzenji, Sapporo.
- C. ferruginipes** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.262.  
— Nikko, Chiuzenji.
- C. fulvipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.258. — Miyanoshita.
- C. gratus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.262.  
— Ichiuchi, Chiuzenji, Subashiri, Miyanoshita, Junsai.
- C. hypocrita** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.259. — Nikko.
- C. modestus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.258.  
— Fukahori, Nikko.
- C. mundulus* Lewis. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.262.  
— Yokohama, Kii, Miyanoshita, Oyama, Oyayama, Hagi.
- C. notabilis* Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94. 259.  
— Nagasaki, Kumamoto, Yuyama.
- C. obscuripes** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.264. — Miyanoshita.
- C. onerosus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.260.  
— Oyama, Tokio, Shimbara, Oyayama, Yuyama.

- C. orientalis** Cand. Elat. nouv. IV. 64.48. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.257. — Chiuzenji, Nikko.  
**C. pacatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.261. — Tokio.  
**C. praenobilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.259. — Idzu, Yokohama, Yuyama.  
**C. puncticollis** Motsch. (Selatosomus). adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.260. — Sapporo, Chiuzenji.  
**C. rubripennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.263. — Higo.  
**C. selectus** Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.258. — Sapporo.  
**C. tessellatus** L. Bisher noch nicht aus Japan nachgewiesen. — Zu streichen!  
**C. vagepictus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.261. — Kumamoto.  
**Ludius Candèzei** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.265. — Nagasaki.  
**L. niponensis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.264. — Sapporo, Nikko.  
**L. Sieboldii** Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.265. — Nagasaki, Kobé, Sapporo.

### **Crigmus** Leconte.

- A. junior** Cand. (Ludius). adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.266. Yuyama, Sapporo, Ichiuchi, Kashiwagi.  
**C. ligatus** Cand. = **lineatus** Cand. = **luteatus** Cand. conf. Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.266. adde: — Kobé, Mayasan.  
**C. plebejus** Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.266. — Nagasaki, Ashiwo, Sapporo.  
**Sericus sericarius** Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.266.  
**Agriotus elegantulus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.313. — Fukushima.  
**A. exulatus** Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.313. — Nagasaki.  
**A. helvolus** Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.313. — Nagasaki, Kobé, Hakone, Junsai.  
**A. longicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.311. — Nikko.  
**A. Ogurae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.313. — Ogura See, Kioto.  
**A. palustris** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.314. — Ogura-See, Tokio, Nikko, Sakai.  
**A. persimilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.312. — Junsai.

- A. sepes* Lewis. adde. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.312. — Kii.  
*A. sericeus* Cand. = *A. sericans* Lewis nicht = *sepes* Lewis, Ann.  
 Mag. Nat. Hist. 94.312. — Subashiri, Wadatogé.  
*Agonischius obscuripes* Cand. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.314.  
 — Kagoshima, Centr. Japan.  
*Sericosomus viridis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.314.  
 — Hitoyoshi, Oyama, Miyanoshita.

### **Aphanobius** Eschscholz.

- A. fuscomarginatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.337. — Oshima.  
*Glyphonyx illepidus* Cand. Adde:  
 Var. *bicolor* Cand. Mém. Soc. des Scienc. Liège 93.66. Lewis, Ann.  
 Mag. Nat. Hist. 94.315.  
 — Higo, Hiogo, Natakusuwa, Tsumago, Fukushima, Hosokute,  
 Shinkano.  
*Silesis crocatus* Cand. Mém. Soc. des Scienc. des Liège 93.68. Mem.  
 Acad. Belg. 96. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.337 (? var.  
 von *S. musculus* Lewis). — Yezo.  
*S. musculus* Cand. adde:  
 Var. *flavipennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.315.  
 — Hakone, Fukui, Tsumago, Numata.  
*S. scabripennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.315. — Yuyama.

### **Adrastus** Eschscholz.

- A. patagiatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.315.  
 — Chiuzenji, Hakone, Wadatogé, Junsai.  
*Lepturoides* (*Campylus*) *miniatus* Cand. adde Lewis, Ann. Mag. Hist.  
 94.317. — Nikko, Miyanoshita, Subashiri, Ichiuchi, Oyayama.  
*L. oculatus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.317.  
 — Miyanoshita, Subashiri.  
*L. scutellaris* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.317. — Oyayama.  
*L. versicolor* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.316. — Chiuzenji.

### **Paralichas** White.

- P. higoniae* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.99. Pl. VI. Fig. 1.  
 — Ichiuchi, Hitoyoshi.  
*P. pectinatus* Kiesw. = *Eucteis bimaculata* Guér. adde Lewis, Ann.  
 Mag. Nat. Hist. 95.99.  
 — Nagasaki, Miyanoshita, Kobé, Nikko.

## **Epilichas** White.

- E. atricolor** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.101.  
— Nikko, Miyanoshita.  
**E. brunneicornis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.100. — Junsai.  
**E. flabellatus** Kiesw. = *Octoglossa flabellata* Kiesw. adde Lewis, Ann.  
Mag. Nat. Hist. 95.100. — Nagasaki, Nara, Kobé.  
**E. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.101.  
— Nikko. Miyanoshita.

## **Drupeus** Lewis.

- D. brevis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.103. — Nara.  
**D. laetabilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.102. Fig. 1.  
— Kashiwagi.  
**D. vittipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.103. — Kashiwagi.  
**Eubrianax granicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.104. Pl. VI.  
f. 2. — Nagasaki, Subashiri.  
**E. pellucidus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.104. — Fukushima.  
**Prionocyphon sexmaculatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.105.  
— Nikko.  
**Scirtes ovatulus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.105. — Hakodate.  
**Sc. sobrinus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.105.  
— Bukenji bei Yokohama.  
**Helodes dux** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.106.  
— Okamayama bei Hitoyoshi, Miyanoshita, Nikko, Fukushima.  
**H. flavicollis** Kiesw. = *Sacodes protectus* Har. adde Lewis, Ann. Mag.  
Nat. Hist. 95.106. — Kiushiu.  
**H. inornatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.107.  
— Nagasaki Kiga, Miyanoshita, Nikko.  
**H. scapularis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.107. •  
— Nagasaki, Hitoyoshi.  
**Cyphon variabilis** Thunb. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.107.

## **Ptilodactyla** Illiger.

- Pt. ramea** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.107.  
— Nagasaki, Fukushima, Oiwake, Nara.  
**Mesolyceus atrorufus** Kiesw. = *M. puniceus* Gorh. adde Lewis, Ann.  
Mag. Nat. Hist. 95.107. — Hagi.



## **Taphes** Waterhouse.

*T. granicollis* Kiesw. = *Eros granicollis* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.407.

## **Pyrocoelia** Gorham.

*P. atripennis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.337. — Oshima.

*Podabrus lictorius* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94. 109.

— Yuyama, Tosamachi, Nishimura, Miyanoshita, Nikko.

*P. temporalis* Harold. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.108.

— Miyanoshita, Yokohama, Tokio, Nikko, Sapporo.

## **Themus** Motschulsky.

*Th. cyanipennis* Motsch. = *Cantharis cyanipennis* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.

— Miyanoshita, Yokohama, Nikko, Hakodate etc.

*Th. episcopalis* Kiesw. = *Cantharis episcopalis* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.109. — Oyayama, Nagasaki.

## **Athemus** Lewis.

*A. attristatus* Kiesw. = *Canth. attristata* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.110. — Nikko.

*A. suturellus* Motsch = *Canth. suturellus* Motsch = *suturalis* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.110.

Var. *luteipennis* Kiesw.

Var. *melanopus* Harold.

**Var. roninus** Lewis. (an n. sp?)

*Cantharis adusticollis* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95. 110.  
— Nara, Seba, Junsai, S. Yezo.

*C. aegrota* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.111.

— Kiga.

*C. ciusiana* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.111.

— Hitoyoshi, Subashiri, Nikko, Miyanoshita.

**C. dichroa** Lewis. (Telephorus). Ann. Mag. Nat. Hist. 95.111.

— Kashiwagi.

*C. japonica* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.112.

— Miyanoshita, Nagasaki.

*C. insulsa* Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.110.

— Miyanoshita, Oyama.

- C. viatica** Lewis (Telephorus). Ann. Mag. Nat. Hist. 95.111.  
— Fukushima.  
**C. vitellina** Kiesw. addé Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.111.  
— Nagasaki. Kiga, Tokio, Kashiwagi.  
**C. vulcana** Lewis (Telephorus). Ann. Mag. Nat. Hist. 95.112.  
— Junsai.

### **Silis** Latreille.

- S. pectinata** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.112. Pl. VI. Fig. 3.  
— Nakatsugawa, Higo.

### **Elianus** Lewis.

- E. rugiceps** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.113. Pl. VI. Fig. 4.  
— Nikko.  
**Ichthyurus atriceps** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.114.  
— Wada-togé.

### **Biurus** Westwood.

- B. pennatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.114.  
— Kashiwagi, Fukushima, Nakasendo.  
**Malthodes kobensis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.115.  
— Kobé, Kashiwagi.  
**Drilaster axillaris** Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.116.  
Pl. VI. Fig. 6. — Mayn Island, Yezo.  
**D. unicolor** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.115. — Higo.  
**Cyphonocerus marginatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.115.  
— Kuma-Kuni.  
**Lajus Kiesenwetteri** Lewis = **flavicornis** Kiesw. conf. Lewis, Ann. Mag.  
Nat. Hist. 95.116.  
**L. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.116. Pl. VI. Fig. 8.  
— Hakodate, Kobé.  
**Malachius eximius** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.117. Fig. 2.  
— Nagasaki, Osaka, Nikko, Kiga, Yokohama.  
**M. vitticollis** Kiesw. zu streichen, conf. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
95.116.  
**Attalus elongatulus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.117.  
— Nagasaki.  
**Dasytes constrictus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.118. Pl. VI. Fig. 9.  
— Hitoyoshi, Yuyama.

**Celsus** Lewis.

- C. spectabilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.119. Pl. VI. Fig. 10.  
— Ichibusayama bei Yuyama.

**Omineus** Lewis.

- O. humeralis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.119. Pl. VI. Fig. 11.  
— Kashiwagi, Omineberg, Ikenshaiga.

**Xerasia** Lewis.

- X. variegata** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.120. Pl. VI. Fig. 12.  
— Hitoyoshi, Wald von Okama.

**Spinoza** Lewis.

- Sp. caeculea** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.185.  
— Insel Main, Kashiwagi.  
**Tillus notatus** Klug. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 92.185.  
— Kiushiu.

- Cladiscus obeliscus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.185.  
— Insel Main, Kiushiu, Nagasaki, Mayasan, Fukushima.

**Cl. strangulatus** Kiesw. ist zu streichen, stammt von den Philippinen.

- Opilo carinatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.186. — Kiushiu.

- O. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.186.  
— Nördl. Insel von Japan.

- Thanasimus (Cleroides) albomaculatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist.  
92.187. — Kiushiu, Higo.

**Omadius** Laporte.

- O. nigromaculatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.187.  
— Kiushiu, Hiogo.

**Callimerus** Gorham.

- C. prasinatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.338. — Oshima.

**Stigmatidium** Laporte.

- St. pilosellum** Kiesw. (Cleroides). adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
92.188. — Kiushiu, Nagasaki, Konose.

- Tarsostenus univittatus** Rossi. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 92.188.  
— Kiushiu, Ipongi.

- Necrobia rufipes* Degeer. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 92.188.  
— Nagasaki.  
*Opetiopampus morulus* Kiesw. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 92.188.  
— Kiushiu, Ipongi, Nagasaki.  
*Tenerus cyaneus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.189.  
— Kiushiu, Konose.  
*T. higonius* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.189. — Kiushiu, Yuyama.  
*T. Hilleri* Harold adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 92.189.  
— Ins. Main, Hagi.  
*T. maculicollis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.188.  
— Kiushiu, Yuyama, Higo.

### **Thaneroclerus** Lefebvre.

- Th. aino* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.190. — Yezo, Junsai.

### **Neoclerus** Lewis.

- N. ornatulus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.190.  
— Kiushiu, Oyayama, Ikenchaiya, Nikko.

### **Isoclerus** Lewis.

- I. pictus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.191.  
— Ins. Main, Nikko, Chiuzenji.

### **Lycosoma** Lewis.

- L. parallelum* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 92.192.  
— Kiushiu, Suwayamatempel bei Nagasaki.

---

## **LYMEXYLONIDAE.**

---

### **Hylecoetus** Latreille.

- H. cossis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96. Januarheft.  
Yuyama, Oyama, Sagami, Nikko, Sapporo.
-

**Apate** Fabricius.

- A. carinipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.338. — Kawatchi.  
**A. niponensis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.339. — Okinawa.

**Sinoxylon** Duftschmid.

- S. japonicum** Lesne. Ann. France 95.175. — Japan.

**Dinoderus** Stephens.

- D. japonicus** Lesne. Ann. France 95.170. — Japan.  
**D. speculifer** Lesne. Ann. France 95.169. — Japan.

**Phellopsis** Leconte.

- Ph. subera** Lewis. Ent. 87.219. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.379.  
 Pl. XIII. Fig. 1. 95.447. — Yuyama, Chiuzenji.

**Blaps** Fabricius.

- B. japonensis** Mars. = *Leptocolena japonensis* Allard. Ann. Soc. Ent.  
 Fr. 80.320, 82.133. Fig. 125. Lewis Ann. Mag. Nat. Hist.  
 94.379. Seydlitz Naturg. Ins. Deutschl. 93. V. 272. — Japan.

**Platyscelis** Latreille.

- Pl. strigicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.447. — Japan.  
**Pedinus** (*Blindus* Muls) **japonicus** Seydlitz. Naturg. Ins. Deutschl.  
 93. V. 374 und 376. Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 95.408.  
 — Japan.

**Micropedinus** Lewis.

- M. algae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.379. — Kobé.  
**M. pallidipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.378. — Kobé.  
*Opatrum coriaceum* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.381.  
 — Yokohama, Odawara, Kiga.  
**O. expansicolle** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.380.  
 — Kiga, Kobé, Arima, Mayasan.  
**O. orarium** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.380. — Kobé.  
**O. persimile** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.381.  
 — Miyanoshita, Odawara.  
**O. recticolle** Mars. = *O. sexuale* Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat.  
 Hist. 94.381. — Kobé, Sannohe, Shirakawa, Fujisan,  
**O. villigerum** Blanch. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.382. = *Meso-*  
*morphus villiger* Miedel D. E. Z. 80.140. — Kobé.



*Idisia ornata* Pasc. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.382.

— Enoshima, Niigata.

*Lichenum seriehispidum* Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.447.

*Phaleria Riederi* Falderm. Bull. Mosc. 33:57. T. III. Fig. 8., Lewis

Ent. 93.151. = *Ph. Hilgendorfi* Har. = *Emypsara Adamsi*

Pasc. Journ. of Ent. 66.461. T. 19. Fig. 3 = *E. flexuosa*

Pasc. l. c. Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 94.382.

*Ph. subhumeralis* Mars. adde Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 94.382.

— Hakodate.

### **Epiphaleria** Lewis.

*E. atriceps* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.383. — 95.447.

— Enoshima, Niigata.

### **Trachyscelis** Latreille.

*Tr. sabuleti* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.383. — Enoshima.

### **Bolitophagus** Illiger.

*B. felix* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.384. Pl. XIII. F. 2.

— Nagasaki.

*B. pannosus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.384. — Oyayama.

### **Atasthalus** Pascoe.

*A. bellicosus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.386. Pl. XIII. F. 4.

— Miyanoshita, Hakone, Chiuzenji, Nikko, Nishimura.

*A. dentifrons* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.385. Pl. XIII. F. 3.

— Hakone, Nikko.

### **Bolitonaeus** Lewis.

*B. mergae* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.387. Pl. XIII. F. 5.

— Yuyama.

### **Byrsax** Pascoe.

*B. niponicus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.388. — Nara.

*B. spiniceps* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.388. — Yuyama, Nikko.

*Diaperis niponensis* Lewis. Ent. 87.217. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.389.

— Nikko, Mayebara, Junsai, Sapporo, Yezo.

*D. Lewisii* Bates = *rubrofasciata* Rtt. adde Lewis, Ann. Mag. Nat.

Hist. 94.389. — Nagasaki, Kumamoto, Miyanoshita, Tokio.

**Derispia** Lewis.

*D. maculipennis* Mars. conf. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.389.

**Leiochrinus** Westwood.

*L. satsumae* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.390. Fig. 2.

— Yuyama, Hitoyoshi, Nara Fukahori.

**Leiochrodes** Westwood.

*L. convexus* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.391. Fig. 3.

— Nagasaki, Kioto.

**Arrhenoplita** Kirby.

*A. (Hoplocephala) asiatica* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.392.

— Sapporo.

**Amarantha** Motschulsky.

*A. atrocyanea* Lewis. Ent. Mo. Mag. 92. Ser. 2. 11. pag. 70., Ann. Mag. Nat. Hist. 94.392.

— Oyayama, Chiuzenji, Sapporo, Junsai, Yezo.

**Ischnodactylus** Chevrolat.

*I. loripes* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.392. Pl. XIII. Fig. 6.

— Oyayama.

*Platydema Dejeani* Lap. Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 94.393.

— Junsai, Sendai, Nikko.

*P. fumosum* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.395. — Kioto, Nara.

*P. higonium* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.394.

— Hitoyoshi, Oguma, Rakuwayama.

*P. lynceum* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.395.

— Nantaizan, Yokohama, Junsai.

*P. Marseuli* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.393. = *nigroaeneum* Mars. — Nagasaki, Kumamoto, Miyanoshita, Kadzusa, Yokohama.

*P. nigroaeneum* Motsch. = *musivum* Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.393. — Nikko, Miyanoshita, Kiga, Oyayama.

*P. recticollis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.394.

— Kiga, Nikko, Oyayama, Konosé.

*P. scriptum* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.396. — Nagasaki.

*P. sylvestre* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.394. — Hakone, Kiga.

### **Basanus** Lacordaire.

- B. erotyloides** Lewis. Ent. Mo. Mag. 91.71. Ann. Mag. Nat. Hist.  
94.396. Pl. XIII. F. 7. — Japan.

### **Scaphidema** Redtenbacher.

- Sc. discale** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.397.  
— Kashiwagi, Kiga, Nikko.  
**Sc. nigricorne** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.397. — Kiga.  
**Sc. ornatellum** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 93.396.  
— Oyayama, Kiga, Nikko.  
**Sc. pictipenne** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.397. — Nara.  
*Alphitophagus japanus* Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.398.  
— Nagasaki, Bukenji bei Yokohama.  
**A. pallidicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.398. — Yokohama.

### **Pentaphyllus** Latreille.

- P. oblongus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.398.  
— Yokohama, Bukenji.

### **Menimus** Sharp.

- M. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.398. — Kiga.  
*Ceropria induta* Wiedm. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.400.  
— Nagasaki, Oyama.  
**C. striata** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.399. — Kuma-Kuni.  
**C. subocellata** Lap. Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 94.399. — Nagasaki.  
**C. sulcifrons** Har. S. E. Z. 78.353. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
94.399. — Kiga, Hakone, Oyayama.

### **Addia** Lewis.

- A. scatebrae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.466. — Miyanoshita.

### **Elixota** Pascoe.

- E. curva** Mars. (*Amarygmus*). Ann. Fr. 76.316. Lewis, Ann. Mag.  
Nat. Hist. 94.466. — Nagasaki, Oyayama, Yokohama.

### **Phthora** Germar.

- Ph. canalicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.466.  
— Sapporo, Junsai.

### **Enanea** Lewis.

- E. testacea** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.467. Fig. 4. — Ichiuchi.  
**Uloma latimanus** Kolbe. Arch. f. Nat. Heft 2.86.202. t. 11. F. 34.  
— Miyanoshita, Hakone, Chiuzenji.

### **Corticeus** Piller.

- C. colydioides** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.468.  
— Miyanoshita, Hakone, Kiga, Nikko, Konose.  
**C. gentilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.468. — Yokohama.  
**Toxicum funginum** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.469.  
— Ichiuchi, Nara, Ogura-See.  
**T. tricornutum** Waterh. = **T. umbrosum** Har. conf. Lewis, Ann. Mag.  
Nat. Hist. 94.468. — Oyayama, Yuyama, Usuitoge, Fujisan.  
**T. tuberculifrons** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.469.  
— Oyayama, Tokio, Nara.

### **Anthracias** Redtenbacher.

- A. boleti** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.471. — Oyayama, Oguma.  
**A. duellicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.470. Pl. XIII. F. 8.  
— Yuyama, Kadzusa, Niigata, Junsai.  
**A. fagi** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.471. — Nikko.  
**A. punctulatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.470.  
— Oyayama, Oguma, Goka bei Kumakuni.

### **Setenis** Motschulsky.

- S. higonius** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.472. — Yuyama.  
**S. insomnis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.472. — Buno, Sapporo.  
**S. noctivigilius** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.473.  
— Oyayama, Kashiwagi.  
**S. striatipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.473.  
— Yuyama, Konose.  
**S. valgipes** Mars. (Nyctobates) adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
94.473. — Nagasaki, Konose, Yuyama.  
**Lypros cribrifrons** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.474.  
— Süd Japan.  
**Hemicera zigzaga** Mars. non = **Tetraphyllus Latreillei** Lap. conf.  
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.474. — Nagasaki.

### **Eucirtus** Pascoe.

**Eu. caeruleus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.475.

— Yuyama, Ichiuchi, Kumagawa.

**Tetraphyllus lunuliger** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.475.

— Nagasaki, Kumamoto, Oyayama, Yuyuma, Kobé.

### **Thydemus** Lewis.

**T. purpurivittatus** Mars. = **Scotaeus purpurivittatus** Mars. conf. Lewis,  
Ann. Mag. Nat. Hist. 94.476.

**Gnesis helopioides** Pasc. adde = **Tromosternus** Haagi Har. conf. Lewis,  
Ann. Mag. Nat. Hist. 94.476.

— Nagasaki, Kobé, Kashiwagi, Sado.

### **Misolampidius** Solsky.

**M. clavicrus** Mars. (**Ptilonyx**) adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.476.

**M. molytopsis** Mars. (**Heliophygus**?) adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
94.476. — Nagasaki, Ichibosayama.

**M. rugipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.476. Pl. XIII. F. 10.

— Hakone, Nikko, Fujisan, Oyayama.

### **Stenophanes** Solsky.

**St. rubripennis** Mars (**Ptilonyx**) adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
94.477. — Kobé, Mayasan.

**St. strigipennis** Mars. (**Ptilonyx**) adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
94.477. — Sapporo, Junsai.

### **Lamperos** Allard.

**L. cordicollis** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.478. Pl. XIII.  
F. 11. — Yuyama, Nagasaki, Kobé, Oyama, Kadzusa.

**L. elegantulus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.478.

— Hakone, Miyanoshta, Nikko, Kashiwagi.

### **Helops** Fabricius.

**H. araneiformis** Allard. L'abeille 76.67., Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
96.340. — Japan.

**Plesiophthalmus laevicollis** Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
94.478. — Nikko, Kioto, Nara, Kashiwagi.

**P. brevipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.340. — Oshima.



*P. nigrocyanus* Motsch. adde = *aeneus* Motsch. = *nigritus* Motsch. =  
*aenescens* Motsch. = *sericifrons* Mars. = *glabricollis* Lewis i. l.,  
 Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.478. — Japan.

*P. spectabilis* Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.479.  
 — Nagasaki, Kobé, Nikko.

### **Ainu** Lewis.

*A. tenuicornis* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.480.  
 — Nishimurà, Kuri-Gahara.

*Strongylium brevicorne* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.482. Pl. XIII.  
 F. 12. — Nara, Kashiwagi, Nagasaki.

*St. helopioides* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.482.  
 — Fukahori, Nagasaki.

*St. impigrum* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.481.  
 — Yuyama, Ichiuchi, Hitoyoshi, Nikko, Kashiwagi, Miyanoshta.

*St. japanum* Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 94.480.  
 — Nagasaki.

*St. Marseuli* Lewis (*costipenne* Mäekl?). Ann. Mag. Nat. Hist. 94.481.  
 — Nagasaki.

*St. niponicum* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.480.  
 — Nikko, Kashiwagi, Sado, Tsukubayama bei Tokio.

*Allecule aeneipennis* Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.252.  
 — Nikko, Fukushima, Kashiwagi, Chiuzenji.

*A. cryptomeriae* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.250.  
 — Chiuzenji, Nikko, Mayebashi.

*A. fuliginosa* Maekl. = *obscura* Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat.  
 Hist. 95.251. — Nagasaki, Kioto.

*A. melanaria* Maekl. = *rufipes* Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat.  
 Hist. 95.251. — Yokohama, Nagasaki.

*A. noctivaga* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.251. — Kashiwagi.

*A. simiola* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.251. — Kashiwagi, Nikko.

### **Hymenorus** Mulsant.

*H. veterator* Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.252.  
 — Nikko, Mayasan nahe Kobé.

*Pseudocistela* Haagi Har. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.252.  
 — Nagasaki, Nikko, Miyanoshta, Kashiwagi.

### **Mycetochoares** Berthold.

- M. collina** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.253. — Kashiwagi.  
**M. mimica** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.253.  
— Hitoyoshi, Wadatogé, Junsai, Sapporo.  
**M. scutellaris** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.253. — Konosé.  
**Pytho nivalis** Lewis adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.254. — Nikko.

### **Istrisia** Lewis.

- I. rufobrunnea** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.254. Fig. 1. — Sapporo.

### **Salpingus** Gyllenhal.

- S. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.255.  
— Nikko, Chiuzenji, Junsai, Nishimura.  
**Lissodema ainuum** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.255. — Junsai.  
**L. beatulum** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.257.  
— Oyayama, Nishimura.  
**L. dentatum** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.257.  
— Fukushima, Junsai.  
**L. japonum** Reitter adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.256. — Hagi.  
**L. laevipenne** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.256.  
— Nagasaki, Fujisan.  
**L. minutum** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.258. — Oyayama.  
**L. pictipenne** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.256. — Chiuzenji.  
**L. plagiatum** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.255. — Junsai.  
**L. tomaroides** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.258. — Miyanoshita.  
**L. validicorne** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.258. — Oyayama.  
**Eustrophus niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.259. — Sappora.

### **Holostrophus** Horn.

- H. dux** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.259. — Yuyama.  
**H. orientalis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.259. — Hitoyoshi, Niigata.  
**H. quadrimaculatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.260.  
— Nikko, Miyanoshita, Fujisan.  
**H. unicolor** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.260. — Yuyama.  
**Orchesia elegantula** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.260. — Junsai.  
**O. imitans** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.261.  
— Ichiuchi, Miyanoshita, S.- u. Centr.-Japan.

- O. Marseuli Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.262.  
— Kashiwagi, Fukushima, Chiuzenji, Junsai.  
**O. micans Mars.** zu streichen. conf. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.262.  
**O. ocularis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.261. — Kashiwagi.

### **Microscapha** Leconte.

- M. foenilis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.262. — Simabara, Nagasaki.  
**M. japonica** Reitter adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.262.  
— Nagasaki, Kashiwagi.  
**M. lata Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.262. — Kashiwagi.

### **Synchroa** Newm.

- S. crepuscula Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.263. — Sapporo, Junsai.  
**S. melanotoides Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.263.  
— Junsai, Miyanoshita, Sapporo, Kurigahara.  
**Serropalpus niponicus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.263.  
— Fukushima.

### **Micadonius** Lewis.

- M. gracilis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.264. Pl. VIII. F. 2 ♂.  
— Miyanoshita, Chiuzenji, Nishimura.

### **Euryzilora** Lewis.

- Eu. lividipennis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.265.  
Chiuzenji, Nikko.  
**Phloeotria bellicosa Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.266.  
— Buno, Nishimura, Sapporo, Junsai.  
**Ph. rugicollis Mars.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.266.  
— Mayasan, Kashiwagi, Sappore, Junsai.

### **Dircaea** Fabricius.

- D. dentato-maculata Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.267.  
— Kumagawafuss, Nikko.  
**D. erotyloides Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.267.  
— Nikko, Chiuzenji, Buno.  
**D. femoralis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.268. — Yuyama, Kumamoto.  
**D. flavitarsis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 95.266. Pl. VIII. F. 3.  
— Yuyama, Miyanoshita, Nikko.

- D. obscura** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.268.  
— Nikko, Miyanoshita, Kashiwagi.  
**D. parvula** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.268.  
— Nikko, Otaru, Junsai.  
**D. validicornis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.266.  
— Ikenchaiya bei Kashiwagi.

### **Abdera** Stephens.

- A. scriptipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.269. — Junsai.

### **Hypulus** Paykull.

- H. acutangulus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.270.  
— Oyama, Chiuzenji.  
**H. cingulatus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.269.  
— Nikko, Oyayama, Hakone.  
**H. higonius** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.269. — Oyayama.

### **Bonzicus** Lewis.

- B. hypocrita** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.271. Pl. VIII. Fig. 4.  
— Oyayama, Nikko, Chiuzenji, Nishimura, Junsai, Sapporo.

### **Ivania** Lewis.

- I. coccinea** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.271. Pl. VIII. Fig. 5.  
— Miyanoshita, Kiga, Kashiwagi, Chiuzenji.

### **Melandrya** Fabricius.

- M. atricolor** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.273. Pl. VIII. Fig. 6.  
— Chiuzenji.  
**M. gloriosa** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.272.  
— Miyanoshita, Hakone, Nikko.  
**M. modesta** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.273.  
— Oyama in Sagami.  
**M. mongolica** Solsky. Hor. Ross. 71. VII. 378. Lewis Ent. XXVI. 152.  
Ann. Mag. Nat. Hist. 95.273. — Japan, Yezo.  
**M. niponica** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.273.  
— Chiuzenji, Niohozan.  
**M. ordinaria** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.274.  
— Oyayama, Kashiwagi, Chiuzenji, Mayebara.

- M. pictipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.275. Pl. VIII. Fig. 8.  
 — Nishimura, Nikko, Ichiuchi.  
**M. ruficollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.274. Pl. VIII. Fig. 7.  
 — Ichiuchi, Yuyama, Nikko.  
*Penthe japana* Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.275.  
**Scotodes niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.275.

— Miyanoshita.

### **Nothus** Olivier.

- N. orientalis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.276.

— Miyanoshita, Nikko.

### **Othnius** Leconte.

- O. Kraatzii** Reitt. (*Elacatis*) adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.276.  
 — Japan.  
**O. ocularis** Lewis adde Ann. Mag. Nat. Hist. 95.276.

Kumagawa in Higo.

### **Eutrapela** Dejean.

- E. robusticeps** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.276. — Sapporo.

### **Arthromaera** Kirby.

- A. decora** Marscul. = *Lagria decora* Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.278. Fig. 3. p. 422. — Kobé, Mayasan.  
**A. higoniae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.278. — Yuyama.  
**A. sumptuosa** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.277. — Chiuzenji.  
**A. viridissima** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.277.  
 — Miyanoshita, Oyama, Tokio.  
**Lagria notabilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.341. — Oshima.

### **Macrolagria** Lewis.

- M. fujisana** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.422.  
 — Chiuzenji, Miyanoshita.  
**M. hirsuta** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.423.  
 — Chiuzenji, Niohosan.  
**M. rugipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.341. — Oshima.

### **Monomma** Klug.

- M. glyphisternum** Mars. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.423.  
 — Satzuma.



## **Eurygenius** La Ferté.

- Eu. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.423. Pl. VIII. Fig. 9.  
— Chiuzenji.
- Stereopalpus femoralis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.424.  
— Konosé.
- St. gigas** Marseul. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.424.  
— Oyama, Sagami, Kawachi.
- Macratria antennalis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.425. — Numata.
- M. apicalis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.424. — Numata.
- M. cingulifera** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.424. — Hiogo.
- M. fluvialilis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.425. — Natakugawa.
- M. japonica** Harold adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.425.  
— Yamaguchi, Niigata, Yokohama, Ichiuchi, Numata.
- Xylophilus distortus** Champ. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.426.  
Fig. 4. — Nikko, Kobé, Sakai, Yokohama.
- Notoxus** Haagi Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.426. Fig. 5.  
— Oyama, Nikko, Yokohama.
- N. daimio** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.426. — Hakodate.
- Mecinotarsus minimus** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.428.  
— Nagasaki, Enoshima, Kioto, Otsu, Yokohama.
- M. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.427. — Odawara.
- Tomoderus clavipes** Champ. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.428.  
Pl. VIII. Fig. 10. — Kobe, Mayasan Tempel.

## **Anthicomorphus** Lewis.

- A. cruralis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.429.  
— Nara, Hitoyoshi, Oyayama.
- A. niponicus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.429.  
— Hitoyoshi, Ichiuchi, Nikko, Fukushima, Kashiwagi, Junsai.
- A. puberulus** Mars. — **Anthicus puberulus** Mars. adde Lewis, Ann.  
Mag. Nat. Hist. 95.429. — Mayasan.
- A. suturalis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.428. Fig. 6.  
— Oyayama, Kashiwagi, Miyanoshta, Tsukubayama.
- Anthicus baicalicus** Mulsant. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.431.  
— Kobé, Odawara, Yokohama, Kawasaki, Niigata, Hakodate.
- A. cohaerens** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.430.  
— Yokohama, Kobé, Mayasan, Usuitogé.

- A. extus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.430. — Sapporo.  
**A. fugiens** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.431. Pl. VIII.  
Fig. 11. ♂. — Kiga, Miyanoshita, Nikko, Nagasaki.  
**A. litoreus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.429. — Hakodate.  
**A. perileptoides** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.431. — Kobé  
**Pyrochroa episcopalis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.432.  
— Yuyama.  
**P. higoniae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.432-  
— Süden der Insel Kiushiu, Oyayama, Yuyama.  
**P. japonica** Heyden. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.432. Fig. 7.

### **Horatocera** Lewis (Rhipiphor. gen. nov.).

- H. niponica** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.35. Fig. und 36.  
— Fukushima, Usuitogé, Nara.

### **Stolinus** Lewis.

- St. vagepictus** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.433. Fig. 8.  
— Higo, Oyayama, Ichiuchi.

### **Ditylus** Fischer.

- D. ruficollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.434. — Chiuzenji.

### **Patalia** Lewis.

- P. antennata** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.434. Pl. VIII. Fig. 12.  
— Nara.  
**P. deformis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.435. — Chiuzenji.  
**P. ocularis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.435. — Oyayama, Higo.  
**Xanthochroa ainu** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.436. — Sapporo.  
**X. atriceps** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.436. — Chiuzenji.  
**X. Hilleri** Harold. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.437.  
— Osaka, Junsai, Shiukano, Sapporo.  
**X. luteipennis** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.437.  
— Osaka, Nikko, Fukui, Nishimura, Sapporo.  
**X. Waterhousei** Harold. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.436.  
— Yokohama, Osaka, Tokio, Miyanoshita, Junsai, Sapporo.  
**Var. bicostata** Lewis. l. c. — Chiuzenji.

### **Eobia** Semenow.

- E. ambusta** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.438. — Nagasaki.  
**E. cinereipennis** Motsch. = *Sessinia-Asclera-Ananca cinereipennis*  
Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.438.  
— Süd- u. Central-Japan, Oshima.  
**E. florilega** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.438. — Kobé.

### **Oxacis** Leconte.

- O. carinicollis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.439.  
— Hakodate, Sapporo.  
*Nacerdes melanura* Linn. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.439.  
— Kobé, Nagasaki, Yokohama, Hakodate.

### **Anoncodes** Schmidt.

- A. sambucea** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.439.  
— Junsai, Ontake.

### **Asclera** Schmidt.

- A. brunnipennis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.440. — Hakodate.  
**A. nigrocyanea** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.440.  
— Oyama, Nikko, Nagasaki.  
**Oedemera concolor** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.442.  
— Junsai, Sapporo.

- Oe. manicata** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.442.  
— Fujisan, Nikko, Miyanoshita, Kashiwagi, Oyama.  
**Oe. montana** Mars. adde Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.441 =  
*Oedemera vitticollis* Motsch et = *Oe. lucidicollis* Motsch.  
— Nagasaki, Yokohama, Miyanoshita.

- Oe. robusta** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.443.  
Miyanoshita, Nikko.  
**Oe. sexualis** Mars. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 95.441.  
— Nagasaki.

### **Oncomera** Stephens.

- O. venosa** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist.  
— Kiga, Hakone, Miyanoshita.

### **Chrysanthia** Schmidt.

- Chr. viatica** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.443.  
— Wadatogé, Tsumago, Toriitogé, Suwaratake, Sapporo.

## Cephaloon Newman.

- C. sakurae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.444.  
 — Miyanoshita, Subashiri, Suyama.  
**Balaninus dentipes** Roel (74!) = Hilgendorfi Har. (78!) Lewis, Ann.  
 Mag. Nat. Hist. 96.341.  
**Hylastes ambignus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.57.  
 — Fujisan.  
**H. attenuatas** Erichson Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.56.  
 — Hiogo.  
**H. glabratus** Zetterst. Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.58.  
 — Nikko.  
**H. interstitialis** Chap. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.58.  
 — Subashiri, Kiga, Nagasaki.  
**H. parallelus** Chap. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.56.  
 — Yokohama, Bukenji, Kiushiu.  
**H. plumbeus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.57. = Hyl. ob-  
 scurus Chap. — Nikko, Kobé.  
**Blastophagus** (Myelophilus Eichh.) minor Hart. adde Blandford, Trans.  
 Ent. Soc. Lond. 94.58. War bisher für Japan fraglich.  
**B. piniperda** Fbr. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.58.  
 — Kiushiu.

## Hyorrhynchus Blandford.

- H. Lewisi** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.60. — Sapporo.

## Sphaerotrypes Blandford.

- S. pila** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.62. — Hitoyoshi.

## Hylesinus Fabricius.

- H. cingulatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.67. — Junsai.  
**H. costatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.63. — Junsai.  
**H. laticollis** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.65. — Sapporo.  
**H. nobilis** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.64. — Sapporo.  
**H. scutulatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.67.  
 — Kiga, Subashiri, Nagasaki, Omori, Oyama.  
**H. tristis** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.66.  
 — Ichiuchi, Junsai.

**Phloeosinus dubius** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.70.

— Kurigahara.

**Ph. minutus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.71. — Ichiuchi.

**Ph. Lewisi** Chap. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.73.

— Kashiwagi, Chiuzenji, Kobé, Nowata.

**Ph. perlatus** Chap. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.71.

— Hiogo.

**Ph. pulchellus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.69. — Wada-togé.

**Ph. rudis** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.73.

— Kashiwagi, Kobé.

**Ph. seriatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.72. — Higo.

### **Polygraphus** Erichson.

**P. miser** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.76. — Nikko.

**P. oblongus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.75.

— Chiuzenji, Subashiri.

**P. proximus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 95.75. — Sapporo.

**Scolytus agnatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.78. — Junsai.

**S. aratus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.79. — Junsai.

**S. claviger** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.80. — Kiga.

**S. esuriens** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.77.

— Junsai, Miyanoshita, Chiuzenji.

**S. frontalis** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.79. — Fukushima.

**S. japonicus** Chap. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.80.

— Junsai.

### **Crypturgus** Erichson.

**C. pusillus** Gyll. Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.82.

— Fujisan, Subashiri.

### **Cryphalus** Erichson.

**C. exiguus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.82. — Fukushima.

### **Hypothenemus** Westwood.

**H. expers** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.85.

— Kumamoto, Nagasaki.

**H. peritus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.84. — Nagasaki.

**H. (Stephanoderes) tristis** Eichh. adde Blandford, Trans. Ent. Soc.  
Lond. 94.84.



## **Cosmoderes** Eichhoff.

**C. consobrinus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.86. — Japan.

## **Pithyophthorus** Eichhoff.

**P. jucundus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.87. — Nagasaki.

**Eidophelus minutus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.88.

— Chiuzenji.

**Tomicus angulatus** Eichh. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond.  
94.89. — Nagasaki, Fujisan, Nikko.

**T. cembrae** Heer. Obs. Ent. 36.28. Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond.  
94.89. — Fujisan.

## **Acanthotomicus** Blandford.

**A. spinosus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.90. ♀? 94.91.

— Oyayama, Nikko, Kashiwagi.

**Dryocoetes affinis** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.93.

— Oyayama.

**D. apatoides** Eichh. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.98.

**D. autographus** Ratzeb. Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.92.

— Chiuzenji.

**D. dinoderoides** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.97.

— Ichiuchi.

**D. luteus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.94. — Japan.

**D. moestus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.96. — Nikko.

**D. nubilus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.95. — Kiga, Suyama.

**D. pilosus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.92. — Nikko.

## **Coccotrypes** Eichhoff.

**C. advena** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.100. — Nagasaki.

**D. graniceps** Eichhoff. Rat. Tom. 79.314. Blandford, Trans. Ent. Soc.  
Lond. 94.98. — Nagasaki, Hiogo.

**C. perditor** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.99. — Nagasaki.

**Xyleborus adumbratus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.115.

— Nagasaki, Hitoyoshi, Oyama. Subashiri.

**X. amputatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.575. — Higo.

- X. apicalis** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.105. — Japan.  
**X. aquilus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.109.  
 — Oyayama, Kiushiu, Hitoyoshi, Subashiri.  
**X. atratus** Eichh. adde. — Kiga, Nagasaki.  
**X. attenuatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.114. — Nikko.  
**X. badius** Dupont (?) Eichhoff, Berl. Ent. Zeit. 68.280. Rat. Tom.  
 79.379. Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.116. — Hiogo.  
**X. bicolor** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.113.  
 — Nagasaki, Inasa.  
**X. brevis** Eichhoff. adde: — Nikko.  
**X. compactus** Eichhoff. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.107.  
**X. concisus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.107. — Japan.  
**X. cucullatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.121. (? ♂ des  
 Xyleborus brevis Eichh. — Kurigahama, Konose.  
**X. defensus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.118. — Sapporo.  
**X. exesus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.119. — Miyanoshita.  
**X. germanus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.106.  
 — Oyayama, Nikko, Kiga, Subashiri, Miyanoshita.  
**X. glabratus** Eichh. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. 94.113.  
 — Yokohama, Higo.  
**X. interjectus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.576. — Japan.  
**X. Lewisi** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.104.  
 — Nikko, Hakone, Miyanoshita.  
**X. minutus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.116. — Inasa.  
**X. muticus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.112.  
 — Kashiwagi.  
**X. mutilatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.103. — Japan.  
**X. obliquecauda** Motsch. Bull. Mosc. 63. 1. 513. = carinipennis  
 Eichh. Berl. Ent. Zeit. 69.152 = obliquecauda Eichh. Rat.  
 Tom. 79.351, Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.109.  
 — Yokohama.  
**X. pelliculosus** Eichhoff. Rat. Tom. 79.336. Blandford, Trans. Ent.  
 Soc. Lond. 94.112. — Kiga.  
**X. praeivus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.110. — Japan.  
**X. Schaufussi** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.117.  
 — Junsai, Nikko.  
**X. semiopacus** Eichhoff. Rat. Tom. 79.330. Blandford, Trans. Ent.  
 Soc. Lond. 94.107. — Konose, Kioto, Chiuzenji.

- X. seriatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.111.  
— Nikko, Miyanoshiba.
- X. sobrinus** Eichh. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.115.  
— Chiuzenji.
- X. validus** Eichh. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.108.  
— Sapporo, Junsai, Nagasaki, Oyayama, Nikko, Miyanoshiba.
- X. vicarius** Eichh. adde Blandford, Trans. Ent. Soc. Lond. 94.116.
- NB. X. galeatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.123. ? = ♂.  
X. aquilus Blandford oder obliquecauda Motsch oder validus Eichh. — Nagasaki.
- X. orbatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.123. ? = ♂. X. germanus Blandford oder semiopacus Eichh. — Kurigahara.

### **Trypodendron** Stephens.

- T. pubipenne** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.125.  
— Sapporo, Kiga, Ichiuchi, Miyanoshiba.
- T. quercus** Eichhoff. Berl. Ent. Zeit. 64.381.
- Var. niponicum** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.124.  
— Oyayama, Miyanoshiba.
- T. sordidum** Blandford. Trans. Ent. Soc. London 94.577. — Japan.

### **Scolytoplatypus** Schaufuss.

- Sc. daimio** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 93.433. Tab. XIV, Fig. 3. — Nikko.
- Sc. micado** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 93.437, Tab. XIV, Fig. 4 u. 5. — Nikko. Oyama.
- Sc. siomio** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 93.436.  
— Nikko, Sendai.
- Sc. shogun** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.126. — Higo.
- Sc. tycon** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 93.432. Tab. XIV, Fig. 1.  
— Nikko, Kiga.

### **Crossotarsus** Chapuis.

- C. concinnus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.578 = C. Chapuisi Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.129. — Higo.
- C. contaminatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.131. — Higo.
- C. niponicus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.130.  
— Sapporo, Hakodate, Kiushin, Miyanoshiba, Yuyama.

## **Platypus** Herbst.

- P. calamus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.137.  
— Miyanoshita, Oshima. Higo, Kiushiu, Yuyama.  
**P. hamatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 64.138.  
— Yuyama, Miyanoſhita.  
**P. Lewisi** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.134.  
— Miyanoshita, Kiga, Yuyama.  
**P. modestus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 94.133.  
— Nikko, Shimidzu, Togé.

## **Diapus** Chapuis.

- D. aculeatus** Blandford. Trans. Ent. Soc. Lond. 84.139. — Higo.

## **Eurypoda** Saunders.

(N. g. Cerambycid. prope Aegosoma).

- E. Batesi** Gahan. Ann. Mag. Nat. Hist. 94.225. — Yamagachi.  
**Xylotrechus Villioni**. L. Villard, Bull. Soc. Ent. France 92. LI.  
— Kioto.  
**Melanauster Oshimanus** Fairmaire. Ann. France 95. Bull. 390.  
— Oshima, Liukiu Archipel.

## **Ceratia** Chapuis (Triaplatys Fairm.).

- C. cattigarensis** Weise. D. E. Z. 92.397. — Japan.  
**Hispa higoniae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.342.  
— Yuyama, Higo.  
**Epilachna admirabilis** Crotch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.25.  
— Hakone, Nikko, Shiba bei Tokio,  
**E. niponica** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.23.  
— Nikko, Miyanoshita, Junsai-See.  
**E. vigintioctomaculata** Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
96.24. — Yokohama.  
**E. vigintioctopunctata** Fabr. Syst. Ent. 1775.34. Lewis, Ann. Mag.  
Nat. Hist. 96.25. — Nagasaki, Konosé, Oshima.

## **Anisosticta** Duponchel.

- A. kobensis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 95.25.  
— Kawasaki bei Kobé, Niigata, Honjo.

## **Hippodamia** Mulsant.

**H. tredecimpunctata** Linn. Syst. Nat. 1758.336. Mulsant Sécuripalp.  
182. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.26.

— Kawasaki bei Kobé, Nikko.

**Coccinella ainu** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.27.

— Sapporo, Morowan.

**C. Crotchii** Lewis. adde. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.28.

— Oyayama, Awomori, Mayasan, Sapporo.

**C. duodecimmaculata** Gebl. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.26.

— Kashiwagi.

**C. octomaculata** Fabr. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 93.26.

— Nagasaki.

**C. quatuordecimpustulata** Linn. Syst. Nat. 1758.368.

— Kashiwagi, Yokohama, Fukui, Fujisan, Sapporo.

**C. ronina** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.27. — Oyama, Junsai.

**C. septempunctata** Linn. adde Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.26.

— Ganz Japan.

**C. transversoguttata** Fald. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.26.

— Sapporo, Niigata, Hakodate.

**Leis quindecimmaculata** Hope. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.28.

— Nagasaki, Oshima.

**Ptychanalis axyridis** Pall. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.28.

— Kiukiang, Nikko.

## **Anatis** Mulsant.

**A. halonis** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.28.

— Nichosan, Tsukubayama.

## **Thea** Mulsant.

**Th. cincta** Fabr. = **Halycia** sp. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.  
96.29. — Nagasaki.

**Th. duodecimguttata** Poda. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.29.

— Kobé, Kamiuchi, Yokohama.

**Halycia japonica** Thunb. (**Coccinella** jap.). adde Weise, Ann. Soc. Ent.

Belg. Lewis = **Prophylaea japonica** Thunb. Ann. Mag. Nat.

Hist. 96.30. — Japan.



- Var. virginalis Weise.** Ann. Soc. Ent. Belg. 92.17.  
**Var. Feliciae Muls.** Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. 92.17.  
**Var. dionea Muls.** Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. 92.18.  
**Var. ancora Weise.** Ann. Soc. Ent. Belg. 92.18.  
**Var. tessellata Weise.** Ann. Soc. Ent. Belg. 92.18.  
**Var. tristis Weise.** Ann. Soc. Ent. Belg. 92.19.  
**Var. Lewisi Weise.** Ann. Soc. Ent. Belg. 92.20.  
**Calvia decemguttata Linn.** Syst. Nat. 1767.583, Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.29. — Kashiwagi, Fujisan, Sapporo.  
**C. quatuordecimguttata L.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.29. — Sapporo, Fujisan.  
**C. quindecimguttata Fabr.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.30. — Tokio, Nagasaki, Niigata.  
**Coelophora inaequalis Fabr.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.30. — Nagasaki.  
**Verania discolor Fabr.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.30. — Nagasaki.  
**Synonymcha grandis Thunb.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.30. — Oshima, Nagasaki, Simabara.  
**Ithone mirabilis Motsch.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.30. — Sendai, Sannohé, Morioka, Shirakawa.  
**Chilomenes quadriplagiata Swartz.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.31. — Nagasaki, Kobé.  
**Chilocorus micado Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.32. — Nagasaki.  
**Ch. rubidus Hope.** Gray Zool. Misc. 31.31. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.31. — Nagasaki, Yokohama.  
**Ch. similis Rossi.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.31. — Japan.  
**Sticholotis Hilleri Weise.** Stett. Ent. Zeit. 85.238. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.32. — Hagi, Yamaguchi.  
**St. pictipennis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.32. — Konosé, Ichiuchi.  
**St. punctata Crotch.** adde = **St. rufosignata Weise.** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.32. — Nagasaki, Kobé, Yokohama.  
**St. substriata Crotch.** adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.32. — Nagasaki, Kobé, Yokohama.

*Pentilia nigra* Weise (*Platynaspis*). adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.33. — Nagasaki, Ichiuchi, Fukushima, Oyama.

***Hyperaspis asiatica* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.33. — Nagasaki. *H. japonica* Crotch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.33.

— Kuroheiji, Nagasaki, Kashiwagi, Miyanoshta, Yokohama. *Aspidimerus orbiculatus* Gyll. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.34.

— Nagasaki, Süd-Japan. *Platynaspis Lewisi* Crotch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.34.

— Tokio, Kobé, Yokohama.

### **Amida** Lewis.

*A. tricolor* Har. (*Scymnus*). adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.35.

— Nara, Yamaguchi.

### **Plotina** Lewis.

***P. versicolor* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.35. — Oyama.

*Scymnus dorcatomoides* Weise. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.36.

Nagasaki, Chiuzenji.

*Sc. ferrugatus* Moll.? für Japan. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.38.

***Sc. fortunatus* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.38. — Nagasaki.

*Sc. Hareja* Weise. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.37.

— Hagi, Mayasan bei Kobé.

*Sc. hilaris* Motsch. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.38.

— Nagasaki, Kiga, Tokio.

*Sc. Hofmanni* Weise. adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.37.

— Kobé, Yokohama, Nagasaki.

***Sc. niponicus* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.37.

— Yokohama, Nagasaki.

***Sc. paganus* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.38.

— Nagasaki, Yuyama, Oyama.

***Sc. patagiatus* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.39. — Nagasaki.

***Sc. phosphorus* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.37.

— Tagania bei Nagasaki.

***Sc. pilicrepus* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.36.

— Yokohama, Kiga, Ichiuchi, Kashiwagi.

***Sc. sylvaticus* Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 96.36.

— Nagasaki, Yokohama.

**Rodolia** Mulsant.

**R. concolor** Lewis (Novius). adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.40.

— Kobé, Nara.

**R. limbata** Motsch (Novius). adde Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 96.39.

— Nagasaki etc.

**R. narae** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.40.

— Nara.

**R. rufocincta** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 96.40.

Kiga, Nikko, Chiuzenji.

---

# DIE WIRBELTHIERE

DES

REGIERUNGSBEZIRKS WIESBADEN.

VON

PROF. DR. B. BORGGREVE

(WIESBADEN.)

---





## I. Einleitung.

---

In den Heften XVII und XVIII der Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde hat der schon damals ca. 25 Jahre am Wiesbadener Naturhistorischen Museum als Conservator wirkende und noch heute in erfreulicher Rüstigkeit dieses Institut fördernde Herr A. Römer sehr verdienstlicher Weise ein

„Verzeichniss der Säugethiere und Vögel des Herzogthums Nassau, insbesondere der Umgegend von Wiesbaden“

veröffentlicht, welches dann von Julius Niedner's Verlagshandlung 1863 auch als Sonderabdruck ausgegeben ist.

Etwa ein Lustrum später, 1869, veröffentlichte Verfasser dieses seine

„Vogelfauna von Norddeutschland“ (Berlin, Julius Springer 1869)

ohne damals von der Existenz der wohl nicht selbstständig in den eigentlichen Buchhandel gelangten A. Römer'schen Arbeit Kenntniss erhalten zu haben.

Verfassers Schrift, welche sich betreffs der Ornis, dem Titel entsprechend, ein viel umfänglicheres Ziel stellt, ist, wie S. 52 derselben erläutert, so angelegt, dass mit Hülfe derselben für jedes kleinere Gebiet Norddeutschlands leicht eine ziemlich richtige Special-Vogelfauna entworfen werden kann.

Den heutigen Regierungsbezirk Wiesbaden freilich hatte Verfasser zu jener Zeit nur flüchtig auf Durchreisen berührt, aber noch nicht näher kennen gelernt, während es ihm schon damals vergönnt gewesen war, übrigens in fast allen Theilen Norddeutschlands, von Ostpreussen und Oberschlesien bis zum Mosel- und Nahegebiet hin, das Material von eigenen Beobachtungen zu sammeln, wie es zur kritischen Sichtung und Verkittung der bereits zu jener Zeit sehr umfänglichen special-

faunistischen Publikationen erforderlich war. Deshalb bot ihm grade die A. Römer'sche Arbeit über Nassau von 1863 zunächst einen überaus geeigneten Prüfstein für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse seiner damaligen, aus Litteratur und eigenen Beobachtungen hergeleiteten Abstraktionen betreffs dessen, was ein jeder kleinere Theil des vom Verfasser bearbeiteten norddeutschen Gesamtgebietes als Special-Vogel-fauna etwa aufweisen müsse. Weiterhin aber ist Verfasser durch seine viel grössere Gebiete mit einbegreifenden Studien über die Verbreitung der europäischen Vögel und Säugethiere, wie auch durch eine nunmehr etwa 6jährige amtliche Thätigkeit im Regierungsbezirk Wiesbaden mit vieler Gelegenheit zur Beobachtung im Freien, wohl berechtigt, hier und da Bedenken gegen manche, später nicht genügend bestätigt erscheinende der A. Römer'schen Angaben von 1863 geltend zu machen, sowie auch einzelne Ergänzungen derselben zu bringen. Dabei sei es ihm gestattet, sein Hauptbeobachtungsgebiet neben der näheren Umgebung von Wiesbaden, nämlich den nicht zum alten Nassau gehörigen Kreis Biedenkopf und auch den Frankfurter Wald mit einzubeziehen, und dann zum Schluss ein übersichtliches, berichtigtes Verzeichniss sämtlicher Wirbelthiere des jetzigen Regierungsbezirkes Wiesbaden nach seinem heutigen Artenbestande zu bringen, in welchem freilich die Amphibien, Reptilien und Fische mit nur unerheblichen Aenderungen nach der verdienstlichen Arbeit Prof. C. L. Kirschbaum's im 17./18. Jahrgang der „Nass. Jahrb. d. G. f. Naturk. im Herz. Nassau“ von 1862/63 aufgeführt werden mussten, da Verf. über diese Klassen aus eigener sicherer Kenntniss nicht viel zufügen oder streichen konnte und sonstige Arbeiten, welche auf der Kirschbaum'schen fortgebaut hätten, ihm nicht bekannt geworden sind.

Betreffs der Säugethiere und Vögel wird er sich dabei — unter Berücksichtigung der beiden von A. Römer selbst im Jahrg. 31/32 von 1878/79 und im Jahrg. 45 von 1892 gebrachten Nachträge — an die am Schlusse der ersten A. Römer'schen Arbeit gegebenen systematischen Uebersichtstabellen halten und zunächst durch die kritische Musterung derselben den Beweis liefern, dass die am Ende gegenwärtiger Arbeit gebrachte neue Aufstellung des Verzeichnisses wenigstens für die Vögel wirklich nöthig erschien.

Da nun der grösste Theil der erforderlichen Aenderungen nicht sowohl Hinzufügung neuer Arten, als vielmehr völlige Streichung einzelner und — vorzugsweise — andere Ergebnisse betreffs der Art des Vorkommens

und des Heimathsrechts vieler Vogelarten im Gebiet betrifft, so erscheint zunächst betreffs der Kunstausdrücke, mit welchen die Verschiedenheiten des temporären Vorkommens der Vögel bezeichnet werden, eine Verständigung erforderlich; sofern die von Herrn A. Römer, S. 5, eingeführten 6 Hauptverschiedenheiten sich zwar dem Sinne nach ziemlich, aber doch der Definition und Anordnung nach nicht ganz mit den vom Verf. in seiner Vogelfauna angewandten und dort S. 28—31 eingehend erläuterten und begründeten decken.

Es möge demgemäss gestattet sein, das Wesentliche des dort Ausgeführten an dieser Stelle auszugsweise zu rekapituliren:

### Typische Verschiedenheiten der periodischen Verbreitung der Vögel.

Sehen wir von den mehr unregelmässigen temporären Veränderungen der Verbreitung — Vagabondiren, Vorrücken, Zurückweichen einzelner Arten — ab, so lassen sich die Verschiedenheiten der Zugverhältnisse nach Kategorien zusammenfassen; nur muss man nicht verlangen, dass bei der unendlichen Mannigfaltigkeit und den vielen Uebergängen, welche die Natur hier wie überall bietet, jede einzelne Vogelart ganz zweifellos und allein einer der bezeichneten Kategorien angehören müsse. Jede wissenschaftlich-didactische Behandlung der Natur verlangt zur Klärung der Sache schärfere Trennungen, als sie in der Natur selbst begründet sind. Ein Zusammenfassen des Gleichartigen ist aber ohne Klassen- etc. Trennung hier so wenig möglich, wie in der Systematik, obwohl also die Natur in systematischer, wie in biologischer Beziehung nicht Klassen etc. sondern nur Typen mit mehr oder weniger merklichen Uebergängen von einem zum andern bietet. In diesem Sinne, als Typen, wolle man die Abtheilungen der nachfolgenden Zusammenstellung auffassen. Manche Bezeichnungen in derselben sind neu, oder wenigstens in einem anderen Sinne gebraucht, wie dies bisher von anderen Schriftstellern geschehen ist.

Wir unterscheiden hiernach folgende Haupttypen:

- A. Die Vögel, welche regulär im Gebiet brüten, „Brutvögel“,  
bleiben entweder als Individuen betrachtet, das ganze Jahr hindurch in der Nähe des Brutplatzes
  - a) und heissen dann „Standvögel“;  
oder sie verlassen den Brutplatz zu gewissen Jahreszeiten, werden dann aber in der Gegend durch andere Individuen derselben Art ersetzt, so dass zwar nicht dasselbe Individuum, aber doch die Art wesentlich immerfort in der Nähe des angenommenen Brutplatzes vertreten ist,
  - b) wir nennen sie dann „Strichvögel“;  
oder endlich sie verlassen als Art die Brutgegend während eines Theiles des Jahres gänzlich, und gehören derselben nur für einen grösseren oder kleineren Theil des Sommers an,
  - c) diese mögen „Sommervögel“ heissen.

- B. Solche Vögel, welche zwar jährlich oder doch in vielen Jahren und grösserer Anzahl eine Gegend berühren, ohne daselbst zu brüten, „Zugvögel“, können in derselben jährlich zweimal erscheinen und dann in der kältesten und wärmsten Jahreszeit dort in der Regel fehlen;
- d) sie werden im folgenden „Durchzugsvögel“ genannt und können
- α. regelmässige, d. h. jährlich erscheinende, und
  - β. unregelmässige, d. h. nur in den meisten Jahren vorkommende sein;
- oder sie bringen im Wesentlichen die ganze kalte Jahreszeit dort zu und fehlen nur in der warmen immer;
- e) für sie gelte die Bezeichnung „Wintervögel“; auch bei ihnen sind wie ad d:
- α. regelmässige und
  - β. unregelmässige zu unterscheiden, welchen hier noch
  - γ. die nur in wenigen Jahren, aber immerhin in grösserer Zahl auftretenden — periodisch erscheinenden — zuzufügen wären.
- C. Vögel, welche nur zuweilen, unregelmässig und dann meist einzeln, aber doch nachweislich im Gebiete vorgekommen sind, nennen wir
- f) „Gäste“ des Gebietes und zwar:
- α) Brutgäste, wenn sie nachweislich schon einzeln im Gebiet gebrütet haben;
  - β. nicht seltene Gäste, wenn fast jährlich hier und da im Gebiet ein oder anderes Exemplar beobachtet wird;
  - γ. seltene Gäste, wenn die einzelnen Vorkommnisse derselben, welche bekannt geworden sind, noch zählbar erschienen;
  - δ. einmal beobachtete Gäste, wenn nur ein Vorkommen sicher nachgewiesen ist.

Hiernach wären die bezeichneten 6 Hauptverschiedenheiten Verfassers:

#### A. Regelmässig vorkommende Arten:

- a) Brutvögel (im Gebiet regelmässig brütend):
- 1. Standvögel, }
  - 2. Strichvögel, } In dem weiter unten folgenden neuen
  - 3. Sommervögel; } Verz. d. Vögel d. Reg.-Bez. Wiesbaden zusammengefasst als „Jahresvögel“.
- b) Zugvögel:
- 4. Durchzugsvögel,
  - 5. Wintervögel.

B. Unregelmässig vorkommende Arten:

6. Gäste. — — —

Herr A. Römer unterscheidet dagegen S. 5 und in der Tabelle:

1. Standvögel,
2. Strichvögel,
3. Zugvögel „im Allgemeinen“,
4. Sommerzugvögel,
5. Winterzugvögel,
6. Irrende.

Wenn man die Nummern 3 und 4 umsetzt, so dürften sich die A. Römer'schen bez. Begriffe ziemlich mit denjenigen decken, welche Verfasser mit obigen 6 Namen etwas anders, und wie er meint, treffender bezeichnete.

## II. Nachträge zu A. Römer's Verzeichniss der Säugethiere.

Ad 2. Hier würde, wenigstens für das Gebiet von Frankfurt und Umgebung, noch einzuschalten sein:

2 a. **Cervus Dama** L. Damhirsch, freilich dort, wie überall in Deutschland, wo er vorkommt, nur eingeführt, aber doch völlig verwildert.

Ad 3. **Sus Scrofa** L. Das Wildschwein, um 1860 nach A. Römer ausser dem Platter Park nicht mehr vorhanden, kommt heute wieder in fast allen grösseren Wäldern des Regierungsbezirks Wiesbaden, am häufigsten wohl in den steilen Rheinabhängen bei Lorch etc. im Freien vor. Es wird aber überall verfolgt und thunlichst ausgerottet und fehlt dann bei seinem unsteten Naturell auch wohl einmal in grösseren Waldkomplexen einige Jahre vollständig, während es an anderen Stellen wieder ganz unerwartet auftritt. Der von A. Römer als damals einziges — aber umschlossenes — Vorkommen erwähnte Park bei der Platte ist, nachdem darin sämmtliches Schwarzwild abgeschossen war, im letzten Winter geöffnet.

Ad. 7. Hier ist einzuschalten:

7 a. **Arvicola agrestis** L. Erdwühlmaus, welche dem Verfasser sowohl aus Biedenkopf, wie auch aus Alt-Nassau mehrfach zur Bestimmung eingeliefert worden ist.



Ad 17 und 18. Hier bleibt zu bemerken, dass **Myoxus Nitela** Schreb. = **M. quercinus** L. Gartenschläfer, im Gebiet, besonders den höheren Berglagen <sup>1)</sup> desselben, nach Verfassers Beobachtungen sehr viel häufiger zu sein scheint, als der eigentliche Siebenschläfer, **M. Glis**, welcher sich doch wohl mehr auf die tieferen (Weinbau-) Lagen beschränkt.

Ad 43. Der Wolf ist für die Gegenwart zu streichen.

### III. Nachträge zu A. Römer's Verzeichniss der Vögel.

Ad 3. **Falco peregrinus** Briss. Wanderfalk. Ist in der 4ten Spalte des Verzeichnisses zu streichen und in die 2te zu übertragen, sofern er verschiedentlich, z. B. am Rheinstein, oberhalb St. Goar etc. regelmässig brütet, dann aber auch in Nassau, wie im übrigen Deutschland während des ganzen Winters, wenn auch nirgends häufig, vorkommt. Auf Anordnung der Behörden hin wird er neuerdings im Interesse der Brieftaubenzucht von den Forstbeamten eifrig verfolgt.

Ad 9. **Pernis apivorus** L. Wespenbussard. Ist im ganzen Regierungsbezirk, wie überhaupt im westdeutschen Berglande thatsächlich viel häufiger als meist angenommen wird. Erst sehr spät, im Mai, eintreffend, bezieht und flickt <sup>2)</sup> er seinen, dann <sup>3)</sup> in den belaubten Buchenkronen meist nur schwer zu entdeckenden Horst, und ist im Fluge resp. nach der Stimme nur für den Kenner von dem gemeinen Bussard zu unterscheiden.

Weil er während der kaum 3 Monate seines hiesigen Aufenthaltes vorwiegend von den Brutwaben der Wespen lebt, deren Nester er mit grossem Geschick auffindet und zerstört, muss er für das Weinbaugebiet, in welchem die Wespen oft sehr schädlich werden, als einer der nützlichsten Vögel gelten und dort mit dem mäusevertilgenden gemeinen Bussard, von dem er sich überdies, wie schon angedeutet, vor der Erlegung nur für Wenige genügend unterscheidet, möglichst geschont werden.

---

<sup>1)</sup> Fast in jeder alten Köhler- oder sonstigen Schutzhütte findet sich im Sommer eine Familie dieser Art.

<sup>2)</sup> In d. R. mit z. Th grün belaubten Zweigen.

<sup>3)</sup> Wenn man ihn also nicht schon vorher resp. in früheren Jahren genau sich gemerkt hat.

Ad 15. *Milvus niger* Briss. Dunkler Gabelweih, ist aus Sp. 3 in Sp. 4 zu überschreiben, da er, wie wohl zuerst von A. von Homeyer festgestellt worden ist, vom Verf. aber aus der neuesten Zeit sicher bestätigt werden kann, wenigstens in den Kiefernwaldungen der Rhein-Main-Ebene um Frankfurt regelmässig brütet. Dieses Brut-Vorkommen des sonst erst vom Elbgebiet ab nach Osten zu, dort aber relativ häufig brütenden Vogels scheint für das westliche Deutschland ein völlig inselartiges zu sein. Nur für die Umgebung von Metz ist vor einem halben Jahrhundert (Schäfer, „Moselfauna“ 1844) das gleiche angegeben, aber aus neuerer Zeit wohl nicht mehr bestätigt.

Ad 10, 16, 17, 24. Bussard, Hühnerhabicht, Sperber und Waldohreule sind richtiger in Sp. 2 als in Sp. 1 unterzubringen, da sie — als Individuen betrachtet — nicht den Winter über in der Umgebung der Brutstelle bleiben.

Ad 19. *Circus pallidus* Sykes. Steppenweihe. Gehört nicht in die 3., sondern in die 6. Spalte.

Ad 20 und 21. *Circus cineraceus* u. *aeruginosus* L. Wiesen- und Rohrweihe. Sind als Brutvögel für das Gebiet noch nicht sicher genug bestätigt, gehören also vorläufig in Spalte 3.

Ad 28 und 30. Die Spurbereule und die Zwergohreule sind wie die Steppenweihe nur Irrgäste und gehören deshalb richtiger in die 6. als in die 3. Spalte.

Ad 37. *Picus Martius* L. Schwarzspecht. Ist mit der Ausdehnung des Nadelholz-Anbaues im westdeutschen Buchengebiet mehr und mehr nach Westen vorgedrungen und heute im Casseler Bezirk, im Kreise Biedenkopf, im Taunus bei Wiesbaden und wahrscheinlich auch noch an anderen Stellen des Gebietes in einigen Pärchen regelmässiger Brut- und echter Standvogel geworden, mithin aus der 6. in die 1. Spalte zu übertragen, während die 3 Bunt-Spechte (No. 38, 39, 40), wie auch der Eisvogel (No. 41) richtiger in Spalte 2 als in Spalte 1 unterzubringen sind.

Ad 49. Gemäss A. Römer's Mitth. über ein Nest mit Eiern, welches bei Sonnenberg gefunden sein soll (ohne Erlegung des Vogels), (I. Nachtrag von 1878/79) wäre mit einzufügen für Sp. 6 (als Brutgast).

49a. *Emberiza Cirlus* L., welche — südwestliche — Art bei Trier auch noch brüten soll.

Ad 50. *Emberiza Miliaria* L. Grauammer. Ist als Art auch über Winter bei uns und daher aus Spalte 4 in Spalte 2 zu übertragen.

Ad 55 und 72—77. Der Dompfaff und sämtliche eigentlich heimischen Meisenarten gehören richtiger in Spalte 2 als in Spalte 1.

Ad 62 und 71. Der Citronenfink und die Bartmeise sind nur Irrgäste und gehören daher nicht in die 3., sondern in die 6. Spalte.

Ad 64. *Fringilla petronia* L. Felsensperling. Die Angaben A. Römer's auf S. 62 dürften ohne neuere Bestätigungen durch zuverlässige Kenner doch nicht genügen, den Felsensperling als Brutvogel des Gebietes zu legitimiren. Vergleiche darüber die Ausführungen auf S. 76 von Verfassers „Vogelfauna von Norddeutschland“, nach welchen sichere Brutvorkommnisse für Deutschland überhaupt nicht constatirt sind. Erfolgt solche Bestätigungen, so wäre Nassau das einzige sicher festgestellte Brutgebiet für einzelne Pärchen dieser Art in Nord- und Mitteldeutschland. Vorläufig gehört sie in Sp. 6, nach Befinden als Brutgast.

Ad 87. *Corvus frugilegus* L. Saatkrähe, brütet auf einigen Rheininseln und gehört daher in Sp. 2.

Ad 93. *Anthus Spinoletta* L. Wasserpieper. Gehört richtiger in die 5. als in die 3. Spalte, weil er, wenn und wo er überhaupt bei uns erscheint, an warmen offen gebliebenen Wiesen- und Uferstellen i. d. R. auch überwintert.

Ad 96. *Anthus campestris* L. Brachpieper. Ist als Brutvogel des Gebietes noch nicht genügend bestätigt und gehört, bis dieses erfolgt ist, in Spalte 6.

Ad 102. *Turdus iliacus* L. Weindrossel. Ueberwintert — abgesehen etwa von vereinzelter, vielleicht krank geschossenen etc. Individuen — bei uns nicht, ist vielmehr ausgesprochener Frühlings- und Herbst-Durchzugsvogel, daher in Spalte 5 zu streichen und in Sp. 3 einzurücken.

Ad 104. *Turdus torquatus* L. Schildamsel. Für sie gilt das gleiche wie für die Weindrossel (102).

Ad 105. *Turdus pilaris* L. Wachholderdrossel. Sie gehört zunächst als ausgesprochener, regelmässiger Wintervogel in Spalte 5. Wenn gleich Kolonien dieser gesellig brütenden, und, wie es scheint von Osten nach Westen etwas vorrückenden Art bis in's Flussgebiet der Elbe schon

länger festgestellt sind, so bleibt die Existenz solcher für Nassau bez. am Lenneberg bei Mainz doch noch sicherer zu bestätigen, als durch die vereinzelte Angabe von Nicolaus auf S. 41.

Ad 106. *Turdus viscivorus* L. Misteldrossel. Ueberwintert fast durchweg im Brutrevier und ist daher aus Spalte 4 in Spalte 1 zu übertragen, in die sie mit mindestens demselben Recht wie die Schwarzsamsel gehört.

Ad 113. *Salicaria aquatica* Loth. Von dieser Rohrsängerart ist das Brüten im Gebiet bisher wohl nicht genügend festgestellt und höchst unwahrscheinlich, wenngleich dieselbe an geeigneten Sumpf-Stellen auf dem Frühlings- und Herbstdurchzuge häufiger im westlichen Deutschland beobachtet resp. erlegt ist. Vorläufig gehört sie am richtigsten in die 6. Spalte.

113 a. Hier bleibt in Sp. 4 einzufügen: *Salicaria locustella* Pennant, Heuschreckenrohrsänger, der vom Verf. Pfingsten 1895 bestimmt bei Battenberg beobachtet ist und nach v. Reichenau, Chr. Deichler und O. Kleinschmidt auch in den Rheinauen brütet. Wegen des charakteristischen Gesanges ist ein Irrthum ausgeschlossen.

Ad 114 und 115. Von den beiden Goldhähnchen gehört das erstere — feuerköpfige — als regelmässiger Sommervogel in die 4., das zweite — gelbköpfige — als Strichvogel in die 2. Spalte.

Ad 124 und 134. Die — östliche — Sperber-Grasmücke und noch mehr der bisher kaum irgendwo in Deutschland sicher erlegte Mittelmeer-Steinschmätzer gehören, wenn überhaupt in das Verzeichniss, dann sicher nur mit einem ? in dessen 6. Spalte. Verf. ist der Meinung, dass beide ganz zu streichen sind, da die A. Römer'schen Textangaben S. 43 und 45 für 124 zur Aufnahme nicht genügen und für 134 sicher auf Verwechslung der Art beruhen.

Ad 125. *Lusciola Philomela* Becht. Sprosser. Die Angabe A. Römer's: „Bei Mainz vorkommend (Nicolaus)“ genügt nicht, den östlichen Vertreter der deutschen Nachtigall als der nassauischen Ornis angehörig zu betrachten. Wenn ein bei Mainz wirklich im Freien erlegtes Exemplar genügend zuverlässig bestimmt ist, so spricht alles dafür, dass es ein von den vielen durch Singvogelhändler importirtes und dann geflüchtetes gewesen ist. Mit gleichem Recht resp. Unrecht könnte Verf. auch den Bergfink Fr. Montifringilla L. als Sommervogel für Nassau bezeichnen, den er voriges Jahr im Hochsommer — zunächst



zu seinem Erstaunen — bei Wiesbaden hörte. Als dann der Vogel mit einem schnell herbeigeschafften Gewehr erlegt war, ergaben die ramponirten Schwanzfedern die Herkunft deutlich genug.

Ad 130. **Lusciola Tithys Scop.** Hausrothschwanz. Von ihm mag hier bemerkt werden, dass er vielleicht nirgends in Deutschland wieder so häufig ist, als im engen Rheinthale zwischen Coblenz und Bingen. Er kann geradezu als Charaktervogel für das genannte Terrain bezeichnet werden.

Ad 141. **Muscicapa albicollis Temm.** Halsband-Fliegenfänger. Ist vorläufig aus dem Verzeichniss zu streichen, da die einmalige von A. Römer angeführte „Beobachtung“ Snells sicher auf der leicht möglichen Verwechslung mit dem schwarzköpfigen Fliegenfänger beruht. Keinenfalls aber gehört die Art in Spalte 3.

Ad 147 und 153. Die als Stammutter der meisten Haustauben-Racen an unsern Thürmen etc. vielfach wieder verwilderte und dann meist völlig in die Urform der Mittelmeerküsten zurückgeschlagene Fels-taube und der mehrfach naturalisirte Fasan gehören — nach Geschmack — gar nicht in das Verzeichniss oder in Spalte 1 desselben.

Ad 157. **Otis tarda L.** Grosse Trappe. Dieselbe kann keinenfalls als Standvogel, schwerlich überhaupt als Brutvogel des Gebietes gelten, gehört vielmehr als seltener Wintergast desselben in Spalte 5 oder 6.

Ad 161. **Ortygometra pygmaea Naum.** Zwergsumpfhuhn. Wenn die Angaben A. Römer's auf S. 51 durch Erlegung von sicher zu bestimmenden Sommer-Exemplaren sich bestätigen liessen, so dass also keine Verwechslung mit dem punktirten Rohrhuhn möglich wäre, so bliebe auch dies Brut-Vorkommen — wie das zweifellose des schwarzen Milans und das sehr zweifelhafte des Felsensperlings — ein Unikum für das nordwestliche Deutschland.

Ad 162. **Rallus aquaticus L.** Wasserralle. Brütet schwerlich im Gebiet und ist, bis sicheres darüber festgestellt wird, in Spalte 3 oder auch 5 zu führen, letzteres weil sie an offenen Bächen vielfach bei uns überwintert. O. Kleinschmidt freilich führt sie auch als Brutvogel auf, giebt aber nichts Näheres an.

Ad 165. **Grus cinerea L.** Kranich. Ist für das Gebiet nicht Winter-, sondern regelmässiger Durchzug-Vogel, gehört daher in Spalte 3.

Ad 166, 168, 170, 171, 174, 183, 184, 186, 187, 192, 194, 202: **Oedienemus crepitans Temm.** Triel. **Squatarola helvetica Briss.**



Kiebitz-Regenpfeifer. *Eudromias Morinellus* L. Mornell-Regenpfeifer. *Aegialites cantianus* Luth. Strand-Regenpfeifer. *Hämatopus Ostralegus* L. Austernfischer. *Phalaropus cinereus* Briss. Kleiner Wassertreter. *Limosa rufa* Briss. Rostrothe Uferschnepfe. *Calidris arenaria* L. Sanderling. *Tringa Canutus* L. Isländischer Strandläufer. *Ascalopax major* J. Fr. Gml. Pfuhlschnepfe. *Numenius Phaeopus* L. Kleiner Brachvogel. *Ardea Nycticorax* L. Nachtreiher. Die sämtlichen hier bezeichneten Stelzvögel können auch für das Rhein- und Mainufer nicht als nur einigermaßen regelmässig vorkommende Durchzugvögel, vielmehr nur als Irrgäste bezeichnet werden, da ihre Zugstrasse sich im Litoralgebiet hält, also Mitteleuropa nicht mit dem Rheinthale durchschneidet.

Ad 173. *Aegialites Hiaticula* L. Seeregenpfeifer. Ist aus Sp. 4 in Sp. 3 zu übertragen, da sein vermeintliches Brüten im Gebiet sicher auf Verwechslung mit dem Flussregenpfeifer zurückzuführen ist.

Ad 179. *Totanus calidris* L. Gambett-Wasserläufer. Brütet an den Seeburger Teichen sicher, gehört also in Sp. 4.

Ad 182. *Actitis hypoleucos* L. Fluss-Uferläufer. Ist zwar in der Tabelle richtig registriert; aus den Angaben A. Römer's auf S. 57 erhellt aber nicht, dass er neben dem bereits erwähnten Flussregenpfeifer der einzige regelmässig, und an geeigneten Stellen — alte Betten, Sandbänke etc. — überall brütende „Strandläufer“ des Rheins und aller seiner grösseren Nebenflüsse ist.

Ad 184. Hier ist nunmehr — für Sp. 6 — einzuschalten:

*Limosa Aegocephala* L. Schwarزشwänzige Uferschnepfe. Uebrigens ist es <sup>1)</sup> wahrscheinlicher, dass diese, als dass die bei A. Römer, S. 57, angeführte rostrothe, die am Rhein öfter erlegte Art war. Denn sie brütet an geeigneten Stellen, wenn auch selten, durch ganz Norddeutschland an süssem Wasser und kommt auf dem Zuge überall häufiger im Binnenlande am süssen Wasser vor, während die hochnordische rostrothe auf ihrem Zuge in Deutschland die Küste nur ganz ausnahmsweise als Irrgast verlassen hat.

Ad 188 — 189. Hier dürften einzuschalten sein die beiden Arten:

*Tringa subarquata* Gölldenstädt und *Temminckii* Leisler, welche ebenso

---

1) Wie Verf. schon, bevor ihm die Bestätigung der Art in A. Römer's Nachtrag von 1892 bekannt wurde, niedergeschrieben hatte.

wie *T. minuta*, aber sehr einzeln, den dem Rheinthale auf dem Zuge folgenden Schwärmen von *T. Cinclus* L. beigemischt sind.

Ad 198. Brutkolonien oder Einzel-Horste des gemeinen Fischreiher sind dem Verf. für Nassau nicht, wohl für die Gegend von Wabern bei Cassel bekannt geworden, wenn auch — wie dieses bei manchen anderen Wasservögeln der Fall ist — vagabondirende, aus irgend welchen Gründen nicht zum Nisten kommende Individuen sich das ganze Jahr hindurch am Rhein etc. aufhalten. Die Art muss aber für Nassau aus Spalte 4 gestrichen und in Spalte 3 oder nach Befinden auch 5 übertragen werden.

Viel wahrscheinlicher bliebe es, dass der Purpurreiher und die grosse Rohrdommel, beide u. A. auch in Holland und Ostfriesland heimisch, gelegentlich in alten Rheinbetten, zwischen den Main-Kribben oder im Ried — bisher unbemerkt — zum Brüten gekommen wären, sofern sie heimlicher leben und ihren Horst versteckt im Rohr haben, nicht auf Bäumen, wie der graue Fischreiher. Wenn A. Römer vom Rohrdommel anführt, dass er nach Prinz Max von Wied — also vor langer Zeit — bei Seeburg gebrütet habe, so ist das, nachdem der grösste der dortigen Teiche längst abgelassen, aufgegeben und dauernd in Acker und Wiese verwandelt worden, für die Gegenwart nicht mehr sicher, wie Verf. auf Anfrage von dem Fürstl. Wiedschen Oberförster Herrn Sorg erfuhr. In der Tabelle figurirt er bei A. Römer richtig in der dritten Spalte.

Ad 203. Einzuschalten für Sp. 6: 203 a. *Ardea Garzetta*, kleiner Seidenreiher. Vor einigen Jahren bei Schierstein erlegt. (Geh. Reg. R. von Reichenau.)

Ad 203. Hier sei bemerkt, dass der schwarze Storch auch heute noch — wenn auch nur sehr vereinzelt Paare — in grösseren zusammenhängenden Waldkomplexen Hessen-Nassaus, z. B. auch bei Battenberg regelmässig im Sommer vorkommt und sicher noch brütete, wenn ihm nicht so nachgestellt würde.

---

Betreffs der Schwimmvögel führt das A. Römer'sche Verzeichniss eine grosse Zahl von Arten in den Spalten 3 und 5 auf, welche nach der Art und Seltenheit ihres Vorkommens richtiger in die Spalte 6 zu übernehmen wären.

Es sind dieses insbesondere:

No. 206.	<i>Cygnus musicus</i> Bechst.	. . .	Singschwan.
„ 207.	<i>Cygnus Olor</i> Gml.	. . .	Höckerschwan.
„ 208.	<i>Anser minutus</i> Naum.	. . .	Zwerggans.
„ 211.	<i>Anser Brenta</i> Pall.	. . .	Rottgans.
„ 212.	<i>Vulpanser Tadorna</i> L.	. . .	Fuchsente.
„ 215.	<i>Anas strepera</i> L.	. . .	Schnatterente.
„ 220.	<i>Oidiemia fusca</i> L.	. . .	Sammetente.
„ 221.	<i>Oidiemia nigra</i> L.	. . .	Trauerente.
„ 224.	<i>Fuligula Marila</i> L.	. . .	Bergente.
„ 226.	<i>Fuligula Nyroca</i> Güld.	. . .	Brandente.
„ 228.	<i>Fuligula rufina</i> Pall.	. . .	Kolbenente.

Ferner:

No. 239—41, alle 3 *Colymbus*-Arten; No. 243—46, alle 4 *Lestris*-Arten und auch die unter 249, 251, 252 und 253 aufgeführten *Larus*-Arten (während No. 250 *L. Canus* L., Sturmmöve, für Spalte 5 noch besser als für Spalte 3 ein Anrecht hätte); endlich noch No. 256 und 257, die englische und die weissschwinge Seeschwalbe, *Sterna anglica* Mont. und *Sterna leucoptera* M. und Sch., wenn es sich betreffs der letzteren nicht, wie (nur 2 Mal aus ganz Deutschland bekannt!) sehr wahrscheinlich, lediglich um Verwechslung mit einem der sehr wandelbaren Kleider der *Sterna nigra* Briss. gehandelt hat. Nach Verfassers Ansicht wäre No. 257 vorläufig zu streichen.

Ausserdem bleiben betreffs der Schwimmvögel noch folgende Bemerkungen zu machen:

Ad 206. Hier wäre einzufügen:

*Cygnus minor* Pall. Kleiner Singschwan, da die etwa auf dem Rhein etc. beobachteten <sup>1)</sup> schwarzschnäbeligen Schwäne gemäss den sonstigen deutschen Provenienzen beider, i. d. R. und wahrscheinlicher dieser, als der aufgeführten grösseren Art angehört haben.

Ad 210. *Anser cinereus* M. et W. Graugans. Gehört richtiger in Sp. 3 als in Sp. 5.

Ad 213. *Anas Penelope* L. Pfeifente. Von ihr gilt das gleiche.

---

<sup>1)</sup> Erlegt werden sie ja bei dem an sich schon seltenen Vorkommen wegen ihrer Menschenscheu nur äusserst selten.

Ad 216. *Anas acuta* L. Spiessente. Wird nach ihrer sonstigen Verbreitung vielleicht gelegentlich am Rhein oder Main brüten und gehört — also abgesehen davon — vorläufig richtiger in Spalte 3 als 5.

Ad 217. *Anas Boschas* L. Märzente. Gehört richtiger in Spalte 2 als 1.

Ad 218. *Anas Crecca* L. Krükente. Es scheint bis zum sicheren Nachweis immerhin noch fraglich, ob die eigentliche Krükente<sup>1)</sup>, die im allgemeinen als Brutvogel dem Litorale angehört, im Gebiet nistet, wenngleich dieses in fast allen Vorarbeiten behauptet wird. Die weiter von der Küste brütenden sogenannten „Krückenten“ gehören aber fast stets der nur von geübteren Ornithologen sicher (zumal in weiblichen und jungen Individuen) zu unterscheidenden, ebenso kleinen Art *Querquedula* L. an, welche im Binnenlande, wenn man sie nicht gleich nach ihrer i. d. R. schon paarweisen Ankunft im April todtschiesst oder verscheucht, an allen ruhigen Teichen gern zum Brutgeschäft schreitet.

Ad 236. *Podiceps cornutus* Loth. Gehörnter Steissfuss. Brütet, als hochnordische Art, bestimmt nicht in Deutschland und gehört in Spalte 5.

Ad 237. *Podiceps cristatus* L. Haubensteissfuss. Wäre im Verzeichniss aus Sp. 3 in Sp. 4 zu übertragen, wenn er, wie im Text angegeben, auf den Seeburger Teichen heute noch nistete. Dieses ist aber nicht der Fall (Oberförster Sorg).

Ad. 238. *Podiceps suberistatus* Jacq. Rothhalsiger Steissfuss. Wird aus Sp. 4 in Sp. 3 zu übernehmen sein, da sein Brüten im Gebiet nicht wahrscheinlich ist.

Ad 247. Hier wäre gemäss A. Römer's Nachtrag von 1892 als 247 a hinzuzufügen *Larus minutus* Pall. für Sp. 6, da diese, vielleicht nur an einer Stelle, in Ostpreussen (Ibenhorst), brütende Art inzwischen 1 Mal bei Eltville erlegt ist.

Ad 255. *Sterna minuta* L. Kleine Fluss-Seeschwalbe. Brütet wahrscheinlich, wie sonst auf den Stromsandbänken, auch auf den zwischen Mainz und Bingen belegenen — wenn dieses auch noch nicht speciell constatirt ist — und wäre dann aus Spalte 3 in Spalte 4 zu übernehmen.

---

1) Krükente nicht Krikente, nach dem Lockton „krük“.



Ad 257. *Sterna leucoptera*. Sollte hier nicht Verwechslung mit der folgenden Art vorliegen?

Ad 258. *Sterna nigra* L. Schwarze Seeschwalbe. Es wäre nicht unmöglich, dass dieselbe in alten Rheinbetten gelegentlich brütete; solange dieses nicht constatirt ist, muss sie aber in Spalte 3 bleiben.

Ad 247—258. Im Uebrigen ist es sehr wahrscheinlich, dass unter den bei Mainz etc. über dem Rhein und Main etc. sich schaukelnden Möven und Seeschwalben auch noch andere Arten, als die von A. Römer aufgeführten als Gäste und selbst als regelmässigere Durchzugs- oder Wintervögel gelegentlich vorkommen (Vergl. u. A. oben Ad 247). Sie gelangen aber nicht leicht in die Hände der Sammler, weil sie in der Luft nur z. Th. und dann nur von den betreffs dieser Gattungen am Mittelrhein nur in kleiner Zahl zu findenden, sehr sicheren Kennern zu unterscheiden sind; und nicht hunderte von den gern gesehenen Vögeln erlegt<sup>1)</sup> und an Sammlern abgeliefert werden können, weil dann vielleicht ein seltenes Exemplar darunter zu finden und sicher zu bestimmen wäre.

Nach Fernrohr-Beobachtungen Verfassers, welche die gemäss dem sonst bekannten Vorkommen der Arten berechtigten Voraussetzungen lediglich bestätigen, ist an der Zusammensetzung der Gesellschaften mövenartiger Vögel auf dem Mittelrhein theilhaft: Zum weitaus überwiegenden Theil sowohl im Sommer wie im Winter die Lachmöve; dazu treten im Sommer die Fluss- und die Zwerg-Seeschwalbe, während im Winter die Sturmmöve, und in manchen Jahren auch die dreizehige Möve in grösserer Zahl sich einfinden und einmischen.

Während des Frühlings- und Herbstdurchzuges werden sicher teilweise auch Flüge der — dann aber nicht auffallend dunkel gefärbten — schwarzen Seeschwalbe und gelegentlich auch wohl noch Individuen oder selbst kleine Gesellschaften der übrigen Sterna-Arten auf dem Rhein zu finden sein.

---

Nach dieser kritischen Musterung der A. Römer'schen Verzeichnisse von 1863 und ihrer beiden Nachträge dürfte es berechtigt erscheinen, dass Verf. im Folgenden aufzustellen versucht ein neues

---

<sup>1)</sup> Ohne besondere Erlaubniss darf überhaupt im Festungs-Rayon nicht geschossen werden.



# IV. Verzeichniss der gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Regierungsbezirk Wiesbaden wild vorkommenden Wirbelthiere.

## Vorbemerkungen.

1. Durchweg ist den Arten eine der gangbarsten deutschen Bezeichnungen und, wenn und soweit sich Verf. ein begründetes Urtheil beimessen dürfte, meist auch eine mit den Buchstaben

h. = häufig, hh. = sehr häufig,

s. = selten, ss. = sehr selten,

sp. = sporadisch, (also nur in einzelnen Theilen, z. B. am Rhein, im Frankfurter Wald etc. — diese Bezeichnung musste u. A. allen von grösseren Wasserflächen abhängigen Arten beigelegt werden) ausgedrückte kurze Bemerkung über die Häufigkeit und die Art des Vorkommens beigelegt. Dass und inwiefern „häufig“ und „selten“ in Bezug auf das Vorkommen von Thier- und Pflanzenarten sehr relative, verschieden aufgefasste und gedeutete Begriffe sind, ist vom Verf. in dessen „Vogelfauna“ von Norddeutschland, Berlin 1869, S. 18 ff. eingehend erörtert. Insbesondere für grosse, in die Augen fallende und in der Nähe der menschlichen Wohnungen lebende Arten sind wir mit dem Ausdruck „häufig“, „gemein“ freigebiger, als nach der pro rata der Gesamtfläche vorhandenen Individuen-Zahl berechtigt erscheint. Wo im Folgenden eine Notiz über die Häufigkeit durch die oben angegebenen Buchstaben fehlt, erschien dem Verf. wegen etwa auf der Mitte sich haltender Häufigkeit oder wegen Mangels sicherer Nachrichten keinerlei bes. Zusatz angemessen.

2. Ein hinter dem Artnamen beigelegtes ? soll andeuten, dass die Belege resp. die Gewährsmänner für das Vorkommen überhaupt oder für die Art desselben (z. B. das Brüten eines Vogels im Gebiet) noch nicht oder nicht mehr (wegen später völlig ausgebliebener Bestätigungen alter mehr oder minder bedenklicher Angaben) genügen, um das gegenwärtige Bürgerrecht der Art entscheidend zu begründen.

3. Die wissenschaftlich lateinische Namen-Bezeichnung und ihre Folge schliesst sich für die Säugethiere und Vögel streng an die noch heute als die beste anzuerkennende diagnostische Arbeit über „die (warmblütigen) Wirbelthiere Europas“ von A. Graf Kayserling und Prof. Dr. J. H. Blasius (Braunschweig 1840) an, womit eine Beifügung der Autorennamen als unnöthig vermieden werden konnte.

Betreffs der Amphibien-Namen gilt das Gleiche für die mit einem Vorwort von Rud. Leukhart eingeführte Schrift von A. Franke „Die Reptilien und Amphibien Deutschlands“ (Leipzig 1881), so dass also nur für die Fische die Autoren-Namen beigelegt zu werden brauchten, sofern das Kirschbaum'sche Verzeichniss nicht Jedem zu Gebote steht.

4. In dem Verzeichniss der Vögel sind zunächst

- a) die Brutvögel, also im Gebiet brütenden Arten (also die Stand-, Strich- und Sommervögel nach S. 149) mit **fetten** Lettern,
- b) die das Gebiet regelmässig oder doch öfter, und dann in grösserer Zahl auf dem Zuge berührenden Arten (also die Durchzugs- und Wintervögel nach S. 150) mit **gesperrten** Lettern,
- c) die nur als zufällig verfliegen, ausnahmsweise vorkommenden Arten, die Gäste (Irrgäste), mit **kleinen** Lettern gedruckt.

Mehr Verschiedenheiten des Vorkommens, als diese drei wichtigsten, durch den Druck hervorzuheben, erschien nicht angemessen. Bezeichnet sind die specielleren Verschiedenheiten durch die angefügten Buchstaben:

Ja = Jahresvogel; Arten, die i. d. R. das ganze Jahr hindurch im Gebiet vertreten sind, also brüten und auch über Winter nicht fehlen. (Stand- und Strichvogel nach S. 149 u. 150).

So = Sommervogel; Arten, von denen wenigstens einzelne Pärchen im Gebiet brüten, im Winter aber i. d. R. keine Individuen vorkommen.

Du = Durchzugsvogel; Arten, welche ganz oder ziemlich regelmässig im Herbst und (oder) Frühling durchziehen, aber nie im Gebiet brüten und nie oder nur selten, in wenigen Individuen, über Winter bleiben.

Wi = Wintervogel; Arten, die im Norden oder höheren Berglagen (z. B. Nusseher im Schwarzwald) brütend, in den meisten oder doch einzelnen strengerer Wintern zahlreicher im Gebiet erscheinen und dort bis zum Eintritt wärmeren Wetters nach Nahrung umherstreifen.

Ga = Gast; Arten, welche nur fern von uns brütend, regelmässig durchziehend resp. überwinternd, durch Zufälle, insbesondere Stürme etc. verschlagen, oft vielleicht auch bloß aus der Gefangenschaft entflohen, in ganz einzelnen Exemplaren erbeutet und in die Hände von Sammlern gelangt sind. Denselben gebührt eigentlich das Bürgerrecht nicht, am wenigsten dann, wenn es sich um nur einmaliges Vorkommen oder vereinzelte blosse „Beobachtung“ derselben ohne Erlegung und sichere Bestimmung, oder um Angaben von Gewährsleuten<sup>1)</sup> handelt, die eine verhältnissmässig grosse Zahl unwahrscheinlicher, besonders als wohl sicher auf falscher Beobachtung oder Bestimmung beruhender Mittheilungen geliefert haben.

Dass alle — im Petitsatz aufgeführten — Gäste des Vogel-Verzeichnisses den Zusatz ss. verdienten, versteht sich von selbst; eben deshalb ist er bei ihnen fortgelassen.

Denjenigen Gästen, welche bisher nur 1 Mal im Gebiet ziemlich sicher erbeutet sind, ist eine 1 beigelegt.

---

<sup>1)</sup> Für einen namhaften Theil, insbesondere der in der A. Römer'schen Arbeit mitgetheilten Angaben von Hatzfeld und Nicolaus (auch betreffs des Brütens) trifft u. a. Letzteres zu. Dagegen können alle Mittheilungen des Prinzen Max zu Wied als sehr zuverlässig gelten.

Vergl. über diesen Punkt Verf.'s Vogelfauna S. 4 ff.

In Fällen, wo es sich um Uebergänge aus der einen in die andere Vorkommens-Art handelt, sind beide Bezeichnungen mit Bindestrich angewandt.

So bedeutet z. B.:

Du-Wi. dass die Haupt-Individuenmenge der Art durchzieht, ein Theil aber auch im Gebiet überwintert (z. B. Wasserralle).

So—Du. dass einzelne Pärchen bei uns brüten, die Hauptmenge aber durchzieht (z. B. Waldschneffe).

Wi—Ga. dass es sich um eine nordische Art handelt, die nur in sehr harten Wintern zu uns kommt. (z. B. Seidenschwanz).

5. Eine Aussonderung der eigentlichen, echten „Standvögel“ im Sinne A. Römers und auch der Vogelfauna Verf.'s, vergl. oben S. 149, in der tabellarischen Vogel-Uebersicht, erschien nicht thunlich resp. zweckmässig. Die Frage, ob Vogelarten, die wir das ganze Jahr hindurch in dem Terrain finden, wo dieselben brüten, wirklich, als Individuen betrachtet, ständig in ihrem Brutrevier geblieben, oder im Herbst und Winter durch nördlicher oder höher in den Bergen domicilirte Individuen der gleichen Art ersetzt werden, können wir nur betreffs weniger Arten sicher im ersteren Sinne mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit bejahend entscheiden.

Mit Sicherheit trifft es zu für die 6 Arten:

1. *Strix flammea*, Perleule.
2. *Passer domesticus*, Hausperling.
3. *Tetrao Urogallus*, Auerhuhn.
4. *Tetrasts Bonasia*, Haselhuhn.

und die beiden künstlich (5) resp. spontan (6) naturalisirten:

5. *Phasianus colchicus*, Fasan.
6. *Columba Livia*; Thurm(Fels-)Taube.

Sehr wahrscheinlich resp. in der Regel wohl noch trifft es ferner zu für die 6 Arten:

7. *Ulula Aluco*, grosser Kauz.
8. *Surnia Noctua*, kleines Käuzchen.
9. *Nyctale Tengmalmi*, rauhfüssiges Käuzchen (?) Wenn brütend; bisher überhaupt noch nicht sicher genug als Brutvogel d. G. bestätigt).
10. *Picus Martius*, Schwarzspecht.
11. *Corvus Corax*, Kolkrabe.
12. *Garrulus glandarius*, Eichelheher.

Bedingt, falls die Winterwitterung nicht ein Verlassen des Brutreviers unbedingt erfordert, dann noch für

13. *Picus viridis*, grosser Grünspecht.
14. *Picus canus*, kleiner Grünspecht.
15. *Alcedo Ispida*, Eiservogel.
16. *Turdus Merula*, Schwarzamsel.
17. *Turdus viscivorus*, Misteldrossel.
18. *Cinclus aquaticus*, Wasseramsel.

19. *Troglodytes parvulus*, Zaunkönig.
20. *Motacilla Boarula*, Gebirgs-Bachstelze.
21. *Alauda cristata*, Haubenlerche.
22. *Sterna (Perdix) cinerea*, Repphuhn.

Sonach sind es, je nachdem man die beiden naturalisirten Arten und das noch unsichere Rauhfuss-Käuzchen zu streichen, oder den Uhu, der doch ausser der Brutzeit öfter in Gegenden vorkommt, in denen er sicher nicht brütet, die Goldammer, den Buchfink, die Elster und den grossen Würger noch hinzufügen will, nur ca. 20—25 Arten, welche für das Nassauische Gebiet — und für ganz Deutschland sicher nicht viel, nur ca. 5—10, mehr — mit grösserem oder geringerem Recht die Bezeichnung echte „Standvögel“ verdienen.

Alle übrigen Brutvögel verlassen ausser der Brutzeit als Individuen das Brutrevier und streichen einzeln oder in Gesellschaften der eigenen Art oder auch mit anderen (Meisen, Strandläufer etc.) in besser nährnde oder mildere — tiefer oder südlicher belegene — Gebiete; und zwar in ganz allmählichem Uebergange vom Buchfink, der noch beinahe als Standvogel bezeichnet werden könnte, bis zum Spottvogel, grauen Fliegenfänger und Wespenbussard etc., die kaum 3 Monate (Anfang—Mitte Mai bis Ende Juli) bei uns zubringen, um dann langsam bis tief nach Afrika hinein zu ziehen und dort zu überwintern.

6. Ueber alle in den 4 Verzeichnissen mit ss. und mit ? bezeichneten, wie auch über sämtliche, im Vogel-Verzeichniss durch Petitsatz als Irrgäste charakterisirten Arten bleiben zuverlässige Mittheilungen an den Verf., womöglich unter Beifügung der etwa erbeuteten Thiere oder Eier für das Wiesbadener Naturhistorische Museum, erwünscht. In erster Reihe gilt das für die mit ? bezeichneten und für sichere Feststellung des Brütens bisher noch zweifelhafte Brutvögel.
  7. Betreffs der Verzeichnisse der Amphibien i. w. S. d. W. und der Fische sei hier nochmals ausdrücklich betont, dass selbige (zumal das letztere) fast lediglich auf der alten Kirschbaum'schen Vorarbeit fussen und wesentlich den Zweck haben, zu neuen Beobachtungen, Studien, Mittheilungen und Sendungen über diese weniger beachteten Klassen der Wirbelthiere anzuregen.
  8. Zu dem Säugethier-Verzeichniss bleibt zu bemerken, dass die Fledermäuse ihre geselligen Winterquartiere z. Th. sehr weit von ihrem Sommeraufenthalt nehmen, so dass deren Zug fast noch schwierigere und interessantere Probleme bietet, als der Vogelzug. Hier wäre bei Sendungen stets anzugeben, ob im Sommer erlegt oder im Winterquartier gefunden.
-

## A. Säugethiere.<sup>1)</sup>

1. *Rhinolophus Hipposideros*, kleine Hufeisennase.
2. *Rhinolophus ferrum equinum*, grosse Hufeisennase. ss.
3. *Plecotus auritus*, langohrige Fledermaus.
4. *Synotis Barbastellus*, breitohrige Fledermaus.
5. *Vesperugo Noctula*, frühfliegende Fledermaus. sp. h.
6. *Vesperugo Leisleri*, rauharmige Fledermaus. ss.
7. *Vesperugo Nathusii*, Nathusius-Fledermaus. ss. ? (1).
8. *Vesperugo Pipistrellus*, Zwerg-Fledermaus. hh.
9. *Vesperugo Nilssonii*, nordische Fledermaus. ss. ? (1).
10. *Vesperugo serotinus*, spätfliiegende Fledermaus. s.
11. *Vesperugo discolor*, zweifarbige Fledermaus. sp. ss.
12. *Verpertilio murinus*, gemeine Fledermaus. sp. h.
13. *Vespertilio Bechsteinii*, Bechstein-Fledermaus. s.
14. *Vespertilio Nattereri*, Natterer-Fledermaus. s.
15. *Vespertilio ciliatus*, gewimperte Fledermaus. ss. (1).
16. *Vespertilio mystacinus*, kleine Wasser-Fledermaus. sp.
17. *Vespertilio Daubentoni*, Daubenton-Fledermaus. sp.
18. *Vespertilio dasycneme*, grosse Wasser-Fledermaus. sp. s.
19. *Talpa europaea*, gemeiner Maulwurf. hh.
20. *Crotopus fodiens*, Wasser-Spitzmaus. h.
21. *Sorex vulgaris*, Wald-Spitzmaus. h.
22. *Sorex pygmaeus*, Zwerg-Spitzmaus. ss.
23. *Crocidara leucodon*, Feld-Spitzmaus. h.
24. *Crocidura araneus*, Haus-Spitzmaus. h.
25. *Erinaceus europaeus*, Igel. h.
26. *Felis Catus*, Wildkatze. s.
27. *Canis Vulpes*, Fuchs. h.
28. *Meles Taxus*, Dachs.
29. *Mustela Martes*, Baummarder. s.
30. *Mustela Foina*, Steinmarder.
31. *Foetorins Putorius*, Iltis.
32. *Foetorius Erminea*, Hermelin. h.

---

<sup>1)</sup> Betreffs der Fledermäuse hat eine sorgfältige Vergleichung der beziehlichen Angaben in der vorzüglichen Arbeit Koch's von 1862/3 stattgefunden. (Jahrb. 17./18. Heft). — Die Gesamtzahl betrug nach A. Römer 51, indem No. 9, 49, 52, 54 — mit Recht — noch fehlten.



33. *Foetorius vulgaris*, Wiesel.
34. *Lutra vulgaris*, Fischotter. sp. h.
35. *Sciurus vulgaris*, Eichhorn. hh.
36. *Myoxus quereinus* (= *Nitela*), buntköpfiger Schläfer. s.
37. *Myoxus Glis*, grauer (»Sieben«) Schläfer. s.
38. *Myoxus avellanarius*, rothbrauner Schläfer (»Haselmaus«). s.
39. *Cricetus frumentarius*, Hamster. sp. hh.
40. *Mus decumanus*, gemeine (graue) Ratte. hh.
41. *Mus Rattus*, kleine (schwarze) Ratte. ?? (Wahrscheinlich ausgerottet).
42. *Mus Musculus*, Haus-Maus. hh.
43. *Mus sylvaticus*, Wald-Maus. hh.
44. *Mus agrarius*, Brand-Maus. sp. ?
45. *Mus minutus*, Zwerg-Maus. s.
46. *Arvicola amphibius*, Wühlratte. h.
47. *Arvicola arvalis*, Feld-Wühlmaus. hh.
48. *Arvicola glareolus*, Wald-Wühlmaus. h.
49. *Arvicola agrestis*, Berg-Wühlmaus.
50. *Lepus timidus*, Hase. hh.
51. *Lepus Cuniculus*, Kaninchen. sp. h. (verwildert).
52. *Sus Scrofa*, Wildsau. s.
53. *Cervus Elaphus*, Rothwild. sp. h.
54. *Cervus Dama*, Damwild. sp. h. (naturalisirt).
55. *Cervus Capreolus*, Rehwild. h.

## B. Vögel.

(Vergl. die Erläuterung oben S. 149 u. 162 ff.!)

1. *Vultur fulvus*, Grauer Geier.
2. *Falco subbuteo*, Lerchenfalk. So. s.
3. *Falco peregrinus*, Wanderfalk. Ja. ss.
4. *Falco Aesalon*, Zwergfalk. Du. s.
5. *Falco vespertinus*, Rothfussfalk.
6. *Falco Tinnunculus*, Thurmalk. So. — Ja. h.
7. *Pandion Haliaëtus* Fischadler. Du. s.
8. *Circaëtus gallieus*, Natteradler. So. ss.
9. *Pernis apivorus*, Wespenbussard. So. sp. h.
10. *Buteo vulgaris*, Bussard. Ja. hh.
11. *Buteo Lagopus*, Raufussbussard. Wi. s.

12. *Aquila naevia*, Schreiadler.
13. *Aquila Chrysaëtos*, Steinadler.
14. *Haliaëtos Albicilla*, Seeadler.
15. *Milvus regalis*, Rother Milan. So. s.
16. *Milvus niger*, Schwarzer Milan. So. sp. s.
17. *Astur palumbarius*, Hühnerhabicht. Ja. s.
18. *Astur Nisus*, Sperber. Ja. h.
19. *Circus cyaneus*, Kornweihe. Ja. ss.
20. *Circus pallidus*, Steppenweihe.
21. *Circus cineraceus*, Wiesenweihe. (So. ? ss.)
22. *Circus aeruginosus*, Rohrweihe. Du. ss.
23. *Strix flammea*, Perleule. Ja. h.
24. *Ulula Aluco*, Waldkauz. Ja. hh.
25. *Aegolius Otus*, Wald-Ohreule. So. ss.
26. *Aegolius brachiotus*, Sumpf-Ohreule. Du. sp. h.
27. *Nyctale Tengmalmi*, Rauhfusskäuzchen. Ja. ss. ?
28. *Surnia noctua*, Käuzchen. Ja. hh.
29. *Surnia funerea*, Sperbereule. ?
30. *Bubo maximus*, Uhu. Ja. ss.
31. *Ephialtes Scops*, Zwerg-Ohreule. ?
32. *Cypselus Apus*, Thurmschwalbe. So. hh.
33. *Caprimulgus europaeus*, Nachtschwalbe. So. sp.
34. *Cuculus canorus*, Kukuk. So. h.
35. *Jynx Torquilla*, Wendehals. So. h.
36. *Picus viridis*, Grünspecht. Ja. h.
37. *Picus canus*, Grauspecht. Ja. h.
38. *Picus Martius*, Schwarzspecht. Ja. sp. ss.
39. *Picus major*, Grösser Buntspecht. Ja. hh.
40. *Picus medius*, Mittlerer Buntspecht. Ja. h.
41. *Picus minor*, Kleiner Buntspecht. Ja. s.
42. *Alcedo Ispida*, Eisvögel. Ja. sp.
43. *Coracias Garrula*, Mandelkrähe. (1.)
44. *Upupa Epops*, Wiedehopf. So. sp. s.
45. *Alauda cristata*, Haubenlerche. Ja. h.
46. *Alauda arborea*, Heidelerche. So. h.
47. *Alauda arvensis*, Feldlerche. So. hh.
48. *Plectrophanes nivalis*, Schneeammer. Wi. — G. ss.
49. *Emberiza Hortulana*, Gartenammer. So. sp. ss.

50. *Emberiza Cirrus*, Zaunammer. (1.) ?
51. *Emberiza Citrinella*, Goldammer. Ja. hh.
52. *Emberiza Miliaria*, Grauammer. Ja. sp. h.
53. *Emberiza Cia*, Zipammer. So. sp. s.
54. *Emberiza Schönielus*, Rohrammer. So. sp.
55. *Passer montanus*, Feldsperling. Ja. hh.
56. *Passer domesticus*, Haussperling. Ja. hh.
57. *Pyrrhula Rubicilla*, Dompfaff. Ja. sp. h.
58. *Pyrrhula Serinus*, Girlitz. So. sp. hh.
59. *Fringilla Spinus*, Zeisig. Wi. hh. So. ?
60. *Fringilla Carduëlis*, Stieglitz. So-Ja. hh.
61. *Fringilla Linaria*, Birkenzeisig. Wi. hh.
62. *Fringilla cannabina*, Hänfling. So-Ja. hh.
63. *Fringilla flayirostris*, Berghänfling. Du-Wi. s.
64. *Fringilla Citrinella* ?
65. *Fringilla Chloris*, Grünfink. So-Ja. hh.
66. *Fringilla Petronia*, Steinsperling. ?
67. *Fringilla Coelebs*, Bruchfink. Ja. hh.
68. *Fringilla Montifringilla*, Bergfink. Wi. hh.
69. *Coccothraustes vulgaris*, Kernbeisser. Ja. h.
70. *Loxia Pityopsittacus*, Kiefernkreuzschnabel. ?
71. *Loxia Curvirostra*, Fichtenkreuzschnabel. sp. Wi. h.
72. *Aegithalus Pendulinus*, Beutelmeise.
73. *Calamophilus barbatus*, Bartmeise.
74. *Parus caudatus*, Schwanzmeise. Ja. hh.
75. *Parus coeruleus*, Blaumeise. Ja. hh.
76. *Parus major*, Kohlmeise. Ja. hh.
77. *Parus ater*, Tannenmeise. Ja. sp. h.
78. *Parus palustris*, Sumpfmeise. Ja. hh.
79. *Parus cristatus*, Haubenmeise. Ja. sp. h.
80. *Sitta europaea*, Spechtmeise. Ja. hh.
81. *Bombycilla Garrula*, Seidenschwanz. Wi-Ga. ss.
82. *Garrulus glandularius*, Heher. Ja. hh.
83. *Nucifraga Caryocatactes*, Nussheher. Du-Wi. ss.
84. *Pica caudata*, Elster. Ja. sp. h.
85. *Corvus Monedula*, Dohle. Ja. sp. hh.
86. *Corvus Corone*, Krähe. Ja. hh.
87. *Corvus Cornix*, Nebelkrähe. Wi. sp. hh.

88. *Corvus Corax*, Rabe. Ja. ss.
89. *Corvus frugilegus*, Saatkrähe. So. sp. Du-Wi. hh.
90. *Sturnus vulgaris*, Staar. So-Ja. hh.
91. *Troglodytes parvulus*, Zaunkönig. Ja. hh.
92. *Certhia familiaris*, Baumläufer. Ja. hh.
93. *Tichodroma muraria*, Mauerläufer.
94. *Cinclus aquaticus*, Wasserramsel. Ja. sp.
95. *Anthus Spinoletta*, Wasserpieper. Du-Wi. ss.
96. *Anthus pratensis*, Wiesenpieper. So. sp. h.
97. *Anthus arboreus*, Baumpieper. So. hh.
98. *Anthus campestris*, Brachpieper. So. ? ss. Du. s.
99. *Motacilla alba*, Weise Bachstelze. So. hh.
100. *Motacilla Boarula*, Gebirgs-Bachstelze. Ja. sp. h.
101. *Motacilla flava*, Gelbe Bachstelze. So. sp. h.
102. *Oriolus Galbula*, Goldamsel. So. h.
103. *Petrochelidon saxatilis*, Steindrossel. So. sp. ss.
104. *Turdus iliacus*, Weindrossel. Du. hh.
105. *Turdus musicus*, Singdrossel. So. hh.
106. *Turdus torquatus*, Schildamsel. Du. s.
107. *Turdus pilaris*, Wachholderdrossel. Du-Wi. hh.
108. *Turdus viscivorus*, Misteldrossel. Ja. h.
109. *Turdus Merula*, Amsel. Ja. hh.
110. *Accentor modularis*, Flöhevogel. So. hh.
111. *Salicaria turdoides*, Drosselrohrsänger. sp. s.
112. *Salicaria arundinacea*, Teichrohrsänger. So. sp. hh.
113. *Salicaria palustris*, Sumpfrohrsänger. So. sp. hh.
114. *Salicaria locustella*, Heuschreckenrohrsänger. So. sp. ss.
115. *Salicaria phragmitis*, Schilfrohrsänger. So. ? sp. ss.
116. *Salicaria aquatica*, Wasserrohrsänger. Du. sp. ss.
117. *Regulus ignicapillus*, Feuerköpfiges Goldhähnchen. So. h.
118. *Regulus cristatus*, Goldhähnchen. Ja. hh.
119. *Ficedula Hypolais*, Spottvogel. So. s.
120. *Ficedula sibilatrix*, Wald-Laubsänger. So. hh.
121. *Ficedula Trochilus*, Fitis-Laubsänger. So. hh.
122. *Ficedula rufa*, Weiden-Laubsänger. So. hh.
123. *Sylvia Curruca*, Klapper-Grasmücke. So. h.
124. *Sylvia atricapilla*, Schwarzplättchen. So. hh.
125. *Sylvia cinerea*, Dorn-Grasmücke. So. hh.

126. *Sylvia hortensis*, Wald-Grasmücke. So. sp. hh.
127. *Lusciola Luscinia*, Nachtigall. So. sp. h.
128. *Lusciola suecica*, Blaukehlchen. So. sp. s.
129. *Lusciola Rubecula*, Rothkehlchen. So. hh.
130. *Lusciola Phoenicurus*, Gartenrothschwanz. So. hh.
131. *Lusciola Tithys*, Hausrothschwanz. So. hh.
132. *Saxicola Rubetra*, Braunkehliger Wiesenschmätzer. So. sp. h.
133. *Saxicola Rubicola*, Schwarzkehliger Wiesenschmätzer. So. sp. h.
134. *Saxicola Oenanthe*, Steinschmätzer. So. sp. h.
135. *Lanius Excubitor*, Grosser grauer Würger. Ja. s.
136. *Lanius minor*, Kleiner grauer Würger. So. sp. s.
137. *Lanius Collurio*, Dornreher. So. hh.
138. *Lanius rufus*, Rothköpfiger Würger. So. sp. s.
139. *Muscicapa Grisola*, Grauer Fliegenfänger. So. hh.
140. *Muscicapa atricapilla*, Bunter Fliegenfänger. So. hh.
141. *Hirundo urbica*, Hausschwalbe. So. hh.
142. *Hirundo rustica*, Rauchschnalze. So. hh.
143. *Hirundo riparia*, Uferschnalze. So. sp. hh.
144. *Columba Palumbus*, Ringeltaube. So. hh.
145. *Columba Oenas*, Hohltaube. So. sp. h.
146. *Columba Livia*, Thurmtaube. Ja. sp. h. (verwildert.)
147. *Columba Turtur*, Turteltaube. So. hh.
148. *Pterocles Alchata*, Sandflughuhn. (1.)
149. *Tetrao Urogallus*, Auerhahn. Ja. sp. ss.
150. *Tetrao Tetrix*, Birkhahn. Ja. sp. ss.
151. *Tetrastes Bonasia*, Haselhahn. Ja. sp. s.
152. *Phasianus colchicus*, Fasan. Ja. sp. h. (naturalisirt.)
153. *Sterna cinerea*, Repphuhn. Ja. hh.
154. *Ortygion Coturnix*, Wachtel. So. h.
155. *Cursorius europaeus*, Rennvogel. (1.)
156. *Otis Tarda*, Trappe. Wi. s.
157. *Otis Tetrix*, Zwergtrappe.
158. *Crex pratensis*, Wachtelkönig. So. s.
159. *Ortygometra Porzana*, Punctirtes Sumpfhuhn. So. sp. s. Du. h.
160. *Ortygometra pygmaea*, Zwerg-Sumpfhuhn. So. sp. ss. ?
161. *Rallus aquaticus*, Wasserralle. Du-Wi. s.
162. *Gallinula chloropus*, Wasserhuhn. So. sp. h.
163. *Fulica atra*, Blässhuhn. So. sp. hh.



164. *Grus cinerea*, Kranich. Du. hh.
165. *Oedienemus crepitans*, Triel.
166. *Vanellus cristatus*, Kiebitz. So. sp. Du. hh.
167. *Squatarola helvetica*, Kiebitz-Regenpfeifer.
168. *Charadrius Pluvialis*, Goldregenpfeifer. Du. s.
169. *Eudromias Morinellus*, Mornellregenpfeifer. (1.)
170. *Aegialites cantianus*, Standregenpfeifer. (1.)
171. *Aegialites curonicus*, Flussregenpfeifer. So. sp. h.
172. *Aegialites Hiaticula*, Seeregenpfeifer. Du. sp. h.
173. *Haematopus Ostralegus*, Austernfischer.
174. *Recurvirostra Avocetta*, Wassersäbler.
175. *Hypsibates Himantopus*, Stelzenläufer. ?
176. *Totanus Glottis*, Grosser Wasserläufer. Du. sp. s.
177. *Totanus fuscus*, Dunkler Wasserläufer. Du. sp. s.
178. *Totanus Calidris*, Gambett-Wasserläufer. So. sp.
179. *Totanus Glareola*, Bruch-Wasserläufer. Du. sp. ss.
180. *Totanus ochropus*, Wald-Wasserläufer. Du. sp. h.
181. *Actitis hypoleucis*, Fluss Uferläufer. So. sp. h.
182. *Phalaropus cinereus*, Kleiner Wassertreter.
183. *Limosa Aegocephala*, Schwarzschnäzige Uferschnepfe.
184. *Limosa rufa*, Rostrothe Uferschnepfe.
185. *Machetes Pugnax*, Kampfhahn. Du. sp. s.
186. *Calidris Arenaria*, Sanderling.
187. *Tringa Canutus*, Isländischer Strandläufer.
188. *Tringa subarquata*, Bogenschnäbliger Strandläufer. (1.)
189. *Tringa Cinclus*, Gemeiner Strandläufer. Du. sp. h.
190. *Tringa Temminckii*, Temminckscher Strandläufer. (1.)
191. *Tringa minuta*, Kleiner Strandläufer. Du. sp. ss.
192. *Ascalopax Gallinula*, Stummschnepfe. Du. sp. s.
193. *Ascalopax Gallinago*, Bekassine. So-Du. sp. hh.
194. *Ascalopax major*, Pfuhschnepfe.
195. *Scolopax rusticola*, Waldschnepfe. So. s. Du. <sup>sp.</sup>h.
196. *Numenius Phaeopus*, Kleiner Brachvogel.
197. *Numenius Arquata*, Grosser Brachvogel. Du. sp. s.
198. *Ibis Falcinellus*, Dunkelfarbiger Sichler. (1.)
199. *Ardea purpurea*, Purpurreiher. Du. sp. s.
200. *Ardea cinerea*, Grauer Reiher. Du-Wi. sp. h.
201. *Ardea Garzetta*, Seidenreiher. (1.)

202. *Ardea comata*, Schopfreiher. (1.)  
203. *Ardea minuta*, Zwergrohrdommel. sp. h.  
204. *Ardea stellaris*, Rohrdommel. So. sp. ss. ? Du. sp. h.  
205. *Ardea Nycticorax*, Nachtreiher.  
206. *Ciconia nigra*, Schwarzer Storch. Du.-So. sp. ss. ?  
207. *Ciconia alba*, Weisser Storch. So. sp. h.  
208. *Platalea leucorodius*, Löffler.  
209. *Cygnus musicus*, Singschwan.  
210. *Cygnus minor*, Kleiner Schwan. ?  
211. *Cygnus Olor*, Höcker-Schwan (vielleicht nur verwilderte).  
212. *Anser albifrons*,<sup>1)</sup> Blässengans. ?  
213. *Anser segetum*, Saatgans. Du-Wi. h.  
214. *Anser cinereus*, Graugans.  
215. *Anser Brenta*, Rottgans.  
216. *Vulpanser Tadorna*, Fuchsente. ?  
217. *Anas Penelope*, Pfeifente. Du. sp. h.  
218. *Anas Querquedula*, Knäckente. So. sp. h.  
219. *Anas strepera*, Schnatterente.  
220. *Anas acuta*, Spiessente. Du. sp. s.  
221. *Anas Boschas*, Stockente. Ja. sp. hh.  
222. *Anas Crecca*, Krückente. So. ? Du. sp. hh.  
223. *Rhynchaspis clypeata*, Löffelente. Du. sp. s.  
224. *Oidemia fusca*, Sammetente.  
225. *Oidemia nigra*, Trauerente.  
226. *Glaucion Clangula*, Schellente. Wi. sp. h.  
227. *Harelda glacialis*, Eisente. Wi. sp. s.  
228. *Fuligula Marila*, Bergente.  
229. *Fuligula cristata*, Reiherente. Wi. sp. s.  
230. *Fuligula Nyroca*, Brandente.  
231. *Fuligula ferina*, Tafelente. Du. sp. s.  
232. *Fuligula rufina*, Kolbenente. (1.)  
233. *Mergus Castor*, Gänsesäger. Wi. sp. h.  
234. *Mergus serrator*, Mittlerer Sänger. Wi. sp. ss.  
235. *Mergus albellus*, Kleiner Sänger. Wi. sp. h.  
236. *Phalacrocorax Carbo*, Kormoran.

---

<sup>1)</sup> Statt der von A. Römer aufgeführten unsicheren Art *minutus* eingereiht.

237. *Sula Bassana*, Basstölpel. ?
238. *Podiceps minor*, Kleiner Steissfuss. Ja. sp.
239. *Podiceps auritus*, Ohren-Steissfuss. So. sp. s.
240. *Podiceps cornutus*, Gehörnter Steissfuss. Wi. sp. s.
241. *Podiceps suberistatus*, Rothhalsiger Steissfuss. Du. ss.
242. *Podiceps cristatus*, Grosser Steissfuss. Du. sp. s.
243. *Colymbus arcticus*, Mittlerer Polartaucher. (Wi.)
244. *Colymbus torquatus*, Grosser Polartaucher. (Wi.)
245. *Colymbus septentrionalis*, Kleiner Polartaucher. Wi. sp.
246. *Thalassidroma Leachii*, Leach'scher Sturmvogel.
247. *Lestris Catarrhactes*, Grosse Raubmöve ?
248. *Lestris pomarinus*, Breitschwänzige Raubmöve. (1.)
249. *Lestris Cephus*, Langschwänzige Raubmöve. (1.)
250. *Lestris parasita*, Schmarotzer-Raubmöve. ?
251. *Larus minutus*, Zwergmöve. (1.)
252. *Larus ridibundus*, Lachmöve. Ja. sp. h. (brütend?)
253. *Larus tridactylus*, Dreizehige Möve. Wi. sp. h.
254. *Larus glaucus*, Eismöve.
255. *Larus canus*, Sturmmöve. Wi. sp.
256. *Larus argentatus*, Silbermöve.
257. *Larus fuscus*, Heringsmöve.
258. *Larus marinus*, Mantelmöve.
259. *Sterna Hirundo*, Gemeine Seeschwalbe. So. sp. h.
260. *Sterna minuta*, Kleine Seeschwalbe. So. sp. ss.?
261. *Sterna anglica*, Lachseeschwalbe. (1.)
262. *Sterna leucoptra*, Weissflügelige Seeschwalbe. ??
263. *Sterna nigra*, Schwarze Seeschwalbe. Du. sp. h.

### Zusätze zum Vogel-Verzeichniss:

1. Das Steppenuhn, *Syrhaptes paradoxus* und die Blau-Merle, *Petrochelidon cyanea* sind nicht mit aufgenommen, da sie nicht im Gebiet, vielmehr nur in der Nähe desselben je einmal bestätigt sind, von der Blaumerle durch von Reichenau-Mainz 1869 bei Wetzlar ein ganzer Zug, aus welchem 7 Stück erbeutet wurden.
2. Sämmtliche Arten mit bedingter Ausnahme von *Milvus niger*, *Saxicola Rubetra* und *Lanius minor* würden sich auch gemäss Verf.'s »Vogelfauna von Norddeutschland« Berlin 1869 für das Gebiet ergeben haben.

3. Das vorstehende Vogel-Verzeichniss kann mit ganz unwesentlichen Aenderungen auch für jeden anderen grösseren Bezirk des nordwestdeutschen, insbes. des rheinischen Berglandes gelten.
4. Das — wegen der Uebergänge nur als etwaiges aufzufassende — Ergebniss einer vergleichenden Zählung der Hauptkategorien ergibt:

a) Jahresvögel	nach A. Römer	ca. 50,	nach Verf.	ca. 60,
b) Sommervögel	» » »	» 90,	» » »	80,
c) Durchzugsvögel	» » »	» 60,	» » »	30,
d) Wintervögel	» » »	» 40,	» » »	20,
e) Gäste	» » »	» 20,	» » »	70.
<hr/>				
Im Ganzen	nach A. Römer	ca. 260,	nach Verf.	ca. 260,
		genau 258,	» »	genau 263.

Wenn somit die Summen für die Brutvögel (a u. b) sowie für die Gesamtzahl sich ziemlich wieder ausgleichen, so bleiben doch auch dabei betreffs der einzelnen Arten, aus denen sie resultiren, namhafte Verschiedenheiten.

Der Hauptunterschied der A. Römer'schen Summen gegenüber denen Verf.'s beruht aber darin, dass letzterer ca. 50 der von A. R. als — mehr minder regelmässige — Zugvögel (c u. d) bewertheten nur als unregelmässige Gäste (e) des Gebiets glaubte gelten lassen zu dürfen.

5. Vergleichsweise sei noch erwähnt, dass von den rund 500 europäischen Vogelarten für Norddeutschland (als ganzes betrachtet) 210 als Brutvögel (a u. b) 50 als Zugvögel (c u. d) und 90 als Gäste (e) gelten können.

### C. Amphibien.<sup>1)</sup>

1. *Coronella austriaca*, Schlingnatter. hh.
2. *Tropidonotus natrix*, Ringelnatter. hh.
3. *Tropidonotus tessellatus*, Würfelnatter. sp. ss.
4. *Callopeltis Aesculapii*, Aesculaps-Natter. sp. ss.

---

<sup>1)</sup> Im weiteren Linné'schen Sinne des Wortes. Die Abtrennung der Reptilien erscheint für den hier verfolgten Zweck nicht nöthig.

5. *Anguis fragilis*, Blindschleiche. hh.
6. *Lacerta agilis*, Waldeidechse. hh.
7. *Lacerta vivipara*, Berg- oder Wieseneidechse. ss. ?
8. *Lacerta viridis*, Smaragdeidechse. sp. ss.
9. *Lacerta muralis*, Mauereidechse. sp.
10. *Hyla arborea*, Laubfrosch. h.
11. *Rana esculenta*, Teichfrosch. hh.
12. *Rana temporaria*, Tausfrosch. hh. (oxyrh. + platyrh.).
13. *Pelobates fuscus*, Knoblauchkröte. ss. ?
14. *Rombinator igneus*, Unke. sp.
15. *Alytes obstetricans*, Geburtshelferkröte. sp.
16. *Bufo vulgaris*, Erdkröte. h.
17. *Bufo variabilis* (= *viridis* Laur.) Wechselkröte. sp. s.
18. *Bufo calamita*, Kreuzkröte. sp. s.
19. *Salamandra maculosa*, Feuersalamander. hh.
20. *Triton cristatus*, Kammmolch. h.
21. *Triton alpestris*, Bergmolch.
22. *Triton taeniatus* (= *punctatus* Latr.) Gartenmolch.
23. *Triton helveticus* (= *palmaris* Schneid?) Leistenmolch. ss. ?

*Pelias berus*, Kreuzotter und *Testudo europaea*, Sumpfschildkröte sind bisher für Nassau und Umgebung nicht genügend sicher nachgewiesen.

## D. Fische.

Ausser den bisherigen erscheinen hier noch die Abkürzungen:  
B. = Bäche, T = Teiche, R. = Rhein, M. = Main, Z. = Zugfisch.

1. *Perea fluviatilis* L., Barsch. h. (Fehlt in der Eder.)
2. *Acerina cernua* L., Kaulbarsch. (Fehlt in der Eder.)
3. *Cottus Gobio* Cuv., Kaulkopf. h.
4. *Gasterosteus aculeatus* Bl., Stichling in B. und T. sp. h.
5. *Gasterosteus pungitius* L. Rh. s.
6. *Lota vulgaris* Cuv., Aalraupe. h.
7. *Cyprinus Carpio* L., Karpfen. h.
8. *Carassius vulgaris* Nils., Karausche.
9. *Rhodeus amarus* Bl., Bitterling. h.
10. *Abramis Brama* Cuv., Bresem.
11. *Blicca Björkna* L., Makel.



12. *Bliccopsis abramo-rutilus* Hol. Rh. ss.
13. *Barbus fluviatilis* Ag. Barbe. hh.
14. *Gobio fluviatilis* Cuv., Grass. hh.
15. *Tinca vulgaris* Cuv., Schleie. sp. h.
16. *Scardinius erythrophthalmus* Bon., Rothauge. h.
17. *Idus melanotus* Hec. Rh. u. M.
18. *Squalius Cephalus* L., Döbel. hh.
19. *Squalius Leuciscus* Hec.. Möne. B.
20. *Leuciscus rutilus* L., Plötze. hh.
21. *Phoxinus laevis* Ag., Ellritze. B. sp. hh.
22. *Alburnus lucidus* Heck., Schneider. h.
23. *Alburnus bipunctatus* Hec. Stronz. h.
24. *Alburnus dolabratus* Hol. Rh.
25. *Aspius rapax* Ag. Rh.
26. *Chondrostoma Nasus* Ag., Weissfisch. hh.
27. *Cobitis fossilis* L., Schlammbeisser. h.
28. *Cobitis barbatula* L., Schmerl. h.
29. *Cobitis Taenia* L., Steingründel. h.
30. *Coregonus oxyrhynchus* L. Rh.
31. *Thymallus vulgaris*, Aesche. sp. s. (Eder.)
32. *Trutta Salar* L. Lachs. Z. h.
33. *Trutta trutta* L., Lachsforelle. Z. ss.
34. *Trutta Fario* L., Foieille. In B. sp. hh.
35. *Esox Lucius* L., Hecht. hh.
36. *Alausa vulgaris* Cuv., Maifisch. Z.
37. *Alausa Finta* Cuv., kleiner Maifisch. Z. h.
38. *Silurus Glanis* L., Wels. Rh. ss.
39. *Anguilla vulgaris* Flem., Aal. h.
40. *Acipenser Sturio* L., Stör. Z. ss. Rh.
41. *Petromyzon marinus* L., Lamprete. Z. ss. Rh.
42. *Petromyzon fluviatilis* L., Fluss-Neunauge. Z. h. Rh. u. M.
43. *Petromyzon Planeri* Bl., kleines Neunauge. B. h.

Ausserdem ist der Zander, *Lucioperca sandra* im Rhein und diese oder jene fremde Salmoniden-Art, wie auch die Orfe, in kleineren abgeschlossenen Gewässern neuerdings mit Erfolg naturalisirt.

Hiernach weist die gegenwärtige Wirbelthier-Fauna des Regierungsbezirks Wiesbaden, wenn man einige zweifelhafte Arten und Vorkommnisse, Bastarde, naturalisirte, einmal verschlagene oder vielleicht aus der Gefangenschaft entkommene Exemplare etc. nicht zurechnet, auf:

etwa	50	Arten	von	Säugethieren
«	260	»	«	Vögeln
«	20	«	«	Amphibien (i. w. S. d. W.)
«	40	«	«	Fischen

---

i. G. mindestens etwa 370 Arten von Wirbelthieren,

welche als genügend berechnigte Bürger der Fauna gelten können und welche sich mit Einschluss der oben bezeichneten und etwa noch unentdeckt gebliebenen vermehren würden höchstens auf rund

**400 Arten.**

---

---

# DIE LEPIDOPTEREN

DES

# NORDPOLARGEBIETES.

VON

**DR. ARNOLD PAGENSTECHER**

(WIESBADEN.)

---



Wenn ich es im Nachstehenden versuche, eine Zusammenstellung des über die Lepidopterenfauna des Nordpolargebietes bis jetzt bekannt Gewordenen zu geben, so wird dieser Versuch, zwei anscheinend so heterogene Elemente wie Lepidopteren und Nordpolargebiet in ihrem gegenseitigen Verhältniss zu schildern, um so mehr als ein schwieriger und theilweise aussichtsloser für den ersten Blick erscheinen, als trotz des in den letzten Jahrzehnten ausserordentlich gestiegenen Interesses und der lebhaften Forscherthätigkeit im Nordpolargebiete umfangreiche Gebiete ganz unvollkommen bekannt und untersucht sind. Zudem erscheint es wenig wahrscheinlich, dass Schmetterlinge in jenen hohen Breitegraden leben könnten, in welchen viele Monate lang »der nachtschwarze Himmel sich Tag und Nacht über die gefrorne, mehr oder weniger mit Schnee bedeckte Erde sich ausspannt«. Und doch entwickelt sich in jenen »ungastlichen, von den kalten Armen des Polar-meers umfassten Ländern in den zwei bis drei Monaten des arktischen Sommers eine nicht unbedeutende Flora an dazu geeigneten Stellen, welche, wie Oasen in der Wüste, an sonnigen Abhängen mit gutem und lockerm Boden oft unmittelbar neben dem Eise dem durch die eintönige Landschaft ermüdeten Auge einen Reichthum von Formen und an Farbenpracht vorzaubern, der unvergesslich bleibt«.

So erzählt Kjellmann (Aus dem Leben der Polarpflanzen in Nordenskjöld's Studien und Forschungen VII, p. 462), dass er auf der kleinen, an der Nordküste Sibiriens gelegenen Preobaschani-Insel während einer Excursion von zwei Stunden auf einer Fläche von kaum einem Quadratkilometer wenigstens 50 Arten phanerogamischer Pflanzen, 30 Gattungen und 15 Familien angehörig, antraf, ein Drittel sämmtlicher Blütenpflanzen, welche er auf der Fahrt der Vega auf den Küstenstrichen zwischen der Mündung des Ob und der Beringsstrasse angetroffen hat.

An solchen Stellen zeigt sich auch im hohen Norden ein mehr oder weniger reiches Insektenleben, ja dasselbe erreicht an manchen



Stellen, besonders des arktischen Europa's, unter dem Zusammentreffen besonderer, dem Klima und der Vegetation günstiger Umstände, wie namentlich auch des Golfstromes, eine ungewöhnliche, allerdings mit anderen arktischen Gegenden wesentlich contrastirende Entwicklung. Freilich ist dieses Insektenleben genöthigt, den Zeitpunkt seines zum vollkommenen Insekten drängenden Lebens auf vier oder sechs Wochen des Sommers zu concentriren, dagegen die Zeit der Vorbereitung im unvollkommenen Zustande vielfach auf mehrere Jahre zu vertheilen. Es herrschen eben hier ähnliche, wenn auch nicht gleiche Verhältnisse, wie wir sie in unseren Hochgebirgen am Fusse der Gletscher antreffen, wo auf blumenreichen Matten oft ein dichtes Heer leichtbeschwingter Falter sich in den Strahlen der Sommersonne tummelt, während im Winter unter dichter Schneedecke ihre Raupen und Puppen ein mehrjähriges Dasein verträumen.

Wenn ich die Lepidopterenfauna des Nordpolargebietes hier als eine von den übrigen Faunen abgetrennte und selbstständige behandle, so muss ich zunächst über die Berechtigung einer solchen Trennung, welche wie eine jede faunistische, keine absolute ist, einige Worte anführen. Ich brauche dabei nicht auf die bekannte, für die Verbreitung der Thierwelt namentlich von Jaeger und Haake vertretene Nordpolarhypothese zu recurriren, zumal die Unwahrscheinlichkeit, ja Unhaltbarkeit derselben sich neuerdings durch die Ergebnisse der Nansen'schen Forschungen ergeben hat. Allerdings war Wallace, der Begründer der neueren Thiergeographie, nicht geneigt (S. dessen »Geographische Verbreitung der Thiere« I, p. 85 ff.), die von Huxley (On the classification and distribution of the Alectromorphae and Heteromorphae, in Proc. Zool. Soc. Lond. 1868, p. 294) vorgeschlagenen Abtrennung einer circumpolaren Region von der Sclater'schen (On the geogr. distr. of the members of the class aves, in Proc. Linn. Soc. Lond. Febr. 1888) paläarktischen und nearctischen Region beizustimmen. Aber auch Allen (The geogr. distr. of the Mammalia consid. in relation to the princip. ontolog. regions, in Bull. of the Survey Vol. IV Washington 1878) hatte sich für die Annahme eines circumpolaren Gebietes ausgesprochen, obwohl nach den Angaben von Wallace die Zahl der Gattungen von arktischen Landsäugethieren nur 3 beträgt (Gulo, Myodes, Rangifer) und nur 2 Arten aus weiteren Gattungen ausschliesslich arktisch sind (Ursus maritimus und Vulpes lagopus), ebenso wie die Zahl der arktischen Vögel gering ist und die angenommene arktische Region daher

ausser allem Verhältniss zu den andern stehen würde, sowohl wegen der wenigen eigenthümlichen Typen, als auch wegen der beschränkten Zahl von Formen und Arten, welche sie thatsächlich bewohnen. Ebenso wie Allen, sprach sich Supan (Grundzüge der physischen Erdkunde 1. Aufl. 1884, p. 452, zweite Aufl., p. 662) für die Aufstellung eines circumpolaren Faunenreiches und, unter wesentlicher Annahme der von Schmarda (Geogr. Verbr. der Thiere 1853, I, p. 225; Polarländer oder das Reich der Pelzthiere) festgesetzten Grenzen. Er betonte: Die Südgrenze ist durch die Baumgrenze gegeben. Hier erfahren die Lebensbedingungen der Thiere eine völlige Veränderung . . . Nicht allein in der Circumpolarität der meisten Thiere liegt die Berechtigung zur Aufstellung eines arktischen Reiches, sondern auch, wie Brauer treffend bemerkte, darin, dass einerseits die Polarthiere zum Charakter des Landes gehören, andererseits ihr Charakter sich aus dem des Landes erklären lässt.

Brauer (Die arktische Subregion, Beitrag zur geographischen Verbreitung der Thiere. Jena 1888) und A. Reichenow (Die Begrenzung geographischer Regionen vom ornithol. Standpunkt. Zool. Jahrb. Syst. III. 1887, p. 671 ff.) adoptirten ein eigenes nordpolares Gebiet und ihnen schloss sich Möbius (Die Thiergebiete der Erde, im Archiv f. Naturgeschichte. 1891, 3. Heft, p. 4) an. Derselbe führte auch statt der Wallace'schen Benennungen »nearktisch« und »neotopisch« die alten Namen »nordamerikanisch« und »südamerikanisch« wieder ein, sowie für den grössten Theil der Slater-Wallace'schen »paläarktischen« Region den Ausdruck »europäisch-sibirisches Gebiet«, nach Abtrennung des nordpolaren.

Man ist im Allgemeinen geneigt, den Polarkreis als Grenze für die arktischen Länder anzunehmen und man hat in diesem in einem Abstand von  $33^{\circ} 27'$  von den Polen, in unserm Falle von dem Nordpol abstehenden und rings um die Erdkugel laufenden Kreis eine gleichmässige Linie, welche sowohl von dem neuen Continent, als von Europa und Asien ansehnliche Theile abtrennt. Indess folgt die organische Welt in ihrer Entwicklung nicht dieser durch die Schiefe der Ekkliptik festgelegten Linie, sondern mehr den auf allgemeinen Verhältnissen des Erdballs beruhenden klimatischen Bedingungen der Erdoberfläche und die hierdurch hervorgerufene Vegetation bedingt auch eine besondere Entwicklung der Landfauna. So kommt es, dass mit der allerdings in einem wechselnden Verhältnisse zu dem Polarkreis verlaufenden Juli-

Isotherme von  $10^{\circ}$  C. ( $8^{\circ}$  R.), mit welcher die Grenze des Baumwuchses zusammenfällt, sich eine eigenthümliche, einen besonderen Abschluss bildende Grenze ergibt, mit welcher eine natürliche und wesentliche Veränderung der Gesamtverhältnisse verbunden ist. Torell hatte bereits erwiesen, dass die Grenze zwischen dem Eismeer und dem Atlantischen Ocean in Folge der warmen Strömungen und dem Einfluss auf das Klima im Westeuropa nicht dem Polarkreis oder einem Parallelkreise des Aequators folgen könne, sondern von den Isothermen bestimmt werden müsste, die er von New-Fundland am nördlichen Island vorbei nach Finmarken zog, die dann im Osten etwas südlicher zu liegen kommt, wie die Grenze des Treibeises, welche eigentlich als der Uebergang beider Meere zu betrachten ist. Das Beeringsmeer und der nördliche Theil des Ochotskischen Meers wird seines Klimas wegen zum Eismeer gerechnet. Auf den Continenten entspricht die nördliche Grenze des Nadelholzes der Linie, welche die Südgrenze des Eismees bezeichnet, welche beide der Isothermen von  $0^{\circ}$  folgen. — Der grösste Theil des durch die Juli-Isotherme von  $+10^{\circ}$  abgeschiedenen Gebietes fällt nördlich des Polarkreises und südlich davon liegt nur ein geringer Theil von der Nordostküste von Asien und Nordamerika. Die in dieser Nördpolarregion vertretene Vegetation besteht aus Moosen, Flechten, Sumpfmoorpflanzen, Weiden und Halbsträuchern, welche nur bis zu drei Monaten Wachsthumsthätigkeit zeigen. In geschützten Flussthalern tritt der Wald noch etwas weiter gegen Norden vor, so im Taimyrlande bis zu  $72\frac{1}{2}^{\circ}$  NBr., sowie in Kola und Lappland, wo Birken, Kiefern und Fichten mit oft weniger als 2 Monaten warmer Tagesmittel fürlieb nehmen. Im Labrador erscheint die Waldgrenze bis gegen den  $52^{\circ}$  NBr. herabgedrückt. Eine ähnliche, auf drei Monate durch Temperaturerniedrigung herabgedrückte Verkürzung der Vegetationsperiode kommt in gleicher Weise in den Hochländern der nördlichen Hemisphäre vor, z. B. am ausgedehntesten auf dem 5000 Meter Höhe vielfach überragenden Hochthale von Thibet. —

Wir besitzen bereits eine vortreffliche Darstellung des arktischen Insektenlebens in einer Arbeit von Aurivillius (in Nordenskjöld's Studien und Forschungen. Leipzig 1885. VI., p. 387 ff.) Ich schliesse mich in den nachfolgenden Ausführungen über die Lepidopterenfauna im Nordpolargebiet dieser Arbeit an. Durch näheres Eingehen auf die auch von Aurivillius angegebenen Quellen, welche vielfach wenig zugänglich und zerstreut sind, sowie durch Heranziehung einiger Nachbar-

gebiete werde ich noch eine eingehendere Uebersicht über das Thema zu gewinnen suchen. Die Arbeit von Petersen (Die Lepidopterenfauna des arktischen Gebietes von Europa und die Eiszeit. St. Petersburg 1887) habe ich ebenfalls mehrfach benutzt.

Bevor ich indess auf die specielle Erörterung der Schmetterlingsfauna des Nordpolargebietes eingehe, erscheint es mir bei dem innigen Verhältniss, in welchem jene mit dem Klima und der durch dieses bedingten Flora steht, geboten, einige allgemeine Bemerkungen über das arktische Klima und die arktische Flora voraus zu schicken, welche nicht allein an und für sich interessant sind, sondern auch das Verständniss von dem Auftreten der Schmetterlingswelt und deren Verbreitung wesentlich zu erleichtern im Stande sein dürften. Ich folge hier besonders den lichtvollen Darstellungen, welche wir Supan, Griesebach, Nathorst, Kjellmann und Drude verdanken. Meiner Auseinandersetzung und Zusammenstellung der von den genannten Autoren angegebenen hauptsächlich hier zu erwähnenden Resultate der Forschung möchte ich die schönen Worte von Linné (Prolog zur Flora lapponica) vorausgehen lassen, mit denen er sagt: »Das Palmengeschlecht herrscht auf den heissesten Theilen des Erdballs, die Tropenzonen werden von Stauden und Sträuchern bewohnt, ein reicher Pflanzengürtel umgibt die Gestade in Südeuropa, Schaaren grüner Gräser überziehen Holland und Dänemark, zahlreiche Moosgeschlechter sind in Schweden zu Hause, die fahlen Algen aber und die weissen Flechten kommen nur im kalten Lappland, dem entlegensten aller bewohnten Erdstriche fort. Die letzten aller Pflanzen bedecken die letzten aller Erdstriche.«

Ebenso wie die Pflanzengeographie die verschiedenartigsten Gegenden des Erdballs untersuchte und namentlich auch die Pflanzenzonen der Gebirge Skandinaviens, der Alpen und Pyrenäen, der Appeninen, der Sierra Nevada wie des Kaukasus unter Hülfe des Barometers bestimmte und die schwindende Vegetation bis über die Grenzen des ewigen Schnees verfolgte, waren es die Nordpoluntersuchungen besonders von Franklin, Ross und Parry, welche uns die Flora des Nordens kennen lehrten und den Botanikern dieselben Blumen vorführten, welche gleichmässig die Wärme fürchtend, am Strande des Eismeers und an der Grenze des ewigen Schnee's in den Hochgebirgen vorkommen.

Die Flora des arktischen Gebietes ist nach Supan's (Grundzüge der phys. Erdkunde, 2. Aufl., p. 602) trefflicher Zusammenstellung am



ärmlichsten auf den nahezu wagerechten Ebenen, wo das sommerliche Schmelzwasser weder abfliessen, noch eindringen kann, und die Bodentemperatur wegen der Nähe des unterirdischen Eises sich nicht über den Gefrierpunkt erhebt. Hier bilden sich die Moostundren, die das Festland der alten Welt jenseits der Waldgrenze umsäumen. Wo festes Gestein der Oberfläche nahe liegt und der Boden einigermassen trocken ist, wie im grössten Theile des polaren Nordamerikas, da entwickeln sich die Flechtentundren, die mit ihren Flechten, Heidel- und Krähenbeeren ein reicheres Thierleben ernähren. Die Flussniederungen schmücken Wiesen mit Kräutern, Weidegestrüpp und Gruppen kleiner Holzgewächse, und auf geneigtem Boden zaubert der monatelange Sommertag anmuthige Matten mit frischem Grün und prächtigen Blumen hervor, welche die spärlichen Insekten, die die Befruchtung ermitteln, hervorlocken. In den höheren Regionen des eisfreien Küstenlandes, wo kein oceanischer Nebel die Sonne verhüllt, steigt Papaver nudicaule bis 1500 Meter, viele Blütenpflanzen bis 1250 m Höhe an und ein Vaccinium trägt noch in 660 m Höhe reife Beeren. Selbst auf den »Nunatakkern« des Binneneises fand Jensen grüne, wenn auch spärlich bewachsene Stellen; in beträchtlicher Entfernung von der Küste und in 1250 m Höhe sammelte er 27 Phanerogamen, und am Rande des Inneneises bei Julianehab empfing ihn eine üppige Vegetation von Gräsern und 3 bis 4 m hohen Birken. Von den 386 Gefässpflanzen, die Grönland besitzt, erreichen noch 88 den 83. Parallelgrad NBr. Auf Grinnellland bei 82° NBr. liefert eine mit Stauden gemischte Moossteppe noch genügendes Futter für Thiere und bei 82° 50' wurden noch 9 Blütenpflanzen gesammelt.

Nathorst (Beiträge d. Polarforschung zur Pflanzengeographie der Vorzeit in Nordenskjöld's Studien und Forschungen. IV., p. 226) spricht sich nach seinen Forschungen in Spitzbergen wie folgt aus:

»Ueber alle Beschreibung lieblich und reizend sind die Blumen in den Polargegenden. Nachdem die Pflanzen die Finsterniss und Kälte des langen Winters überstanden, ist, wenn die Sonne endlich kommt, das neue Leben um so herrlicher. Jetzt geniessen sie einen mehrere Monate langen Tag, und gleichsam durch einen Reflex von diesem Ueberfluss an Licht öffnen sich nun die Blüten derselben in den prunkendsten Farben. Ob schon oft nicht höher als ein paar Zoll, können sie durch ihren Schmuck doch die Blicke des Wanderers von grosser Weite auf sich ziehen« . . . »An und für sich hübsch, wie die



Pflanzen sind, wird ihre Schönheit noch mehr erhöht durch den Contrast ihrer öden Umgebung.« . . . . »Es ist die directe Einwirkung der Sonne, die warmen Sonnenstrahlen, welche in den arktischen Gegenden beinahe allein das Dasein und die Entwicklung des höhern Wachsthum's ermöglichen.« . . . . »Deshalb findet man auch, dass die Abhänge auf Spitzbergen die reichste und üppigste Flora besitzen. Gerade in Folge der tiefen Stellung der Sonne fallen die Strahlen derselben ziemlich winkelrecht gegen die Abhänge, und hier kann desshalb zuweilen eine Wärme herrschen, die sich in der gewöhnlichen Vorstellung nicht mit dem Gedanken an ein arktisches Klima vereinbaren lässt.« . . . . So ist auch die Geschwindigkeit, mit der im Innern der Fjorde und in den Thälern das Schmelzen des Schnee's vor sich geht, und die Vegetation emporschiesst, nahezu unglaublich. Da, wo erst vor einigen Tagen tiefe Schneewehen lagen, ist die Erde heute mit einer Menge von Blumen bekleidet, und einige Tage später findet man sogar schon einige derselben in Frucht. Der beständige Tag und das Sonnenlicht, welche verursachen, dass die Entwicklung auch des Nachts fortschreitet, üben hierbei einen selbstverständlich nicht unbedeutenden Einfluss.« . . . .

Nathorst geht in seiner Arbeit auch auf die Fragen der früheren und jetzigen Verbreitung der Pflanzen, auf den Einfluss der Eiszeit und die früher bestandenen Landverbindungen ein, Fragen, welche auch für die Erklärung der Verbreitung der Insekten von Wichtigkeit sind, deren Deutung aber immerhin noch viel Hypothetisches hat. Ich kann mich hier des Weiteren darauf nicht einlassen. Der sich dafür interessirende Leser möge desshalb bei Nathorst selbst nachlesen.

In besonders sorgfältiger Weise hat Griesebach (Vegetation der Erde I, p. 7 ff.) die Verhältnisse der arktischen Flora nach den klimatischen Bedingungen geschildert. Er bezieht alle Landschaften jenseits der Polargrenze der Wälder hierher und betont die Aehnlichkeit, nicht aber Gleichheit der Verhältnisse in den Hochgebirgen und der arktischen Zone, welche schon der Schüler Linné's, Wahlenberg, im Anfang des Jahrhunderts erfolgreich erforscht hatte.

Eine Reihe physischer Bedingungen wirkt dahin, dass das arktische Tiefland sich im Sommer von Schnee befreit und der Vegetation einen unbegrenzten Schauplatz eröffnet. Indem das Meer die Eismassen beständig fortschafft, und auf diese Weise die Nachwirkungen der Winter-

kälte aufhebt, kommt die Sommerwärme dem Festlande zu Statten, und es übt das System der Meeresströmungen auf die Flora einen umfassenden Einfluss aus. So findet man in Skandinavien in Folge des Golfstroms keine arktische, sondern eine alpine Flora, so dass Bäume sich bis zum Nordcap ( $71^{\circ}$ ) finden, während die Waldungen in Sibirien in den Continent hineintritt ( $66^{\circ}$ ). Die Wälder Nordamerikas werden durch den Schmelzungsprocess des Küsteneises weit heruntergedrängt und die arktische Flora geht bis zum  $66^{\circ}$ , ja  $60\frac{1}{2}^{\circ}$  NBr. herunter.

Die arktische Flora hat eine grosse Gleichförmigkeit, bedingt durch die Kürze der Vegetationsperiode und die geringe Wärme derselben. In vielen Gegenden des arktischen Gebiets halten die Pflanzen einen Winterschlaf von 9 Monaten. Bäume, deren Entwicklung an eine höhere Temperatur gebunden ist, kommen nicht mehr fort wegen der Kürze der Vegetationszeit. Die Winterkälte beschränkt die arktische Vegetation weniger durch ihre Strenge, wie durch ihre Dauer, der die Pflanzen durch ihre Kleinheit zu begegnen suchen, ebenso wie die auf das Aeusserste getriebene Benutzung der gespendeten Sommerwärme und der Schutz gegen die Kälte die überwiegenden Momente unter den Lebensbedingungen der arktischen Flora sind. — Die Moostundren nehmen in beiden Continenten den grössten Theil der Oberfläche ein. Sie sind lange nicht so günstig wie die Lichenentundren, welche den Rennthierheerden und Bisamthieren Nahrung gewähren, während die Ziersträucher von *Vaccinium* und *Ericaceen* den Bären und Gänsen ihre Früchte liefern. Da, wo die Grasrasen zurückgedrängt und durch Stauden ersetzt wird, bildet sich das einzige anmuthige Landschaftsbild in den Polarländern, wo auf geeignetem Boden ein freudiges Grün mit glänzenden Blumenfarben gemischt entsteht. So konnte von Baer in seiner berühmten Schilderung der Vegetation von Nowaja Semlja diesen bunten Teppich mit einem von kunstreicher Hand in der Eisregion angelegten Garten und mit dem Schmuck der alpinen Landschaft vergleichen. Er schilderte den mit purpurfarbigen Blumen dicht besetzten Rasen der *Silenen* und *Saxifragen*, gemischt mit dem azurnen Stern des Vergissmännichs mit goldgelben Raunkeln und Draben und mit andern Blüthen von blauen, weissen und hellrothen Farbentönen, unter denen das Grün des geringen Laubes kaum bemerkt wird. —

Die arktischen Pflanzen haben gegen eine niedrige Temperatur um ihr Dasein zu kämpfen, und ihr Streben ist darauf gerichtet, Schutz und Widerstandskraft gegen die Strenge der Kälte zu gewinnen,

während der Vegetationsperiode in den Genuss der grösstmöglichen Wärmemenge zu gelangen, und die Entwicklung so viel wie möglich zu beschleunigen. (S. Kjellmann, Aus dem Leben der Polarpflanzen in Nordenskjöld's Studien VII, p. 452). Ihre innere Organisation begünstigt sie dabei, sowie eine eigenthümliche Lebensthätigkeit, welche die Thätigkeit, welche bei andern Pflanzen im Frühjahr und Winter eintritt, in den Herbst oder Spätsommer verlegt, der Vegetationsperiode die grösstmögliche Dauer gibt, mit dem Material sparsam umgeht und gleich am Anfange der Vegetationsperiode eine Menge Organe in derselben Richtung wirksam hat, indem die Verzweigung sehr weit getrieben wird. Die Ansicht, dass im Winter eine ausgiebige Schneedecke die Pflanzen überall schütze, ist nicht richtig, da grosse, pflanzenbewachsene Flächen in den Polargegenden überhaupt keine schützende Schneedecke haben.

Bei der Untersuchung der Anordnung der arktischen Pflanzen hat man gefunden, dass die grönländische Flora mit der des alten Continents in engerer Verbindung steht, als mit Amerika, eine Thatsache, welche Hooker und Darwin's Hypothese über die Wanderung der Pflanzen in der Glacialperiode zu erklären suchte, während Griesebach in den Meeresströmungen eine Quelle der Verknüpfung der grönländischen Flora mit der des arktischen Asiens fand, ebenso wie arktische Pflanzen aus Asien in die Gebirge Skandinaviens wanderten. Das sibirische Treibeis, welches an Grönlands Ostküste, wie an die Nordküste von Island angespült wird, nachdem es Spitzbergen berührt hat, bringt die Samen der Gewächse mit sich, während Samen des europäischen Waldlandes nach Island durch nordische Vögel verpflanzt wurden, wie durch den Verkehr der Menschen. Spitzbergens Flora ist aus der Richtung des arktischen Stromes entstanden, näher mit Sibirien und Grönland, als mit dem pflanzenreichen Lappland verknüpft. — Die Vegetation aller Inseln des Eismeers ist dem Festland entlehnt, das im arktischen Europa und Asien grösste Uebereinstimmung zeigt; es wachsen die Unterschiede, wenn man zu dem westlichen, dann zu dem östlichen Nordamerika übergeht, so dass Labrador und der arktisch-amerikanische Archipel zu dem Samojedenland den verhältnissmässig grössten Gegensatz bildet.

Nach Drude (Pflanzengeographie, p. 350) bilden die mit polaren Klima von 12 Monaten unter 10° C. Temperaturmittel versehenen Inseln und Nordküsten der beiden grossen Continentalmassen zugleich

mit den unmittelbar an diese Küstengebiete sich anschliessenden Hochgebirgen: die Fjeldregion der skandinavischen Alpen, nördlicher Ural, Stanowoigebirge und die nördlichen Rocky Mountains das arktische Florengebiet, welches sich allerdings noch in das nördliche Waldgebiet im Bereich der Lärchen- und Weissbirkenwälder, ja mit seinen letzten Ausläufern weit südwärts auf die Hochgebirge erstreckt. Diese rings um die Erde in hohen Breiten laufende arktische Glacial- und Tundrazone ist nach Drude ein dem nordischen Florenreich untergeordnetes Gebiet, unsgezeichnet durch vorherrschende Moos- und Flechtenmatten und Sumpfmoorformation, denen sich eine aus theilweise noch immergrünen Ericaceen bestehende Halbstrauchheide und die arktischen Geröllfluren mit karger, gemischter Vegetation anschliessen. Geographisch scheidet sich das arktische Gebiet in die welligen Flachländer mit der Tundrafläche, zusammenhängenden Moos- und Flechtenbeständen mit eingestreuten Blütenpflanzen und in die mächtige Gebirgsformation mit ihren Moränenwällen und den kleinen Oasen Jahrhunderte alter Humusanhäufungen, der Fjordregion Drude's. —

Zum Schlusse dieser Auseinandersetzung über die arktische Flora möchte ich hier noch mittheilen, was Paasch (Zweite deutsche Nordpolfahrt 1869, Bd. II, S. 74) in dem Bericht über Klima und Pflanzenleben auf Ostgrönland wiedergibt.

»Die ostgrönländische Küste zeigt im Sommer nicht eine ganze Schneedecke mit einzelnen eisfreien Flecken, sondern die Expedition fand ein völlig eisfreies Land während drei voller Monate. Die Schneestürme jagen den Schnee in lokalen Bodengestaltungen zusammen. Die allgemeine Schneedecke schmilzt bereits im April und durch die auf dem dunklen, felsigen Boden bei klarer und trockener Luft auffallende Sonne, die nicht mehr untergeht, dringt die Wärme in denselben ein, der auch bei unter dem Gefrierpunkt stehender Lufttemperatur einige Grad Wärme erhält. Nächtliche Abkühlung durch Thau gibt es nicht. Durch Nebel wird die Wärme etwas ermässigt, aber der Boden strahlt auch nicht aus, er thaut bis  $1\frac{1}{2}'$  Tiefe auf. Die warme aufsteigende Luft folgt dem Hange der Berge und wird durch die Sonnenstrahlen wieder erwärmt. Dadurch gibt es keine Höhengrenze. Feuchtigkeit ist überall im Boden reichlich vorhanden, da das Schneewasser unter den Boden hin sickert. So sieht man gleichmässig grüne Flächen, auf denen Heerden von Rennthieren und Moschus-Ochsen weiden, nicht nur am Fusse der Berge, sondern in den Gebirgen bis über 1000 Fuss.



Diese grüne Fläche besteht aus schönen Rasen mit Löwenzahn und dichten Halmen von Androsace, Heidelbeeren, Farrenkraut und Ampfer. An sonnigen Halden steht *Campanula* und *Pyrola*, im Schuttgeröll *Epilobien*, zwischen Felsen *Polemonium* mit fein gefiederten Blättern und grossen, hellblauen Blumen. Selbst Birkengestrüpp findet sich neben Alpenrosen und fruchttragenden Heidelbeeren. Hier gibt es Rennthiere, Polarhasen, arktische Ochsen, Lemminge, Gänse und Schneehühner, als deren Feinde Füchse, Hermeline, Eulen und Falke sich finden. Schneeammern zwitschern, Regenpfeifer und Strandläufer stellen den Mücken nach.\*

Ich habe oben angegeben, dass das circumpolare, meist nördlich vom Polarkreise gelegene, mit seinem südlich davon gelegenen Theile nur Stücke von Asien und Nordamerika einnehmende Nordpolargebiet seine Südgrenze an der Nordgrenze des Baumwuchses findet, welche ihrerseits ziemlich gut mit der Juli-Isotherme von  $10^0$  zusammenfällt. Verfolgen wir die letztere, welche freilich nicht eine gleichmässige mit der Verbreitung der Falter verlaufende Linie darstellt, so finden wir, dass sie den nördlichen Polarkreis mehrfach kreuzt und namentlich über einen grossen Theil von Skandinavien hinausgeht, welcher in das vom Polarkreise abgeschiedene Gebiet hineinfällt, was auf den Einfluss des warmen Golfstromes im Wesentlichen zurückzuführen ist. Die Juli-Isotherme schneidet die Nordspitze Alaskas ab, senkt sich über den nördlichen Theil des amerikanischen Festlandes allmählich herab in den nördlichen Theil Labradors und geht an der Südspitze von Grönland vorüber unterhalb Islands zu dem nördlichsten Theil Skandinaviens, um sich von hier abwärts auf den nördlichen Theil Sibiriens zu senken und oberhalb Kamtschatkas längs der Aleuten am  $60^0$  NBr. wieder einzutreten.

Der von Möbius als Grenzlinie angenommene Verlauf deckt sich nicht ganz hiermit, indem er eine von Engler angegebene »Karte der Vertheilung der wichtigsten physiologischen Pflanzengruppen in den Vegetationsgebieten der Erde« (Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, Leipzig 1879) für seine Karte der Thierverbreitung als Grundlage angenommen und dabei einige weit nach Süden vorspringenden Buchten dieser Linie abgerundet hat. Seine Grenzlinie geht von unterhalb der Südspitze Grönlands von  $60^0$  NBr., den Polarkreis kreuzend und längs desselben oberhalb Islands verlaufend quer durch das nordatlantische Meer nach Nordskandinavien bis über den  $70^0$  NBr., senkt sich in



der Insel Kola zum Polarkreis herab diesen bis zum Ob nahezu begleitend. Vom Ob geht sie etwas südlich, um sich am Jenisei steil zum  $70^{\circ}$  zu erheben und über denselben bis hinter die Lena hinaus zu gehen. Von hier senkt sich die Grenze wieder hinab, um an der Kolyma den Polarkreis zu kreuzen, sich abermals etwas zu erheben und dann in der Tschutschken-Halbinsel steil abwärts zu den Aleuten zu verlaufen. Diesen folgend steigt die Grenze im nordwestlichen Nordamerika wieder über den Polarkreis bis nahe der Mündung des Mackenzie's hinaus und bleibt in einiger Höhe über denselben, um ihn bei etwa  $120^{\circ}$  westl. Länge abermals zu kreuzen und sich dann steilabwärts nach der Hudsonsbai unter  $60^{\circ}$  NBr. zu senken. Sie schneidet den nördlichen Theil von Labrador bis etwa zum  $52^{\circ}$  NBr. ab und steigt von hier zur Südspitze Grönlands und zum  $60^{\circ}$  wieder empor. Während sie daher in Europa und Nordasien zu einem nicht unbeträchtlichen Theil oberhalb des Polarkreises verläuft, geht sie in Nordamerika weit unter denselben herab. In den Ländern an der südlichen Grenze des Eismeers schwärmen die Mücken in vermehrter Zahl, welche bei  $70^{\circ}$  NBr. noch die Mannschaft von John Ross an der Arbeit hinderten. Nördlich vom  $73^{\circ}$  scheint die Insektenwelt fast ausgestorben, bei  $70^{\circ}$  erscheint sie schon reich.

In der Erörterung der arktischen Schmetterlingsfauna kann ich mich nicht streng an diese Linie halten. Einmal würden hierzu unsre Kenntnisse über die Verbreitung der Schmetterlinge nicht reichen und andererseits binden sich die Falter in ihre Verbreitung nicht völlig an sie. Aurivillius sagt in seiner oben angeführten Arbeit über das Insektenleben in arktischen Ländern, dass das zu erörternde Gebiet eigentlich vom Polarkreis begrenzt sein sollte: »Da aber sowohl der ausserhalb des Polarkreises gelegener Theil Grönlands, wie auch ganz Island der Natur nach arktisch sind und in thiergeographischer Beziehung sich nicht vom arktischen Gebiet abgrenzen lassen, so sind auch diese Länder im Zusammenhang mit den innerhalb des nördlichen Polarkreises gelegenen zu betrachten.

Geographisch zerfällt nach Aurivillius das zu betrachtende Gebiet in folgende Theile:

1) das arktische Europa, welches den nördlichen Theil von Norwegen, Schweden, Finnland, die Halbinsel Kola, sowie einen schmalen Streifen vom europäischen Russland zwischen dem weissen Meer und dem Fluss Kora umfasst;

2) das arktische Asien, ein sehr ausgedehntes, aber wenig bekanntes Land, das sich vom Fluss Kora im Westen bis nördlich vom Ostcap ausdehnt;

3) das arktische Amerika, ein schmaler Landstrich längs der Eismeerküste nebst einer grossen Anzahl daselbst gelegener, grösserer und kleinerer Inseln;

4) Grönland, das sich vom  $60^{\circ}$  NBr. bis zum  $83^{\circ}$  NBr. ausdehnt;

5) Island ( $63^{\circ}$ — $66^{\circ}$  NBr.);

6) Nowaja Semlja ( $70^{\circ}$ — $77^{\circ}$  NBr.);

7) Bäreninsel ( $74^{\circ}$ );

8) Ian Meyen ( $71^{\circ}$ );

9) Spitzbergen ( $77^{\circ}$ — $87^{\circ}$  NBr.);

10) Franz Josephland ( $80^{\circ}$ ); und

11) die neusibirischen Inseln und Wrangelland im Eismeer. Ich schliesse der Erörterung noch an Labrador, das allerdings seiner Lage nach kein Polarland ist — seine nördlichste Spitze erhebt sich nur bis zum  $61^{\circ}$  NBr. — das aber ebenfalls einen wesentlich arktischen Charakter nach seiner klimatischen Beschaffenheit hat.

Unter diesen Ländern und Inseln ist das arktisch-europäische Festland in entomologischer Beziehung am besten bekannt und auch an Insekten, beziehungsweise Schmetterlingen am reichsten.

Namentlich ist dies im skandinavischen, vom Golfstrom umspülten Theile der Fall, wodurch ein in arktischen Ländern nicht wieder vorkommendes Klima erzeugt wird. Kola und das arktische Russland dagegen stimmen mehr mit Sibirien überein. Die eigentlich arktische Fauna beginnt ungefähr am  $65^{\circ}$  NBr. Sie wird von Torell in drei Zonen eingetheilt (S. Petermann's geographische Mittheilungen 1861, p. 87), nämlich in eine südliche hyperboreische vom  $65^{\circ}$ — $68^{\circ}$ , wohin Finnmarken und Island gehören, in eine Glacialzone bis  $74^{\circ}$ , wohin *Boothia felix*, Grönland südlich vom Upernavik bis zu  $65^{\circ}$ , Jan Meyen und Bäreninsel, und in eine dritte Zone (Polarzone) vom  $74^{\circ}$  bis zum Pol, für welche Spitzbergen und die Länder im nördlichen Amerika typisch sind, welche durch den vom Lancastersund bis zur Mac Clurestrasse sich fortsetzenden Meeresarm getrennt werden. Hierher gehört auch Grönland nördlich von Upernavik und Nowaja Semlja.

Die ältesten entomologischen Untersuchungen über unser Gebiet sind von Linné auf seiner denkwürdigen Reise nach Lappland im Jahre

1732 angestellt worden. Er hat dieselben in seiner *Fauna suecica* 1761 veröffentlicht. Ihm folgte Thunberg mit den zumeist von seinen Schülern ausgearbeiteten Dissertationen (1784 bis 1795) über viele Arten aus dem hohen Norden. Acerbi besuchte 1798—1799 Torneä Lappmark und das norwegische Finmarken und beschrieb dort aufgefundene Insekten in seiner *Voyage Nord Cape* 1801, z. B. *Argynnis aglaja v. emilia*, *Arctia alpina* Quens = *thulea* Dalm. A. *lapponica* Thbg. = *festiva* Bbh.). Zetterstedt machte auf seiner 1821 ausgeführten Reise nach Torneä Lappmark, nach Ofoten und von da nach Alten und Haparanda ausgedehnte Untersuchungen, die er in seiner im Jahre 1828 veröffentlichte: »*Fauna insectorum lapponica*« und in »*Insecta lapponica*« (1840) veröffentlichte. Von den 77 von Zetterstedt als in Lappland einheimisch aufgeführten Tagschmetterlingen kommen nach Speyer nicht weniger als 62 auch in Deutschland vor. Wallengren (*Lep. Scand. Rhopal.* Malmö 1852) reducirte die Zahl der 77 Zetterstedt'schen Arten auf 61, wovon 42 in Deutschland vorkommen. Selbst unter den restirenden 14 hochnordischen Faltern, nämlich *Melitaea iduna*; *Argynnis polaris*, *freya*, *frigga*; *Erebia embla*, *disa*; *Chionobas norna*, *bore*, *jutta*; *Lycaena aquilo*; *Colias boothii*, *nastes*; *Hesperia centaureae* B. und *andromedae* Wall. sind zwei wahrscheinlich nur Localvarietäten deutscher Arten, nämlich *L. aquilo* von *orbitulus*, und *H. andromedae* von *alveus* oder *calaciae*. Hierbei hat Lappland  $\frac{4}{5}$  seiner Falter mit Deutschland gemein. Von Noctuiden zählte Wallengren 57 lappländische Arten auf, von denen 31 hochnordisch sind, also ungleich mehr eigenthümliche Arten, als die Tagfalter, Schwärmer und Spinner zusammen aufzuweisen haben. Das Verhältniss der Tagfalter von Schweden und Norwegen überhaupt zu denen von Lappland stellt sich nach Wallengren wie folgt:

	Schweden, Norwegen	Lappland
Nymphaliden . . . . .	28	19
Danaiden . . . . .	0	0
Satyriden . . . . .	20	15
Libytheiden . . . . .	0	0
Eryciniden . . . . .	1	0
Lycaeniden . . . . .	28	13
Pieriden . . . . .	11	9
Papilioniden . . . . .	3	1
Hesperiden . . . . .	12	3

Auf Zetterstedt, dessen Bestimmungen leider vielfach zu berichtigen sind, folgten zahlreiche entomologische Forschungsreisen in dem arktischen Theil der schwedischen und finnischen Lappmarken, so von Sanmarck, Sahlberg, Boheman, Märklin, Erwald, und ist Verschiedenes hierüber veröffentlicht. Von Deutschen sammelten im schwedischen Lappland Kretschmar und Keitel. Ueber das norwegische Finnmarken besaßen wir bis 1860 keine zuverlässigen Angaben, in welchem Jahre Dr. Staudinger und Dr. Wocke ihre Beobachtungen dortselbst machten und allein am Altenfjord 192 Schmetterlinge antrafen, wo allerdings unter den Einflusse des Golfstroms eine üppige Vegetation (bei 70° NBr.) sich findet, ja noch Kornbau getrieben wird. Staudinger (Stett. Ent. Ztg. 1861, p. 325 ff.) bezog sich in seinem Berichte auf die früheren Arbeiten von Thunberg, Paykull, Schneider (Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie, Stralsund 1791—1794), Dalman, Boheman und besonders auf Zetterstedt. Er erwähnt 24 Rhopaloceren, 1 Zygaena, 3 Bombyces, 21 Noctuen, 35 Geometriden, 17 Pyraliden und 2 Pterophoriden und glaubt vermuthen zu können, dass sich bei Bossekop (67° NBr.) in Altenfjord ungefähr 300 Arten im Ganzen würden finden lassen. Von den 24 aufgeführten Tagfaltern sind nur 8 nordische, von denen 4 in Nordamerika, 4 in Labrador vorkommen. Von den übrigen 16 sind zwei auf den Alpen und in Sibirien gefunden. Zehn sind im mittleren Europa, nur 4 im südlichen vertreten. Der dritte Theil der Tagvögel Finnmarkens, 8 Arten, gehört zu Argynnis. Von Pieriden finden sich ein Pieris und 2 Colias, Lycaeniden vier, Nymphaliden zehn, eine Vanessa, eine Melitaea und acht Argynnis; Satyriden sechs, Hesperiden nur eine.

Arm ist Finnmarken an SpHINGIDEN, von denen sich nur eine Zygaena (exulans) fand. Von Bombyciden fanden sich nur 3 Arten, 2 Euprepia, 1 Psyche. Von 21 Noctuen sind zehn rein nordisch, 5 in Labrador, 3 in Labrador und den Alpen, die übrigen 8 in Europa gefunden. Das Genus Anarta ist mit  $\frac{2}{3}$  seiner Arten vertreten. Von 35 Geometriden sind 5 specifisch nordisch, 1 kommt in Labrador, 2 im schwedischen Lappland vor. Von den übrigen 30 sind 3 in den Alpen, 26 im nördlichen Europa, 1 durch ganz Europa beobachtet. Ein grosser Theil der Spanner gehört dem Genus Cidaria ( $\frac{4}{7}$ ), ein kleinerer zu Eupithecia ( $\frac{1}{7}$ ).

S. Anhang Nr. 1.



Ueber die in Finnmarken gefundenen Microlepidopteren berichtete Dr. Wocke (Stett. Ent. Ztg. Bd. 23, p. 30 und 235, 1862).

S. Anhang Nr. 2.

Derselbe Autor berichtet auch über die von ihm auf dem Dovrefjeld, einem seiner klimatischen Verhältnisse wegen mit arktischer Natur versehenen, etwas südlicher gelegenen, Gebirgsplateau von 3000—4000 durchschnittlicher Meereshöhe, wo des Nachts oft 0°, am Tage 6 bis 8°, seltener 10° R. sind (Beitrag zur Lepidopterenfauna Norwegens in Stett. Ent. Ztg. 1864, p. 168 ff.). Er fand daselbst noch 166 Arten von Schmetterlingen und zwar 12 Tagfalter (von denen 9 in Finnmarken vorkommen. Drei sind nordisch, die andern auch in Deutschland gefunden. Von Zygaeniden fand er nur exulans, von Sesiiden nur eine leere Puppenhülle; Sphingiden fehlen sonst völlig. Weiter fand er zwei Hepialiden, 9 Bombyciden, 216 Noctuiden (von denen 12 in Finnmarken vorkommen; 8 polar, 19 deutsch und 6 alpin sind), ferner 25 Geometriden (davon 19 in Finnmarken, 1 nordisch, alle andern in Deutschland). Von Microlepidopteren fand er 95 Arten, wovon 12 nordisch sind, 83 auch in Deutschland angetroffen werden und 9 alpin sind. Die 6 Pterophoridae kommen alle auch in Deutschland vor. Viele von Zetterstedt angegebene Arten fand Wocke nicht. Die Schmetterlinge waren nicht träge, sondern, namentlich Geometriden lebhaft; Tagfalter wegen vielem Regen selten.

Ueber Nordfinnland haben wir Mittheilungen von Schilde (Stett. Ent. Ztg. 1873, p. 157 ff. und 1874, p. 57 ff.). Er besuchte Kuusamo (66° NBr.) in Russischfinnland nahe dem Polarkreis und fand daselbst im Ganzen 111 Macrolepidopteren und 50 Microlepidopteren. Während bei uns die Tagfalter nur  $\frac{1}{3}$  der Arten ausmachen, waren sie dort den Noctuen (21) ziemlich gleich. Spinner gab es 15, worunter 4 Psychiden. Von heliophilen Eulen (von denen 8 Anarten und 6 Plusia in Lappland heimisch sind) fing er 5 Plusien in Kuusamo.

S. Anhang Nr. 3.

Zusätze zu Schilde's Bemerkungen lieferte Hofmann (Stett. Ent. Ztg. 1893, p. 131).

Zahlreich sind die Mittheilungen nordischer Entomologen, welche ihr Vaterland mit dem grössten Eifer und Erfolge durchsucht haben, so dass z. B. Nordnorwegen wohl zu den hinsichtlich seiner Schmetterlingsfauna bestbekanntesten Gegenden Europas gehört.



Schoyen (Nye Bidrag til Kundskaben om det artiske Norges Lepid. in Tromsø Mus. Aarshefter IV, p. 71, (1881), welcher sich hier auf die mir nicht zugänglich gewesene Arbeit im Archiv for Math. og Nat. Bd. V, p. 119—228, sowie auf den Bidrag til Videnskap om Norges Lepid. i Kgl. Acad. Svensk. Forhandl. 1881, Nr. 2 bezieht) führt von Sydvaranger ( $69^{\circ}$ — $70^{\circ}$  NBr.) im Ganzen 132 Arten auf, nämlich 44 Macrolepidopteren und 98 Microlepidopteren, worunter 25 Tagfalter, 3 Abendfalter, 9 Spinner, 14 Noctuen, 32 Geometriden, 10 Pyraliden und Crambiden, 17 Tortriciden, 19 Tineiden und 2 Pterophoriden.

S. Anhang Nr. 4.

Sparre Schneider (Tromsø Mus. Aarshefter 1880, p. 83, Lepid. Bidrag til Norges arktiske Fauna) fand in Bejern ( $67^{\circ}$  NBr.) vom 16. bis 21. Juli 1880 nicht weniger als 15 Tagfalter, 1 *Lycaena*, 3 Spinner, 2 Noctuen, 22 Spanner, 13 Pyraliden, 21 Tortrices, 17 Tineinen und 3 Pterophoriden und bei Grote ( $68^{\circ}$  NBr.) vom 27. Juli bis 1. August 9 Tagfalter, 2 *Lycaenen*, 2 Spinner, 4 Noctuen, 14 Spanner, 18 Tortriciden, 5 Tineinen und 1 Pterophoride.

S. Anhang Nr. 5a und 5b).

Derselbe (Entom. Tidskrift 1883, Heft 2, p. 117) erhöht die Zahl der von Schoyen für Sydvaranger angegebenen 132 Arten von Schmetterlingen auf 150, worunter 2 neue Arten, *Agrotis comparata* Moschler (gelida Schneider) und *Acidalia Schoyeni*.

Sandberg (Ent. Tidskrift 1855, p. 187 und p. 221, suppl. à la fauna Lep. de Sydvaranger) fügte noch 33 Arten hinzu, so dass Sydvaranger mit 183 Arten Lepidopteren sich an die Seite des durch Staudinger und Wocke am besten bekannten Alten-Distriktes stellt, der 196 bekannte Arten zeigt. Sandberg fand in Sydvaranger auf 101 Macrolepidopteren nur 84 Microl.

S. Anhang Nr. 6.

In Saltdalen hat Schoyen (Nye Bidrag til Kundskaben om det arktiske Norges Lep. fauna in Tromsø Mus. Aarshefter V, p. 1, 1882) gefunden:

31 Tagfalter, 3 Sphingiden, 10 Bombyces, 23 Noctuen, 53 Geometriden (darunter 27 *Cidaria* und 7 *Eupithecia*), 23 Pyraliden. Im Nachtrag führt er noch 2 Bombyces und 2 Noctuen auf.

S. Anhang Nr. 7.

Schoyen gibt 1882 (Tromsø Mus. Aarshefter V, p. 61) nachfolgende Uebersicht.

	Norwegen	Arktische Region	Doorefeld
Rhopalocera . . . .	92	46	31
Sphinges . . . .	14	2	—
Sesiidae . . . .	12	2	2
Zygaenidae . . . .	4	2	3
Bombyces . . . .	76	22	23
Noctuen . . . .	210	39	43
Geometriden . . . .	188	69	50
<hr/>			
Macrolep. . . .	596	182	152
Pyraliden . . . .	82	34	26
Tortriciden . . . .	275	63	49
Tineiden . . . .	225	85	60
Pterophoriden . . . .	24	9	8
<hr/>			
Microl. . . .	506	191	143
<hr/>			
Summa	1102	373	295

Sparre Schneider (Tromsø Museums Aarshefter 1893. Lepidopterenfauna paa Tromsøen og i nærmeste omegn (mit einem Resumé), p. 2—156, siehe auch Stett. Ent. Ztg. 1894, p. 75) bezieht sich in seiner Arbeit zunächst auf seine interessante Zusammenstellung der Erscheinungszeit der von ihm in Tromsø gesammelten Schmetterlinge (Tromsø Museums Aarsberetning for 1883, p. 14, Oversigt af Lepidoptere iagttagne paa Tromsø og i nærmeste omegn).

Die Zahl der bis 1883 von ihm in Tromsø und Tromsdal (69° 40' NBr.) beobachteten Species war 112. Diese Uebersicht druckt er in der obengenannten Arbeit von 1893 nochmals ab (p. 133). Bis zum Jahre 1893 hatte sich die Zahl der beobachteten Arten auf 134 vermehrt, die von Sparre Schneider ausführlich erörtert werden (S. 1—132).

#### S. Anhang Nr. 8.

Zum Schlusse gibt er dann eine vollständige Uebersicht über die ihm aus dem arktischen Norwegen, d. h. von Saltdalen (66½°—97° NBr.) Tromsø und Maalselvdaalen (69°—69° NO.); Alten (70°) und Sydvaranger (69°—70° NBr.), der am besten untersuchten Distrikte, bekannt gewordene Schmetterlinge. Diese tabellarische Uebersicht fasst die in dem Vorstehenden bereits behandelten Species (siehe die Anmerkungen Nr. 1 bis 8) einheitlich zusammen und erwähnt auch einige

andere Fundorte. Sie ist die Vollständigste, die wir über die Schmetterlingsfauna des nördlichen Norwegens besitzen.

S. Anhang Nr. 9.

In einem deutsch geschriebenen Resumé (p. 151) verbreitet sich Sparre Schneider des Nähern über die geologischen und botanischen Verhältnisse von Tromsö und Tromsdal, wo er 335 Gefäßpflanzen und 134 Schmetterlinge fand, während sich im Allgemeinen die Relation zwischen Pflanzen, Schmetterlingen und Käfer im arktischen Gebiet Norwegens so stellt, dass von Käfern dieselbe Zahl wie von Gefäßpflanzen, von Schmetterlingen die Hälfte, beobachtet wird. Die für Tromsö als für eine Küstenfauna im Ganzen arme Zahl erhöht sich im nicht weit entfernten schönen Maalselvdal bereits nicht unerheblich. Uebrigens rechnet Sparre Schneider zum arktischen Norwegen nur die Aemter Finnmarken mit 47,000 □ Kilometer, Tromsö mit 20,200 □ Kilometer und was vom Nordland oberhalb des Polarkreises liegt, also ein Areal von im Ganzen 85—90,000 □ Kilometer.

Eine vollständige Zusammenstellung der Macrolepidopteren Scandinaviens und Finnlands (sowie Dänemarks) giebt Sven Lampa in Entom. Tidskrift 1885, p. 1 ff., worin auch die Erfahrungen der bereits genannten Forscher verwerthet sind. Es werden dort, entsprechend den viel weiter gesetzten Grenzen, 897 Macrolepidopteren erörtert, über deren Vorkommen u. s. w. man das Nähere dortselbst nachlesen möge.

Eine gleich bemerkenswerthe Arbeit ist die von Tengström (Catal. Lep. faunae fennicae praecurs. in Notiser ur Sällsapets pro Fauna et Flora fennica förhandlingar. Helsingfors 1869) bearbeitete Catalog (in lateinischer Sprache), worin 1233 Arten aufgeführt werden nebst ihrer nähern Verbreitung in den verschiedenen Provinzen, darunter circa 250 aus Lappland. Lappland hat hiernach eben so viele Tagfalter als Britannien, welches, allerdings mit Ausnahme der Polargegenden und einiger Inseln des Mittelmeers das an Tagfaltern ärmste Land von Europa ist, welches bekanntlich in der Richtung gegen Nordwest eine bedeutsame Verarmung der Tagfalterfauna zeigt.

Ebenso ist hier der Platz, der Arbeit von Petersen (die Lepidopterenfauna des arktischen Gebietes von Europa und die Eiszeit; St. Petersburg 1887) zu gedenken. Petersen urgirt dortselbst, dass der Polarkreis keine wirkliche faunistische Begrenzung bilde und dass die Verbreitung wichtiger Arten nicht immer mit einer bestimmten Isotherme übereinstimme. Das oceanische Klima an der Küste Norwegens bis zum

Nordcap und das Continentalklima in Nordfinnland und Lappland drücke der Fauna seine Stempel auf, aber der arktische Charakter finde sich in beiden Theilen. Petersen nimmt für seine Erörterungen den 65. Parallelkreis als südliche Begrenzungslinie an, führt aber noch solche Arten auf, von denen man annehmen kann, dass sie, da sie bei 64° vorkommen, auch noch den 65. überschreiten. Als Gesamtziffer giebt er an: 402 Arten und zwar 80 Rhopaloceren, 21 Sphinges, 54 Bombyces, 116 Noctuen, 131 Geometriden, eine hohe Zahl, die nur durch das gemässigte Klima und die Zugänglichkeit des Gebietes von Südosten her erklärlich ist. In einer übersichtlichen Tabelle vergleicht er die einzelnen Arten nach ihrer Verbreitung sowohl in Europa, als in andern Ländern (s. Anhang No. 10). Petersen nimmt an, dass man für die Lepidopteren kein besonders arktisches Gebiet beanspruchen könne, noch auch eine Circumpolarregion, da das Gebiet einen Bestandtheil der Wallace'schen polararktischen Region bilde. Nur eine einzige Gattung der Geometriden (*Malacodea* Tengström, Cat. No. 475, p. 357) nahe verwandt mit *Cheimatobia*, sei dem arktischen Gebiet Europas eigenthümlich, dagegen von Tagfaltern keine Art, von Sphingiden nur *Sesia Aurivillii* und *Sesia polaris*, von Bombyces nur *Nola karelica* und *Arctia thulea* und von Noctuen nur *Agrotis subcaerulea*, *gelida*, *Dianthoecia skrelingia*, *dovrensis*, *Orthosia crasis*, *Anarta Bohemanni*, *quieta* und von Geometriden: *Acidalia Schoyeni*, *Halia fursaria*, *Malacodea regelaria*, *Cidaria serraria*, *filigrammaria*, *Eupithecia altenaria*.

Die Bemerkungen, welche Petersen weiter über die Verbreitungsverhältnisse einzelner Arten, sowie über den Einfluss der Eiszeit und über die Einwanderung aus Sibirien macht, möge man im Original nachlesen, ebenso wie die über die Beziehungen der nordamerikanischen Lepidopterenfauna zu der europäischen, sowie die über Islands Fauna. — Diese Verhältnisse fanden bei Hoffmann (*Isoporien der europäischen Tagfalter*, Stuttgart 1878) eine ähnliche Darstellung, insofern nach ihm die ganze jetzt in den Alpen und dem hohen Norden vorkommende, aus der Eiszeit hergeleitete Fauna der Tagfalter auf sibirischer Einwanderung beruhen soll. —

Ich gehe nunmehr zu der Erörterung der Schmetterlingsfauna des arktischen Sibiriens über. Bekanntlich bilden Europa und Asien einen nur durch den Ural getrennten Continent. Die Flora und Fauna des östlichen Nordeuropas geht auch nach Sibirien herüber und der westliche Theil Sibiriens ähnelt noch vollständig Europa, während der



östliche, durch den Jenissei getrennte, Hinneigung zu den Produkten des nordamerikanischen Festlandes zeigt, auch in seiner physischen Natur von dem westlichen Theil verschieden erscheint, indem hier ein mehr gebirgiger Charakter auftritt.

Wir wissen noch sehr wenig von der Schmetterlingsfauna dieses ausgedehnten nordischen Landstriches, ja dieselbe war bis 1843 fast unbekannt, in welchem Jahre Middendorf seine Forschungsreise nach der Taymir-Halbinsel unternahm. Unter den von Ménétries und Erichson beschriebenen, von jenen aus dem arktischen Sibirien mitgebrachten Insekten (50 Arten) waren nach Aurivillius fünf Tag- und ein Nachtfalter (s. Anhang No. 11).

Die Zahl derselben wurde vermehrt durch die Fahrten Norden-skjöld's auf dem Jenissei im Jahre 1875 und 1876, wobei Trybom und Sahlberg sammelten. Ersterer berichtete in einer Schrift: Dagfjärilar insamlade af svenska expeditionen till Jenisei 1876 (Stockholm 1877 in Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Acad. Forh. No. 6). Er erwähnt dortselbst 51 Tagfalter, welche vom 56° (Krasnojarsk) bis 70° 40' (Nikandrovskaja) NBr. gesammelt wurden, von denen die meisten (45) noch in Europa gefunden werden (s. Anhang No. 12), 36 in Skandinavien und Finnland, 7 in Sibirien und Amurland, 1 (*Arg. eugenia* (= *gemmata*?) in Sibirien und Thibet, *Syr. centaureae* in Skandinavien und Labrador, *Erebia disa* in Skandinavien.

Von dem östlichen jenseits des Jenissei gelegenen Theil des arktischen Sibiriens erfuhren wir durch die Vega-Expedition, welche bei Pittlekoy überwinterte. Sie brachte circa 86 Insektenarten mit, darunter auch verschiedene Schmetterlinge aus Sibirien. Aurivillius hat hierüber berichtet in Vegas Exped. Vetenskap. Tachley, Bd. IV, Stockholm 1885. Lepid. insem. i nordligste Asien under Vega exped.

Er erwähnt dortselbst:

1. *Erebia Rossii* Curtis (mit Abbildung),
2. *Oeneis crambis* Freyer (= *taygete*) aus dem arktischen Amerika (mit Abbildung),
3. *Argynnis* spec. (als Larve gefunden; mit Abbildung),
4. *Dasychira Rossii* (Arktisches Nordamerika, Mount Washington, Grönland, Labrador; mit Abbildung),
5. *Arctia* (?) spec.



6. *Anarta Richardsoni* Curtis (= *algida* Bf.) = *Mamestra* (?) *Feildeni* (Arkt. Skandinavien, Dovre, Labrador, Grönland, Grinnellland),
7. *Cidaria* (?) *spec.* (von *Pittlekoy*),
8. *Plutella* (*cruciferarum* Zeller), auch von Spitzbergen.

Auf Sibirien entfallen hiervon: 1 Tagfalter: *Erebia Rossii*, 1 Spinner: *Dasychira Rossii*, 1 Nachtfalter, 1 Spanner.

Künftige Untersuchungen werden uns wohl über diese Gegenden weitem Aufschluss bringen. Es möge indess erlaubt sein, hier einer Bemerkung von Grum Grzimaïlo (s. dessen höchst interessanten Bericht über eine Reise in das Alai-Gebiet in Romanoff, *Memoires sur les Lepidopt.* II., p. 296) Erwähnung zu thun. Es heisst dortselbst: Die sehr unerhebliche in Centralasien beobachtete Anzahl rein polarer Formen ist bekannt, sowie dass der Nordabhang des Altai, der mit dem Gebirgssystem des Thian Schan in directem Zusammenhang steht, viel Aehnlichkeit bietet mit der Sibirischen Taiga, die von sehr vielen Polarformen bewohnt wird. Hieraus lässt sich der Schluss ziehen, dass diese Polarformen sich bis zu den äussersten Punkten des Thian Schan ausbreiten konnten, da sie überall die gleichen klimatischen Bedingungen vorfanden. Mir gelang es, am Fluss Kisil Art, wie dem verstorbenen Fedtschenko, eine typische *Colias nastes* (*cocandica* Erschoff), die sonst in Labrador und Lappland verbreitet ist, zu fangen, und zwar sowohl Männchen als Weibchen dieser so interessanten polaren Art, sowie noch manche andere rein polare Formen. —

Viel besser bekannt sind wir mit manchen Theilen des arktischen Amerikas, welches aus dem Festlande und der Inseln im Eismeer besteht, die wir hier vom nearktischen Gebiet abscheiden, das nach Kirby eigentlich mit dem paläarktischen zusammenzulegen ist. Auf dem Festlande zieht sich die in Asien zwischen dem 66. und 69. Breitengrade hinziehende Baumgrenze anfangs in gleicher Weise fort, so dass es an der Mündung des Makenziefflusses noch Bäume giebt, sie geht aber, je mehr man sich dem atlantischen Ocean nähert, mehr nach Süden herab, so dass sie an der Küste den 52. und 53. Grad erreicht. Der westliche Theil des arktischen Amerikas, in welchem von 71° NBr. bis zum Polarkreis die Vegetation mit grosser Schnelligkeit zunimmt, ist viel reicher an Insekten als der östliche.

1848/49 unternahm Richardson eine Reise den Makenzieffluss herab bis zur Mündung und längs der Eismeerküste. White sammelte dabei Insekten aller Ordnungen und nicht weniger als 11 Tagfalter,

2 Nachtfalter, 2 Spinner, 2 Motten (Richardson Journal of a boat voyage through Ruperts land and the arctic sea in search of Franklin. With botanical and Zool. app. London 1851; s. Anhang No. 13).

Die Eismeerküsten, welche viel häufiger besucht wurden, scheinen ärmer zu sein. Von Parry's erster Reise (1869/70) beschrieb Kirby (Suppl. to app. Capt. Parry's voyage for the discovery of a north west passage) einen angeblichen Spinner als *Bombyx Sabini* K. = *Psychophora Sabini* K. (s. Anhang 14).

Von seinem dritten Besuch 1824/25 brachte Parry noch einen Tagfalter mit: *Melitaea tullia* Fabr. (wohl = *Argynnis chariclea* Schn.) — Die Reise von Ross nach Boothia felix und der umliegenden Gegend brachte 14 von Curtis (App. to the narrat. of a second voyage in search of a north west passage. London 1835) beschriebene Lepidopteren, nämlich 6 Tagfalter, 2 Spinner, 1 Nachtfalter, 2 Spanner und 3 Wickler (s. Anhang 15).

Auf der Barings-Insel, der westlichsten, fand Miertsching 1852 im August unter  $76^{\circ} 6'$  noch zwei Tagfalter, eine *Colias*, *Argynnis*, einen kleinen Nachtfalter und eine behaarte Larve. Nach Christoph (Einige im hohen Norden beobachtete Insekten in Stett. Ent. Ztg. 1855, XVI, p. 111), waren es *Argynnis ossianus*, *Colias pelidne*, eine *Noctua* und die Raupe von *Dasychira Rossii* Curt.

Von der Expedition M. Clintock's im Jahre 1858/59 nach Boothia felix berichtete Walker (1860) über einen Tagfalter, 1 Spinner (*Arctia americana* Harris) 1 Nachtfalter, 1 Spanner, 1 Wickler.

An der Pondsbai unter  $72^{\circ}$  an der Westküste der Baffinsbai fand Walker *Anarta Richardsoni* Curtis und an der Cumberlandstrasse westlich von der Davisstrasse wurden von der Howgate Expedition 1877/78 mitgebracht: 4 Tagfalter, 2 Nachtfalter und einige andere Insekten.

Am überraschendsten waren die Entdeckungen im Gebiete des Insektenlebens, welche bei der von Capitain Nares im Jahre 1875/76 auf dem Alert und Discovery unternommenen englischen Polarexpedition gemacht wurden. Die beiden Naturforscher Feilden und Hart fanden auf Grinnellland zwischen  $78^{\circ}$  und  $83^{\circ}$  NBr. ein viel reicheres Leben, als man es von Westgrönland und von Spitzbergen kannte.

Wir besitzen über die Insektenausbeute eine ausführliche Arbeit von Mc. Lachlan (Report on the insects coll. by captain Feilden and Mr. Hart between the parallels of  $78^{\circ}$  and  $83^{\circ}$  North latitude,

during the recent arctic expedition Alert and Discovery in Journal Proc. Linn. Soc. Zool. XIV, p. 98 ff. 1878. Mc. Lachlan geht in dieser Arbeit ausführlich auf die bis dahin bekannt gewordenen Verhältnisse der Flora und Fauna der Ostküste von Grönland ein und erwähnt 60 von Feilden und Hart mitgebrachte Insektenarten. Nach Feilden seien in der kurzen Zeit, wo keine Nacht eintritt, die Tagfalter stets unterwegs, so lange die Sonne nicht durch Wolken oder Schnee verdunkelt wird. Mc. Lachlan stellt bereits die Frage über die Dauer der Entwicklung der Insekten auf und hält es für wahrscheinlich, dass die meisten Schmetterlinge eine mehrjährige Entwicklung beanspruchen. Er hält die arktischen Lepidopteren für Relikten der Eiszeit, bei welchen sich, wie bei den alpinen, grosse Neigung zum Variiren zeige.

Die von Mc Lachlan angeführten Arten sind: *Colias hecla* Lefebvre var. *glacialis* (81° 45'); *Argynnis polaris* B. (82° 52'); *Argynnis chariclea* Schneid. (81° 52') nebst *A. chariclea* var. *obscurata* (80°); *Chrysophanus phlaeas*, var. *Feildeni* M. L. (81° 45'); *Lycaena aquilo* B. (81° 45'); *Dasychira grönlandica* Wocke (82° 45'), (= *D. Rossii* Curtis), Raupe auf *Sa ifraga oppositifolia* und *Salix arctica*; *Noctua* (*Mamestra*) *Feildeni* (= *Anarta Richardsoni* Curtis), *Plusia parilis* H. (79°); *Psychophora Sabini* K. (= *Glauc. sabiniaria* Paed); *Scoparia gelida* M. L. (82° 30'); ferner 3 Tortriciden (*Penthina*, *Retinia*) und ein weiteres Micropter.

Alle diese Arten sind den arktischen Ländern Europas und Asiens gemeinsam. Grinnellland ist auch sonst reich an Thieren, so an Landsäugethieren (8), es hat 3 Süßwasserfische und 58 Arten Phanerogamen. Diese Geschöpfe dürften von Norden her eingewandert sein. Auch ist wohl von hier aus der amerikanische Theil der Fauna und Flora nach der Ostküste von Grönland vorgedrungen.

Von Grönland, der Nachbarinsel von Grinnellland, kennen wir bereits seit 1780 durch Otto Fabricius' *Fauna grönlandica* neben verschiedenen andern Insekten 9 Schmetterlinge. Wahrscheinlich sind dieselben aber, wenigstens was die Phalänen betrifft, falsch bestimmt. Nachdem Lefebure in den *Annal. entom. France* 1836 einen Tagfalter: *Colias hecla* und 5 Nachtfalter von Grönland beschrieben hatte, und Zetterstedt in seiner *Insecta lapponica* 1840 zwei Tagfalter und 9 Nachtfalter von dort aufgeführt hatte, gab Staudinger 1857 in der *Stett. Ent. Ztg.*, p. 299 einen Beitrag zur Lepidopterenfauna Grönlands heraus nach den von ihm studirten Vorräthen der Museen

von Kopenhagen und Berlin, wie der Westermann'schen Sammlung. Er berichtet verschiedene Fabricius'sche Arten und zählt ausser *Episema graminis* noch 19 Arten auf, die er persönlich geprüft hatte. Es sind dies: *Argynnis chariclea* mit var. *Boisduvali* Sommer; *Colias boothii* Ross (*hecla* Lef.); *Agrotis islandica* St.; *Agrotis rava* Ht.; *A. Drewseni* Staud.; *Noctua Westermanni* St.; *Hadena Sommeri* Lefb.; *Hadena exulis* Lefbr.; *Plusia parilis* W.; *Plusia diasema* Dalm; *Plusia gamma* L.; *Plusia interrogationis* L., var. *grönlandica* St., *Anarta algida* Lefb. (= *Richardsoni* Curt.), *Cidaria truncata* L. und *Pempelia carbonariella* F. R.

1872 gaben Schiödte (Uebersicht der Land-, Süsswasser- und Ufer-Arthropoden Grönlands) und Holmgren (Insektenfauna Nordgrönland samlade af Prof. Nordenskjöld Stockholm 1872 in Ofversigt Kgl. Vet. Acad. Forh. 29, No. 6, p. 97 ff.) ebenfalls Uebersichten der von Grönland bekannt gewordenen Insekten, letzterer namentlich über die von Nordenskjöld gesammelten, worunter 2 Schmetterlinge (s. Anhang 15a und 16).

1878 soll die amerikanische Howgate Expedition auf der Disco-Insel die beiden, sonst nicht in Grönland aufgefundenen Arten *Argynnis freija* (welche wohl *Argynnis chariclea* war [P.]) und *Anarta melanopa* entdeckt haben. Vom 81° 20'—81° 50' NBr. an der Westküste brachte die nordamerikanische Polarexpedition einen Tagfalter: *Arg. chariclea* und drei andere Falter mit.

Von der Ostküste Grönlands wurden durch Scoresby (Journal of a voyage to the Northern Whale Fishery including researches and discoveries on the eastern coast of W. Grönland, made in the summer of 1822 in the ship Baffin of Liverpool, Edinburg 1823) vom 71° 30' NBr. zwei Tagfalter bekannt, die ursprünglich von Jameson (l. c. p. 423) als *P. palaeno* und *P. dia* beschrieben, wohl *Colias hecla* Lefb. und *Arg. chariclea* Schn. var. *arctica* Zett. waren.

Die bereits früher erwähnte deutsche Polar-Expedition unter Captain Koldewey (1869/70) brachte ebenfalls verschiedene Schmetterlinge mit, welche von A. von Homeyer 1874 (Zweite deutsche Nordpolarfahrt von 1869, Bd. II, p. 409) bearbeitet wurden. Derselbe erwähnt: *Argynnis chariclea*; *Arg. polaris*, *Colias hecla*, *Cidaria polata* Geometra sp. und *Dasychira grönlandica* Wocke (= *D. Rossii* Curtis). Auch Nordenskjöld brachte 1883 vom 65° NBr. einen Nachtfalter mit.



Packard (Unit. St. Geol. Survey, X, p. 567) führt 1876 in seiner Arbeit über die nordamerikanischen Phalaeniden einige Spanner von Grönland auf, nämlich *Glaucopteryx sabinaria* (= *Pychophora Sabini* K.), *Glaucopteryx phocataria* (= *phocata* Möschler), *Acidalia sentinaria* P. (= *spuraria* Möschler) und p. 555 *Agrotis islandica*.

Packard führte 1877 im *American Naturalist*, II, p. 51 grönländische Lepidopteren auf (*Exploration of the Polaris exped. to the North Pole*).

Bessel (die amerikanische Nordpolarexpedition, Leipzig 1879) giebt an: *Laria Rossii* Curtis und *Colias Rossii* Curt.

Auch bei Möschler (die Nordamerika und Europa gemeinsam angehörenden Lepidopteren in Verhandl. zool. bot. Gesellsch. Wien 1884, p. 273 ff.) finden sich grönländische Schmetterlinge aufgeführt; bei Edwards (*Revised Cat. of diurnal Lep. of America north of Mexico* in Phil. Fr. Ann. Ent. Soc., II, p. 254, 1884) sind drei Arten von Grönland aufgeführt.

Zu erwähnen ist hier auch das von der dänischen Expedition auf Grönland im Jahre 1878 auf den aus dem Eise hervorragenden Berggipfeln, den Jensen'schen »Nunatakkers« beobachtete Insektenleben. Auf diesen 16 Meilen weit vom Eis umgebenen und 4000' über Meereshöhe sich erhebenden Berggipfeln wuchsen inmitten einer öden Eiswüste noch allerlei Pflanzen (*Saxifraga*, *Ranunculus*, *Papaver*, *Campanula*, *Potentilla*) und es fand sich dort eine Nachfalterraupe (wohl von *Dasychira Rossii*) und eine Spinne.

Eine ausführliche und überaus gründliche Darstellung der auf Grönland vorkommenden Schmetterlinge verdanken wir Aurivillius (*Grönlands Insectfauna, Lepidoptera, Hymenoptera* in Bihang till. K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. XV, Affd. IV, No. 1, Stockholm 1890). Er giebt dortselbst zunächst eine vollständige Uebersicht der seit 1780 bis 1887 erschienenen einschlägigen Litteratur und führt dann von Schmetterlingen 28 Arten auf, die er im Nachtrag auf 33 erhöht, und zum Theil auch vortrefflich abbildet (s. Anhang No. 17).

Ich reihe hier die Erörterung der Schmetterlinge von Labrador an, der grössten und nördlichsten Halbinsel Nordamerikas zwischen 49 und 63° NBr. und 55—79° westl. Länge. Man ist gewohnt, hiervon als Labrador im engern Sinne den nordöstlichsten Theil, vom 52° bis 61° N. Br. abzuschneiden, der fast allein näher bekannt ist. Die nörd-



liche Spitze Labradors, welche mit Norddeutschland und Südschweden unter gleichem Breitegrade liegt, fällt geographisch weit unter den Polarkreis, aber die Waldgrenze geht auf Labrador bis zum 52° herunter und es machen die klimatischen und sonstigen physikalischen Verhältnisse das Land zu einem richtigen Polarland und zwar zu einem der ödesten und unwirthlichsten der Erde. Dadurch bieten sich für uns viele wichtige Vergleichsmomente. Fast alle Schmetterlingsarten, die das eigentliche arktische Gebiet Nordamerikas und Europas bevölkern, kommen auch in Labrador vor, hier untermischt mit einzelnen besonderen Species. Aber der Reichthum der unter gleicher Breite liegenden europäischen Länder wird bei Weitem nicht erreicht.

Um die Kenntniss der Schmetterlingsfauna von Labrador hat sich namentlich Möschler auf Grund von Sendungen, die er von dort lebenden Missionaren erhielt, verdient gemacht.

Möschler's erster kurzer Aufsatz in der Stett. Ent. Ztg., Bd. IX, p. 172—174 (1848) erwähnt 17 Arten, während Christoph in Stett. Ent. Ztg., Bd. XIX, p. 307—315 bereits 29 Arten besprach, welche bei Okkak, einer Missionsstation unter 57° 43' NBr. gefunden worden waren. Diese Arten hat Möschler 1860 in einer grössern Arbeit, Beiträge zur Lepidopterenfauna von Labrador, Wiener Ent. Mon. IV, p. 329 ff., ausführlich besprochen. Er schildert dortselbst auch die Beschaffenheit des vom 56 bis 61° Breitegrad sich erstreckenden Landes, dessen Nordspitze noch südlicher liegt als die Südspitze Islands mit 63° 35', als eine öde, unbewohnte, gebirgige Wildniss, die mit grossen Waldungen, Sümpfen und Seen angefüllt und wo die Kälte während des langen Winters heftiger als in Grönland ist. Der Winter beginnt Anfangs August und hört im Juni auf, dauert also 9 bis 10 Monate, wobei das Thermometer bis auf 25° R. fällt, während dasselbe in den Sommermonaten öfters bis auf 25° R. Wärme steigt. Die Folge dieser grössern Sommerwärme ist der grössere Reichthum an Pflanzen und Insekten als in Grönland, so dass die Flora 200—250 Arten von Phanerogamen zählt und Waldungen von Tannen, Fichten und Lärchen vorkommen, deren Stamm zu Bauholz geeignet sind. Daneben kommen Birken, Erlen, Wollweiden, Johannisbeeren, Himbeeren und die meisten der in Skandinavien wachsenden Phanerogamen vor, Saxifraga, Vaccinium, Viola, Epilobium neben Gräsern, Büschen und Farrenkräutern. Die allein bewohnte Küste scheint sowohl in den nördlichen, als in den südlichen Theilen gleichmässig von Lepidopteren bevölkert, doch reichen

die bis jetzt gemachten Untersuchungen noch nicht zu einer völlig verlässlichen Darstellung ihrer Verbreitung.

Hiernach fällt allerdings der grössere Theil Labradors unter die Baumgrenze und damit unterhalb das eigentliche, uns beschäftigende Gebiet, indess wird aus den bereits angegebenen Momenten eine nähere Aufzählung der bekannt gewordenen Lepidopteren und eine Besprechung derselben von Werth sein.

In der oben angeführten ausführlichen Arbeit in Wien. Ent. Mon., Bd. IV, p. 329 aus dem Jahre 1860 bespricht Möschler bereits eine stattliche Zahl von Arten, sowohl von Tag- als Nachtfaltern bis auf die Microlepidopteren herab und giebt auch bildliche Darstellungen.

Im VI. Bande der Wiener Ent. Monatsschrift (1862) beschreibt Möschler weitere Arten und bildet ebenfalls einige ab, desgleichen in Wien. Ent. Mon. 1864, p. 193. In der Stett. Ent. Ztg. 1870, p. 113 giebt er darauf eine vollständige Aufzählung der ihm bis dahin bekannt gewordenen Schmetterlinge von Labrador unter Bezugnahme auf die von Scudder (Revision of Chionobas of North America in Proc. Soc. Phil., Juli 1861) seine besonders von Packard (View. of the Lepid. of Labrador in Proc. Soc. Nat. Hist. Boston, XI, Jan. 1857) beschriebenen Arten (s. Anhang No. 18).

Diesen fügte Möschler noch weitere Arten hinzu in Stett. Ent. Ztg. 1874, Bd. XXXV, p. 153, sowie in Stett. Ent. Ztg. 1885, p. 114 (s. Anhang No. 19 und 20).

Von Tagfalter-Gattungen finden wir verzeichnet: *Pieris*, *Colias*, *Polyommatus*, *Lycaena*, *Vanessa*, *Argynnis*, *Chionobas*, *Syrichthus*, *Hesperia*.

Von Spinnern: *Arctia*, *Hepialus*, *Dasychira*.

Von Eulen: *Agrotis*, *Dianthoecia*, *Hadena*, *Mamestra*, *Pachnobia*, *Leucania*, *Plusia*, *Anarta*, *Brephos*.

Von Spannern: *Acidalia*, *Aspilates*, *Macaria*, *Triphosa*, *Lygris*, *Cidaria*, *Eupithecia*.

Von Pyraliden: *Crambus*, *Botys*, *Pyrausta*.

Von Wicklern: *Sciaphila*, *Pendemia*, *Tortrix*, *Conchylis*, *Penthina*, *Halionota*, *Archylopera*, *Antithesia*, *Grapholitha*.

Von Tineiden: *Tinea*, *Incurvaria*, *Gelechia*, *Ornix*, *Oecophora*, *Glyphyteryx*.

Also Gattungen, die wir auch im arktischen Gebiete von Europa aufgefunden hatten.

Möschler hat in der oben bereits erwähnten interessanten Arbeit (Die Nordamerika und Europa gemeinsam angehörenden Lepidopteren Verhandl. k. k. zool. bot. Gesellschaft Wien, Bd. XXXIV, p. 273 ff. 1885) eine Reihe von dem Nordpolargebiete angehörigen Arten, besonders von Grönland und Labrador, sowohl Tag- als Nachtfalter, besprochen. Möschler betont, dass Grönland sowohl wie Labrador, obwohl geographisch zu Nordamerika gehörig, doch in ihrer Lepidopterenfauna dieselbe Verwandtschaft zur europäischen hätten, wie Amur und Centralasien. Um Wiederholungen zu vermeiden, sehe ich hier von einer Aufzählung der von ihm besprochenen Arten ab, mache aber auf die interessanten vergleichenden Bemerkungen aufmerksam, welche Möschler hinsichtlich des Auftretens bestimmter Färbungen bei europäischen, polaren und amerikanischen Arten aufführt, so auf die weissere Färbung der Hinterflügel der nordamerikanischen polaren *Anarta*-Arten gegenüber den polaren europäischen, auf die geringere Variabilität der europäischen polaren *Pachnobia carnea* gegenüber der Labradorform, auf die constante Färbung der Labradorform gegenüber der in Island so veränderlichen *Had. exulis* u. s. w.

In seiner grossen, bereits erwähnten Arbeit über die Geometriden Nordamerikas bespricht Packard auch die in Labrador vorkommenden Spanner-Arten und giebt eine lehrreiche Uebersicht über deren Verbreitung (s. Anhang No. 21).

Er sagt dortselbst: »For instance we cannot explain the similarity between the insectfauna of the pacific states and Colorado and this of eastern Europa and Central Asia without supposing the original migration of the ancestors of the present circumpolar species from a common source, the supposed tertiary arctic continent and the preservation of their descendants in their present areas through similar climatic and physical causes«.

Es ist hier der Ort, auch auf Island und seine Lepidopterenfauna näher einzugehen. Wiewohl die Südgrenze des Nordpolargebietes auf der oben angeführten Möbius'schen Karte oberhalb Islands verläuft, welches in seiner Flora zwischen der arktisch-grönländischen, der arktisch-nordeuropäischen und zwischen der mitteleuropäischen vermittelnd auftritt, so trägt die Lepidopterenfauna doch einen wesentlich arktischen Charakter. Olafson nennt bereits im Jahre 1772 unter 200 verschiedenen Insektenarten von Island 4 Falter und Mohr erhebt diese Zahl auf 12, welche Zahl sich nach Hagen (St. Ent. Ztg. 1857,

p. 381) auch bei Glismann, geographische Beschreibung von Island 1824 findet.

Ausführliche und zuverlässige Angaben über die Insektenfauna Islands erhielten wir erst durch Dr. Staudinger, welcher die Insel 1856 bereiste und 322 Insekten-Arten einsammelte, darunter 33 Lepidopteren. Er berichtet hierüber in einer Arbeit in der St. Ent. Ztg. 1857, p. 109 ff. mit besonderer Rücksichtnahme auf die physischen und botanischen Verhältnisse.

Tagfalter, Sphingiden und Bombyciden traf Staudinger dortselbst nicht an, sondern nur Noctuiden, Geometriden und Microlepidopteren (s. Anhang No. 22). Staudinger schreibt es den Stürmen, der mangelnden Wärme und den vielen Regen zu, dass Tagfalter auf Island nicht aufkommen (Boisduval hatte fälschlich zwei Tagfalter von dort aufgeführt). Die Raupen der aufgefundenen Arten leben meist versteckt im Grase und Moose; auffallend häufig sind klimatische Varietäten einzelner Arten. Es fanden sich 9 Noctuiden, 10 Geometriden (darunter *Cidaria* 7 und *Eupithecia* 3) und 14 Microlepidopteren (unter diesen die im südlichen Europa, in Kleinasien, aber auch auf Spitzbergen als einzigen Schmetterling gefundene *Plutella cruciferarum* Z.

Auffallend ist das Fehlen der heliophilen *Anarta*-Arten, welche in Lappland, Grönland und Labrador verbreitet sind.

Die Insel Spitzbergen zeigt sehr ungünstige Ergebnisse hinsichtlich der Insektenfauna, wie überhaupt das Dasein aller Lebewesen dort unsäglich dürftig ist, so dass eine kleine Spinne bei der Capitain Bade'schen Touristenreise dorthin Sensation erregte (Wegener, Zum ewigen Eise, p. 208). Die klimatischen Verhältnisse sind aber auch äusserst mangelhaft. Bei einer Sonnenhöhe, die nicht über  $37^{\circ}$  beträgt, müssen diese schrägen Strahlen erst eine dicke Nebelhemisphäre durchdringen, ehe sie zur Erde gelangen und haben daher viel Wärme verloren. Da vom 26. October bis zum 16. Februar keine Sonne sichtbar wird (nach Torell vom 22. October bis 22. Februar) und sie in 128 Tagen sich kaum über den Horizont erhebt, so ist das Klima der Insel eines der strengsten — bei einer Mitteltemperatur von  $-5^{\circ}$ — $7,5^{\circ}$  C. und einer etwas südlich von Spitzbergen verlaufenden Juliisotherme von  $+5^{\circ}$ , während die Juliisotherme  $+2,5$  etwas nördlich von der Insel verläuft — die es giebt. Dennoch ist Spitzbergen weniger kalt, als es im Smithsound im nördlichen Amerika wird, wohin man den Kältepunkt der nördlichen Halbkugel gelegt hat. Der Golfstrom wirkt für Spitzbergen begünstigend,



so dass eine mittlere Sommerwärme von  $+ 1,3^0$  entsteht, ohne dass der Boden bis zu einiger Tiefe aufthaut.

Während auf Island 402 Phanerogamen bekannt sind, auf der Taimyrhalbinsel 124, hat Spitzbergen nur 93. Es mischen sich auf der Insel die skandinavische und die arktische Flora und 24 Arten sind circumpolar. (Martins, Von Spitzbergen zur Sahara. Deutsch von C. Vogt). Das Klima des nördlichen und südlichen Spitzbergen ist ziemlich ungleich, die Flora aber im Norden nicht unbedeutend ärmer.

G. Wegener sagt in seinem interessanten, oben erwähnten Buche p. 167, dass bei seinem Besuche eine dichte Pflanzendecke den Boden überzog, grösstentheils aus Moosen in üppiger Entwicklung und ungemeiner Vielgestaltigkeit bestehend. Aber auch Blütenpflanzen waren zahlreich; winzig kleine Pflänzlein, nirgends höher als ein Finger, aber in reizender Färbung, meist gelb und violett. Es lag darin eine rührende Bescheidenheit der Vegetation, welche sich mit der verschwindenden Spanne Wärme, welche ihr verliehen, sorgsam einrichtete, soviel von den Tag und Nacht vom Himmel rieselnden Sonnenstrahlen einschlürfte, wie die Blütenkelchlein fassen wollten, und dabei in so heitern Farben spielten, als könne es gar kein schöneres Dasein geben.

Wir wissen von der Insektenfauna der Insel hauptsächlich durch schwedische Gelehrte. Bohemann (Ofversigt of kongl. Vetenskap. Acad. förhandl. 1865, p. 363) zählte 26 Insektenarten auf, welche von Sundewall, Nordenskjöld, Holmgren, Goes und Smitt zusammengebracht worden waren, darunter als einzigen Schmetterling: *Plutella cruciferarum* Zett. var. *Plut. nivella* Zett. Holmgren erhöhte 1868 die Zahl der Insekten auf 64, unter denen Käfer wie Hummeln und Tagfalter gänzlich fehlen.

Von der aus düstern und kahlen, nebelumwallten Felsen gebildeten, mit reichem Vogelleben versehenen Bären-Insel kennt man 12 Insektenarten (1 Schlupfwespe, 11 Zweiflügler), aber keinen Schmetterling (Holmgren, om Beeren Island och Spitzbergens Insectfauna. Stockholm 1869).

Ueber Nowaja Semlja erfuhren wir durch Middendorf's Reise, dass von Baer dort *Psodos trepidata* (einen Spanner) antraf, während auf der Nordenskjöld'schen Expedition 1876 eine nicht geringe Anzahl von Insekten zusammengebracht wurde, 15 Käfer, 2 Nachtfalter, 46 Wespen und 81 Zweiflügler, welche von Holmgren (*Novae spec. insect. a Nordenskjöld in Novaja Semlja coarctae*. Holmiae)



und Aurivillius beschrieben wurden. Letzterer führt die Ergebnisse dieser und der Markham'schen Reise von 1879 in der Entom. Tidsskrift 1883, p. 191 an wie folgt:

Fam. Nymphalidae:

1. *Argynnis chariclea* Schneider. Markham 1879.
2. *Arg. improba* Buter. Markham 1879. (Wohl nichts anders als *Arg. freija* var. *arctica* (P.)

Fam. Papilionidae:

3. *Colias nastes*, var. *werdandi* Zett. Markham 1879.

Fam. Noctuidae:

4. *Anarta richardsoni* Curtis. Markham 1879.
5. *Anarta lipponica* Thonberg. Markham 1879.
6. *Schoyenina* (Aur.) *arctica* Auriv. Nordenskjöld 1876. (Möglicherweise identisch mit Middendorf's *Amphidasys semifasciata* [s. dessen Reise III, p. 59 t. 3/62]).

Fam. Geometridae:

7. *Psodos coraciata* Esp. (*trepidata*). von Baer 1837.
8. *Glaucopheryx sabini* Curtis. Markham 1879. (Ob *Cidaria frigidaria* Gn.? P.)

Fam. Tortricidae:

9. *Grapholitha* (*Semesia*) sp. Nordenskjöld 1876.

Auf der Wrangel Insel wurde nach Aurivillius (Insektenleben etc., p. 401) eine Schmetterlingsraupe gefunden (ob von *Dasychira Rossii* Curtis?).

Von Jan Meyen und Franz Josefland kennt man keine Insekten. —

Im Vorstehenden habe ich das gesammte Nordpolargebiet nebst einigen Adnexen hinsichtlich der von ihm bekannt gewordenen Schmetterlingsfauna durchgegangen. Es möge zur bessern Uebersicht noch auf eine von Aurivillius gegebene Tabelle aufmerksam gemacht werden, die ich hier mittheile (s. Anhang No. 23).

Nach Aurivillius lassen sich in demselben drei Unterabtheilungen unterscheiden, von denen jede ihre Eigenthümlichkeiten hat, welche aber zusammen ein eigenartiges Gebiet mit einem einheitlichen Charakter in der Art zeigt, dass eine grosse Anzahl von Arten völlig unverändert überall in diesem Gebiet sich finden. Diese von Aurivillius aufgestellten Unterabtheilungen sind:

1. Das skandinavisch-arktische Gebiet, umfassend Norwegen, Schweden, Finnland und ? die Kola Halbinsel, sowie Island, Grönland (Westküste bis  $76^{\circ}$  NBr. und südl. Theil der Ostküste), Bäreninsel und Spitzbergen.
2. Das asiatisch-arktische Gebiet vom weissen Meer im Westen bis zum Lenafluss im Osten mit Nowaja Semlja und den neusibirischen Inseln.
3. Das amerikanisch-arktische Gebiet, welches das Festland und die Inseln Amerikas, sowie möglicherweise den östlichen Theil des arktischen Sibiriens umfasst.

Manche der nordischen Schmetterlinge finden wir in allen drei Gebieten. Die drei aus Grönland sicher bekannten Tagfalter *Colias hecla*, *Argynnis chariclea* und *Arg. polaris*, welche letztere von Schoyen (Arch. für Math., Bd. V, Christiania 1880) in Porsanger Ende Juni auf den ödesten Fjelds, wo keine andere Vegetation war als *Dryas octopetala* und feines Gras, häufig gefangen ward, kommen ausserdem auch im arktischen Amerika, Asien und Europa vor, *chariclea* sogar in Nowaja Semlja. Einzelne der Arten finden noch eine weitere Verbreitung nach Süden hin. So war Elwes erstaunt, auf einem entomologischen Streifzug eine Menge hochnordischer Arten in den Felsengebirgen von Colorado und Alberta anzutreffen, so *Argynnis chariclea*, *freija*; *Papilio machaon*; *Colias hecla*, *nastés* u. s. w.

*Anarta Richardsoni*, welche im arktischen Amerika, in Grinnellland und Grönland gefunden wurde, ist auch in Lappland, Nowaja Semlja und im östlichen Asien angetroffen worden (die gegentheilige Angabe Petersen in seinem oben angeführten Buche ist unrichtig; P.)

Ebenso hat *Dasychira Rossii* eine sehr weite Verbreitung, da wir diesen Spinner sowohl von Nordamerika, als vom nördlichen Asien (Pittlekoy) kennen.

Die von Nordamerika und von Nowaja Semlja aufgeführten *Argynnis improba* Butler ist wohl nur Varietät von *Arg. freija* und dann ebenfalls weit auch im arktischen Europa verbreitet. Von 9 Tagfaltern des amerikanischen Archipels sind 5 in Europa, 2 in Asien gefunden; je weiter wir nach Süden in Amerika kommen, um so mehr nimmt die Zahl der für dieses Land eigenthümlichen Arten zu, so auch am Makenziefluss, während im höchsten Norden, im Grinnellland alle Arten mit denen der arktischen Länder Europas und Asiens gemeinsam sind, so dass das circumpolare Gepräge des arktischen Gebietes immer deut-

licher wird, je näher man dem Pole kommt, während nach dem Polarkreis hin die Lokalfauna und die Eigenthümlichkeiten des Erdtheils hervortreten.

Aurivillius macht auch darauf aufmerksam, dass die Begrenzung des arktischen Gebietes wohl früher eine andere war, indem während der Eiszeit die arktische Thierwelt sowohl in Europa wie in Amerika weit über den Polarkreis hinausging, wo sie sich z. B. in Nordamerika auf dem Mount Washington in New Hampshire bei 5000' Höhe noch theilweise erhalten hat (*Oeneis semidea*; *Dasychira Rossii*). Als die Eiszeit zurückging, zogen sich die Thiere nach Norden und nach der Höhe zurück.

Es ist natürlich, dass die Schmetterlinge, deren Raupen an die pflanzliche Nahrung gebunden sind, gegen Norden mehr und mehr an Zahl abnehmen, einigermaassen wird die geringere Artenzahl wie im Hochgebirge, durch die Menge der auf einem Platz concentrirten Individuen öfters ausgeglichen.

So finden wir in dem ungastlichen Spitzbergen nur eine kleine, auf Kreuzblüthern lebende Motte, die oben genannte *Plutella cruciferarum*. Diese Armuth Spitzbergens, welche in grossem Gegensatz zu dem relativen Reichthum von Grinnellland steht, scheint allerdings noch durch besondere Verhältnisse bedingt zu sein.

Die Tagfalter sind im Verhältniss im hohen Norden viel stärker entwickelt, als die Nachtfalter und es sind besonders die Gattungen: *Pieris*, *Colias*, *Argynnis* (Anhang 24), *Chionobas*, *Erebia* (Anhang 25), *Lycaena*, *Hesperia*, die wir ziemlich gleichmässig vertreten finden. Von den Gattungen der Nachtfalter verdienen besondere Erwähnung: *Dasychira*, *Arctia*, *Agrotis*, *Anarta* und *Plusia*, ferner *Acidalia*, *Cidaria* und *Eupithecia*, welche meist in mehrfachen, ja einzelne in sehr zahlreichen Arten vertreten sind. Einige Tortriciden-Gattungen, sowie einige Micropteren finden sich ebenfalls besonders zahlreich bis weit in den hohen Norden verbreitet. Andere Schmetterlingsgattungen sind oft nur in einzelnen Arten vertreten.

Das von Tengström (Cat. Lep. faunae fennicae 1869, p. 357) aus Lappland beschriebene Genus *Malacodea* mit der einzigen Art *Regelaria* ist die einzige, dem arktischen Europa eigenthümliche, mit *Cheimatobia* und *Anisopteryx* nahe verwandte Gattung. Wahrscheinlich ist auch hier das Weibchen flügellos; die drei allein bekannten Männchen wurden von Nylander und Gadd aus Lappland mitgebracht.

Ein besonderes Interesse gewährt auch die bereits von Parry von seiner ersten Nordlandsreise mitgebrachte *Psychophora Sabini* K., welche mit grösster Wahrscheinlichkeit nichts anders ist, als die *Cidaria frigida* Guenée's, wie ich bereits oben feststellte.

Es würde zu weit führen, hier auf die einzelnen interessanten Vorkommnisse der nordischen Arten näher einzugehen. Theilweise würde es eine Wiederholung des bereits Mitgetheilten sein oder zu genaue Details erfordern, die ich den freundlichen Leser lieber in den zahlreichen, oben angeführten Arbeiten je nach seinem Interesse nachzulesen bitte, wo er mit wirklicher Genugthuung forschen kann, so in den Catalogen von Petersen, Tengström, Lampa, Sparre Schneider. Es sei mir hier noch erlaubt, auf einige mehr allgemeine Fragen etwas einzugehen.

Es ist das zunächst die bereits mehrfach erwähnte Neigung der nordischen Arten zum Variiren. Dieselbe ist namentlich bei einigen Noctuen und Geometriden in einer der Nomenclatur wenig förderlich gewesenen Art ausgesprochen, so dass es bei mancher Art schwer wird, sich unter der Fülle der ihr von den verschiedenen Autoren beigelegten Namen zurecht zu finden. Diese Neigung besteht vielfach in einer Verdunkelung; in einzelnen Fällen wird auch ein Bleicherwerden bezeichnet, was beides auf denselben Ursachen beruhen kann. Häufig ist eine Zunahme und stärkere Entwicklung der Behaarung. Manche der Thiere erhalten dadurch ein eigenthümliches zottiges Aussehen.

Auf Island (s. Staudinger, St. Ent. Ztg. 1857, p. 227) entstehen dadurch nicht allein sehr häufige constante locale Varietäten, sondern auch in Folge des ungünstigen und feuchten Klimas zufällige Aberrationen, welche sich namentlich bei *Hadena exulis*, *Hadena sommeri* und besonders bei *Cidaria truncata* finden. —

Das Leben der Schmetterlinge im voll entwickelten Zustande ist im hohen Norden naturgemäss ein sehr kurzes. »La periode, pendant laquelle le papillon parfait peut voler et jouer de la vie, est exceptionnellement courte dans ce pays du soleil du minuit. La vie est alors concentrée comme au foyer d'un miroir ardent, dans cette lumière non interrompue d'un soleil, qui a oublié de se coucher« (Sandberg, Ent. Tidskrift 1883). Die Entwicklungszeit vertheilt sich vielfach auf mehrere Jahre, wie dies namentlich Spangberg in Sydvaranger (69° 40' N Br.) beobachtet hat (Spangberg, Sur les metamorphoses des Lepid. arctiques in Ent. Tidskrift 1883, p. 52) und Sandberg (Ent. Tidskrift 1885,



p. 187 und 221 resumé). Spangberg hat durch seine direkten Beobachtungen die Voraussetzungen Mc. Lachlan's (s. oben S.) bestätigt: So braucht nach ihm *Oeneis bore* zwei Jahre, *Erebia lappona* 1 Jahr, *Argynnis freija* zwei Jahre zur Entwicklung, ebenso erscheint *Arctia Quenseli* alle zwei Jahre. *Saturnia pavonia* ist ein- oder mehrjährig, *Notodonta dromedaria* einjährig, *Cymatomophora duplaris* wahrscheinlich zweijährig, *Pachnobia carnea* zweijährig. *Agrotis hyperborea* Zett. braucht zwei bis drei Jahre zur vollen Entwicklung, *Agrotis speciosa* zwei Jahre, ebenso *Anarta lupponica* und nach Staudinger *Hadena exulis*. Auf diese Weise wissen sich die nordischen Schmetterlinge vor den Unbilden der Witterung zu schützen und die Erhaltung und Fortentwicklung der Art zu gewährleisten. Während der harten Winter, welche die Schmetterlinge im Larvenzustande verleben müssen, gefrieren sie vollständig, ohne dass dies, selbst wenn es wiederholt geschähe, direkt schadet. Ja, wie wir dies von unsern überwinternden Raupen wissen, ist starke Kälte weniger schädlich, als häufig wiederholtes Aufthauen durch Wechsel der Witterung. Die interessanten Versuche, welche bereits Capitain Ross mit den Raupen von *Dasychira Rossii* Curtis mit wiederholten Aufthauungsversuchen gemacht hat und welche seitdem öfters nachgemacht wurden, haben dies bewährheitet.

Ueber den Einfluss, welchen die Schmetterlinge im Norden auf die Befruchtung der Blumen ausüben, hat Aurivillius in seiner mehrfach aufgeführten Arbeit (Das Insektenleben in arktischen Landen, p. 435 ff.) interessante Untersuchungen angestellt. Er urgirt, dass die Schmetterlingsblüthen gegen Norden hin abnehmen, dass sie aber in Finnmarken, wo auch die Schmetterlinge, insbesondere die Tagfalter, einen bedeutenden Theil der Insektenfauna ausmachen, weit zahlreicher seien. Die einzelnen Insektenordnungen scheinen in einem gewissen Verhältniss nach Norden abzunehmen, wie es die einzelnen, zu ihnen in Relation stehenden Blumenarten thun, die Windblumen oder Insektenblumen. Die Zweiflügler nehmen gegen Norden im Verhältniss zu andern Ordnungen zu und damit auch die Fliegenblumen, die z. B. auf Spitzbergen 73,7 % aller Insektenblumen ausmachen. Schmetterlinge sind in Finnmarken etwas zahlreicher als in Schonen, was damit übereinstimmt, dass die Schmetterlinge auch in den Alpen eine grössere Rolle nach den Untersuchungen von Müller spielen, als im Tieflande.

Die rothen und blauen Farben der Blumen, welchen die Hummeln und Schmetterlinge am meisten zusagen, nehmen ebenfalls im Norden



in gleichem Verhältniss ab wie diese Insekten, und die von den Fliegen bevorzugten weissen und gelben, ja sogar grünen Blumen nehmen zu. Aurivillius weist auch darauf hin, dass die wohlriechenden Blumen ebenfalls innerhalb des Polarkreises abnehmen, gleichwie die Pflanzen der Anden in der Nähe des ewigen Schnees nicht aromatisch sind, was wohl mit der beständigen Helle des Sommers in Verbindung stehe, die es unnöthig mache, Insekten auf andere Weise als durch die Farben anzulocken. Die im Norden vorkommenden Nachtschmetterlinge sind zumeist solchen Gattungen angehörig, welche auch im Süden heliophil sind. —

Ein ganz besonderes Interesse bietet ein Vergleich der Nordpolarfauna mit der der Hochgebirge. Zwar besteht keine vollkommene Analogie zwischen den Faltern des Hochgebirges und denen des Nordens, aber eine überraschende Aehnlichkeit und nahe Verwandtschaft, die in vielen Fällen sich bis zur völligen Gleichheit steigert. Wir wissen, dass auf eine Erhebung von 200 Metern eine Temperaturabnahme von  $1^{\circ}$  fällt und dass somit die höher gelegene Gegend einer entsprechend tieferen in höhern Breiten entspricht. Aber diese analoge Abnahme der Temperatur ruft noch keine völlige Gleichheit der Verhältnisse hervor, weil eine Reihe von andern Momenten bestimmend auf das Leben der Schmetterlinge einwirkt, wie der Luftdruck, die Feuchtigkeit und besonders auch die Insolation, welche im Polarkreise wegen niederer Sonnenhöhe und kurzem Sommer niemals kräftig wirkt, während auf dem Hochgebirge die relative Sonnenwärme, verglichen mit der der Luft, in stetiger Progression zunimmt.

Aehnlich wie für die Polargegend die Nordgrenze der Baumgrenze die Südgrenze bildet, bezeichnen wir in den Alpen das als eigentliche Hochgebirgsgegend, was über den Saum der Hochwälder emporragt. Die untere Grenze schwankt (Vergl. Heller, Ueber die Verbreitung der Thierwelt im Tyroler Hochgebirge, Sitzungsberichte der Wiener Academie der Wissensch.: Math. Nat. Classe, Bd. LXXXIII, p. 103 ff. 1881) in unsern Alpen zwischen 1700 und 2000 Metern, während die obere Grenze sich in den Tyroler Alpen bis zu 3900 Meter erhebt. Aehnlich wie dies Torell für das arktische Gebiet thut, unterscheidet man drei Abtheilungen: die alpine, subnivale und nivale.

Die erste von 1700—2300 Meter reichend, umfasst ein reiches Thierleben und reiche Vegetation von Matten und Sträuchern, die subnivale von 2300—2900 Meter hat sparsame Pflanzendecke und arme

Thierwelt und auf der nivalen von 2700—3900 zeigt sich Schnee und Eis, Cryptogamengebiet und fast erstarbene Thierwelt.

Die genuinen Alpenthiere haben vielfach eine dunklere Färbung, welche Heer von der ungenügenden Insolation und der versteckten Lebensweise herleitet, die aber wahrscheinlich Temperatureffekten ihren Ursprung verdankt. Die Verwandtschaft mit den Thieren des hohen Nordens beruht nach Heer auf ihrer Natur als Relikten einer früher weitverbreiteten arktischen Fauna. In der nivalen Region sind eigentliche Bewohner sehr selten, meist nur besuchen sie dieselbe gelegentlich.

Was die Schmetterlinge betrifft, so erwähnen die Gebrüder Speyer (Geogr. Verbr. d. Schmetterl., I, p. 48) 20 Tagfalter der deutschen Alpen, welche die subnivale Region erreichen, *Melitaea cynthia*, *merope*, *asteria*; *Argynnis pales*; *Vanessa urticae*, *antiopa*, *cardui*; *Erebia epiphron* (v. *cassiope*), *melampus*, *alecto*, *manto*, *gorge*, *tyndarus*, *mnestra*; *Lycaena pheretes*, *orbitulus*; *Pieris brassicae*, *rapae*, *napi* und *callidice*. Oberhalb 8000' wurden noch bemerkt: *Vanessa cardui*; *Melitaea asteria*; *Argynnis pales* (8500'); *Vanessa antiopa*, *Erebia cassiope* und *manto* (9000'); *E. gorge* (11000'). Wir finden hierunter viele Bekannte der arktischen Region.

Bemerkenswerthe Angaben über die Höhengrenzen, welche verschiedene Alpenfalter im bayrischen Gebirge erreichen, macht auch Sendtner (Stett. Ent. Ztg. 1857, p. 46).

Solche Höhengrenzen sind natürlich sehr wechselnd in den verschiedenen Gebirgen Europas, Asiens und Amerikas, in welchen die Schnee- und Baumgrenze bedeutend wechselt. Denn die in unsern Alpen bei über 8000' liegende Region der Kryptogamen beginnt am Chimborazo z. B. erst bei 16000 Fuss, während die obere Grenze der Sträucher in den Anden der Aequatorialzone bei 12800' sich befindet und die Vegetation im Himalaya und Tibet noch etwas höher geht. So sahen Humboldt und Bonpland noch bei 15000' am Chimborazo oberhalb der Schneegrenze zahlreiche Schmetterlinge über den Boden hinfliegen und bei 18000 Fuss fliegenähnliche Dipteren, die nach ihnen durch Luftströmungen dorthin geführt waren. (Humboldt's Ansichten der Natur, II, p. 40 und 44).

Eine übersichtliche Tabelle, welche die Gebrüder Speyer (Geogr. Verbr. der Schmettl., I, p. 73) für die Verbreitung der Falter in Europa, d. h. im Alpenlande, in Schweden und in Lappland geben, zeigt, dass

die Verbreitungsgrenzen in erster Linie durch Temperatureinflüsse bedingt sind.

Es reichen im Alpenlande:			Davon finden sich:	
			in	in
von 0' bis zur Schneelinie . .	8 Arten,		Schweden 8,	Lappland 5
2. bis in die alpine Region . .	15 «		« 13	« 6
3. in subalpine Region . . .	26 «		« 21	« 12
4. in die montane Region . .	42 «		« 20	« 8
5. in die colline Region . .	44 «		« 10	« 2

»Die lepidopterologische Physiognomie wird um so einförmiger, je höher man steigt, aber der abnehmenden Mannigfaltigkeit und Buntheit geht keineswegs abnehmende Lebendigkeit parallel. Die Matten der alpinen Region, sonnige, kräuterreiche Lehnen, Mulden, hoch genug gelegen, um Schneestreifen den ganzen Sommer hindurch zu bewahren, wimmeln nicht minder von Schmetterlingen, als die begünstigten Lokalitäten des Tief- und Hügellandes und lassen die Nähe der Grenze alles thierischen Lebens nicht ahnen«.

Die Widerstandskraft der Schmetterlinge gegen die Unbilden der Witterung in den Hochalpen ist analog derjenigen der Polargegenden. Unmittelbar nach Schneestürmen tummeln sich die Tagfalter wieder in der Sonne.

Von den vielen interessanten Mittheilungen, welche wir über das Auftreten der Schmetterlinge im Hochgebirge besitzen, will ich hier nur einige erwähnen, welche die nahe Verwandtschaft mit demselben in den Polargegenden bekunden.

Garlepp erzählt in seinem Brief aus Bolivien (Iris V, p. 272) 1892 von seinem mehrwöchentlichen Aufenthalt in einem Hochthal in der Heimath der Vicunnas, Huanacos und Alpenhasen, oberhalb des an der Waldgrenze liegenden Dorfes Cocopata etwa 4000 Meter hoch. Er fing dort ausser Arten von *Pieris*, *Colias*, *Argynnis*, *Lycaena* Vertreter von *Phulia*, einer merkwürdigen Pieridengattung, welche von Staudinger (Iris. VII, p. 93) beschrieben und abgebildet wurden. Garlepp fing auf den höchsten Spitzen der Cordilleren fast bei 5800 Meter eine weitere Pieride, *Trifucula Huanaco* Staud., die wohl den am höchsten vorkommenden Schmetterling darstellt, während *Argynnis inca* Staud. bei 4000 Meter, eine *Pedaliodes* etwa bei 5000 Meter und ebendasselbst die schönen *Lycäniden* *Cupido speciosa*, *vapa* und *moza* Staud. gefangen

wurden neben einer Reihe anderer Falter aus den Spannergattungen *Erateina* und *Scordylia*. Die Thiere leben dort unter den kümmerlichsten Verhältnissen, buchstäblich zwischen Eis und Schnee und fast kahlen Felsen, ähnlich wie die Polarfalter und sind ihnen in den Gattungen gleich oder verwandt.

Auch A. Stübel (s. Lepidopteren, gesammelt von A. Stübel, bearbeitet von G. Weymer und P. Maassen, Berlin 1890) fand auf den rauen Einöden der Hochgebirgsregion Südamerikas, welche er bereiste, den Paramos, meist kleine und unansehnliche Lepidopteren, zu *Phulia*, *Pedaliodes*, *Lymanopoda*, *Pseudomaniola*, *Colias* gehörig, von Spinnern *Langsdorfia* und *Triodia* Arten (*Hepialus* verwandt) und vereinzelte Noctuen, zu *Prodenia* und *Agrotis* gehörig, sowie Geometriden aus den Gattungen *Psodos* und *Cidaria*, von Microlepidopteren *Crambus*-Arten, *Tortrix* und *Gelechia*. Wir begegnen also auch hier denselben Gattungen, welche im höchsten Norden vertreten sind, nur dass an die Stelle von *Chionobas* und *Erebia* verwandte Gattungen treten.

Derselbe direkte Einfluss der Höhe und die Wirkung der herabgesetzten Temperatur zeigt sich auch, wie im Norden, bei den Schmetterlingen Centralasiens. Vom Pamir, wo die Schneegrenze bei der trocknen Luft der Nordabdachung der Gebirge, wie im Himalaya, bis zu 17000 und 18000 Fuss Höhe steigt, dagegen auf der Südseite bis zu 15000 Fuss herabgeht, berichtet Grum Grzmailo in Romanoff, *Memoires sur les Lepidopteres* IV, p. 109 ff. ebenso wie über den Transalai und Alai, wo die Schneegrenze tiefer liegt, der Schnee bis Mitte Juni liegen bleibt und der Herbst mit Ende August beginnt. Dort in den höchsten Regionen fliegen *Parnassius* und *Pieris*, *Argynnis*, *Colias*, *Melitaea*, *Erebia*, *Satyrus*, *Epinephele* und *Pyrgus*-Arten von Tagfaltern. Alles drängt sich zum Leben während der paar Wochen, innerhalb deren die Sonne mehr erwärmt. Doch leugnet Grum Grzmailo den direkten Einfluss der Erhebung und lässt die Verbreitung der Schmetterlinge abhängig sein von besonderer physiographischer Natur, nämlich 1. von der Nähe des ewigen Schnees, 2. von der Art und Position der Abhänge, 3. von der Bodencomposition und dessen Besonderheiten und 4. von dem Wasserverhältnisse, welche ich auch in der Einleitung als wichtig für die Polarflora bezeichnen konnte.

Die Hochgebirge Nordamerikas, die Gebirge der Rocky Mountains, wie die der Sierra Nevada von Californien zeigen ähnliche Verhältnisse. Die mir aus den Hochgebirgen von Californien (Mount Whitney) aus



einer Höhe von 10 000 bis 13 000 Fuss zugegangenen Schmetterlinge bestanden aus Vertretern der Gattungen *Parnassius*, *Pieris*, *Colias*, *Argynnis*, *Lycaena*, *Oeneis* und *Hesperia*.

Interessant ist auch das eigenthümliche Verhalten des Mount Washington in New-Hampshire, welches ich bereits früher erwähnte.

Ebenso zeigen bereits die Mooregebiete des Oberharzes (s. Hoffmann in Stett. Ent. Ztg. 1888) eine Reihe von Schmetterlingen, denen wir sonst im hohen Norden zu begegnen pflegen. Die geringe Artenzahl bei grosser Menge der Individuen und die Beschränkung auf wenige Futterpflanzen bringt sie den Faltern der Hochgebirge nahe, wie auch ihre Flugzeit auf drei Monate beschränkt ist und ein längeres Raupenleben eintritt. Nach Hoffmann sind dort die Falter grösser und kräftiger gebaut, die Noctuen meist grobschuppiger bei Tendenz zur Verdunkelung in Folge des nebligen, feuchten Klimas, wie wir dies ähnlich an der Nordseeküste und den benachbarten Inseln, dem Norden Englands und Schottlands und auf Island begegnen. Diese Erscheinungen treten auch auf den Shetlandsinseln auf, welche sonst, wie Hoffmann (Stett. Ent. Ztg. 1884, p. 353) bemerkt, ein in die Grenze des borealen Gebietes eingeschobener Posten der mitteleuropäische Fauna darstellen, wo alle für den Norden charakteristischen Falter, wie *Argynnis*, *Erebia*, *Oeneis*, *Agrotis*, *Hadena*, *Anarta* und *Plusia* fehlen, während die hohe Lage eine andere Natur erwarten lässt. —

Soll ich mir gestatten, nochmals die wesentlichen Resultate zusammenzustellen, welche uns die vorstehende Erörterung unsrer jetzigen Kenntnisse über die Schmetterlingsfauna der Nordpolarregion kennen gelehrt hat, so betrachten wir diese als eine selbstständige nördliche Abtheilung des europäisch-sibirischen (paläarktischen) und nordamerikanischen (nearktischen) Gebietes, welche beide Gebiete auch zu einem einzigen mit guten Gründen vereinigt werden können.

Auch in jenen entlegenen Gegenden der Herrschaft der Kälte und des Eises vermag das Leben der Schmetterlinge in Verbindung mit dem der Pflanzen sich nicht nur unter geeigneten Umständen zu erhalten, sondern kräftig aufzutreten.

Bis in der Nähe des Nordpols, welcher freilich nicht als der kälteste Punkt der Erde aufzufassen ist, fanden wir noch einzelne Vertreter gewisser Schmetterlingsgattungen, welche dem Naturgesetze der Wiederkehr gleicher generischer Formen bei der Wiederkehr sehr ähnlicher klimatischer Verhältnisse entsprechen (M. Wagner), wenigstens soweit



bis jetzt der menschliche Forschungsdrang vorgeschritten ist ( $83^{\circ} 20'$  N. Br. Markham;  $83^{\circ} 24,5'$  N. Br. Lockwood 1883; von Nansen noch überschritten 1896).

Die am meisten nach Norden hin beobachteten Gattungen sind: von Tagfaltern: *Colias*, *Argynnis*, *Chrysophanus* und *Lycaena*; von Spinnern: *Dasychira*; von Noctuen: *Anarta* und *Plusia*; von Spannern *Cidaria* (= *Psychophora* = *Glaucopteryx*); von Microlepidopteren: *Scoparia* und *Penthina*, welche auf Grinnelland gefunden wurden. Ihnen schliessen sich dann *Pieris*, *Chionobas* (*Oeneis*), *Erebia*, *Hesperia* und *Arctia*, *Agrotis*, *Acidalia* und *Eupithecia*, *Plutella*, *Botys*, *Crambus*, mehrere Wicklergattungen, besonders *Tortrix*, *Penthina*, *Grapholitha* und *Tineiden* an. Die genannten Gattungen finden sich auch im Hochgebirge wieder und zwar nicht allein in den Alpen Europas, sondern auch in den Hochgebirgen Centralasiens, wie in den Rocky Mountains und andern Gebirgen Nordamerikas, ebenso wie zum Theil in den Anden Südamerikas bis zum Feuerlande herunter.

Erwähnenswerth ist, dass der arktischen Fauna die sonst die kältern und hoch gelegenen Gegenden bewohnende Gattung *Parnassins* fehlt, welche namentlich in Hochasien unter Verhältnissen überaus häufig und in mancherlei Arten auftritt, die den arktischen überaus ähnlich sind. Von ihr gehen nur die Arten *mnemosyne* und *eversmanni* in die Nähe der Nordpolargegend, vielleicht in Nordsibirien auch in sie hinein.

Dagegen kommt *Papilia machaon* bis zum  $65^{\circ}$  N. Br. in Sydvaranger wie in Sibirien und Nordamerika vor, und die so weit verbreiteten *Vanessa*-Arten, wie *cardui* und *antiopa* bis zum  $65^{\circ}$  Grade, so auch in Labrador und Nordamerika, in welchem letztern Lande ihr gleichfalls weit verbreiteter Vetter *urticae* fehlt.

Die Sphingiden sind im hohen Norden nur durch einige Sesiiden und eine *Zygaena* vertreten; mehr nach der Baumgrenze hin treten einige weitere Arten auf. Die Bombyciden sind ebenfalls sehr spärlich vertreten und auf Island fehlen sie nebst den Spinnern und Tagfaltern, sowie auffälligerweise mit *Anarta* völlig, obwohl man der Lage nach letztere erwarten könnte.

Die Fauna hat anfänglich eine circumpolare Verbreitung und mischt sich erst nach der Baumgrenze mit lokalen und südlichen Arten. Wir finden einen bemerkenswerthen Reichthum unter den durch warme Meeresströmungen bewirkten günstigen klimatischen Bedingungen, so in dem nördlichen Skandinavien, während da, wo kalte Strömungen herrschen,

auch eine Abnahme der Vegetation und damit der Schmetterlingsfauna bemerklich wird. Oceanische Inseln, die im Allgemeinen bereits vielfach eine gewisse Armuth der Fauna zu zeigen pflegen, finden wir auch im arktischen Norden, je nach den klimatischen Bedingungen in verschiedener Weise, geringer besetzt als die hier in Frage kommenden Küstengegenden der Continente und die ihm benachbarten noch hierher gehörigen Landestheile.

Es ist nicht die Kälte an und für sich, welche die Armuth des Schmetterlingslebens an vielen Stellen der Nordpolarregion erzeugt, sondern vielmehr, wie bei den Pflanzen, der Mangel an hinreichender Wärme im Sommer. Ueberall, wo eine gesteigerte Sommerwärme beobachtet wird und diese ein Erblühen der Vegetation hervorruft, sehen wir auch die Schmetterlingsfauna erstarken, während ein Fehlen der Sonne und ein Vorwiegen einer regnerischen, kalten Witterung zunächst die Tagfalter, wie auf Island, verschwinden lässt, während einzelne Noctuen, Geometriden und Microptern sich erhalten und den Unbilden der Witterung mit Erfolg trotzen.

Eine verzögerte Entwicklung kommt den nordischen Lepidopteren in ihrem Kampfe gegen die Natur zu Hilfe, dem sie vielleicht auch schon als Nachkommen früherer, vor der Eisperiode vorhandener Vorfahren besser gewachsen sind.

Es findet sich eine gewisse Analogie zwischen den Bewohnern der höchsten Breiten und denen der höheren Gebirgsgegenden, in manchen Fällen sogar in den Arten, zumeist aber in den Gattungen. Diese Analogie geht, wie bemerkt, über die Gebirge von Europa und Asien, wie von Nordamerika, ja selbst Südamerika, hinüber und die beobachtete Aehnlichkeit und Verwandtschaft zwischen der Flora und Fauna der höheren Breiten und die der höhern Gebirge in den verschiedensten Ländern beweist eine gewisse Einheit der Erdrinde.

Alle arktischen Länder gehören einem einzigen Faunengebiet an, das mit der Annäherung zum Nordpole immer charakteristischer wird, während es nach dem Polarkreis hin und über diesen hinaus immer mehr die Eigenthümlichkeiten eines jeden Erdtheils durch Einwanderung von Süden her annimmt. Zwischen Europa und Asien tritt dies weniger hervor, zumal das erstere seine Bevölkerung an Schmetterlingen vielleicht letzterem verdankt und zwar möglicherweise jenen hohen Centralgebirgen, die jetzt noch einen namentlich von Grum Grzmailo, der bei 11000' im Alaigebirge selbst bei ungünstigem Wetter täglich 400 Stück Schmetter-

linge verschiedener Arten auffinden konnte, bewiesenen ungewöhnlichen Reichthum beherbergen. Ist dem so, so wären dieselben Gegenden, welche man als die Wiege des Menschengeschlechts anzusehen gewohnt war, auch die Ursprungsstätten der leicht beschwingten Falter, die unser Auge, wie in unsern heimathlichen Fluren, so in verwandten Gattungen und Arten selbst im höchsten Norden erfreuen.

*Anhang No. 1.* S. S. 195. Die von Staudinger von Finnmarken (Alten) aufgeführten *Macrolepidopteren* sind:

*Pieris napi* L. et v. *bryoniae*, O., *Colias palaeno* L. v. *philomene* Hb., *L. Boothii* Curtis, *Polyommatus eurydice* Rott. v. *Stieberi* Gerh., *P. phlaeas* L., *Lycæna optilete* Knoch v. *cyparissus* Hb., *Vanessa urticae* L., *Melitæa parthenie* Bkh., *Argynnis aphirophe* Hb., v. *ossianus* Hbst., *A. selene* S. V., *A. euphrosyne* L. v. *figinal* Hbst., *A. pales* S. V. et var. *arsilache* Esp., v. *lapponica*, *A. chariclea* Schn., *A. freija* Thbg., *A. frigga* Thbg., *A. thore* Hb. v. *borealis*, *Erebia medusa* S. V. *polaris*, *E. manto* S. V., *E. disa* Thbg., *Chionobas norna* Thbg., *Ch. taygete* Hb. (*Bootes* B.), *Ch. bore* Esp., *Hesperia comma* L., *Zygaena exulans* R. v. *vanadis* Dalm., *Nemeophila plantaginis* L., *Spilosoma fuliginosa* L., *Psyche opacella* H. S., *Acronycta menyanthidis* Kisw., *Agrotis hyperborea* Zett., *Agr. arctica* Zett., *Agr. laetabilis* Zett., *A. conflua* Tr., *Charaëas greminis* L., *Mamestra dentina* S. V., *Hyppa rectilinea* Esp., *Taeniocampa gothica* L., *Pachnobia carnea* Thbg., *Plusia parilis* Hb., 40. Pl. *Hochenwarthi* Hbst. (*divergens* F.), *Anarta cordigera* Thbg., *A. bohemannii* Staud., *A. melanopa* Thbg. (*vidua* Hb.), *A. schönherri* Zett. (*leucoeycla* Stdg.), *A. quieta* Hb., *A. lapponica* Thbg., (*amissa* Lef.), *A. funesta* Payk. (*funebria* Hb.), *A. melaleuca* Thunbg., *Brepbos parthenias* L., *Acidalia commutata* For., *Macaria liturata* L., *Gnophos sordaria* Thbg. (*mendicaria* H. S.), *Psodos chaonaria* For., *Colutogyne fusca* Thbg. (*venetaria* H. S.), *Fidonia carbonaria* L. (*picearia* Hb.), *Thamnonoma brunneata* Thbg. (*pinetaria* Hb.), *Phasiane clathrata* L., *Anaitis sororaria* Hb., v. *paludata* Thbg., *Lygris populata* S. V., *Cidaria variata* S. V. v. *obeliscata* Hb., *C. simulata* Hb., *C. truncata* Hufn. (*russata* S. V.), *C. munitata* Hb., *C. incursata* Hb. (*disceptaria* F. R., *decrepitata* Zett.), *C. frigidaria* Guenée, *C. fluctuata* L., *C. montanata* S. V., *C. ferrugaria* L., *C. propugnata* S. V., *C. abrasaria* H. S. (*ligularia* Gn.), *C. dilutata* S. V., *C. polata* Hb., Dup., *C. caesiata* S. V., *C. luctuata* S. V., *C. hastata* L. v. *hastulata* Hb., *C. affinitata* Stph. (*inciliata* Zett.), *C. minorata* Fr., *C. albulata* S. V., *C. elutata* Hb., *Eupithecia pygmaea* Hb., *E. satyrata* Hb., *E. helveticaria* H. (*arceuthata* Fer.), *E. hyperborea* Staud., *E. altenaria* Staud.

*Anhang No. 2.* S. S. 196. Wocke, Stett. Ent. Ztg. Bd. 23, p. 30 u. p. 233 ff. (1862) zählt folgende *Microlepidopteren* aus Finnmarken auf:

*Botys octomaculata* L., *B. porphyralis* S. V., *B. inquinatalis* Zell., *B. decrepitalis* H. S., *Cr. dumetellus* Hb., *Cr. ericellus* Hb., *Cr. maculalis* Zett. (*cacuminellus* Zeller), *Cr. margaritellus* Fabr., *Cr. Warringtonellus* Stt., Zell.,

*Eudorea centuriella* S. V., *End. murana* Curtis, *E. sudetica* Z., *Pempelia fusca* Hw. (*carbonariella* F. R.), *Nephopteryx abietella* S. V., *Hypochalcia auriciliella* Hb. (*auricella* Zell.?), *Myelois tetricella* S. V., *Myel. altensis* Wk., *Teras mac-cana* Fr., *T. ferrugana* S. V., *Tortrix rubicundana* H. S., *T. forsterana* F. (ad, *junctana* Tr.), *T. viburnana* S. V., *T. ministrana* L., *Sciaphila osseana* Scop. (*boreana* Zett.), *Sc. penziana* Hb., *Sc. wahlbomiana* L., *Conchylis rutilana* Hb.-C. (*deutschiana* Zett., *C. dubitana* Hb., *Retinia posticana* Zett., *Penthina betu-laetana* Hw. (*sororculana* Zett.), *P. moestana* Wk., *P. dinidiana* Std. (*atro-punctana* Zett.), *P. sauciana* Hb., *P. lediana* L. (*linigiana* Z., *westwoodiana* Zett.), *P. arbutella* L., *P. metallicana* Hb., *P. palustrana* Z., *P. concretana* Wk., *P. lacunana* S. V. (*decussana* Z.), *P. bipunctana* F., *P. furfurana* Hw., *P. schulziana* F., Zett. (*zinckeniana* Erhl.), *Grapholitha ravulana* H. S., *Gr. penkleriana* S. V., *Gr. sinuana* S. V. (*parmatana* Hb.), *Gr. tetraquetra* Hw. (*frutetana* Hb.), *Gr. biscutana* Wk., *Gr. aspidiscana* Hb. (*Dahlbomiana* Zett.), *Gr. coniferana* Ratz. (*separatana* Hb.), *Gr. duplicana* Z. (*interruptana* H. S., *geminana* Zett.), *Gr. augustana* Hb. (*cruciana* Zett.), *Gr. mercuriana* Hb., *Gr. incarnana* Hw. (*dealbana* Frl.), *Gr. nemorivaga* Tgstr., *Gr. quadrana* Hb., *Gr. myrtillana* Tr. (*badiana* Zett.), *Gr. unguicella* L., *Phthoroblastis fimbriana* Hw., *Talaeporia borealis* Wk., *Solenobia pineti* Z.?, *Sol. spec.*?, *Lypusa maurella* S. V. (*aethiopilla* Zett.), *Tinea rusticella* Hb., *T. tapetzella* L. (*tapetiella* Zett.), *T. picarella* L. (*riga-nella* H. S.), *T. bistrigella* Hw. (*abalineella* Zett., *dilorella* H. S.), *Lampronia praelatella* S. V. (*stipella* Zett.), *Incurvaria vetulella* Zett. v. *circulella* Zett., *I. oehlmanniella* Hb., *Micropteryx aureatella* Scop. (*ammanuella* Zett.), *M. uni-maculella* Zett. (*purpurella* v. Zell.), *M. semipurpurella* Hw. (*amentella* Zett., *violacella* H. S.), *Nemophora panzerella* Hb., *Swammardamia conspersella* Tgstr., *Sw. griseocapitella* Hb., *Plutella cruciferarum* Zell., *Pl. dalella* Stdg., *Cerostoma costella* F., *C. radiatella* Don. (*fissella* Hb.), *Semioscopis avenellanella* Hb., *Depressaria applanata* F., *D. olerella* Zell., *Gelechia velocella* Dup., *G. continuella* Zell., *G. ericetella* Hb. (*gallinella* Fr.), *G. infernalis* Hs., *G. senectella* Zell., *G. galbanella* Zell., *G. perspersella* Wk., *G. diffinis* Hw. (*scabidella* Zell.), *G. longicornis* Curt. (*zebrella* Fr.), *G. lugubrella* F., *G. viduella* F., *Thbg.*, *Pleurota bicostella* L., *Oecophora sulphurella* Hb., *Oec. flavifrontella* S. V., *Endrosis lacteella* S. V., *Aechmia Haworthana* Stph. (*zonella* Zett.), *Simaethis nemorana* Hb., *Argyresthia abdominalis* Dalm., *Arg. sorbiella* Tr., *Arg. pygmacella* Hb., *Arg. aurulentella* Stt., *Gracilaria elongella* L., *Ornix scutulatella* S., *O. betulae* Stt., *O. polygrammella* Wk., *O. interruptella* Zett., *Coleophora orbitella* Zell., *C. caespititiella* Zell., *C. annulatella* Tgstr., *Laverna Raschkiella* Z., *Poecilop-tilia airae* Stt., *P. montanella* Wk., *P. grisescens* Wk., *P. humilis* Zell., *P. adscitella* Stt., *Lithocolletis strigulatella* Z., *L. junionella* Z., *L. ulmi-fo-liella* Hb., *L. spinolella* Dup., *L. pastorella* Zell., *Nepticula tristis* Wk., *N. lapponica* Wk., *N. comari* Wk., *Platyptilia zetterstedtii* Zell., *Pl. fischeri* Zell.

*Anhang No. 3.* S. S. 196. Schilde führt nachfolgende Lepidopteren als von ihm in Nordfinnland gesammelt auf:

I. *Rhopalocera*. 1. *Papilio machaon* L., 2. *Pieris napi* L. und var. *brioniae* O., 3. *Colias palaeno* L. (*Werdandi* H. S., v. *lapponica* Staud.),



4. *Thecla rubi* L., 5. *Polyommatus amphidaas* Esp. (helle. Hb.), 6. *Lycaena argus* L., 7. *L. eumedon* Esp., 8. *L. optilete* v. *cyparissus* Hb., 9. *Vanessa urticae* L., 10. *V. cardui* L., 11. *Argynnis aphiraphe* v. *ossianus* Hbst., 12. *Arg. selene* und v. *hela* Stdgr., 13. *A. euphrosyne* L. v. *figal* Hbst., 14. *A. arsilache* v. *lapponica* Stdgr., 15. *A. freija* Thbg., 16. *A. frigga* Thbg., 17. *Erebja ligea*, 18. *Erebja embla* Thbg., 19. *E. norna* Thbg., 20. *Coenomynpha davus* v. *Isis*, 21. *Syrichthus centaureae*. II. *Heterocera*. 22. *Sphinx pinastri* L., 23. *Nemeophila plantaginis* L., 24. *Spilosoma fuliginosa* v. *borealis* Stdgr., 25. *Arctia caja* L., 26. *Hepialus velleda* Hb., 27. *Cossus cossus* L., 28. *Psyche graslinella* B?, 29. *P. spec.*, 30. *P. opacella* H. S., 31. *P. spec.*, 32. *Bombyx spec? crataegi?*, 33. *Saturnia pavonia* L., 34. *Drepana lacertinaria* L., 35. *Harpyia furcula* v. *ajatus*, 36. *H. bifida* Hb.?, 37. *Pterostoma palpina* L., 38. *Acronycta leporina* v. *bradyporina* Fr., 39. *Acr. megacephala* S. V., 40. *Acr. auricoma* S. V., 41. *Acr. rumicis* L.?, 42. *Agrotis hyperborea* Zett., 43. *A. polygona* S. V., 44. *A. speciosa* Hb. et v. *arctica* Zett., 45. *A. conflua* Fr., 46. *A. simulans* Hfn., 47. *A. occulta* L. et v. *implicata* Lef., 48. *Charaeas graminis* L., 49. *Mamestra dissimilis* Kr., 50. *M. pisi* L., 51. *M. glauca* Hb. et v. *lappo* Dup., 52. *M. dentina* S. V., 53. *M. cucubali* S. V., 54. *Had. meillardi* H. S. (gelata Lef.), 55. *H. rubirena* Fr., 56. *H. gemina* Hb. v. *remissa* Fr., 57. *Hyppa rectilinea* Esp., 58. *Caradrina cubicularis*, v. *menetresii*, K., 59. *Dyschorista suspecta* Hb., 60. *Orthosia crasis* H. S. var., 61. *Calocampa solidaginis* Hb., 62. *Plusia festucae* L., 63. *P. interrogationis* L., 64. *P. parilis* Hb., 65. *P. diasema* Std., 66. *P. microgamma* Hb., 67. *Anarta cordigera* Thbg., 68. *A. melaleuca* Thbg., 69. *A. funebris* Hb., 70. *Jodis punctata* L., 71. *Acidalia fumata* Lpl. (commutata For.), 72. *Zonosoma pendularia* Cl., 73. *Abraxas marginata* L., 74. *Selenia lunaria* Schiff., 75. *Boarmia crepuscularia* S. V., 76. *Gnophos sordaria* Thbg., 77. *Fidonia carbonaria* L. (amnicularia Zett.), 78. *Ematurga atomaria* L., 79. *Halia wawaria* L., 80. *Halia brunneata* Thbg., 81. *Anaitis paludata* Thbg., 82. *Lygris prunata* L., 83. *L. testata* L. *achatinata* Hb., 84. *L. populata* L., 85. *Cid. bicolorata* Hf., 86. *C. truncata* Hf. (russata B., incurvata Hw.), 87. *C. munitata* Hb., 88. *C. didymata* L., 89. *C. vespertaria* L. V., 90. *C. incurvata* Hb. (v. *monticolaria* Hb.), 91. *C. fluctuata* L., 92. *C. ferrugata* Cl., 93. *C. suffumata* S. V. et v. *picata* Thbg., 94. *C. serraria* Z., 95. *C. caesiata* S. V. et v. *aunosata* Zett. (gelata Gn.), 96. *C. lugubrata* (luctuata Hb.), 97. *C. hastata* (gothicata, subhastata), 98. *C. sociata* Bbh., 99. *C. alchemillata* L., 100. *C. adaequata* Bbh. (blandiata S. V.), 101. *C. albulata* Schiff., 102. *C. trifasciata* et v., 103. *Eupithecia oblongata* (centaureata S. V.), 104. *E. pusillata* S. V.), 105. *E. veratraria* L. S., 106. *E. helveticaria* B., 107. *E. satyrata* V., 108. *E. alternaria* Stdg., 109. *E. hyperboreata* Stdg., 110. *E. spec.*, 111. *E. pygmaeata* Hb.

*Anhang No. 4.* S. S. 197. W. M. Schoyen führt auf: Von Sydvaranger: 69—70° N. B.:

*Papilio machaon* L., *Pieris brassicae* L., *P. rapae* L., *P. napi* v. *bryoniae* O., *Colias palaeno* v. *lapponica* Stdg., *Thecla rubi* L., *Polyommatus phlaeas*, v. *americanus* d'Urb., *Lycaena optilete* kn. v. *cyparissus* Hb., *Vanessa urticae* L., *V. antiopa* L., *V. cardui* v. *pallida* Sandb., *Melitaea parthenie* Bbh., *Argynnis*



aphiraphe, v. ossianus H. Sch., Arg. selene, v. hela Stdg., A. euphrosyne, v. fíngal Herbst, A. pales, v. lapponica Stdg., A. polaris B., A. freija Thbg., A. frigga Thbg., Erebia lappona Esp., E. embla Thbg., E. disa Thbg., Oeneis norna Thbg., O. bore Schn., Syrichthus centaureae Rbr., Sphinx pinastri L., Deilephila galii Rett., Zygaena exulans, v. vanadis Dalm., Nola karelica Tgstr. (arctica Sch.), Arctia quenseli Payk. v. gelida Moschl., Hepialus hecta L. Psyche Standfussi, Trichiura crataegi L. v. ariae Hb., Saturnia pavonia L., Notodonta dromedaria L., Cymatophora duplaris L., Asphalia flavicornis L. v. fumarctica Sch., Acronycta auricoma L. V., Agrotis hyperborea Zett., A. speciosa v. arctica Zett., Charaëas graminis L., Mamestra glauca, Pachnobia carnea Thbg., Plusia interrogationis L., Pl. parilis Hb., Pl. hohenwarthi Hoch., Anarta cordigera Thbg., A. melanopa Thbg., A. melaleuca Thbg., A. funebris Hb., Brepheos parthenias L., Acidalia fumata Stdg., Selenia bilunaria Esp., Ploëria pulverata Thbg., Biston lapponarius B., Gnophos sordaria Thbg., Psodos coracina Esp., Pygmaena fusca Thbg., Fidonia carbonaria L., Anaitis paludata Thbg., Lygris prunata L., L. populata L., Cidaria munitata Hb., C. turbata v. arctica Sch., C. incurvata Hb., C. fluctuata L., C. montanata S. V. v., C. ferrugata v. spadicearia H. S. C. suffumata S. V., C. designata Hufe, C. dilutata S. V., C. polata v. cineraria Schoy, C. caesiata S. V., C. sociata Bbh., C. lugubrata Stdg., C. hastata v. hastulata Hb., C. affinitata, C. alchemillata L., C. minorata Fr., C. adaequata Bbh., C. albulata L. V., Eupithecia hyperboreata Stdg., E. satyrata H., Scoparia centuriella S. V., Sc. gracilaria St., S. murana Curt., Botys decrepitalis H. S., B. inquinatalis Zell., Crambus ericellus Hb., Cr. maculalis Zett., Cr. margaritellus Hb., Pempelia fusca Haw., Myelois annulatella Z., Tortrix ministrana L., T. forsterana Z., T. viburnana S. V., T. rubicundana Hb., Sciaphila osseana Scop., Cochylis deutschiana Zell., Penthina sororeculana Zett., P. lediana L., P. metallicana Hb., P. nebulosana Zett., P. palustrana Zett., P. schafferana Hb., P. schulziana F., P. lacunana S. V., S. bipunctana F., Steganoptycha quadrana Hb., St. mercuriana Hb., Talaëporia borealis W., Solenobia cembrella L., Blabophanes rusticella v. spilotella Tgstr., Tinea ornatella Haw., T. cloacella Haw., T. picarella L., Incurvaria vetulella Zett., I. rupella S. V., Swammerdamia conspersella Tgstr., Plutella cruciferarum Zell., Semioscopis avellanella Hb., Gelechia infernalis Hb., G. continuella Z., G. perspersella W. (rhombella Tr.), G. viduella F., Pleurota bicostella L., Oecophora stipella L., Endrosis lacteella S. V., Micropteryx-semipurpurella, Platypylus Zetterstedti Z., Leioptilus tephrodactylus Hb. In der Nachschrift: Tortrix lapponana Tgstr.

*Anhang No. 5a.* S. S. 197. Die von Sparre Schneider aufgefundenen Lepidopteren waren:

In Bejern (67° N. B.) vom 16. bis 24. Juli: Pieris brassicae, P. napi v. bryoniae, Polyommatus hippothoe L. v. stieberi Gerh., P. phlaeas, Lycaena argus v. aegidion Meissn., L. optilete v. cyparissus Hb., L. icarus Rott. (alexis auct.), L. actrarche Bgstr. (agestis auct.), Vanessa urticae L., Argynnis selene Schiff., A. euphrosyne L., A. aglaja L., A. pales Schiff., v. arsilache Esp., Erebia ligea L., Pararge maera Z., Zygaena exulans Hoch., Cymatophora duplaris L., Nemeophila plantaginis L., Saturnia pavonia L., Hadenä adusta Esp., Anarta

melaleuca Hbg., *Acidalia fumata* Steph., *Abraxas marginata* L., *Psodos coracina* Esp., *Pygmaena fusca* Esp., *Fidonia carbonaria* L., *Ematurga atomaria* L., *Halia brunneata* Thbg., *Phasiane clathrata* L., *Cidaria taeniata* Steph., *C. truncata* Hufn., *C. munitata* Hb., *C. cambrica* Curt., *C. montanata* Orb., *C. nebulata* Thbg. (dilutata S. V.), *C. caesiata* Leup., *C. hastata* L. v. *hastulata* Hb., *C. alchemillata* L., *C. minorata* Fr., *C. albulata* Schiff., *C. trifasciata* Bbh., *Eupithecia satyrata* Hb., *E. absinthiata* Cl. (munitata Fr.), *Scoparia sudetica* Z., *Sc. murana* Curtis, *Botys funebris* H. (octomaculana auct.), *B. purpuralis* L., *B. nebulalis* Hb., *B. inquinatalis* Zell., *B. decrepitalis* H. S., *Crambus pratellus* L., *C. dumetellus* Hb., *C. myellus* Hb., *C. culmellus* L., *C. margaritellus* Hb., *Pempelia fusca* H., *Sciaphila osseana* Scop., *Cochylis deutschiana* Zett., *C. dubitana* Hb., *Penthina sororculana* Zett., *P. dimidiana* Sc., *P. metallicana* Hb., *P. nebulosana* Zett., *P. sudetana* Standf., *P. schulziana* Fabr., *P. rufana* Scop., *P. lacunana* Scop., *P. urticae* Hb., *P. cespitana* Hb., *A. lanceolana* Hb., *Grapholitha penkleriana* S. V., *G. tetraquetra* Hw., *G. duplicana* Zett., *Steganoptycha quadrana* Hb., *Phox. unguicella* L., *Phox. myrtillana* T., *Ph. lundana* F., *Blabophanes rusticella* Hb., *Tinea cloacella* Hw., *Incurvaria rupella* Schiff., *Nemophora panzerella* Hb., *Adela degeerella* L., *Argyresthia curvella* L. (sorbicella Tr.), *Plutella cruciferarum* Zell., *P. senilella* Zett. (dalella auct.), *Gelechia diffinis* Hw., *G. infernalis* H. S., *G. galbanella* Z., *Bryotropha umbrosella* Zell., *Pleurota bicostella* Cl., *Oecophora stipella* L., *Glyphypteryx haworthiana* Steph., *Gracilaria elongella* L., *Coleophora laripennella* Zett., *Platyptilia zetterstedti* Zell., *Pl. gonodactyla* Schiff., *Leioptilus osteodactylus* Zell.

*Anhang No. 5b.* S. S. 197. Sparre Schneider fand bei Grote (68° n. Br.) vom 27. Juli bis 2. August 1880 folgende Arten:

*Pieris brassicae* L., *P. napi* v. *bryoniae* O., *Polyommatus phlaeas* L., *Lycaena argus* v. *aegidion* Meissn., *L. optilete* v. *cyparissus* Hb., *L. icarus* Rott., *Argynnis selene* Schiff., *A. euphrosyne* L., *A. aglaja* L., *Zygaena exulans* Hoch., *Z. filipendulae* L. v. *arctica*, *Nemeophila plantaginis* L., *Arctia caja* L., *Agrotis lucerneae* L., *A. conflua* Tr., *Hadena adusta* Esp., *H. lateritia* Hufn., *Acidalia fumata* Steph., *Pygmaena fusca* Thbg., *Phasiane clathrata* L., *Ematurga atomaria* L., *Lygris populata* L., *C. truncata* Hufn., *C. munitata* Hb., *C. fluctuata* L., *C. montanata* S. V., *C. caesiata* Lang, *C. minorata* Fr., *C. albulata* Schiff., *C. alchemillata* L. (rivulata auct.), *Eupithecia satyrata* Hb., *Scoparia sudetica* Zell., *Sc. murana* Curt., *Botys nebulalis* Hb., *Crambus alienellus* Zink., *C. culmellus* L., *Catastia auriciliella* Hb., *Sciaphila osseana* Scop., *Penthina dimidiana* Sod., *P. nebulosana* Zett. (irriguana H. S.), *P. schulziana* F., *P. lacunana* S. V., *P. bipunctana* F., *Grapholitha subocellana* Don. (campoliliana S. V.), *Phoxopteryx unguicella* L., *Ph. lundana* F., *Blabophanes rusticella* Hb., *Plutella senilella* (dalella auct.), *Gelechia perspersella* Wk., *Pleurota bicostella* Cl., *Coleophora laripennella* Zett., *Platyptilia Zetterstedti* Z.

*Anhang No. 6.* S. S. 197. Sandberg fügte den Schöyen'schen Spezies folgende Arten zu:

*Polyommatus helle* W. V., *Lyc. argyrognomon* (argus auct.) Bgstr., *A. aglaja* L., *Acherontia atropos* L., *Spilosoma fuliginosa* L., *Hepialus velleda* Hb., *Leucoma*

salicis St., Eriogaster sp. Germ., Hadenä Maillardi Hb., Orthosia iris Zett. (crasis H. S.), Plusia diasema B. und 21 neue Microlepidopteren, nämlich: Scoparia sudetica Zell., Cr. furcatellus Zett., T. lapponana Tgstr., P. dimidiana Sod., P. rivulana Scop., P. bifasciana Haw., Graph. Tort? (subocellana), Steganoptycha Gyllenhaliana Thbg., St. ericetana H. S., Scardia tessulatella Z., Tinea? Incurvaria capitella Cl., Nemophora panzerella H., Swammerdamia griseocapitella Stt. v. obscurior., Argyreothia goedartella L., Depressaria ciniflonella Z., Gelechia diffinis Hw., Coleophora laripennella Z., Elachista Zett. sp., Lithocolletis rayella L., Nepticula Z. sp., Micropteryx Hb. sp.

*Anhang No. 7. S. S. 197. W. M. Schoyen sammelte in Saltdalen:*

Aporia crataegi L. (?). Pieris brassicae L., P. napi L. v. bryoniae O., Colias palaeno L. v. lapponica Stdg., C. nastes B. v. werdandi Zett., C. hecla Lef., Thecla rubi L., Polymmatatus hippothoe L. v. Stieberi Gerh., P. phlaeas L. v. americanus d'Urb., Lycaena argus auct. v. aegidion Meiss., L. optilete Kn. v. cyparissus Hb., L. orbitulus Pr. v. aquilo B., L. astrarche Bergstr. (agestis auct.), L. icarus Rott. (alexis auct. et ab. icarinus Scriba), L. minima Fuessl., Vanessa urticae L., V. cardui L., Argynnis selene S. V. et v. hela Stdg., A. euphrosyne L. et v. fingal Hbst., A. pales S. V. v. lapponica Stdg. et v. arsilache Esp., A. freya Thbg., A. thore Hb. v. borealis Stdg., A. aglaja L., Erebia lappona Esp., E. ligea L., E. disa Thbg., Oeneis norna Thbg., Pararge maera L., Syrichthus andromedae W. allgr., Carterocephalus silvius Kn., Bembecia hylaei formis Lasp., Zygaena aculeus Hoch. et v. vanadis Dalm., Z. filipendulae L. (?), Nemeophila plantaginis et v. hospita S. V., Spilosoma fuliginosa L. v. borealis Stdg., Hepialus velleda Hb., Phymatopus hecla L., Cossus cossus L. (ligniperda Fb.), Psyche standfussi H. S., Drepana lacertinaria L. Harpya bifida Hb. v. saltensis Schoyen, Lophopteryx camelina L., Cymatophora duplaris L., Acronycta auricoma (S. V.) Fb., Agrotis hyberborea Zett., A. baja (S. V.) Fb., A. speciosa Hb. v. arctica Zett., A. conflua Tr., A. prasina (S. V.) Fb., A. occulta L., Charaeas graminis L., Mamestra pisi L., M. glauca Hb., M. dentina Esp. et ab. latenai Pierr., Dianthoecia dovrensis Wk., Hadenä adusta Esp., R. lateritia Hfn., Anomogyna laetabilis Zett., Taeniocampa gothica L. et v. gothicina H. S., Pachnobia carnea Thbg., Cleoceris viminalis Fb., Anarta cordigera Thbg., A. melaleuca Thbg., A. funebris Thbg., A. schönherri Zett., Hypena proboscidalis L., Geometra papilionaria L., Acidalia fumata Stph., Abraxas marginata L. v. nigrofasciata, Selenia bilunaria Esp., Biston hirtarius Cl., Gnophos sordaria Thbg., Psodos coracina Esp., Pygmaena fusca Esp., Fidonia carbonaria L., Ematurga atomaria L., Halia brunneata Thbg., Phasiane clathrata L., Anaitis paludata Thbg. et v. imbutata Hb., Lobophora carpinata Bkh., Lygris prunata L., L. populata L., Cidaria ocellata L., C. bicolorata Hfn., C. simulata Hb., C. taeniata Stph., C. truncata Hfn., C. munitata Hb., C. cambrica Curt., C. incursata Hb., C. fluctuata L., C. montanata S. V. et v. lapponica Stdg., C. ferrugata et v. spadicearia S. V., C. suffumata S. V., C. designata Hfn., C. dilutata S. V., C. polata Hb. et v. cineraria Schoyen, C. caesiata Lang, C. flavicinctata Hb., C. sociata Bkh., C. hastata L. v. hastulata Hb., C. tristata L., C. affinitata Stph., C. alchemillata L. (rivulata auct.), C. minorata Tr., C. albu-

tata Schiff., *C. sordidata* Fb. v. *fuscoundata* Don. et *infusata* Stdg., *C. autumnalis* H. (trifasciata Bkh.), *C. silacea* Hb., *Eupithecia abietaria* Goeze, *E. hyperborea* Stdg., *E. pygmaea* Hb., *E. plumbeolata* Hw., *E. satyrata* Hb., *E. absynthiata* Cl., *E. indigata* Hb., *Scoparia centuriella* Schiff., *S. sudetica* Z., *S. murana* Curt., *Botys funebris* H. Sch. (*trigutta* Esp.), *B. porphyralis* Schiff., *B. purpuralis* L., *B. ehippialis* Zett., *Botys nebulalis* Hb., *B. decrepitalis* H. S., *B. terrealis* Tr., *Crambus alienellus* Zett., *C. pratellus* L., *C. hortuellus* Hb. et *cespitellus* Hb., *C. dumetellus* Hb., *C. maculalis* Zett., *C. falsellus* Schiff., *C. myellus* L., *C. margaritellus* Hb., *C. fuscateilus* Zett., *C. culmellus* L., *Pempelia fusca* Hb., *Catastia auriciliella* Hb., *Myelois annulatella* Zett. (*altensis* Wk.), *Teras maccana* Tr., *Tortrix ribeana* v. *obscura*, *T. musculana* Hb., *T. ministrana* L., *T. forsterana* Fb., *T. paleana* Hb. v. *icterana* Froel., *T. rusticana* Fr., *T. grotiana* Fb., *T. rubicundana* H. S., *Sciaphila osseana* Scop., *S. penziana* Hb., *Cochylis vulneratana* Zett., *C. dubitana* Hb., *Penthina sororeculana* Zett., *P. sauciana* Hb., *P. dimidiana* Sod., *C. turfosana* H. S., *P. arbutella* L., *P. metallicana* Hb., *C. nebulosana* Zett., *C. sudetana* Standf., *P. palustrana* Zell., *P. schaefferana* H. S., *P. schulziana* F., *P. urtica* Hb., *P. lacunana* S. V., *P. cespitana* Hb., *P. bipunctana* Fb., *Aphelia lanceolana* Hb., *Grapholitha tetraquetra* Hw., *G. aspidiscana* H., *Steganoptycha ustomaculana* Curt., *S. quadra* Hb., *S. mercuriana* Hb., *Phoxopteryx unguicella* L., *Ph. lundana* Fb., *Ph. myrtillana* Tr., *Simaethis oxyacanthella* L., *Talaeporia borealis* Wk., *Selenobia cembrella* L., *Blabophanes rusticella* Hb. et v. *spilotella* Tgstr., *Tinea fulvimitrella* Sod., *T. cloacella* Hw., *Lampronia praelatella* Sch., *Incurvaria paetina* J. *velutella* Zett., *J. rupella* Schiff., *J. oehlmaniella* Tr., *Nemophora swammerdamiella* L., *Adela degeerella* L., *Swammerdamia conspersella* Tgstr., *S. griseicapitella* St., *Plutella crueiferarum* Zell., *P. senilella* L. (*dalella* auct.), *Semioscopis avellanella* Hb., *Psecadia funerella* Fb., *Depressaria applanata* Fb., *Gelechia velocella* dup. v. *brunnea*, *G. infernalis* H. S., *G. galbanella* Zett., *G. tarandella* Wk., *G. virgella* Thbg. (*longicornis* auct.), *G. diffinis* Hb., *G. lugubrella* Fb., *G. viduella* Fb., *G. saltenella* Schoyen, *Bryotropha umbrosella* Zett., *Teleia mouffetella* Zett. (*proximella* auct.), *Tachyptilia populella* Cl., *Pleurota bicostella* Cl., *Oecophora stipella* L., *O. similella* Hb., *Gracilaria elongella* L., *Ornix interruptella* Zett., *O. betulae* St., *Coleophora serratella* L. (*nigricella* Stph.), *C. therinella* Tengst (?), *C. laripennella* Zett., *Laverna idaei* Zell., *Endrosis lacteella* Schiff., *Lithocolletis rayella* L. (*strigulatella* auct.), *L. spinolella* Dup., *L. betulae* Is., *Micropteryx sparmanella* Bosc., *M. unimaculella* Zett., *M. semipurpurella* Stph., *Platyptilia gonodactyla* S. V., *Pl. zetterstedtii* Zell., *Amblyptilia cosmodactyla* Hb., *Oedematophorus rogenhoferi* Sch., *Leioptilus tephradactylus* Hb., *L. osteodactylus* Zell. In der Nachschrift führt Sch. noch auf: *Notodonta dromedarius* L., *Lophopteryx carmelita* Esp., *Asphalia flavicornis* L. v. *finmarchica* Schoyen, *Hydroecia nictitans* Bkh.

*Anhang No. 8.* S. S. 199. Sparre Schneider zählt folgende 134 Arten auf von Tromsø und Umgebung:

*Pieris brassicae* L., *P. napi* L. v. *bryoniae* O., *Polyommatus hippothoe* L. v. *stieberi* Gerh., *P. phlaeas* L. v. *americanus* d'Urb., *Lycena argyrognomon*



Bergstr. v. aegidion Meiss. (argus auct.), Lyc. optilete Kn. v. cyparissus Hb., L. icarus Rott., Vanessa urticae L. et v. polaris Stdg., Argynnis selene F. et hela Stdg., A. euphrosyne L. et v. fingal Hbst., A. pales Schiff. v. lapponica Stdg., A. pales Schiff. v. arsilache Esp. et forma lapponica Stdg., Erebia lappona Esp., E. ligea L., Sesia culiciformis L., Zygaena exulans Hoch. v. vanadis Dalm., Nemeophila plantaginis L. et hospita Schiff., Spilosoma fuliginosa L. et v. borealis Stdg., Psyche standfussi H. S., Bombyx crataegi L. et v. ariae Hb., Agrotis conflua Tr., Characas graminis L., Mamestra dentina Esp., M. glauca Hb., Hadenia meillardi H. G. var., H. adusta Esp., Anarta cordigera Thbg., A. melanopa Thbg. v. rupestralis Hb., A. melaleuca Thbg., A. lapponica Thbg., A. zetterstedti Stdg., Taeniocampa gothica L., Brephos parthenias L., Acidalia fumata Sph., Gnophos sordaria Thbg., Psodos coracina Esp., Pygmaena fusca Thbg., Anaitis paludata Thbg. et v. imbutata Hb., Lygris populata L. et v. musuaria Fr., Cheimantobia boreata Hb. var., Cidaria truncata Hufn., C. immanata Hw., C. munitata Hb., C. incurvata Hb., C. fluctuata L., C. montanata S. V. v. lapponica Stdg., O. ferrugata Cl. v. spadicearia Bkh., C. suffumata S. V., C. designata Hufn., C. dilutata S. V. et v. obscurata Stdg., C. byssata Auriv. (polata auct. p. p.), C. caesiata Lang, ab. annosata Zett., glaciata Germ., gelata Stdg., C. nobiliaria H. S., C. subhastata Nolek., C. alchemillata L. (rivulata S. V.), C. affinitata Sph. (alchemillata Z. turbaria Sph.), C. minorata Tr., C. adaequata Bkh., C. albulata Schiff., C. sordidata Fabr., Eupithecia satyrata Hb., E. hyperboreata Stdg., Scoparia sudetica Zell., Sc. murana Curt., Botys porphyralis Schiff. (punicealis Zett.), B. decrepitalis H. S. (albidalis Zett.), B. inquinatalis Z. (prunalis Zett.), B. ephippialis Zett., Crambus dumetellus Hb., Cr. maculalis Zett., Cr. furcatellus Zett., Cr. margaritellus Hb., Catastia marginea Schiff. v. auriciliella Hb., Tortrix ministrana L., T. forsterana F., T. rubicundana H. S., Sciaphila osseana Scop., Cochylis dubitana Hb., C. vulneratana Zett., Penthina sororculana Zett., P. sauciana Hb., P. noricana H. S., P. arbutella L., P. metallicana Hb. (ljunghiana Thbg.), P. nebulosana Zett. (irriguana H. S.), P. sudetana Stdf. (obsoletana Zett.), P. palustrana Zett., P. schulziana F., P. lacunana S. V., P. bipunctana F., Grapholitha sordidana Hb., Gr. subocellana Dor., Gr. tetraquetra Hw., Steganoptycha nemorivaga Tgstr., St. ericetana H. S., St. quadrana (strigulosana Zett., St. mercuriana Hb., St. gyllenhaliana Thbg., Phoxopteryx unguicella L., Ph. myrtillana Fr., Dichrorhampha plumbana Scop., Simaethis oxyacanthella L., Scardia tessulatella L., Blabophanes rusticella Hb., Tinea pelliellonella L., Phylloporia bistrigella Hw., Incurvaria vetulella Zett., I. oehlmaniella Tr., Nemophora swammerdamiella L., Swammerdamia conspersella Tgstr., Argyresthia curvella L. (sorbiella Fr.), Argyr. pygmaeella Hb., Plutella cruciferarum Z., Pl. senilella Zett. (dalella auct.), Semioscopis avellanaella Hb., Depressaria applana F., Gelechia velocella Dup. v. brunnea Schöyen, G. virgella Thbg. (longicornis auct.), G. diffinis Hw., G. viduella F., Pleurota bicostella Cl., Oecophora stipella L., Glyphipteryx haworthiana Sph., Ornix betulae Stdg., O. polygrammella Wk., Coleophora laripennella Zett., Laverna pilipennella Zett., Endrosia lactella Schiff., Lithocolletis rayella L. (strigulatella Zett.), L. ulmifoliella Hb., Nepticula Esp., Micropteryx aureatella Scop., M. semipurpurella Sph., Platyptilus zetterstedtii Zett., Pl. tesseradactyla L.



Anhang No. 9. S. S. 199. J. Sparre Schneider (Tromsø Mus. Aarshefter 15. 1892, p. 150) gibt die folgende Recapitulation:

	Arktisches Norwegen	Saltdalen	Tromsö und Malselvdaalen	Alten	Sydvaranger	
Rhopalocera . . .	46	30	27	26	29	= 10,8% der pol. Fauna
Sphinges . . .	7	2	3	2	4	= 1,2%
Bombyces . . .	29	14	9	7	4	= 6,8%
Noctuae . . .	44	25	16	22	23	= 10,4%
Geometrae . . .	79	57	39	38	37	= 18,6%
Pyalidina . . .	33	23	17	18	13	= 7,8%
Tortricina . . .	73	38	37	39	32	= 17,2%
Tineina . . .	101	51	40	62	37	= 23,8%
Micropterygina . .	4	3	2	3	2	= 0,9%
Pterophorina . .	10	7	3	2	2	= 2,4%
Summa	425	250	193	219	193	

also Macrolepidoptera 205 und Microlepidoptera 220, während nach Schoyen ganz Norwegen 632 Macros und 630 Microlepidopteren hat.

Anhang No. 10. S. S. 200. Petersen gibt nachstehende Uebersicht der 402 Arten:

	Gesamthbestand des arktischen Gebietes	Genera (davon eigenthümlich)	Sibirisch	%	Nur arktisch- europäisch	Arktisch und alpin (davon sibirisch)	Nur arktisch- europäisch und sibirisch	Nur arktisch-euro- päisch u. arktisch- amerikanisch	Arktisch und circumpolar	Arktisch-europäisch alpin u. zugleich arkt.-amerikanisch
Rhopalocera . . .	80	22 (0)	73	91	—	5 (4)	9	3	6	0
Sphinges . . .	21	10 (0)	10	50	2	1 (0)	—	0	0	0
Bombyces . . .	54	27 (0)	26	50	2	2 (1)	1	0	1	0
Noctuae . . .	116	38 (0)	72	62	7	7 (0)	5	6	2	5
Geometrae . . .	131	40 (1)	74	56	6	6 (0)	2	2	1	0
*Summa . . .	402	137 (1)	255	63	17	21 (5)	17	11	10	5

Anhang No. 11. S. S. 201. In Middendorff's Sibirischer Reise II, 1. (1853) werden p. 56 von Ménétries aufgezählt:

Lepidoptera: Pap. machaon L. bei Udskey Ostrog (Stadt in Küstenprovinz, südwestlich von Ochotsk). Anthocaris cardamines L. daselbst, Leucophasia sinapis L. ebendaher, Colias hyale L. ebendaher, Colias palaeno L. von der Baganida, Lycaena argiolus L. von Udskey Ostrog, L. pheretes Ochs. ebendaher, Thecla rubi L. ebendaher, Argynnis

aphiraphe Hüb. von der Baganida, Arg. frigga Thunberg ebendaher, Arg. pales Fabr. ebendaher, Arg. polaris Boisd. (U. O., Baganida, am Teimyrfluss bis zu 75° N. B. gemein), Van. c. album L. (U. O.), V. polychloros L. (U. O.), V. antiopa L. (U. O.), V. cardui L. (U. O.), Erebia ligea L. (U. O.), E. stygne Ochs. var. (U. O.), E. edda Mén. (U. O.), E. blandina Fabr. (U. O.), E. norna Thunberg (U. O.) Noctuae: Amphidasys semifasciata Mén. (gemein in der Baganida), Fidonia atomaria L. (U. O.), Numeria pulveraria God. (U. O.), Ploseria diversaria Hüb. (U. O.), Melanippe hastaria B. (U. O.), M. tristaria Boisd. (U. O.).

*Anhang No. 12.* S. S. 201. Trybom (l. c. p. 35) erwähnt vom Jenisei:

1. Papilio machaon L. (59°—69°), 2. Pieris napi L. v. gen. II naepae Esp. (62° 45'—70° 40'), aberr. bryoniae O. (67° 25'), 3. P. callidice Esp. (68° 55'), 4. Anthocaris belia Cramer (65° 50') v. ochracea), 5. A. tagis Hb. (64° 5'), 6. A. cardamines L. (56°—61° 25'), 7. Leucophasia sinapis L. (56°—64° 5'), 8. Colias palaeno L. (59° 10'—69° 25'), europomene Hb., philomene Hb., 9. C. edusa Fabr. (60° 20'), 10. Rhodocera rhamni L. (59° 10'), 11. Thecla Frivaldzkyi Led. (59° 10'), 12. Thecla rubi L. (59°—63° 25'), 13. Polyommatus amphidamas Esp. helle Hb. (59°—65° 35'), 14. Lycaena argiades P. (56°—59° 10'), 15. L. optilete Kn. v. cyparissus Hb. (65° 55'—69° 25'), 16. L. argiolus L. (65° 50'), 17. L. sebrus B. (61° 5'), 18. L. cyllarus B. (56°—60° 20'), 19. Vanessa levana L. (— 63° 25'), 20. Van. c. album L. (— 65° 50'), 21. V. urticae L. (61° 5'), 22. V. jo L. (59° 25'), 23. V. antiopa L. (63° 25'), 24. V. cardui L. (— 67° 25'), 25. Argynnis aphiraphe Hb. v. ossianus Hbst. (65° 55'—65° 25'), 26. A. selenis Eversm. (65°), 27. A. selene Schiff. var. hela St. (68° 25'), 28. A. euphrosyne L. (69° 25'), 29. A. pales Sch. (68°—70° 40'), 30. A. chariclea Schn. (68° 25') aber. boisduvalii Dup., 31. A. freija Thbg. (68° 25'), 32. A. dia L. (56°), 33. A. frigga Thbg. (69° 25'), 34. A. thore Hbn. (68° 55'), 35. A. eugenia Eversm. (69° 25'), 36. Erebia medusa F. (56°), 37. E. ligea L. v. jennisseiensis (68° 25'), 38. E. cyclopius Ev. (56°) v. intermedia Tryb., 39. E. embla Thbg. (68° 25'), 40. E. disa Thbg. (68° 25'), 41. E. discoidalis Kb. (68° 25'), 42. E. ero Bremer (68° 25'), 43. Oenis jutta Hb. (68° 25'), 44. O. tarpeja Pall. (56°), 45. O. urda Ev. (56°), 46. O. bore Schn. v. taygete Hb. (68° 25'), 47. Pararge hiera Fabr. (— 62° 5'), 48. Syrichthus centaureae Ramb. (68°—68° 25'), 49. S. malvae L. [alveolus Hb.] (59°), 50. Carterocephalus palaemon Pull. [brotus Hb.] (65° 55'), 51. C. sylvius Knoch. (56°—66° 30').

*Anhang No. 13.* S. S. 203. Richardson Arctic searching expedition, Journal of a boats voyage through Rupert's land and the arctic sea. London 1851. Vol. II p. 362.

Es werden daselbst aufgeführt (White, list of insects etc.) Lepidoptera: Papilio turnus L. (Fort Simpson, Makenzie River), Pontia casta K. (Arctic coast 67 $\frac{1}{2}$ —68°), Pontia sp. (Fort Simpson, Makenzie River), Anthocharis spec.? (bei simplonia) Arctic coast 67 $\frac{1}{2}$ —68°, Colias palaeno L. (F. S.), Colias Boothii Curt. (Arctic coast 67 $\frac{1}{2}$ —68°), C. chione C. var. (Arctic coast), Argynnis freya Thunberg (Melitaea tarpuinia Curtis) (Arctic coast 67 $\frac{1}{2}$ —68°), Argynnis spec.?

(Arctic coast) (*frigga*, var. *improb* Butler) (P.), *Vanessa milberti* G. (*V. farcillata*) (F. S.), *Vanessa progne* Hed. (*V. c. argenteum* K. (F. S. Arctic coast), *Nymphalis artemis* (F. S., border of Makenzie, slave river), *Chionobas bore* B. ? (Arctic coast 67 $\frac{1}{2}$ —68°), *Hipparchia* n. sp. (an *discoidalis*) (Arctic coast), *Hipparchia Rossii* Curtis (67 $\frac{1}{2}$ —68°), *Polyommatus Franklini* Curt. (Arctic coast), *Arctia americana* Harris (Borders of Makenzie and slave river), *Hadena Richardsoni* Curtis (Arctic coast), Geometridae, two species (Arctic coast), Tineidae, three species (Arctic coast).

*Anhang No. 14.* S. S. 203. Die Synonyme von *Glauc. sabinaria* sind:

1820. *Bombyx Sabini* Kirby in Suppl. to app. Capt. Parrys voyage for the discovery of a north west passage (1820). 1825. *Psychophora Sabini* K., Curtis, App. Ross. narrat. sec. voyage in search of a north west passage (1835) pl. A f. 12 u. 17. 1852/57. *Cidaria frigidaria* Guenée, Ur. et Phal. II, 269. 1861. *Cidaria frigidaria*, G. Standinger, St. Ent. Ztg. 1861 p. 392. 1869. *Cid. frigidaria* Gn., Tengstr. Cat. Fen. p. 321. 1872. *Cid. frigidaria* Standinger, Cat. 1872, führt das Curtis'sche Citat auf und sagt: si certum nomen ut vetustius accipiendum. 1874. Wallengren Index (Lapp. intermed.) 1876. *Glaucopteryx sabinaria* Packard, North Amer. Phal. p. 75 pl. 8 f. 20 hält die Art für verschieden, wenn auch sehr ähnlich, von *frigidaria* Gn. 1878. Schoyen bei Kistrand in Porsanger auf flachen Klippen mit Geröll. 1887. *Cidaria frigidaria* Gn., Petersen, Lep. des arktischen Gebiets von Europa p. 121 (65°, Nordamerika?) Die Exemplare, welche ich als *Cid. frigidaria* Gn. seiner Zeit von Hrn. Möschler erhielt, stimmen mit den Abbildungen von Curtis und Packard über *Psych. Sabini* und *Glauc. sabinaria* ganz gut überein. — *Acidalia frigidaria* Möschler, Wien. Ent. Mon. IV T. 10 f. 1 (1860) ist gleich *Acid. inductata* Guenée, Packard, N. A. Phal. p. 340, und *Acid. okakaria* Packard, Bost. Soc. XI, n. 3 (1867) eine wesentlich andere Art.

*Anhang No. 15.* S. S. 203. Ich gebe aus den Mittheilungen von Curtis, Beschreibung der Insekten, die durch Commodore J. C. Ross nach England gebracht sind, in Ross, Zweite Entdeckungsreise nach den Gegenden des Nordpols 1829—1833. Aus dem Engl. von Graf von der Groeben. Berlin 1836. p. 238, Folgendes wieder:

„Alle Formen in der Sammlung der Insekten sind vollkommen europäische.“  
*Colias Boothii* pl. A f. 3 ♂ f. 4 ♀, f. 5 Unterseite des ♀. *Col. chione* pl. A f. 6 ♂ (als Varietät der vorigen?) Mitte Juli, wie die beiden folgenden Arten, hauptsächlich auf *Oxytropis campestris* und *O. arctica*; vom 14. Juli bis 13. August. *G. Hipparchia* Fabr. *H. Rossii*, 5 Exemplare. Die Schmetterlinge waren selten und hielten sich an Abhängen schwärzlicher Felsen und im losen Gestein besonders auf, niemals an Blumen. Juli. *H. subhyalina*. Ob Varietät der vorigen? *G. Melitaea* (Fabr.), *M. tarquinius* häufig an denselben Blumen wie *Colias*. Raupe schwärzlich, unter Steinen (wohl *Argynnis freija* Thbg.). *G. Polyommatus* (Fabr.), *P. franklini* pl. A f. 8 u. 9. Juli (= *aquila* B.). Fam. Bombycidae und Arctiidae. *G. Laria*. *L. Rossii* pl. A f. 10. Häufig, besonders im Raupenzustand. Thaut, wieder

holt hart gefroren, wieder zum Leben auf; lebt auf *Saxifraga tricuspidata* und *S. oppositifolia*. *G. Euprepia* Ochs., *E. hyperboreus*. Fam. Noctuidae. *G. Hadenä*, *H. Richardsoni* pl. A f. 11. Juli (= *An. Richardsoni*). Fam. Phalenidae. *G. Psychophora*; *Ps. Sabini* K. pl. A f. 12 u. 7. *G. Oporatia*; *O. punctipes*. Fam. Tortricidae. *G. Orthotaenia*; *O. bentleyana* Don. (pinetana Hb.); *O. septentrionana*. *G. Argyrota*; *A. parryana* pl. A f. 13.

*Anhang No. 15a.* S. S. 205. J. C. Schiödte (Uebersicht der Land-Süsswasser- und Ufer-Arthropoden Grönlands. Aus dem Dänischen übersetzt von A. v. Etzel in Berl. Ent. Zeitschrift 1859 p. 134) begründet die eigenthümliche Armuth der Landarthropoden Grönlands und deren Verhältniss zu ihren Verwandten in Amerika, Europa und Asien. Er führt auf (mit Berücksichtigung von Otto Fabricius, Zetterstedt, Lefebvre, Curtis, Staudinger, Boisduval):

*Argynnis chariclea* Herbst. (*Pap. tullia* Fabr., *A. arctica* Zett.), *Chionobas balder* Boisd. (nach B.'s Angabe, P.), *Chionobas bore* Hübn. (nach B.'s Angabe, P.), *Colias boothii* Curtis (c. *chione* Curtis, *hecla* Lefeb.), ? *Charaeas graminis* L. (Larve verheerend), *Agrotis quadrangula* Z., *A. rava* H. S., *A. islandica* St., *A. Dreisseni* St., *Noctua Westermanni* Stg., *Hadenä exulis* Lefeb., *Hadenä gelata* Lefeb. = ♀ der vorigen, *H. marmorata* Zett., *H. Sommeri* Lefeb., *H. groenlandica* Zett., *Had. picticollis* Zett., *Aplecta occulta* Rossi var. *implicata* Lefeb., *Plusia gamma* L., *Pl. interrogationis* L., *Pl. parilis* Hbn., *Pl. diasema* Dalm., *Anarta algida* (= *Ph. myrtilli* Fabr.), *A. amissa* Lefeb., *A. leucocycla* St., *A. lapponica* Thbg., *Phaesyse polaria* Boisd. v. *brullei* Lefeb., *Cidaria brumata* L., *Botis hybridalis* Hbn., *Teras indecorana* Zett., *Eudorea centuriella* Schiff. (= *E. borealis* Lefeb.), *Pempelia carbonariella* F. v. R., *Plutella senilella* Zett.

*Anhang No. 16.* S. S. 205. Holmgren, A. E. (Insekter fran Nordgrönland, samlade af Prof. A. E. Nordenskjöld as 1870) in Ofversigt af Konigl. Vetenskaps Akad.-Förhandl. 1872, n. 6, p. 97, Stockholm (Lepidoptera p. 105) führt von Schmetterlingen auf:

*Argynnis chariclea* Herbst = *Pap. tullia* Fabr. Faun. Grönl. 143 = *Arg. arctica* Zetterstadt, Ins. Lapp. *Colias Boothii* Curtis App. etc. LXV, 10 pl. A f. 3, 4, 6.

*Anhang No. 17.* S. S. 206. Aurivillius: Grönlands Insectfauna I: Lepidoptera, Hymenoptera in Bihang till k. Svenska Vet. Akad. handlingar Bd. 15 Affd. IV n. 1. Stockholm 1890.

Rhopalocera. Fam. Nymphalidae. 1. *Argynnis chariclea* Schn. var. *arctica* Zett. Taf. I, f. 1, 3, 4, Finmarkia, Lapponia fennica; var. *boisduvali* Dup. (Labrador), v. *arctica* Zett. (Groenlandia, Novaja Semlia, Am. arct. ins. ?; ab. *butleri* Edw. (Amer. occid. arct. 67°—68°, Nova Zembla). Fam. Papilionidae. 2. *Colias hecla* Lef. Taf. 2, f. 9, 10 (*C. boothii* H. S.) (Grönland, Grinnell's Land) var. *sulitelma* (Finmarkia, Lapponia). Fam. Orgyidae. 3. *Dasychira groenlandica* Wocke (Grönland, Grinnell's Land 82° 45'), ? *Laria* Rossi Packard.



Fam. Noctuidae. 4. *Agrotis clandestina* Harris (Grönland, Labrador, N.-Amerika). 5. *Agr. quadrangula* Zett. (*A. rava* H. S.) (Grönland, Island, Labrador). 6. *Agr. westermanni* Staud., Taf. 2 f. 8 (Grönland, Labrador). 7. *Agr. drewseni* Staud., Taf. 2 f. 7 (Grönland, Labrador?). 8. *Agr. islandica* Staud., T. 1 f. 5 ♀ (Grönland, Labrador, Island, Livland, Sibirien). 9. *Agr. occulta* L. var. *implicata* Lefeb. (Grönland, Labrador, Lappland). 10. *Hadena sommeri* Lefeb., Taf. I f. 9, 10 ♀ (Grönland, Island). 11. *H. exulis* Lefeb. (Grönland, Labrador, Island, Scotland, Dovre, Finmarken). 12. *Plusia gamma* L. (Grönland, Nord-Amerika, Asien, Europa, Centralasien). 13. *Pl. u. aureum* Guenée, Taf. 1 f. 7 ♀ (Grönland, Labrador). 14. *Pl. parilis* Hübn., Taf. 1 f. 6 (Grinnell's Land 75°, Island, Labrador, Lappland, Finmarken). 15. *Pl. diasema* Boisd. v. *borea*, Taf. 1 f. 8 (Grönland). 16. *Anarta Richardsoni* Curtis, Taf. 1 f. 12 (*algida* Lef.; *Mamestra*? *Feildeni* Mc. Sullivan (Grönland, Grinnell's Land, Labrador, Dovre, Finmarken, Lappland, Ostasien). 17. *Anarta lapponica* Thunbg. Taf. 2 f. 2 (*amissa* Lef.) (Grönland, Labrador, Lappland). 18. *An. Kolthoffi* Aur. (aut. v. *Zetterstedti* Taf. 2 f. 1) = *amissa* Lef. ♀ (Grönland). Fam. Geometridae. 19. *Cidaria polata* Dup. Taf. 2 f. 4 (= *brullei* Lef.) Grönland, Belle Isle Strait, Caribou Island, Labrador, Arct. Lappland, Finmarken. 20. *Eupithecia nanata* Hübn. var.? (= *hyperboreata* Stdg.), Grönland. 21. *Eup. altenaria* Staud.? Taf. 2 f. 3 (Grönland). Fam. Pyralidae. 22. *Scoparia centuriella* Fabr., Taf. 2 f. 6 (= *albisinuatella* Pack.) (Grönland, Labrador, Finmarken, Lappland, Finland, Schlesien, Alpen). 23. *Botys torvalis* Möschler (Grönland, Labrador, Pyrenäen). 24. *Pempelia fusca* Haw., Taf. 2 f. 5 (= *carbonariella* F. v. R. = *frigidella* Packard) (Grönland, Island, Labrador, Europa). Fam. Tortricidae. 25. Gen.? spec.? Fam. Tineidae. 26. *Plutella* spec. (*senilis* Zett.). 27. *Bupalis* spec. Ausser diesen führt Aur. auf Grund anderer Autoren noch an: *Argynnis polaris* B., einige zweifelhafte Fabricius'sche Arten, *Teras indecorana* Zett. (= *Rh. effractana* Froel.), *Chionobas balder* Schiodte, *Chion. bore* Hübn., *Cheimatobia brumata* L., *Glaucopteryx sabiniaria* Curtis, Packard, *Anarta tenebricosa* Möschler, *Anarta melanopa* Thunbg., so dass die Zahl der von Grönland bekannten Arten auf 33 steigt.

*Anhang No. 18.* S. S. 208. Möschler (l. c.) führt 1870 die folgenden (auch Scudder'sche und Packard'sche) Arten von Labrador auf:

*Pieris frigida* Sc., *Colias pelidne* L., *Col. anthyale* (= *pelidne* B.), *Col. nastes* B., *Polyommatus epixanthe*, *Lycaena aquilo* B., *Vanessa interrogationis* Db., *Vanessa cardui*, *V. antiopa*, *Arg. aphiraphe* var. *tricularis*, *A. chariclea* Schn. und var. *boisduvali* Duf., *A. polaris*, *A. freya*, *A. frigga*, *Chionobas jutta*, *Ch. bore* (= *bootes* auct.), *Ch. crambis* Fr. (= *taygete* H. S.), *Ch. semidea* (= *oeno* Bd.), *Syrichthus centaureae*, *Hesp. comma* L., *Arctia borealis* M., *Arctia caja* L., *Arctia Quenseli* Payk., *Arctia speciosa* Möschl., *Epialus hyperboreus* M. (= *pulcher* Gn.), *E. labradoriensis* Pack., *Dasychira Rossii* Curtis, *Agr. conflua* Fabr., *Agr. umbratica* Pack. (ob Var. der vorigen?), *A. littoralis* Pack. (= *Pachnobia carnea*), *Agr. Wockei* M. (= *okakensis* Pack.), *A. Staudingeri* Möschl., *Agrotis comparata* Möschl., *A. dissona* Möschl., *A. rava* H. S., *A. speciosa*,



*A. laetabilis* Zett., *A. islandica* Stdg., *A. fusca* Bd., *A. septentrionalis* M. (= ♂ von *fusca*), *A. ypsilon*, *A. occulta* L. var. *implicata* Lef., *Dianthoecia subdita* M., *D. phoca* M., *Hadena exulis* Lef., *H. exornata* M., *H. arctica* Bd., *Mamestra Rogenhoferi* M., *Pachnobia carnea* Thbg., *Leucania rufostrigata* Pack., *Plusia* *U. aureum* (= *interrogationis* var.?), *Pl. parilis* Hb., *Pl. hohenwarthi* Hb., *Anarta cordigera*, *A. melaleuca* Thbg. (= *bicycla* Pack.), *A. melanopa* (= *nigrolunata* Sch.), *A. funesta*, *A. richardsoni* Curtis (= *algida* Lef.), *A. Zetterstedti* Stdg., *A. lapponica* Thbg. (= *amissa* Lef.), *A. Schönherri* Z. (= *leucocycla* St.), *Brephos infans* M., *Acidalia frigidaria* M. (= *okakaria* Pack.), *A. sentinaria* (= *spuraria* Chr.), *Aspilates gilvaria* S. V., *Anaitis sororaria* Hb., *Macaria sexmaculata* Pack., *Triphosa dubitata* L., *Lygris lugubrata* M. (= *nubilata* Pack.), *L. destinata* M., *L. incursata* Hb. (= *disceptaria* F. v. R.), *Cidaria polata* Hb. var. *brullei* Lef., *C. phocata*, ?*C. caesiata* S. V., ?*C. aqueata* Hs. (= *lotaria* B), *C. hastata* var. *gothicata* Gn., *C. luctuata* var. *obducata* M., *C. brunneata* P., *C. nigrofasciaria* Pack., *C. strigata*, *C. aurata* Pack., *Coremia labradoriensis* (= ?*munitata* Hw.), *C. truncata*, *Eupithecia luteata* Pack., *E. gelidata* M., *Botys ephippialis* Z., *B. torvalis* M., *B. inquinatalis* Z., (= *glacialis* Pack.), *Pyrausta borealis* Pack., *Eudorea centuriella* S. V. (= *E. frigidella* Pack.), *E. albisinuatella* P., *Crambus unistriatellus* Pack., *O. argillacaellus* Pack., *Crambus trichostomus* Chr., *C. albellus* Cl., *C. inornatellus* Cl., *C. labradoriensis* Chr., *Sciaphila osseana* (= *niveosana* Pack.), *Pandemia leucophaleratana* Pack., *Tortrix gelidana* M., *Conchylis deutschiana* Z., *Penthina glaciana* M., *P. frigidana* P., *P. tessellana* Hb., *P. fulvifrontana*, *P. murina*, *P. moestana* Wocke, *Anchylopera plagosana* Cl., *Halonota packardiana* Cl., *Antithesia bipartitana* Cl., *Grapholitha nebulosana* Pack., *Tinea rusticana* L. var. *spilotella* Tengstr., *Incurvaria labradorella* Cl., *Gelechia continuella* Z., *G. labradorica* M., *G. labradorella* Cl., *G. brunnella* Cl., *Ornix boreacella* Cl., *Oecophora frigidella* P., *Oecophora* sp., *Oec. spec.*, *Glyphypteryx spec.*

*Anhang No. 19.* S. S. 208. 1874 besprach Möschler folgende Labrador-Arten:

*Pieris frigida* Scudder (= *napi*), *Lycaena scudderi*, *Argynnis atlantis* Edw., *Deilephila galii* L., *Arctia speciosa* Möschl., *Epialus hyperboreus* Möschl., *Agrotis westermanni* St., *A. erdmanni* Möschl., *Agr. comparata* M. (= *imperita* Hb. Zutr.), *Plusia hohenwarthi*, *Pl. devergens* Hb., *Anarta Zetterstedti* Stdg., *Lygris destinata* Möschl., *C. suspectata* Möschl., *C. algidata* Möschl., *C. dilutata* Bkh., *Botys hyperborealis*, *Tortrix arctica* Möschl., *Penthina roseomaculana* H. S. und *Grapholitha tarandana* Möschl.

*Anhang No. 20.* S. S. 208. 1885 führt Möschler (St. Ent. Ztg. p. 114) weiter von Labrador erhaltene Arten auf:

*Polyammatus helloides* Bdr. (castro Reak.), *P. dorilis* Hufn., *Casterocephalus paniscus* Hb., (palaemon Poll.), *Alypia langtoni*, *Arctia Yarrowii* Stretch., *Orthosia crasis* Hb., *Semiothisa labradoriata* Möschl., *Halia packardaria* Möschl., *Lygris populata* L., *Cidaria munitata* Hb., *C. montanata* S. V. var. *lapponica* Stdg., *C. ferrugata*, *C. unidentaria* Haw., *C. designata* Hufn., *C. abrasaria* H. S. (= *ligularia* Gn.), *C. silaceata* Hb. (var. *defflorata* Stdg.), *Eupithecia scriptaria*

H. S., *Scoparia inceptalis* Dup., *Botys radiosalis* M., *Crainbus luctiferellus* Hb. var. *luctuellus* H. S., *Conchylis smeathmanniana*, *Penthina septentrionona* M., *Cypophora Idaei* Zell.

Packard (View etc.) sagt: „Es wird zu sehen sein, dass viele der allgewöhnlichsten Formen circumpolare Arten sind, gewöhnlich in hohen Breiten und anzeigend, dass, was die Insektenfauna betrifft, die unmittelbar an der Küste gefundenen Vertreter beinahe rein arktisch in ihrem Charakter sind, nahe übereinstimmend mit der grönländischen Fauna und entfernter verwandt mit denen der skandinavischen Berge, besonders der Fjelds von Norwegen und Finmarken. Im Innern des Landes, wo es wärmer und dichter bewaldet ist, würden wir eine der Küsten der Hudsonsbai ähnlichere Fauna finden, welche mit zahlreichen borealen Formen vermischt ist. Solche boreale oder „canadische“ Arten beginnen auf Caribou Island in der Strasse von Belle Isle in Südlabrador gefunden zu werden.“

Anhang No. 21. S. S. 209. Packard, Uebersicht über das Vorkommen einiger Spannarten:

	Colorado	M. Washingt.	La- brador	Island	Lapp- land	Alpen	Ural
<i>Gl. caesiata</i> . .	×	×	×	×	×	×	×
<i>Gl. cambricaria</i>	—	×	—	—	—	×	—
<i>Gl. dilutata</i> . .	—	—	×	×	×	×	×
<i>H. trifasciata</i> . .	×	×	×	×	×	×	×
<i>P. truncata</i> . .	×	×	×	×	×	×	×
<i>P. prunata</i> . .	×	×	×	—	—	×	—
<i>P. testata</i> . .	×	—	—	—	—	×	×
<i>O. ferrugaria</i> . .	×	×	×	×	×	×	×
<i>O. munitaria</i> . .	×	—	×	×	×	×	—
<i>P. fluctuata</i> . .	×	—	—	—	—	×	×
<i>P. lugubrata</i> . .	×	—	×	—	×	×	×
<i>P. tristata</i> . .	×	—	×	—	—	×	×
<i>P. hastata</i> . .	×	×	×	×	×	×	×

Anhang No. 22. S. S. 210. Die von Staudinger für Island aufgeführten Arten sind:

*Episema graminis*, *Agrotis islandica*, *A. rava*, *Noctua conflua*, *Tryphaena pronuba*, *Hadena* (?) *exulis* (überaus variierend), *Hadena sommeri*, *Mamestra pisi*, *Plusia interrogationis*, *Cidaria truncata*, *munitata*, *propugnata*, *caesiata*, *thulearia*, *alchemillata*, *elutata*, *Eupithecia scoriata*, *satyrata*, *valerianata*, *Teras macrana*, *Tortrix pratana*, *Penthina betulana*, *Crambus pascuellus*, *Cr. extinctellus*, *Pempelia carbonariella*, *Tinea rusticella*, *Plutella cruciferarum*, *Plut. dalella*, *Plut. septentrionum*, *Gelechia* (*Bryotropha*) *thulealla*, *G. spec.?*, *Endrosia lacteella*, *Coleophora algidella* und *Pterophorus islandicus*.

Anhang No. 23. S. S. 212. Aurivillius gibt (p. 405) nachfolgende interessante Zusammenstellung über die Verbreitung der Schmetterlinge in arktischen Ländern:

	Schweden und Norwegen	Arktisches Skandinavien	Arktisches Asien	Arktisches Amerika			Grönland	Novaja Semlja	Spitzbergen
				Festland	Inseln	Island			
Lepidoptera (Schmetterl.) . . .	1731	396	76	18	27	33	27+(3?)	9	1
Rhopalocera (Tgf.) . . .	110	49	26	11	9	—	3+(3?)	3	—
Closterocera (Abendf.) . . .	37	11	—	—	—	—	—	—	—
Nematocera . . . . .	697	114	18	4	10	19	20	5	—
Bombyces (Spinner) . . . .	119	29	1	—	5	—	1	—	—
Noctuae (Eulen) . . . . .	327	45	4	2	3	9	17	3	—
Geometrae (Spanner) . . . .	251	70	13	2	2	10	2	2	—
Microlepidoptera . . . . .	887	192	32	3	8	14	4	1	1
Pyrilidae (Lichtmotten) . . .	141	34	5	—	1	3	2	—	—
Tortrices (Wücker) . . . .	270	64	20	—	7	3	1	1	—
Tineae (Motten) . . . . .	447	85	5	3	—	7	1	—	1
Pterophorina (Federn.) . . .	29	9	2	—	—	1	—	—	—

Anhang No. 24. S. S. 214. Die arktischen Argynnis-Arten sind nach Elwes (Rev. of the genus Argynnis, Tr. Ent. Soc. 1889, p. 538 ff.):

Argynnis aphiraphe Hb. var. ossianus Hbst. (Lappland, Ross. bor., Amur sup., Hudson Bay, Labrador, v. triclaris Hb. (Amur, Colorado, Rocky Mountains). Arg. selene Schiff., v. hela Staud. (Scand. bor., Asia bor. 68°). Arg. euphrosyne L. (Asia bor. 70°) v. fignal Herbst (Scand. cent. et bor.). A. pales Schiff. v. lapponica Stdgr. (Scand. bor., Amur inf.), v. arsilache Esp. (Scand., Ross. bor. et cent, Sib. ad 70° N.). A. chariclea Schn. (Eur., Asia et Am. bor.; Labrador, Newfoundland, Rocky Mountains, Brit. Colombia), v. Boisduvali Dup., v. obscurata M. Lachl. (Grinnelland 80°), butleri Edw. (Kotzebue Sound., N. W. Am. 67—68°, Novaja Zembla. A. selenis Ev. v. sibirica Ersch. (Amur, Sib. bor. ad 65° N. Irkutsk. A. freija Thunberg (Europa, As. 59 ad 70°, Rocky Mountains, Colorado America bor. ad 63° N., v. tarquinius Curt. (Booth. felix 70° N. A. frigga Thbg. (Eur. Asia 60° ad 70°, v. improba Butl. (Am. arct. 67—68°, Nov. Zembl. A. polaris Bdv. (Labrador, Arct. Amer. ad 81° 52' N., Norv. bor. 71°. A. thore Hb. v. borealis Staud. (Lapland, Altai, Amur). A. eugenia Ev. (Sib. et bor. Dudinska 69° N.) (Ist wohl nicht von gemmata Butl. verschieden. P.)

Elwes bemerkt zu den vorgenannten Arten:

A. chariclea ist circumpolar, bis jetzt nur an einzelnen Stellen in Lappland und Sibirien gefunden, dagegen in Labrador, Britisch Amerika und Grönland überall verbreitet. Im hohen Norden tritt sie als obscurata in verdunkeltem

Gewand, in Rocky mountains und gelegentlich in Labrador als *Boisduvali* auf, welche bereits von Edwards als eigene Art angesehen wird. *Charicela* geht höher hinauf als jede andere Art, mit Ausnahme von *A. polaris*.

*A. frigga* ist ebenfalls circumpolar. Labrador-Exemplare zeigen weisse oder gelbliche Flecke auf der Unterseite der Hinterflügel. Die *v. improba* kommt seltsamerweise in so weit entfernten Gegenden wie *Novaja Semlja* und arktisch Amerika vor; sie ist klein und dunkler.

*A. freija* ist sehr weit verbreitet, ohne wesentlich zu variiren. Exemplare vom Yellowstonepark sind nicht zu unterscheiden von solchen von Lappland und Schweden. In Europa geht sie nicht südlicher als 58 oder 59° in Esthland und 60° in Schweden, sie geht bis 70° in Lappland und Sibirien. In den Rocky mountains geht sie bis 40° in Colorado nördlich bis Port Simpson 62° N. *Tarquinius* ist nur eine dunkle arktische Varietät, welche auch in British Columbia auftrat.

Von Lappland werden noch aufgeführt: Bei Tengström *A. aglaja* L.; bei Petersen: *A. ino* Esp., *A. lathonia* L., *A. niobe* (sehr selten), *A. adippe* (sehr selten) und im südlichen Lappland *A. paphia*.

*Anhang No. 25.* S. S. 214.

Die arktischen *Erebia* finden nachfolgende Erwähnung bei: Elwes, on the genus *Erebia*, Trans. Ent. Soc. London 1889, p. 317 ff. Er zählt 3 Arten aus dem arktischen Europa, 4 oder vielleicht 5 aus arktischem Amerika auf, wovon *sofia* und *fasciata* eigenthümlich sind, während *discoidalis* sich nach dem östlichen und nördlichen Asien ausdehnt. *E. disa* ist circumpolar. *Erebia sofia* Strecker (Fort Churchill, Hudson Bay). *E. medusa v. polaris* Staud. (Lappland, Norv. bor., Finmarken.) *E. lappona* Esp. (*manto* F.) (*Scandinaviae montes*, Lappland, Alpen, Pyrenäen, eigenthümlicher Weise nicht im arktischen Amerika oder Asien.) *E. discoidalis* Kirby (America bor., Hudson Bay, Brit. Col., Asia bor. 70° von Pochrofska am oberen Amur bis zu den Ufern des Jenissei, auch im Westen der Hudson Bay, vielleicht auch an anderen Plätzen von Northwest-Amerika oder Nordost-Asien.) *E. ligea* L. (*Scand. montes*), var. *euryaloides* Tengstr. (Fen. Ross. occ. et bor.) *V. jennisseiensis* Tryb. (*Jenissei flumen* 62—68°) *E. embla* Thbg. (*Scand. centr. et bor., Rossia. sept., Sib. bor. ad 70°, Amur.*) *E. disa* Thbg. (*Lapl., Ross. bor., Sib. bor. ad 70°.*) ? Var. *mancinus* Doubl. (*Am. bor., Alaska, Brit. Col.) v. rossii* Curtis (*Am. arct. 67—68° N. B., Boothia felix, St. Lawrence Bay, N. E. Asia.*) *E. fasciata* Butl. (*Am. arctica, Cambridge Bay, Hudson Bay.*) *Embla, disa* und *fasciata* sind nordische Formen von grosser Ausbreitung. *E. rossii* ist vielleicht besondere Art. *E. cyclopius* Er. (*Sib.*) *v. intermedia* Tryb. (*Jenissei 65° N. Br.*) *E. ero* Brem. (*Amur, Jenissei 70°.*) Vielleicht nur Varietät von *disa*.

---

Tabellarische Zusammenstellung  
der  
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen  
der  
**Station Wiesbaden**  
in den Jahren 1870—1895 incl.

nebst den Angaben

der 26jährigen Mittelwerthe, der höchsten und tiefsten  
Barometer- und Thermometerstände und der Summen der  
weiteren Beobachtungen dieses Zeitraumes.

Von

**Aug. Römer**, Conservator.  
(Wiesbaden.)



# Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse der in den Jahren 1870—1895 incl., nebst Angaben der 26jährigen Mittel- der Summen der weiteren Be-

Oestliche Länge von Greenwich = 8° 14'. Nördliche Breite =

Jahr.	Luftdruck reduc. auf 0° C.					Luft.			
	Mittel.	Maxi- mum.	Datum.	Mini- mum.	Datum.	7 <sup>h</sup> a.	2 <sup>h</sup> p.	9 <sup>h</sup> p.	Mittel
	mm	mm		mm		C.°	C.°	C.°	C.°
1870 . . .	751,8	766,8	30. IX.	728,6	9. X.	6,1	12,2	7,7	8,4
1871 . . .	752,2	766,6	12. XII.	733,4	2. X.	5,5	11,4	7,0	7,7
1872 . . .	749,8	763,7	3. III.	728,1	10. XII.	7,8	13,6	9,3	10,0
1873 . . .	751,8	771,1	18. II.	722,1	20. I.	7,5	13,5	9,0	9,8
1874 . . .	752,4	768,6	2. II.	725,6	9. XII.	6,5	12,9	8,1	9,0
1875 . . .	752,2	768,6	31. I.	725,6	2. XI.	6,7	12,7	8,2	9,0
1876 . . .	751,0	770,2	24. I.	726,1	12. III.	7,3	12,9	8,7	9,4
1877 . . .	751,2	769,3	22. I.	730,1	25. XI.	7,2	12,7	9,0	9,5
1878 . . .	750,6	768,1	13. I.	726,2	29. III.	7,6	12,7	9,0	9,6
1879 . . .	751,2	773,5	23. XII.	726,2	17. II.	5,9	11,0	7,1	7,8
1880 . . .	753,0	769,8	7. XII.	729,8	16. XI.	7,5	13,3	9,1	9,8
1881 . . .	751,5	769,0	26. XII.	728,6	11. II.	6,7	12,4	8,3	8,9
1882 . . .	751,4	775,5	16. I.	729,9	26. III.	7,4	12,6	8,8	9,4
1883 . . .	752,0	770,6	23. II.	731,7	26. III.	7,1	12,8	8,6	9,3
1884 . . .	752,6	769,1	19. I.	722,7	20. XII.	7,8	13,4	9,1	9,8
1885 . . .	751,2	766,5	16. XII.	730,6	11. I.	6,9	12,5	8,2	9,0
1886 . . .	751,1	772,2	8. II.	723,8	8. XII.	7,3	13,1	8,8	9,5
1887 . . .	753,0	770,5	7. II.	730,8	6. I.	6,4	11,6	7,6	8,3
1888 . . .	752,0	769,2	10. I.	729,1	29. III.	6,7	11,4	7,7	8,4
1889 . . .	751,9	770,8	20. XI.	729,9	9. II.	7,1	12,0	8,2	8,9
1890 . . .	752,1	769,1	7. I.	727,8	23. I.	7,0	12,2	8,4	9,0
1891 . . .	752,4	770,4	12. XII.	735,1	11. III.	7,0	12,1	8,2	8,9
1892 . . .	751,3	766,5	28. XI.	731,4	17. II.	7,0	12,5	8,5	9,1
1893 . . .	752,5	772,1	29. XII.	725,5	22. II.	7,4	12,9	9,1	9,6
1894 . . .	752,3	768,2	25. XII.	731,3	30. XII.	7,7	12,4	9,2	9,6
1895 . . .	750,8	765,9	28. II.	729,3	13. XII.	6,8	12,3	8,6	9,1
Summa . .	19545,3	—	—	—	—	181,9	325,1	219,5	236,8
Mittel . .	751,7	—	—	—	—	7,0	12,5	8,4	9,1
Maximum .	—	775,5	16. I. 1882	—	—	—	—	—	—
Minimum .	—	—	—	722,1	20. I. 1873	—	—	—	—

# meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden

werthe, der höchsten und tiefsten Barometer- und Thermometerstände und obachtungen dieses Zeitraumes.

50° 5'. Höhe des Barometers über dem Meere = 113,5 Meter.

temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
Absol. Max.	Datum.	Absol. Minim.	Datum.	7 <sup>h</sup> a.	2 <sup>h</sup> p.	9 <sup>h</sup> p.	Mittel.	7 <sup>h</sup> a.	2 <sup>h</sup> p.	9 <sup>h</sup> p.	Mittel.
C. <sup>o</sup>		C. <sup>o</sup>		mm	mm	mm	mm	0/0	0/0	0/0	0/0
33,8	11. VII.	—16,0	24. XII.	6,4	6,5	6,5	6,5	84	60	77	74
31,5	18. VII.	—18,2	8. XII.	6,4	6,7	6,6	6,6	86	64	81	77
32,0	27. VII.	— 5,2	2. II.	7,2	7,4	7,3	7,3	88	64	82	78
32,0	23. VII.	— 8,2	31. XII.	7,0	7,2	7,2	7,1	86	62	80	76
32,5	3. VII.	—17,0	29. XII.	6,6	6,6	7,0	6,7	86	59	81	76
32,5	18. VIII.	—15,5	7. XII.	6,7	6,8	7,0	6,8	85	60	80	75
32,5	16. VIII.	—12,5	2. I.	6,9	7,2	7,0	7,0	85	64	79	76
32,5	12. VI.	— 9,3	2. III.	7,1	7,1	7,2	7,1	87	63	81	78
29,0	23. VII.	—10,3	11. XII.	7,2	7,4	7,5	7,4	88	66	84	79
32,0	3. VIII.	—20,0	10. XII.	6,7	6,9	7,0	6,9	87	66	84	79
31,5	16. VII.	—16,5	20. I.	7,0	7,0	7,0	7,0	83	60	76	73
35,0	20. VII.	—18,8	22. I.	6,6	6,6	6,7	6,6	82	60	76	73
30,0	24. VI.	— 8,5	4. II.	7,0	7,3	7,3	7,2	87	65	82	78
31,0	3. VII.	—10,5	17. III.	6,8	6,6	7,1	6,8	85	60	80	75
33,8	13. VII.	—10,0	26. XI.	7,0	6,9	7,2	7,0	84	59	80	74
29,6	29. V.	—15,0	12. XII.	6,8	6,8	7,0	6,9	86	62	81	76
31,0	22. V.	—12,0	12. I.	7,1	7,0	7,4	7,2	86	61	81	76
31,9	30. VII.	—14,5	31. XII.	6,5	6,3	6,8	6,5	83	63	81	75
31,1	4. VI.	—17,4	1. I.	6,6	6,7	6,8	6,7	84	65	81	77
30,4	2. VI.	—16,9	13. II.	7,1	7,4	7,3	7,3	84	68	82	78
29,2	1. VIII.	—13,4	19. XII.	7,0	7,4	7,4	7,3	85	66	82	78
30,0	1. VII.	—14,5	19. I.	7,1	7,5	7,4	7,3	86	68	84	79
36,0	17. VIII.	—16,0	18. II.	6,9	7,2	7,1	7,1	82	64	79	75
31,6	19. VIII.	—18,9	17. I.	6,9	7,2	7,2	7,1	83	64	78	75
34,0	25. VII.	—13,3	4. I.	7,1	7,6	7,5	7,4	85	68	82	78
32,5	28. VII.	—18,4	8. II.	7,0	7,7	7,5	7,4	85	68	82	78
—	—	—	—	178,7	183,0	185,0	182,2	2212	1649	2096	1986
—	—	—	—	6,0	6,1	6,2	6,1	85	63	80	76
36,0	17. VIII. 1892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—20,0	10. XII. 1879	—	—	—	—	—	—	—	—



Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse der  
in den Jahren 1870—1895 incl., nebst Angaben der 26jährigen Mittel-  
der Summen der weiteren Be-

Oestliche Länge von Greenwich = 8° 14'. Nördliche Breite =

Jahr.	Luftdruck reduc. auf 0° C.					Luft.			
	Mittel.	Maxi- mum.	Datum.	Mini- mum.	Datum.	7 h a.	2 h p.	9 h p.	Mittel.
	mm	mm		mm		° C	° C	° C	° C
1870 . . .	751,8	766,8	30. IX.	728,6	9. X.	6,1	12,2	7,7	8,4
1871 . . .	752,2	766,6	12. XII.	733,4	2. X.	5,5	11,4	7,0	7,7
1872 . . .	749,8	763,7	3. III.	728,1	10. XII.	7,8	13,6	9,3	10,9
1873 . . .	751,8	771,1	18. II.	722,1	20. I.	7,5	13,5	9,0	9,8
1874 . . .	752,4	768,6	2. II.	725,6	9. XII.	6,5	12,9	8,1	9,0
1875 . . .	752,2	768,6	31. I.	725,6	2. XI.	6,7	12,7	8,2	9,0
1876 . . .	751,0	770,2	24. I.	726,1	12. III.	7,3	12,9	8,7	9,4
1877 . . .	751,2	769,3	22. I.	730,1	25. XI.	7,2	12,7	9,0	9,3
1878 . . .	750,6	768,1	13. I.	726,2	29. III.	7,6	12,7	9,0	9,6
1879 . . .	751,2	773,5	23. XII.	726,2	17. II.	5,9	11,0	7,1	7,8
1880 . . .	753,0	769,8	7. XII.	729,8	16. XI.	7,5	13,3	9,1	9,8
1881 . . .	751,5	769,0	26. XII.	728,6	11. II.	6,7	12,4	8,3	8,9
1882 . . .	751,4	775,5	16. I.	729,9	26. III.	7,4	12,6	8,8	9,4
1883 . . .	752,0	770,6	23. II.	731,7	26. III.	7,1	12,8	8,6	9,3
1884 . . .	752,6	769,1	19. I.	722,7	20. XII.	7,8	13,4	9,1	9,8
1885 . . .	751,2	766,5	16. XII.	730,6	11. I.	6,9	12,5	8,2	9,9
1886 . . .	751,1	772,2	8. II.	723,8	8. XII.	7,3	13,1	8,8	9,5
1887 . . .	753,0	770,5	7. II.	730,8	6. I.	6,4	11,6	7,6	8,3
1888 . . .	752,0	769,2	10. I.	729,1	29. III.	6,7	11,4	7,7	8,4
1889 . . .	751,9	770,8	20. XI.	729,9	9. II.	7,1	12,0	8,2	8,9
1890 . . .	752,1	769,1	7. I.	727,8	23. I.	7,0	12,2	8,4	9,9
1891 . . .	752,4	770,4	12. XII.	735,1	11. III.	7,0	12,1	8,2	8,9
1892 . . .	751,3	766,5	28. XI.	731,4	17. II.	7,0	12,5	8,5	9,1
1893 . . .	752,5	772,1	29. XII.	725,5	22. II.	7,4	12,9	9,1	9,6
1894 . . .	752,3	768,2	25. XII.	731,3	30. XII.	7,7	12,4	9,2	9,6
1895 . . .	750,8	765,9	28. II.	729,3	13. XII.	6,8	12,3	8,6	9,1
Summa . .	19545,3	—	—	—	—	181,9	325,1	219,5	234,8
Mittel . .	751,7	—	—	—	—	7,0	12,5	8,4	9,1
Maximum .	—	775,5	16. I. 1882	—	—	—	—	—	—
Minimum .	—	—	—	722,1	20. I. 1873	—	—	—	—

meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden  
werthe, der höchsten und tiefsten Barometer- und Thermometerstände und  
obachtungen dieses Zeitraumes.

3. Höhe des Barometers über dem Meere = 113,5 Meter.

Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
Absol. Max.	Datum.	Absol. Minim.	Datum.	7 h a.	2 h p.	9 h p.	Mittel.	7 h a.	2 h p.	9 h p.	Mittel.
° C		° C		mm	mm	mm	mm	%	%	%	%
33,8	11. VII.	-16,0	24. XII.	6,4	6,5	6,5	6,5	84	60	77	74
31,5	18. VII.	-18,2	8. XII.	6,4	6,7	6,6	6,6	86	64	81	77
29,9	27. VII.	- 5,2	2. II.	7,2	7,4	7,3	7,3	88	64	82	78
32,0	23. VII.	- 8,2	31. XII.	7,0	7,2	7,2	7,1	86	62	80	76
32,5	3. VII.	-17,0	29. XII.	6,6	6,6	7,0	6,7	86	59	81	76
25,5	18. VIII.	-15,5	7. XII.	6,7	6,8	7,0	6,8	85	60	80	75
25,5	16. VIII.	-12,5	2. I.	6,9	7,2	7,0	7,0	85	64	79	76
25,5	12. VI.	- 9,3	2. III.	7,1	7,1	7,2	7,1	87	63	81	78
29,9	23. VII.	-10,3	11. XII.	7,2	7,4	7,5	7,4	88	66	84	79
29,9	3. VIII.	-20,0	10. XII.	6,7	6,9	7,0	6,9	87	66	84	79
29,9	16. VII.	-16,5	20. I.	7,0	7,0	7,0	7,0	83	60	76	73
29,9	20. VII.	-18,8	22. I.	6,6	6,6	6,7	6,6	82	60	76	73
29,9	24. VI.	- 8,5	4. II.	7,0	7,3	7,3	7,2	87	65	82	78
29,9	3. VII.	-10,5	17. III.	6,8	6,6	7,1	6,8	85	60	80	75
29,9	13. VII.	-10,0	26. XI.	7,0	6,9	7,2	7,0	84	59	80	74
29,9	20. V.	-15,0	12. XII.	6,8	6,8	7,0	6,9	86	62	81	76
29,9	3. VI.	-12,0	12. I.	7,1	7,0	7,4	7,2	86	61	81	76
29,9	30. VII.	-14,5	31. XII.	6,5	6,3	6,8	6,5	83	63	81	75
29,9	4. VI.	-17,4	1. I.	6,6	6,7	6,8	6,7	84	65	81	77
29,9	2. VI.	-16,9	13. II.	7,1	7,4	7,3	7,3	84	68	82	78
29,9	1. VIII.	-13,4	19. XII.	7,0	7,4	7,4	7,3	85	66	82	78
29,9	1. VII.	-14,5	19. I.	7,1	7,5	7,4	7,3	86	68	84	79
29,9	17. VII.	-16,0	18. II.	6,9	7,2	7,1	7,1	82	64	79	75
29,9	19. VIII.	-18,9	17. I.	6,9	7,2	7,2	7,1	83	64	78	75
29,9	25. VII.	-13,3	4. I.	7,1	7,6	7,5	7,4	85	68	82	78
29,9	28. VII.	-18,4	8. II.	7,0	7,7	7,5	7,4	85	68	82	78
—	—	—	—	178,7	183,0	185,0	182,2	2212	1649	2096	1986
—	—	—	—	6,0	6,1	6,2	6,1	85	63	80	76
—	17. VIII. 1892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	-20,0	10. XII. 1879	—	—	—	—	—	—	—	—



Jahr.	Bewölkung wolkenlos = 0. bedeckt = 10.				Niederschlag.			Zahl der		
	7 <sup>h</sup> a.	2 <sup>h</sup> p.	9 <sup>h</sup> p.	Mittel.	Sum- ma. mm	Maxi- mum in 24 Stun- den. mm	Datum.	Regen.	Schnee.	Grampeln und Hagel.
1870 . . .	—	—	—	—	776,1	33,6	28. VII.	132	22	2
1871 . . .	—	—	—	—	611,6	32,9	31. VIII.	132	31	4
1872 . . .	—	—	—	—	714,2	16,3	30. XI.	186	12	4
1873 . . .	—	—	—	—	441,5	33,7	8. XI.	140	24	2
1874 . . .	—	—	—	—	456,9	27,5	21. VII.	124	23	4
1875 . . .	—	—	—	—	680,7	32,7	2. V.	130	22	2
1876 . . .	—	—	—	—	637,3	36,1	16. VI.	148	24	7
1877 . . .	—	—	—	—	649,2	22,2	11. VIII.	171	28	2
1878 . . .	—	—	—	—	719,4	29,1	1. V.	173	29	3
1879 . . .	—	—	—	—	637,9	24,8	20. VII.	181	26	6
1880 . . .	6,8	6,7	5,8	6,4	653,5	28,2	7. X.	164	18	2
1881 . . .	5,9	7,0	6,8	6,6	520,4	36,6	17. VIII.	175	29	1
1882 . . .	7,2	7,5	6,9	7,2	919,5	28,4	12. VII.	188	18	8
1883 . . .	6,7	7,2	6,0	6,6	554,4	19,2	13. VII.	147	23	5
1884 . . .	6,6	7,3	5,8	6,5	549,2	42,2	19. V.	137	24	6
1885 . . .	6,6	7,0	5,3	6,3	610,5	29,3	5. VIII.	149	17	8
1886 . . .	6,8	6,8	5,7	6,4	779,9	28,0	16. X.	146	39	4
1887 . . .	6,5	6,8	5,8	6,4	529,6	21,7	15. XI.	138	37	7
1888 . . .	6,6	6,4	5,6	6,2	620,3	24,0	10. X.	150	33	8
1889 . . .	7,3	7,1	6,3	6,9	505,5	22,0	12. VIII.	152	45	9
1890 . . .	6,6	6,6	5,8	6,3	598,3	20,0	24. I.	163	20	3
1891 . . .	7,2	6,8	5,9	6,6	684,5	40,5	26. VI.	165	41	11
1892 . . .	6,4	6,4	5,5	6,1	401,0	26,0	31. V.	139	35	11
1893 . . .	6,1	6,1	5,4	5,9	567,1	24,0	6. VII.	151	27	6
1894 . . .	6,8	6,9	6,0	6,6	618,4	40,5	23. X.	177	15	7
1895 . . .	6,2	6,1	5,9	6,1	545,2	24,5	24. X.	139	41	6
Summa . .	106,3	108,7	94,5	103,1	15782,1	—	—	3997	703	138
Mittel . .	6,6	6,8	5,9	6,4	—	—	—	—	—	—
Maximum .	—	—	—	—	—	42,2	19. V. 1884	—	—	—

Anmerkungen. Die täglichen Beobachtungsstunden waren in der Zeit vom Jahre

1. Januar 1887 anfangend, auf 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr

Die Jahres-Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen werden vom hiesige Station II. Ordnung gehört, im meteorologischen Jahrbuch, Beobach-

Die Bewölkung, deren Angaben in Stärkegraden durch Zahlen in den werden. Auch die Spalte der Windstillen während derselben Zeit musste



Tage mit		Zahl der			Zahl der Beobachtungen.								
Gewitter.	Nebel.	heiteren Tage (wolkenlos),	trüben Tage (bedeckt),	Sturm- tage.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Windstillen.
18	22	42	196	4	145	231	101	46	26	246	140	160	—
21	53	44	180	2	100	193	154	70	29	267	98	184	—
21	21	11	220	4	116	142	119	125	65	293	107	131	—
25	18	17	220	4	102	157	125	70	50	301	113	177	—
21	20	13	198	4	189	89	123	44	68	219	153	210	—
26	13	69	140	2	119	261	113	69	43	194	94	202	—
22	32	57	141	6	125	216	86	90	58	252	117	154	—
16	13	41	134	6	87	116	68	56	47	296	188	237	—
39	12	21	155	4	95	146	87	93	79	299	112	184	—
27	14	45	131	11	85	215	78	81	72	253	117	194	—
20	16	55	140	5	86	189	96	88	45	263	92	141	98
12	40	47	163	6	72	173	126	74	34	214	91	165	146
18	41	31	185	6	61	115	69	59	36	252	102	136	265
22	30	47	156	4	58	164	101	46	32	211	130	190	163
24	25	54	158	5	66	177	81	70	42	205	103	167	187
13	22	56	142	6	130	126	75	83	58	220	66	119	218
19	12	61	156	—	116	110	100	68	41	259	87	110	204
14	24	56	147	—	137	152	92	60	32	213	71	129	209
25	29	48	172	—	99	138	99	32	22	274	101	124	209
24	26	36	164	2	107	174	84	39	23	208	115	130	215
18	17	52	146	—	93	148	64	71	37	203	115	124	240
21	18	38	147	2	121	119	78	33	33	235	122	122	232
15	14	65	137	1	107	130	74	57	46	205	123	121	235
14	10	75	128	1	158	99	115	54	27	213	82	145	202
18	10	55	159	4	99	136	110	53	52	253	101	115	176
22	5	59	125	3	135	131	94	49	51	199	103	137	196
535	557	1195	4140	92	2808	4047	2512	1680	1148	6247	2843	4008	3195
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1870—1887 6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abends, sind aber vom Abends (Ortszeit) verlegt worden.

Königlich preussischen meteorologischen Institute zu Berlin, zu dessen Verbands-Veröffentlichungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten, veröffentlicht.

Jahren von 1870—1879 nicht angegeben worden waren, konnten nicht berechnet ausgefüllt bleiben.



Jahr.	Bewölkung wolkenlos = 0. bedeckt = 10.				Niederschlag.			Zahl der			Zahl der			Zahl der Beobachtungen.											
	7h a.	2h p.	9h p.	Mittel.	Summa. mm	Maximum in 24 Stunden. mm	Datum.	Regen.	Schnee.	Graupeln und Hagel.	Gewitter.	Nebel.	heiteren Tage (wolkenlos).	trüben Tage (bedeckt).	Sturm- tage.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Windstillen.	
1870	—	—	—	—	776,1	33,6	28. VII.	132	22	—	—	—	42	196	4	145	231	101	46	26	246	140	160	—	
1871	—	—	—	—	611,6	32,9	31. VIII.	132	31	—	—	—	53	180	2	100	193	154	70	29	267	98	184	—	
1872	—	—	—	—	714,2	16,3	30. XI.	186	12	—	—	—	21	11	4	116	142	119	125	65	293	107	131	—	
1873	—	—	—	—	441,5	33,7	8. XI.	140	24	—	—	—	18	17	4	102	157	125	70	50	301	113	177	—	
1874	—	—	—	—	456,9	27,5	21. VII.	124	23	—	—	—	20	13	4	189	89	123	44	68	219	153	210	—	
1875	—	—	—	—	680,7	32,7	2. V.	130	22	—	—	—	13	69	40	2	119	261	113	69	43	194	94	202	—
1876	—	—	—	—	637,3	36,1	16. VI.	148	24	—	—	—	32	57	141	6	125	216	86	90	58	252	117	154	—
1877	—	—	—	—	649,2	22,2	11. VIII.	171	28	—	—	—	13	41	134	6	87	116	68	56	47	296	188	237	—
1878	—	—	—	—	719,4	29,1	1. V.	173	29	—	—	—	12	21	155	4	95	146	87	93	79	299	112	184	—
1879	—	—	—	—	637,9	24,8	20. VII.	181	26	—	—	—	14	45	131	11	85	215	78	81	72	253	117	194	—
1880	6,8	6,7	5,8	6,4	653,5	28,2	7. X.	164	18	2	—	—	16	55	140	5	86	189	96	88	45	263	92	141	98
1881	5,9	7,0	6,8	6,6	520,4	36,6	17. VIII.	175	29	1	—	—	40	47	163	6	72	173	126	74	34	214	91	165	146
1882	7,2	7,5	6,9	7,2	919,5	28,4	12. VII.	188	18	—	—	—	41	31	185	6	61	115	69	59	36	252	102	136	265
1883	6,7	7,2	6,0	6,6	554,4	19,2	13. VII.	147	23	—	—	—	30	47	156	4	58	164	101	46	32	211	130	190	163
1884	6,6	7,3	5,8	6,5	549,2	12,2	19. V.	137	24	—	—	—	25	54	158	5	66	177	81	70	42	205	103	167	187
1885	6,6	7,0	5,3	6,3	610,5	29,3	5. VIII.	149	17	—	—	—	22	56	142	6	130	126	75	83	58	220	66	119	218
1886	6,8	6,8	5,7	6,4	779,9	28,0	16. X.	146	39	4	—	—	12	61	156	—	116	110	100	68	41	259	87	110	204
1887	6,5	6,8	5,8	6,4	529,6	21,7	15. XI.	138	37	7	—	—	24	56	147	—	137	152	92	60	32	213	71	129	209
1888	6,6	6,4	5,6	6,2	620,3	24,0	10. X.	150	33	—	—	—	29	48	172	—	99	138	99	32	22	274	101	124	209
1889	7,3	7,1	6,3	6,9	505,5	22,0	12. VIII.	152	45	2	—	—	26	36	164	2	107	174	84	39	23	208	115	130	215
1890	6,6	6,6	5,8	6,3	598,3	20,0	24. I.	163	26	—	—	—	17	52	146	—	93	148	64	71	37	203	115	124	240
1891	7,2	6,8	5,9	6,6	684,5	40,5	26. VI.	165	41	11	—	—	18	38	147	2	121	119	78	33	33	235	122	122	232
1892	6,4	6,4	5,5	6,1	401,0	26,0	31. V.	139	35	11	—	—	14	65	137	1	107	130	74	57	46	205	123	121	235
1893	6,1	6,1	5,4	5,9	567,1	24,0	6. VII.	151	27	6	—	—	10	75	128	1	158	99	115	54	27	213	82	145	202
1894	6,8	6,9	6,0	6,6	618,4	40,5	23. X.	177	15	7	—	—	10	55	159	4	99	136	110	53	52	253	101	115	176
1895	6,2	6,1	5,9	6,1	545,2	24,5	24. X.	139	41	6	—	—	5	59	125	3	135	131	94	49	51	199	103	137	196
Summa	106,3	108,7	94,5	103,1	15782,1	—	—	3997	703	—	—	—	567	1195	4140	92	2808	4047	2512	1680	1148	6247	2843	4008	3195
Mittel	6,6	6,8	5,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maximum	—	—	—	—	—	42,2	19. V. 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmerkungen. Die täglichen Beobachtungsstunden waren in der Zeit vom Jahre 1. Januar 1887 anfangend, auf 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr

Die Jahres-Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen werden von hiesiger Station II. Ordnung gehört, im meteorologischen Jahrbuch, herausgegeben

Die Bewölkung, deren Angaben in Stärkegraden durch Zahlen 0 bis 10 ausgedrückt werden. Auch die Spalte der Windstillen während derselben Zeit angegeben

1870—1887 6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abends, sind aber vom hiesigen (Ortszeit) verlegt worden.

Das meteorologische Institut zu Berlin, zu dessen Verbands die meteorologischen Institute des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten, veröffentlicht. Die Beobachtungen von 1870—1879 nicht angegeben worden waren, konnten nicht berechnet werden.



# Ergebnisse

der

meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden

im Jahre 1896.

Von

Aug. Römer,

Conservator.

---

Die beigefügte Tabelle ergibt folgende

## Jahres-Uebersicht.\*)

Mittlerer Luftdruck . . . . .	752,8 mm
Höchster beobachteter Luftdruck am 29. Januar . . .	773,7 «
Niedrigster « « « 14. December . . .	728,9 «
Mittlere Lufttemperatur . . . . .	9,4° C.
Höchste beobachtete Lufttemperatur am 10. Juli . . .	32,0 «
Niedrigste « « « 1. Januar . . .	— 7,6 «
Höchstes Tagesmittel der « « 15. Juni . . .	23,6 «
Niedrigstes « « « 10. Januar . . .	— 4,6 «
Mittlere absolute Feuchtigkeit . . . . .	7,3 mm
« relative « . . . . .	78 %
Höhensumme der atmosphärischen Niederschläge . . .	553 mm
Grösste Regenhöhe innerhalb 24 Stunden am 26. August .	38,5 «

---

\*) Die Beobachtungsstunden sind: 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. (Ortszeit.)



# Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der Station Wiesbaden

im Jahre 1896.

Oestliche Länge von Greenwich = 8° 14'. Nördliche Breite = 50° 5'. Höhe des Barometers über dem Meere = 113,5 Meter.

Monate	Luftdruck reduc. auf 0° C.					Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit						
	Maximum		Minimum		Datum	7h a.	2h p.	9h p.	Mittel	Mittel. Max.	Mittel. Min.	Differenz.	Abso- lutes Max.	Datum		Abso- lutes Min.	Datum		7h a.	2h p.	9h p.	Mittel	7h a.	2h p.	2h p.	Mittel
	mm	mm	mm	mm	mm	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	mm	mm	mm	mm	mm	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	C.º	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Januar .	760,6	773,7	29	736,2	14	0,8	2,0	1,1	1,2	2,9	-0,5	3,4	7,4	17	-7,6	11	4,3	4,5	4,4	4,4	89	84	87	87		
Februar .	60,7	70,8	3	47,6	26	-0,4	3,4	1,0	1,3	4,0	-1,1	5,1	11,0	12	-5,9	25	3,9	4,2	4,2	4,1	88	71	84	81		
März .	48,5	61,3	10	30,4	4	5,0	10,3	7,6	7,6	11,6	4,4	7,2	20,5	25	0,0	11,14	5,6	6,1	6,2	6,0	84	66	78	76		
April .	54,1	62,2	21	43,1	13	6,3	10,8	8,0	8,3	11,9	4,9	7,0	19,5	27	-3,9	3	5,9	6,2	6,3	6,1	81	64	78	74		
Mai .	53,8	58,5	12	45,2	20	10,8	17,7	13,0	13,6	18,3	8,3	10,0	24,0	12	3,4	6	6,8	6,8	7,3	7,0	70	45	65	60		
Juni .	50,8	57,9	19	40,1	9	16,2	22,4	17,3	18,3	23,7	13,6	10,1	28,6	15	9,9	23,30	10,8	10,8	11,4	11,0	78	54	77	70		
Juli .	52,2	58,6	6	47,2	4	16,0	22,5	17,5	18,4	23,6	14,0	9,6	32,0	10	8,4	3	11,0	11,4	11,8	11,4	81	57	79	72		
August .	51,6	58,5	29	40,7	26	13,7	19,0	15,3	15,8	20,1	12,2	7,9	24,5	1	5,9	27	10,2	11,1	10,9	10,7	87	68	85	80		
September	49,3	61,1	30	29,2	25	12,0	17,0	13,1	13,8	18,0	10,5	7,5	22,6	18	5,5	25	9,6	10,9	10,2	10,2	91	74	90	85		
October .	47,9	59,4	1	33,0	29	7,9	12,0	9,0	9,5	12,7	6,5	6,2	19,5	8	0,9	30	7,4	8,2	7,8	7,8	91	77	89	86		
November	54,1	67,4	22	38,6	15	2,5	5,3	3,4	3,6	6,0	1,5	4,5	9,2	16	-6,6	30	4,8	5,1	4,9	4,9	85	76	83	81		
December	50,1	65,3	26	28,9	14	0,3	1,7	1,0	1,0	2,7	-0,6	3,3	7,0	13	-5,3	1	4,2	4,4	4,4	4,3	89	85	89	88		
Jahr . .	752,8	773,7	29. I.	728,9	14. XII.	7,6	12,0	8,9	9,4	13,0	6,1	6,9	32,0	10. VI	-7,6	11. I.	7,0	7,5	7,5	7,3	84	68	82	78		

Monate.	Bewölkung wolkenlos = 0. bedeckt = 10.			Niederschlag.		Zahl der Tage mit								Zahl der						Zahl der Beobachtungen.									
	7h a.	2h p.	9h z.	Mittel.	Sum- ma. mm	Maxi- mum in 24 Stun- den. mm	Datum.	mehrs als 0,2mm Regen, Schnee, Grau- peln. mm	Regen.	Schnee.	Graupeln und Hagel.	Nebel.	Gewitter.	Wetterleucht.	heiteren Tage (wolkenlos).	trüben Tage (bedeckt).	Sturmtage.	Eistage.	Frosttage.	Sommertage.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.
Januar	8,5	8,5	8,2	8,4	32	19,0	15.	9	5	4	1	—	—	—	1	24	—	2	12	—	2	29	4	9	3	11	14	6	15
Februar	7,0	6,2	5,4	6,2	1	0,4	16.	1	1	3	—	1	—	—	8	15	—	1	17	—	9	19	8	2	3	17	4	8	17
März	7,0	7,0	7,5	7,2	48	9,0	2.	14	17	1	—	1	—	—	3	17	1	—	—	—	6	4	1	4	6	31	12	12	17
April	7,4	7,8	7,8	7,7	42	7,6	29.	14	18	1	5	—	—	—	2	16	—	1	—	—	27	2	—	—	2	15	3	32	9
Mai	4,4	5,0	4,1	4,5	6	2,4	1. 20.	4	6	—	—	—	1	—	10	5	—	—	—	—	48	20	4	1	—	—	—	17	3
Juni	6,0	7,0	6,8	6,6	52	15,0	26.	11	14	—	—	—	4	2	2	10	—	—	—	11	20	8	7	—	5	13	11	17	9
Juli	5,2	6,0	5,8	5,7	75	23,5	11.	11	12	—	—	—	5	2	7	9	—	—	—	14	9	6	7	4	7	17	5	13	25
August	7,3	7,7	6,5	7,1	77	38,5	26.	15	15	—	2	1	2	—	2	12	—	—	—	—	18	6	2	6	2	11	11	19	18
September	8,4	7,2	6,9	7,5	92	18,4	7.	22	22	—	—	—	1	3	—	13	—	—	—	—	4	3	1	4	2	25	16	6	29
October	8,5	7,4	8,0	8,0	63	13,3	20.	18	20	—	—	1	—	—	2	21	—	—	—	—	3	9	7	4	12	40	3	—	15
November	6,7	6,2	6,8	6,6	28	11,6	2.	8	10	1	—	1	—	—	6	16	—	—	—	—	13	30	5	—	2	12	3	8	17
December	9,4	9,5	9,5	9,5	37	7,6	15.	15	14	7	1	2	—	—	—	28	—	—	—	—	11	14	6	9	3	34	2	2	12
Jahr	7,2	7,1	6,9	7,1	553	38,5	26.VIII.	142	154	17	9	8	15	4	43	186	1	3	53	25	170	150	52	43	47	226	84	140	186

Zahl der Tage mit Niederschlag (mehr als 0,2 mm)	142
« « « « Regen	154
« « « « Schnee	17
« « « « Hagel	—
« « « « Graupeln	9
« « « « Thau	44
« « « « Reif	34
« « « « Nebel	8
« « « « Gewitter	15
« « « « Wetterleuchten	4
Zahl der heiteren (wolkenlosen) Tage	43
« « trüben (bedeckten) Tage	186
« « Sturmtage	1
« « Eistage	3
« « Frosttage	53
« « Sommertage	25
Zahl der beobachteten N.-Winde	170
« « « NE.-	150
« « « E.-	52
« « « SE.-	43
« « « S.-	47
« « « SW.-	226
« « « W.-	84
« « « NW.-	140
« « « Windstillen	186

# Skizze v. Neu-Guinea.




Maafsstab 1 : 12 000 000.





## Kartenskizze v. Neu-Guinea.



Maßstab 1:12 000 000.



JAHRBÜCHER

DES

NASSAUISCHEN VEREINS

FÜR

NATURKUNDE.

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. ARNOLD PAGENSTECHER,

KÖNIGL. GEH. SANITÄTSRATH, INSPECTOR DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS UND  
SECRETÄR DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE.

---

JAHRGANG 49.

MIT 4 LITHOGRAPHIRTEN TAFELN.

---

WIESBADEN.

VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1896.

Ergebnisse  
der  
**Anatomie und Entwicklungsgeschichte.**

Unter Mitwirkung von Fachgenossen  
herausgegeben von

**Fr. Merkel** in Göttingen und **R. Bonnet** in Greifswald.

**Bd. IV. Ueber das Jahr 1894.**

Preis M. 25.—.

Inhalt: **A. Anatomie.** Nervenendigungen in Drüsen von **E. Kallius**, Göttingen. — Knochen, Bänder, Muskeln von **Karl von Bardeleben**, Jena. — Cirkulationsorgane, sog. Blutgefäßdrüsen von **C. J. Eberth**, Halle. — Verdauungsorgane, von **A. v. Brunn**, Rostock. — Urogenitalsystem von **F. Hermann**, Erlangen. — Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse vom Flüssigkeitswechsel des Auges von **Th. Leber**, Heidelberg. — Gehörapparat von **A. Barth**, Breslau. — Nervensystem von **C. Golgi**, Pavia und **R. Fusari**, Bologna. — Regeneration und Involution von **D. Barfurth**, Dorpat. — Topographische Anatomie von **Er. Merkel**, Göttingen. — Die Ergebnisse der Gefrierdurchschnitte durch Schwangere von **A. Döderlein**, Leipzig. — Zelle von **W. Flemming**, Kiel.

**B. Entwicklungsgeschichte.** Zur Geschichte der Reptilien-Entwicklung von **H. Strahl**, Giessen. Das Zahnsystem der Wirbelthiere von **C. Röse**, München. — Die Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsdrüsen von **G. Born**, Breslau. — Die Probleme, welche sich aus dem Studium der Entwicklungsanomalien des menschlichen Embryos ergeben von **C. Giacomini**, Turin.

---

**365 Speisezettel für Zuckerkrank** mit 20 Rezepten über Zubereitung von Aleuronatbrot und Mehlspeisen. Von **F. W.** eleg. geb. M. 2.—.

---

**Kochbuch für Zuckerkrank und Fettleibige** unter Anwendung von Aleuronat-Mehl und -Pepton. Von **F. W.**, Verfasserin der „365 Speisezettel für Zuckerkrank“. M. 2.—.

---

**Practisches Kochbuch für chronisch Leidende.** Mit besonderer Berücksichtigung der Steinleidenden nebst practischen Winken für die Pflege der Letzteren. Nach ärztlichen Anordnungen zusammengestellt. Von **Louise Seick**, Kassel. M. 2.—.

---

**Lehrbuch der Schwedischen Heilgymnastik** unter Berücksichtigung der Herzkrankheiten. Mit 144 Abbildungen, 100 Uebungen und 40 Rezepten. Von Dr. med. **Henry Hughes** in Bad Soden. M. 6.—.

JAHRBÜCHER  
DES  
NASSAUISCHEN VEREINS  
FÜR  
NATURKUNDE.

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. ARNOLD PAGENSTECHER,

KÖNIGL. GEH. SANITÄTSRATH, INSPECTOR DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS UND  
SECRETÄR DES NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATURKUNDE.

---

JAHRGANG 50.

MIT EINEM PORTRÄT VON C. R. FRESENIUS  
UND EINER KARTEN-SKIZZE.

---

WIESBADEN.  
VERLAG VON J. F. BERGMANN.

1897.





**Naturwissenschaftliche Einführung in die Bakteriologie.** Von Dr. **Ferdinand Hnepppe**, Professor der Hygiene an der Deutschen Universität zu Prag. Mit 28 Holzschnitten im Texte. Preis: M. 6.—

**Vorlesungen über die Zelle und die einfachen Gewebe des thierischen Körpers.** Von Dr. **R. S. Bergh**, Dozent der Histologie und Embryologie an der Universität Kopenhagen. Mit 138 Figuren. Preis: M. 7.—

**Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte.** Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Prof. Dr. **Fr. Merkel** in Göttingen und Prof. Dr. **R. Bonnet** in Greifswald. V. Band: Ueber das Jahr 1895. Preis: ca. M. 25.—  
Jährlich ein Band. Bis jetzt erschienen vier Bände.

**Vorlesungen über allgemeine Embryologie.** Von Dr. **R. S. Bergh** in Kopenhagen. Mit 126 Figuren. Preis: M. 7.—

**Lehrbuch der Zoologie.** Nach morphogenischen Gesichtspunkten bearbeitet von Dr. **A. Fleischmann**, Privatdozent der Zoologie in Erlangen. I. Die Wirbelthiere. Mit 98 Abbildungen im Texte und 3 Farbendrucktafeln. Preis: M. 4.—

**Die Dottersack-Gefässe des Huhnes.** Von **Demetrius Popoff**, Assistenten a. d. geburtsh.-gynäkolog. Klinik des Professor A. Lebedeff der Militär-Medizin.-Akademie zu St. Petersburg. Mit 12 lithographirten Tafeln in Farbendruck. Preis: M. 27.—

**Lehrbuch der Histologie des Menschen** einschliesslich der mikroskopischen Technik. Von **A. A. Böhm**, Prosector und **M. v. Davidoff**, vorm. Assistent am Anatomischen Institut zu München. Mit 246 Abbildungen. Preis: M. 7.—, geb. M. 8.—

**Weitere Beiträge zur Blutlehre.** Von Dr. **Alexander Schmidt**, Professor ord. der Physiologie an der kaiserl. Universität Dorpat. Nach des Verfassers Tode herausgegeben. Preis: M. 7.—

**Beiträge zur Histologie des Nervensystems und der Sinnesorgane.** Von **Michael von Lenhossék** in Tübingen. Mit 3 Tafeln und 15 Figuren im Texte. Preis: M. 12,60

**Die Blutgefässe im Labyrinth des menschlichen Ohres.** Nach eigenen Untersuchungen an Celloidin-Korrosionen und an Schnitten. Von Dr. **F. Siebenmann**, Professor der Ohrenheilkunde und Laryngologie in Basel. Mit 11 Tafeln in Farbendruck. Preis: M. 36.—

**Lehrbuch der physiologischen Chemie.** Von **O. Hammarsten**, Professor der med. u. phys. Chemie an der Universität Upsala. Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage. Preis: M. 14,60

**Ergebnisse der Allgemeinen Pathologischen Morphologie und Physiologie des Menschen und der Thiere.** Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Professor Dr. **O. Lubarsch** in Rostock und Professor Dr. **R. Ostertag** in Berlin. Preis: M. 18,65

# SONNIGE WELTEN.

## Ostasiatische Reise-Skizzen

von

Emil und Lenore Selenka.

Mit 200 Abbildungen im Text und 9 facsimilirten Vollbildern.

**Preis Mk. 12 60, geb. Mk. 16.—**

**INHALT:** **Borneo.** Flussfahrt im Urwaldreich. — Im Heim der Dajaks: — Was wir bei unseren Dajakfreunden sahen und hörten. — Die Menschenaffen. — Unter den Kopffägern. — Aus dem Geistesleben der Dajaks (von Frau L. Selenka). — Vom alten Rajah (von Frau L. Selenka). **Japan.** Jung Japan. — In den Strassen von Tokio. Japans Menschen. — Unter japanischem Dach. — Ueber Sprache und Poesie. — Mit dem Tuschpinsel. — Beim Mikado zu Gast. — Blumenkult. — Nikko-Kekko. — Im Theehanse. — Theater (von Frau L. Selenka). — Japanische Schauspiele (von Frau L. Selenka). — Auf hoher See. — Ein Streifzug durch Java. — Aus Sumatra (Tagebuchblätter). (Von Frau L. Selenka). Aus den Padang'schen Hochlanden. — Durch das Barrisan-Gebirge. — Eine fürstliche Hochzeit im Hochlande. **Vom indischen Festland.** Die Tamilstadt Madura. — Von Calcutta in die Himalaya's. Die heilige Stadt. — Ein Denkmal der Arjamund. — Jeypur. — **Ceylon.** Neujahr auf dem Adamspik. — Teufeltänze. — In den Ruinen einer Königsstadt (von Frau L. Selenka).

In diesem eigenartigen, mit zweihundert Illustrationen geschmückten Werke ziehen fesselnde Bilder ostasiatischen Lebens an unserem Auge vorüber.

Nicht etwa zufällige Tageserlebnisse sind es, welche Verfasser und Verfasserin von ihren zweijährigen Reisen durch Borneo, Japan, Java, Sumatra und Vorderindien berichten, sondern intime Schilderungen jener Länder und des Geisteslebens ihrer Bewohner. Aus den Hütten der Eingeborenen, aus dem Volksgeiste heraus klingen die Erzählungen über Sitten und Religion der Dajaks, der Malayen, der Japaner, der Inder und Singhalesen uns entgegen. Das Streben nach objectiver Darstellung wird belebt durch eine warme Begeisterung für das rein Menschliche und die Anerkennung, das Geltenlassen auch Dessen, was den modernen Kulturbegriffen widerspricht.

Nicht erschöpfende Beschreibungen bieten die Verfasser, als vielmehr sorgfältige Skizzen, welche in frischer, ungezwungener Form charakteristische Züge der verschiedensten Nationen wiedergeben, hie und da belebt und ergänzt durch literarische Belege, von denen viele dem deutschen und europäischen Leserkreise hier zum ersten Male eröffnet werden.

Das drollige Gebahren zutraulicher Orang-utan-Kinder, wie die graziösen Pantomimen der japanischen Thechausmädchen, die ärztliche Prüfung eines Dajaks in Borneo, wie die frommen Gebetsübungen der Inder, hypnotische Zustände der Javanen wie Teufelsbeschwörungen der Singhalesen, das matriarchalische Familienleben der Sumatraner wie hinduistische Lebensregeln, das Strassenleben in Indiens Prachtstädten wie in Japans Kapitale, Scenerien des majestätischen Himalaya wie der Urwälder Borneos fesseln das Interesse des Lesers.

Um die Anschaulichkeit der Schilderung zu beleben, sind Photographieen, von denen der Autor viele selbst aufgenommen, sowie Farbendrucke, zeichnerische Darstellungen dem Texte als autotypische und lithographische, in den renommiertesten Anstalten hergestellte und vorzüglich gelungene Reproduktionen eingestreut. Treffliche Wahl und feinsinnige Anordnung der Illustrationen, die Lebendigkeit der Schilderungen verleihen dem vornehmen Buche den Charakter eines ergötzenden, anregenden, belehrenden Reisewerkes.

Gleich einem bunten Strausse ist das Buch locker zusammengefügt aus Blüten und Früchten, welche die Verfasser in den Sonnenlanden des fernen Ostens pflückten. Es wird der Oeffentlichkeit übergeben, „damit auch andere sich daran erfreuen mögen, die nicht mit eigenen Augen die Wunder des Ostens schauen noch Herz und Geist seiner Menschenkinder persönlich kennen lernen können“.















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01355 4985